

LOUIS VIDAL

DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES

1933

P 11247-1933 83218

LOUIS VIDAL *83218*

DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITES
PHARMACEUTIQUES

1933



83218

Transfert Bibliothèque


2014


Exclu du prêt

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE

107, Rue Lafayette, PARIS (X^e)

Tél. : Trudaine 41-05 et 06-84.





AU CORPS MÉDICAL

La XIV^e édition (1933)
du *DICTIONNAIRE de SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES* que nous avons le
plaisir de vous présenter comporte des perfec-
tionnements sensibles sur les précédentes.

Heureux de vous être
utiles et de reconnaître ainsi la bienveillance
que vous nous témoignez depuis de nombreuses
années, nous cherchons toujours à mieux faire.
A la veille du « Bon à tirer » nous avons l'impres-
sion, cette fois, de vous offrir un ouvrage complet,
dont la consultation simple, claire et sûre, doit
vous dispenser de toute autre documentation.

Nous avons incorporé
de nombreuses spécialités nouvelles, remanié,
complété le texte de chacune d'elles. L'indication
des prix est plus souvent mentionnée. La classi-
fication des spécialités par Laboratoires, créée
dans l'Édition précédente, a été mise au point.
Une sélection rigoureuse a été opérée, qui vous
permet de prescrire dans votre clientèle d'assurés
sociaux tous les produits, sans craindre la moindre
réaction administrative. Le format a été encore
une fois modifié, pour s'adapter plus heureuse-
ment à l'augmentation considérable du nombre
de pages.

Enfin, nous attirons tout particulièrement votre attention sur le remaniement total de la Première Partie.

Pour faciliter vos recherches, nous avons substitué à une Table par Indications Thérapeutiques — que la multiplicité des produits avait rendue insuffisante — une classification beaucoup plus détaillée. Pour chaque chapitre (Appareil Digestif, Respiratoire, etc...), nous avons groupé les spécialités sous deux dénominations différentes :

Thérapeutique Générale (T. G.)

Thérapeutique Spéciale (T. S.)

Dans la première, nous avons classé les produits par action médicamenteuse (cholagogues, eupeptiques, laxatifs, etc...), dans la deuxième, par affections (aérophagie, cirrhose, constipation, dyspepsie, etc...).

Nous nous sommes bornés à une simple nomenclature, nous abstenant de donner des conseils thérapeutiques déplacés. Cherchant le maximum de simplicité, nous avons maintenu l'ordre alphabétique de beaucoup plus pratique, auquel vous êtes déjà habitué.

Enfin, nous avons répété, en tête de chaque page, le nom du chapitre, pour permettre un maniement facile et rapide.

Certes, une transformation aussi complète représente un gros travail et il est possible que, pour la première fois, quelques

erreurs s'y soient glissées. Nous faisons appel à votre indulgence, une mise au point définitive se fera dans la prochaine Edition.

Nous remercions ici les nombreux Médecins qui ont bien voulu nous fournir leurs suggestions et leurs avis éclairés, et nous tenons également à remercier les Fabricants qui nous ont apporté leur appui financier. Bien rares sont ceux qui se sont abstenus ; tous ont compris l'intérêt d'une œuvre dont nous sommes fiers et considèrent que l'insertion au D. S. P. est aujourd'hui une nécessité.

Nous ne pouvions pas être mieux récompensés de notre persévérance et de nos efforts.

Nous sommes persuadés que notre *DICTIONNAIRE de SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES*, doyen des ouvrages de documentation spécialisée, restera pour vous l'ami fidèle, à portée de votre main, et continuera, comme par le passé, à vous rendre les services journaliers, auxquels vous êtes accoutumé.

Octobre 1932.

LOUIS VIDAL.

NOTA

**Les prix des spécialités
pharmaceutiques
donnés dans cet ouvrage
sont ceux pratiqués en France.
Ils varient
pour chacun des autres pays.**

Première Partie

**CLASSIFICATION DES CHAPITRES
par actions médicamenteuses
et
indications thérapeutiques**

I. — APPAREIL CIRCULATOIRE

Thérapeutique générale

Antispasmodiques artériels.
Diurétiques.
Hémostatiques.
Modérateurs cardiaques,
Toni-cardiaques.
Vaso-constricteurs artériels, Hypertenseurs.
Vaso-constricteurs veineux.
Vaso-dilatateurs artériels, Hypotenseurs.

Thérapeutique spéciale

Anémies, chlorose.
Angines de poitrine.
Artério-sclérose et ses complications.
Artérites, Aortites, Claudication intermittente.
Arythmies.
Cardiopathies aiguës.
Eréthisme. — Tachycardie. — Palpitations.
Gangrène, syndrome de Raynaud.
Hémophilies.
Hémorragies.
Hémorroïdes, varices, phlébites.
Hypertension.
Hypotension.
Insuffisances cardiaques, Hyposystolie, Asystolie.
Leucémie, lymphadénie.
Œdèmes périphériques.
Purpura.
Shock, Accidents sériques.

II. — APPAREIL DIGESTIF

Thérapeutique générale

Alcalins, saturants.
Antidiarrhéiques.
Antiémétisants.
Antiseptiques intestinaux, antifermentescibles.
Antispasmodiques et sédatifs.
Cholagogues.
Eupeptiques, stomachiques.
Laxatifs, purgatifs.
Pansements gastriques.
Stimulants de la sécrétion et de la motilité gastrique.
Vaccinothérapie.

Thérapeutique spéciale

Aérophagie. — Dilatation de l'estomac.
Anaphylaxie alimentaire.
Anorexie.
Cholécystites, angiocholites.
Cirrhoses.
Congestions du foie, foie cardiaque.
Constipation.
Dysenteries, Choléra.
Dyspepsies.
Entérites aiguës, diarrhées, coliques et fermentations intestinales.
Entérites chroniques, appendicite chronique.
Gastralgies.
Gastro-entérites de l'enfance, Diarrhées infantiles.
Hématémèse, mélena.
Hyperchlorhydrie.
Hypochlorhydrie, hypopepsie, atonie gastrique.
Ictères, cholémie.
Infections intestinales.
Insuffisance hépatique.
Insuffisance pancréatique.
Intoxications.
Lithiase biliaire, coliques hépatiques.
Rectites, Fistules anales, Fissures anales, Prurit anal.
Saturnisme, Coliques de plomb.
Sténoses du pylore.
Stomatites, gingivites, muguet.
Tuberculose intestinale.
Ulcères de l'estomac et du duodénum.
Vomissements.

III. — APPAREIL GENITO-URINAIRE

Thérapeutique générale

Alcalins.
Antiseptiques gynécologiques.
Antiseptiques urinaires externes.
Antiseptiques urinaires internes.
Balsamiques.
Décongestifs pelviens.
Dissolvants uriques.
Diurétiques.
Galactogènes.
Hémostatiques utérins.
Régulateurs des règles, Sédatifs utéro-ovariens.
Vaccins.

Thérapeutique spéciale

Albuminuries, Anurie, Urémie, Azotémie.
Allaitement, Crevasses du sein.
Blennorragie, Orchite.
Chancres mou.
Cystites, prostatisme.
Eclampsie, vomissements incoercibles.
Fibromes.
Grossesse, accouchements, avortements.
Hématuries.
Impuissance, spermatorrhée.
Incontinence d'urine.
Infection puerpérale.
Insuffisances rénales, néphrites chroniques, néphrites aiguës.
Lithiase rénale, coliques néphrétiques.
Métrites, Leucorrhée.
Puberté, Menstruation, Ménopause.
Pyélonéphrites.
Salpingo-ovarites.
Syphilis rénale.
Tuberculose rénale.

IV. — APPAREIL RESPIRATOIRE

Thérapeutique générale

Antidyspnéïques.
Antiseptiques des voies respiratoires.
Antispasmodiques, sédatifs de la toux.
Hémostatiques.
Modificateurs sécrétoires, balsamiques.
Modificateurs sécrétoires, expectorants.
Révulsifs.
Sérothérapie, Vaccinothérapie.

Thérapeutique spéciale

Adénopathie trachéo-bronchique.
Asthme, Asthme des foin.
Bronchite fétide, gangrène pulmonaire, abcès du poumon.
Congestions pulmonaires, Pneumonie franche aiguë, Bronchopneumonies.
Coqueluche, toux spasmodiques.
Emphysème pulmonaire, sclérose pulmonaire.
Œdème aigu du poumon.
Pleurésies.
Trachéites, trachéo-bronchites aiguës, bronchites chroniques.
Tuberculose.

V. — CHIRURGIE — THÉRAPEUTIQUE EXTERNE

Thérapeutique générale

Anesthésiques.
Antiseptiques externes comprimés.
Antiseptiques externes liquides.
Antiseptiques externes pommades.
Antiseptiques externes poudres.
Antiseptiques externes savons, ovules.
Antiseptiques internes.
Bains.
Cataplasmes, Révulsifs.
Cicatrisants.
Hémostatiques.
Stérilisation.
Vaccinothérapie.

Thérapeutique spéciale

Adénites.
Brûlures.
Cicatrices vicieuses.
Entorses, fractures, hyarthroses.
Furuncles, furonculose, abcès, panaris, anthrax,
phlegmons, piqûres d'insectes.
Ostéites, ostéo-myélites.
Pansements, Plaies, Fistules, Ulcères.
Tuberculoses osseuses.

VI. — DIÉTÉTIQUE

VII. — INSTRUMENTATION — APPAREILS

VIII. — MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE

Thérapeutique générale

Accélérateurs de la nutrition.
Dissolvants uriques, Antigoutteux.
Médicaments d'épargne.
Produits vitaminés, irradiés.
Régulateurs de la nutrition.

Thérapeutique spéciale

Acétonémie.
Alcalose.

Arthritisme.
Asthénie, surmenage, convalescence.
Athrepsie.
Avitaminose, carence en vitamines.
Carence calcique, carence phosphatée.
Carence magnésienne.
Diabète.
Goutte.
Obésité.
Phosphaturie.
Rachitisme, lymphatisme, troubles de croissance.
Rhumatismes chroniques, algies rhumatismales, lumbago.

IX. — MALADIES DE LA PEAU

Thérapeutique générale

Antiprurigineux.
Antiseptiques.
Kératoplastiques.
Vaccins.

Thérapeutique spéciale

Acné.
Alopécies.
Crevasses, Gerçures, Engelures.
Eczémas.
Erythèmes, intertrigo.
Herpès.
Impétigo.
Mycoses, sycosis.
Phthiriase, teigne, gale.
Pityriasis.
Prurigo, Dartres, Prurits.
Psoriasis.
Pyodermites.
Séborrhée.
Tuberculose cutanée, Lupus.
Tumeurs de la peau, Verrues.
Ulcères variqueux.
Urticaire.

X. — MALADIES INFECTIEUSES

Thérapeutique générale

Antipyrétiques.
Antiseptiques externes.
Antiseptiques internes.

Bactériophages.
Bactériothérapie, Ferments lactiques.
Balnéothérapie.
Chimiothérapie, Colloïdes.
Diaphorétiques.
Sérums, Vaccins.

Thérapeutique spéciale

Colibacillose.
Diphthérie.
Erysipèle.
Fièvres éruptives, Lèpre.
Grippe.
Oreillons.
Rhumatisme articulaire aigu.
Rougeole.
Septicémies.
Tétanos.
Typhoïdes et paratyphoïdes.
Zona.

XI. — MALADIES PARASITAIRES

Amibiase.
Helminthiase.
Maladie du sommeil.
Mycoses.
Paludisme.
Parasites de l'intestin et des voies biliaires.

XII. — OPHTALMOLOGIE

Anesthésiques locaux.
Antiseptiques locaux.
Bains d'yeux.
Instillations, Collyres.
Pommades.
Vaccins.

XIII. — OPOTHÉRAPIE

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Thérapeutique générale

Analgésiques généraux.
Analgésiques locaux.
Antiseptiques.
Gargarismes, collutoires, lavages.

Inhalations.
Instillations, pulvérisations.
Pommades.
Poudres.
Vaccins.
Vaso-constricteurs, décongestifs.

Thérapeutique spéciale

Angines aiguës.
Angine de Vincent.
Bourdonnements d'oreille, Surdit .
Coryzas aigus et chroniques.
Coryza spasmodique, rhume des foins.
Epistaxis.
Laryngites aigu s et chroniques.
Laryngite striduleuse.
Otites, masto dites.
Oz ne.
Pharyngites aigu s.
Rhino-pharyngites chroniques.
Sinusites.
V g tations ad no ides, ad no idites.

XV. — RADIOGRAPHIE

XVI. — STOMATOLOGIE

XVII. — SYPHILIS

Pr ventifs.
Traitement ars nical.
Traitement bismuthique.
Traitement iodur .
Traitement mercuriel.
Traitement mixte.

XVIII. — SYST ME NERVEUX

Th rapeutique g n rale

Analg siques externes.
Analg siques internes.
Anesth siques g n raux.
Anesth siques locaux.
Anesth siques rachidiens.
Antispasmodiques.
Hypnotiques.
Modificateurs du sympathique et du parasympathique.
Neuro-toniques.
S datifs.

Thérapeutique spéciale

Algies, céphalées, migraines, névralgies, sciatiques, névrites.
Congestion cérébrale, hémorragie cérébrale, ramollissement cérébral, hémiplegie.
Encéphalite aiguë, séquelles d'encéphalite.
Goitre exophtalmique.
Hystérie, Épilepsie, Chorée.
Insomnies, Nervosisme.
Méningite cérébro-spinale.
Méningite tuberculeuse.
Migraine ophtalmique.
Neurasthénie, Névrose d'angoisse.
Paralysie agitante.
Paralysies périphériques.
Tabès.
Tics, Convulsions, Délires.
Troubles vago-sympathiques.

XIX. — TUBERCULOSE

Amaigrissement.
Antiseptiques généraux.
Médications locales.
Toniques, Reminéralisants, Récalcifiants.
Traitement spécifique.
Traitement symptomatique : Anorexie.
Traitement symptomatique : Diarrhée.
Traitement symptomatique : Dyspnée.
Traitement symptomatique : Expectoration.
Traitement symptomatique : Fièvre.
Traitement symptomatique : Hémoptysies.
Traitement symptomatique : Sueurs.
Traitement symptomatique : Toux.

XX. — TUMEURS — CANCER

Abréviations : { T. G. : Thérapeutique générale.
T. S. : Thérapeutique spéciale.



APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

ANTISPASMODIQUES ARTÉRIELS

Acécoline.	Hypotan.
Alepsal Genevrier.	Natirose.
Amphotonyl.	Néospasmodyl Vély.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Papavéryl.
Benzylol.	Pragmoline.
Cardialgine Dubois.	Pyréthane.
Cardiosthénine.	Spasmine Jolly.
Crataegus Gmet.	Spasmosédine.
Dragées Lumeval.	Théovérine Laleuf.
Eupavéryl Pachaut.	Vagosédyl.
Gui Gmet.	Valéramyl.
	Valériane Gmet.

DIURÉTIQUES

Adoverne.	Pneumogéine Renard
Ampoules Théobryl Roche.	Rénion Vincardi.
Calcional.	Rénocardine.
Chophytol Rosa.	Saint Aré.
Cynurol Rosa.	Santhéose.
Détensyl.	Scillarène Sandoz.
Digalène Roche.	Scillitrine.
Digibaine.	Sclérosérol.
Digifoline Ciba.	Strophantine Catillon.
Digimialbaine.	Strophantus Catillon.
Digitaline cristallisée Mi- alhe Petit.	Técarine.
Digitaline Invar.	Théisine Dubat.
Digitaline Nativello.	Théobromine Invar.
Diurène.	Théobromose Dumesnil.
Diurétique Gmet.	Théosalvose.
Diurocalcine Gros.	Théovadil.
Dragées Lebrun toni-car- diaques.	Théovérine Laleuf.
Eupnine Vernade.	Théoxantine.
Gui Byla.	Tonicardine Gonnon.
Gui Gmet.	Urisanine.
Guipsine.	Uromil.
Lacto-sérum Lavril.	Urosalyl.
Métaformine.	Urosalyl Méthylé.
Neptal.	Vin diurétique végétal amer Pyrola.

HÉMOSTATIQUES

Adrénaline Invar.	Calcional.
Adrénine.	Calcium Sandoz.
Adrénoides Béral.	Calci-sténine.
Ampoules de Sécacornine Roche.	Capsellase.
Anthéma.	Chloro-calcion.
Arhémapectine Gallier.	Clisémine Longuet.
Artérase.	Coagulène Ciba.
Belhémine.	Complexes colloïdaux du Dr Riquoir.
Boricine Meissonnier.	Ergotine Lamante.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

HÉMOSTATIQUES

Glucalcium R. X.
Gui Byla.
Gui Gmet.
Guipsine.
Hamamélis Gmet.
Hémocalciopectine.
Hémogénol Dausse.
Hémosamine.
Hémostatique Goy.

Hémostyl du Dr Roussel.
Lugocalcion.
Post Hypophyse Choay.
Rénaleptine.
Sécarcornine Roche.
Séro-sérum Rivier.
Sérum Oliviero.
Tonicalcine.

MODÉRATEURS CARDIAQUES

Alepsal.
Amphosthène.
Amphotonyl.
Artério-veine.
Benzoflorine.
Cantéine Bouteille.
Crataegine.
Crataegus Gmet.
Dragées Lumeval
Euphytose.
Florhépatine.
Freinospasmyl.
Grassyl Buisson.
Néospasmodyl Vély.
Opothérapie Carrion.

Passiflorine.
Passival.
Paxène.
Phosphobrom.
Pulmocardine.
PuIsamone.
Sédarsan.
Sédatuline.
Sédobrol Roche.
Sédosine.
Spasmine Jolly.
Spasmosédine.
Valériane Byla.
Valérinodor Malmanche.

TONI-CARDIAQUES

Acécoline spartéinée.
Adoverne.
Adrénaline Invar.
Adrénine.
Adrénoïdes Béral.
Alcamfétol.
Ampoules de Digalène Roche.
Ampoules de Sécacornine Roche.
Anacamphre.
Asthmo-Actine.
Bain carbogazeux Wolo.
Camphodausse.
Campho-Spartéine Dubois.
Camphostyl Lacroix.
Camphydryl Robin.
Cardialgine Dubois.
Cardibaïne.
Cardio Vincardi.
Cardiosténine.
Collo-iode Dubois.
Coramine Ciba.
Crataegine.

Crataegus Gmet.
Curoraisin.
Digalène Roche.
Digibaïne.
Digifoline Ciba.
Digimialbaïne.
Digitaline cristallisée Mialhe Petit.
Digitaline Invar.
Digitaline, Nativelle.
Diurène.
Diurocalcine Gros.
Dragées Lebrun toni-cardiaques.
Eupnine Vernade.
Féminadène.
Génésérine.
Génostrychnine.
Granules de Pantofort du Dr Bovell.
Gui Byla.
Gui Gmet.
Guipsine.
Hydrocamphre.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

TONI-CARDIAQUES

Intrait de strophantus.
Ionyl.
Kola granulée Astier.
Kola Monavon.
Mialbaine.
Natibaine.
Ouabaine Arnaud
Pavérinol Laleuf.
Phlébotonine.
Phosoforme.
Pitullobine Byla.
Pneumogéine Renard.
Protensène Lejeune.
Renaleptine.
Renocardine.
Rythmosystol.

Santhéose.
Scillarène Sandoz.
Scillitrine.
Sérum Normet médical.
Silguine.
Solucamphre Delalande.
Solucamphre Spartéiné De-
la lande.
Spasmine Jolly.
Strophantine Catillon.
Strophantus Catillon.
Strychnal Longuet.
Théobromose Dumesnil.
Tonicardine Gonnon.
Visco-sérum.

VASO-CONSTRICTEURS ARTÉRIELS HYPERTENSEURS

Adrénaline Invar.
Adrénine.
Adrénoïdes Béral.
Adréphédrine Béral.
Aloysine.
Ampoules de Sécacornine
Roche.
Androcalcion H.
Androcalcion E.
Angioxyl du Dr Roussel.

Antonal.
Arsécrinol.
Artérase.
Composé Gmet.
Ephédrine naturelle Béral.
Ergotine Lamante.
Phylla Dyn.
Rénaleptine.
Sanédrine.
Spasmine Jolly.

VASO-CONSTRICTEURS VEINEUX

Acésine Guillaumin.
Adrépatine.
Aesculase.
Aphloïne Trouette-Perret.
Bursol.
Catemenyl.
Ergotine Lamante.
Extrait Hamyd.
Fluxine (Gouttes).
Gouttes de Serù.
Hamaméline Roya.
Hamaméliode.
Hamamélis Gmet.
Hamamélis Grandvai.
Hémaxol.
Hémodrome.
Hémoductyl.
Hémoluol.
Hémopausine.
Hémorroïdine (Gouttes).

Hémovéine.
Hirudinase.
Indhaméline Lejeune pluri-
glandulaire.
Indhaméline Lejeune
Simple.
Intrait de marron d'Inde
Dausse.
Iodamélis Logeais.
Mictasol.
Phlébotonine.
Phlébogull.
Salvenase Legoux
Tot'Hamélis.
Triglandine.
Veinoposine.
Veinosérum.
Veinosine.
Veinotrope.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

VASO-DILATATEURS ARTÉRIELS HYPOTENSEURS

- Acécoline.
Acécoline camphre.
Acécoline spartéine.
Acécoline yohimbine.
Acoégénol.
Algatan.
Allisatine Sandoz.
Aloysine.
Amphotonyl.
Ampoules Boissy.
Androcalcion H.
Angioxyl du Dr Roussel.
Antonol.
Artérase.
Artérion Vincardi.
Artério-Veinine.
Artoradine.
Athérolysine.
Bain carbogazeux Wolo.
Banikol.
Benzyanyl.
Benzylol.
Blocs Vécór.
Cantéine Bouteille.
Carboiodine.
Carboiodure Fraudin.
Citrophos.
Collo-iodé Dubois.
Cortiode.
Crataegine.
Curiode.
Curiode arsénié.
Détensyl.
Diasclérol.
Dicaliode.
Dioséine Prunier.
Eniodé Lefebvre.
Eranol.
Eutensyl Grémy.
Fuciodine.
Globules Fumouze iodure
de potassium.
Glycocarpine.
Gouttes antispasmodiques
Dausse.
Gouttes hypotensives
Fraisée.
Gui Byla.
Gui Gmet.
Guipsine.
Hémoductyl.
Hypersan.
Hypotan.
Ioda.
Iodalose Galbrun.
Iodaméllis Logeals.
Iodasclérine.
Iodassium.
Iode organique Boissy
Iodinjectol Jammes.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Maisine Globules.
Iodone Robin.
Iodonésyl.
Iodonucléol.
Iodosan Zambeletti.
Iodostarine Roche.
Iodo-Vitasine.
Iodural Novat.
Iodurase.
Iodure Pachaut.
Iodure Philippe.
Iodures Souffron.
Laminiode.
Lipiodol Lafay.
Lipoiodine Ciba.
Magiodyl.
Natirose.
Néo-Riodine.
Pilules Philippe.
Pneumogéine Renard.
Protensène Lejeune.
Rhocya Dyn.
Rhodazil.
Riodine.
Saint-Aré.
Santhéose.
Scillitrine.
Sclérosérol.
Sédotensyl.
Sérum hypotensif Fraix.
Silguine.
Silicyl.
Silisiode.
Solvosclérose.
Spasmine Jolly.
Théoverine Laleu.
Tiodine Cognet.
Toritanol Lamo.
Trinitrine caféinée Dubois.
Trinitrine-Papavérine La-
leuf.
Trinitrine Roussel.
Trisodyl Rozet.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. G.

VASO-DILATATEURS ARTÉRIELS HYPOTENSEURS

Ulcéosine.
Uroïodine.
Valovarine.

Vascurol.
Verticurine.
Viscum Zyma.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ANÉMIES — CHLOROSE

Adrénaline Invar.
Adrénine.
Adrénoides Béral.
Adréphédrine Béral.
Alexime.
Antiphi.
Ardogène.
Arrhénal Adrian.
Arrhénuclène Bergevin.
Arsécrinol.
Arséniode Buriat.
Arsi-strychnal Longuet.
Arsicodyle.
Arsylène Roche.
Ascoléine Rivier.
Baumolacpinine.
Beef Lavoix.
Belhémine.
Benzylocalcium.
Biocalose.
Bionéol.
Biosine Le Perdriel.
Biotrigon.
Cachets réparateurs.
Cacodyle Gonnon.
Cacodyline Jammes.
Calcoléol.
Carnine Lefrancq.
Cérébro-Lipase.
Cérébrosthénine Datin.
Colloïdogénine du Dr Bayle.
Composé Gmet.
Comprimés Levure Mycéta.
Créagénol.
Cytobiase.
Cyto-sérum Corbière.
Diasténine Grémy.
Diastogène Dehaussy.

Diastogène F. Dehaussy.
Dragées ferro-ergotées Man-
net.
Dragées Hecquet.
Elixir Dussaud.
Elixir ferro-ergoté Man-
net.
Endopancrine.
Extrait de céréales Adrian.
Fénucine.
Fer Bravais.
Fer intraveineux Fraisse.
Fer Larcade.
Fer ovarine Vitalis.
Feroxal Buisson.
Ferrocodile et Ferricodile.
Ferrocol.
Ferrophytine Ciba.
Fœnugol.
Fluodyle.
Fludiose.
Fondant mangano-ferreux
Forxol.
Fosfoxyl Carron.
Fosyls Carron.
Gaduamine.
Gaduase.
Gaurol.
Génosthéniques.
Globexine.
Glyctone phosphatée Char-
rière.
Glyphospher.
Granions (Les).
Granoxyl.
Granulé Caresmel.
Granulés de Pantofort du
Dr Boveil.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ANÉMIES — CHLOROSE

Hectine.	Morrhuetine Jungken vi-
Hémagénine Giraud.	aminée.
Hémato-iodine.	Morrhuel.
Hémoantitoxine « Sofos ».	Morrhuxine.
Hémo-cyto-sérum Cor-	Morubiase.
bière.	Moruxase.
Hémofer.	Murones du D ^r Robert
Hémogénol Dausse.	Jacques.
Hémoglobine Deschiens.	Musculosine Byla.
Hémopanbiline.	Néoarsite.
Hémo-Phagostyl.	Néo-Arsycodile.
Hémoplase Lumière.	Néo-Calculine.
Hémostra « Roche ».	Néo-Neurosine Prunier.
Hémostyl du D ^r Roussel.	Néo-Rhomnol.
Hémotal.	Nergine Heudebert.
Hémotonine Buisson.	Nervocithine Tissot.
Hépanème.	Neuroplasma Fort.
Hépaphos.	Neuroplasma massif.
Héparmone.	Neurotrophol Byla.
Hépatergol.	Nucléasine.
Hépathémo.	Nucléigène.
Hépatrol.	Nuclhémose.
Hépatrol injectable.	Opocalcium du D ^r Guer-
Héracléol.	sant.
Hipposarcine Roy.	Opocalcium irradié du
Huile de foie de morue	D ^r Guersant.
médicinale suractivée	Opochol.
Rhône Poulenc.	Opocobalt.
I. A. M.	Opoferrine vitaminée.
Ixium Buisson.	Oponuclyl irradié Trouette-
Jemalt Wander.	Perret.
Lécithine Vacheron.	Opophytol.
Lioncyl.	Oposérum.
Lipocérébrine Chevreton.	Oposynergines.
Liposplénine du D ^r Groc.	Opothérapie du D ^r Frayssé.
Magol Churchill.	Opothérapie Fournier.
Malt Barley.	Opotonine.
Malt français Déjardin (Ex-	Orthozomine.
trait de).	Ostéoglandulol.
Malt pailleté.	Pancrinol du D ^r Debat.
Malt Wander ou Gloma.	Panostyl.
Mancobène.	Panxylon.
Mangaine.	Pepto-fer Jalliet.
Mangano-Phosphal Ju-	Peptonate de fer Robin.
lien.	Persodine Lumière.
Mangarsenic.	Phagosthyl.
Mangratines.	Phagosthyl Mangane.
Marinol.	Phosoforme.
Marrucol.	Phospharsol.
Mésothorium Buisson.	Phosphatol vitaminé irra-
Minergil.	dié.
Morrhualène Gautier.	Phospho-Fluor Beynet.
Morrhuetine Jungken	Phospholéose Demasles.
	Phosphopinal Juin.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ANÉMIES — CHLOROSE

Phostyl.	Splénomanganol.
Phylla Dyn.	Stérogyl.
Phytergol.	Sthénoxal.
Phytine Ciba.	Stomarol.
Phytogénine Ciba.	Strychnal Longuet.
Phyto-Lécithine.	Strychnarsitol Robin.
Phytomarine.	Sulfurine du Dr Langlebert.
Phytosplénol Plé.	Supernacléine Legrand.
Plurion Couturieus.	Taburol.
Pneumo-Lipase.	Terpoxyl interne.
Prosthénase Galbrun.	Thiocol Roche.
Protonic.	Thorium X Rhemda.
Quina Baron.	Tonikéine Chevretin.
Quinarsol antianémique.	Tonique Gonnon.
Quinéine.	Tonique Roche.
Quinovarine Optima.	Tonudol.
Quinquina Gmet.	Total Tonic.
Réalphène Buisson.	Tréphonyl du Dr Roussel.
Reconstituant Mary.	Ultra Violets.
Rénaleptine.	Uvéphorine.
Sanas.	Vanadarsine Guillaumin.
Sanguil.	Végéphos.
Sanguine irradiée.	Vénecine.
Sels du Jura.	Vin de Baudon.
Sérifer Laurençon.	Vin de Bugeaud.
Séroma Rey.	Vin de Carnéose.
Séro-sérum Rivier.	Vin « Lux Galliac » moussoux.
Sérum Neuropsychique.	Viosten.
Sérum Normet chirurgical.	Vioxyl Mouneyrat.
Sérum Normet médical.	Visco-sérum.
Sérum Oliviero.	Vitamyl.
Sirop de Lovel.	Zimbyl.
Sirop Roche au Thiocol.	Zohol.
Solution Bardet.	Zomine.
Spectrol.	Zomo-Musculosine Byla.
Splénarmone.	

ANGINE DE POITRINE

Acécoline.	Benzoflorine Julien
Alepsal Genvrier.	Benzyanyl.
Amphotonyl.	Benzytol.
Ampoules Boissy.	Carboiodine.
Ampoules de Spasalgine Roche.	Cardiosthénine.
Angioxyl du Dr Roussel.	Comitiol.
Antonal.	Cortiode.
Artérase.	Curiode.
Artérion Vincardi.	Curiode Arsénié.
Artério Veinine.	Dépuriodé du Dr Roger Weber.
Artoradine.	Détensyl.
Athérolysine.	Dialacétine Ciba.
Belladénal « Sandoz ».	Dicaliodé.
Bellafoline Sandoz	Digitaline Nativelle.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ANGINE DE POITRINE

Endopancrine.	RévuIsoplasm.
Eupavéryl Pachaut.	Rhocya Dyn.
Euphytose.	Scillitrine.
Eupnine Vernade.	Sédoneurol Dehaussy.
Florhépatine.	Silicyl.
Fucoiodine.	Silisode.
Génomorphine.	Solvosclérose.
Glycocarpine.	Spasalgine Roche.
Gui Gmet.	Spasmosédine.
Iloglandol « Roche ».	Tétranitrol Roussel.
Iodasclérine.	Théobromose Dumesni.
Iode organique Boissy.	Théovérine Laleuf.
Iodogénol Pépin.	Tiodine Cognet.
Iodostarine Roche.	Tonicardine Gonnon.
Lipoiodine Ciba.	Toritanol Lamo.
Mésothorium Buisson.	Trinitrine caféinée Dubois.
Natirose.	Trinitrine Papavérine La-
Néopasmodyl Vely.	leuf.
Ouabaine Arnaud.	Trinitrine Roussel.
Papavéryl.	Trisodyl Rozet.
Pilules V. E. Doumer.	Valéramyl.
Pragmoline.	Verticurine
Pulmocardine.	

ARTÉRIO-SCLÉROSE ET SES COMPLICATIONS

(Voir : Système nerveux central.)

Absuric.	Citrocarbine.
Acécoline.	Collo-Iode Dubois
Acoégenol.	Cortiode.
Algatan.	Curiode.
Allisatine Sandoz.	Curiode arsénié.
Aloysine.	Dépuratif Rob Lechaux.
Amphotonyl.	Dépuriodé du D ^r Roger
Ampoules Théobryl Roche.	Weber.
Angioxyl du D ^r Roussel.	Détensyl.
Antonal.	Diasclérol.
Artérase.	Dicaliode.
Artériol Vincardi.	Dioséine Prunier.
Artério Veinine.	Diurène.
Artoradine.	Diurétique Gmet.
Athérolysine.	Diurocalcine Gros.
Bain carbogazeux Wolo.	Endopancrine.
Banikol.	Eniode Lefebvre.
Benzobromine	Eranol.
Benzzyanyl.	Eupnine Vernade.
Bi-Citrol Marinier.	Eutensyl Grémy.
Bolcitol.	Fucoiodine.
Carboiodine.	Globules Fumouze à
Carboiodure Fraudin	l'iodure de potassium.
Carbolactyl Billé.	Glycocarpine.
Cardiosthénine	

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ARTÉRIO-SCLÉROSE ET SES COMPLICATIONS

(Voir : Système nerveux central.)

Gouttes hypotensives.	Phosoforme.
Fraïsse.	Pilules Philippe.
Gravural.	Pipérazine Midy.
Gui Byla.	Progaster.
Gui Gmet.	Protensène Lejeune.
Guipsine.	Pulmocardine.
Hamaméliode.	Rénion Vincardi.
Hémofluidol.	Rénocardine.
Hirudinase.	Rhocya Dyn.
Hypotan.	Riodine.
Iloglandol « Roche ».	Salsanos.
Ioda.	Santhéose.
Iodalose Galbrun.	Sclérosérol.
Iodamelis Logeais.	Sel hépatique U. N. Arque- vaux.
Iodascérine.	Sérum Hypotensif Fraïsse.
Iodassium.	Silguine.
Iode organique Boissy.	Silicyl.
Iodinjectol Jammes.	Silisode.
Iodogénol Pépin.	Solvosclérose.
Iodo-Maisine Globules.	Solvuric
Iodométine.	Spasmine Jolly.
Iodone Robin.	Strophantine Catillon.
Iodonésyl.	Strophantus Catillon.
Iodonucléol.	Théisine Dubat.
Iodosan Zambeletti.	Théobromine Invar.
Iodostarine Roche.	Théobromose Dumesnil.
Iodo-Vitasine.	Théobryl Roche.
Iodural Novat.	Théosalvose.
Iodurase.	Théovadil.
Iodure Pachaut.	Théoverine Laleuf.
Iodure Philippe.	Théoxantine.
Iodures Souffron.	Tiodine Cognet.
Ionyl.	Tonicardine Gonnon.
Laminiode.	Triglandine.
Lipiodol Lafay.	Trisodyl Rozet.
Lipiodine Ciba.	Ulcéosine.
Maglodyl.	Uricémine.
Mésothorium Buisson.	Uroïodine.
Mésothorium Rhemda.	Uromil.
Morrhualène Gautier.	Vascurol.
Néo-Riodine.	Vénecine.
Opothérapie du Dr Fraysse.	Verticurine.
Opotonine.	Vin diurétique végétal amer Pyrola.
Orthogénol.	Viscum Zyma.
Panbiline.	
Papavéryl.	

ARTÉRITES — AORTITES CLAUDICATION INTERMITTENTE

Acécoline.	Algatan.
Alepsal Génévrier.	Angioxyl du Dr Roussel.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ARTÉRITES — AORTITES CLAUDICATION INTERMITTENTE

Antonal.	Iloglandol « Roche ».
Artérase.	Ioda.
Artérion Vincardi.	Iodalose Galbrun.
Artério-Veinine.	Iodasclérine.
Artoradine.	Iode organique Boissy.
Athérolysine.	Iodogénol Pépin.
Bain carbogazeux Wolo.	Iodo-Maisine Globules.
Banikol.	Iodone Robin.
Benzobromine.	Iodonucléol.
Benzyanyl.	Iodostarine Roche.
Carboiodine.	Iodo-Vitasine.
Carboiodure Fraudin.	Laminiodé.
Citrosodine Longuet.	Lipiodol Lafay.
Collo-Iode Dubois.	Lipiodine Ciba.
Crataegus Gmet.	Magiodyl.
Dépuriodé du Dr Roger	Natirose.
Weber.	Néo-riodine.
Dicaliode.	Pilules Philippe.
Endopancrine.	Pragmoline.
Eniode Lefebvre.	Rhocya Dyn.
Épicural.	Sclérosérol.
Eranol.	Silicyl.
Eupavéryl Pachaut.	Sillsode.
Eutensyl Grémy.	Solvosclérose.
Formocitrine.	Tiodine Cognet.
Fuciodine.	Toritanol Lamo.
Globules Fumouze à iodure	Trinitrine-Papavérine La-
de potassium.	leuf.
Glycocarpine.	Trinitrine Roussel.
Hémofluidol.	Trisodyl Rozet.
Hirudinase.	Verticurine.

ARYTHMIES

Adoverne.	Digitimialbaïne.
Ampoules de Sécacornine	Digitaline cristallisée
Roche.	Mialhe-Petit.
Anacamphre.	Digitaline Invar.
Anaclasine Ranson.	Digitaline Nativelle.
Benzoflorine Julien.	Diurène.
Camphodausse.	Dragées Lebrun toni-car-
Campho-Spartéiné Dubois.	diaques.
Camphostyl Lacroix.	Génostrychnine.
Camphydryl Robin.	Mialbaïne.
Cardialgine Dubois.	Natibaïne.
Cardibaïne.	Ouabaïne Arnaud.
Cardiosthénine.	Pavérinol Laleuf.
Coramine Ciba.	Quinicardine.
Crataegine.	Quinoïdine Duriez.
Crataegus Gmet.	Rénocardine.
Digalène Roche.	Rythmosystol.
Digibaïne.	Solucamphre Delalande.
Digifoline Ciba.	Spasmine Jolly.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ARYTHMIES

Strophantine Catillon.	Théobromose Dumesnil.
Strophantus Catillon.	Vaso-Neurine.
Strychnal Longuet.	

CARDIOPATHIES AIGÜES

Adoverne.	Eupnine Vernade.
Adrénaline Invar.	Génostrychnine.
Adrénine.	Gui Byla.
Adrénoïdes Béral.	Gui Gmet.
Ampoules de Sécacornine Roche.	Guipsine.
Ampoules Théobryl Roche.	Hydrocamphre.
Anacamphre	Intrait de Strophantus.
Camphodausse.	Natibaïne.
Campho-Spartéine Dubois.	Oubaine Arnaud.
Camphostyl Lacroix.	Pavérinöl Laleuf.
Camphydryl Robin.	Pneumogéine Renard.
Cardialgine Dubois.	Rénaleptine.
Cardibaïne.	Scillarène Sandoz.
Cardiosthénine.	Sédobrol Roche.
Coramine Ciba.	Solucamphre Delalande.
Digalène Roche.	Solucamphre Spartéiné Delalande.
Digibaïne.	Strophantine Catillon.
Digifoline Ciba.	Strophantus Catillon.
Digimialbaïne.	Strychnal Longuet.
Digitaline cristallisée Mialhe Petit.	Théisine Dubat.
Digitaline Invar.	Théobromine Invar.
Digitaline Nativelle.	Théobromose Dumesnil.
Diurène.	Théobryl Roche.
Diurétique Gmet.	Théosalvose.
Diurocalcine Gros.	Théovadil.
Dragées Lebrun toni-cardiaques.	Théoxantine.
	Tonicardine Gonnon.

ÉRÉTHISME — TACHYCARDIE PALPITATIONS

(Voir : Modérateurs-cardiaques,
Système nerveux central : Sédatifs.)

Adrénoïdes Béral.	Crataégine.
Alepsal Génévrier.	Crataegus Gmet.
Amphosthène.	Digalène Roche.
Amphotonyl.	Digibaïne.
Anaclasine Ranson.	Digifoline Ciba.
Bellafoline Sandoz.	Digimialbaïne.
Benzoflorine Julien.	Digitaline cristallisée Mialhe, Petit.
Blocs Vécot.	Digitaline Invar.
Bromovose.	Digitaline Nativelle.
Cantéine Bouteille.	Dragées Lumeval.
Cardialgine Dubois.	Euphytose.
Cardiosthénine.	

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

ÉRÉTHISME — TACHYCARDIE PALPITATIONS

*(Voir : Modérateurs cardiaques,
Système nerveux central : Sédatifs.)*

Flörhépatine.	Sédarsan.
Freinospasmyl.	Sédatuline.
Génésérine.	Sédobrol Roche.
Grassyl Buisson.	Sédosine.
Gynergène Sandoz.	Somnicones Béral.
Natibaine.	Spasmine Jolly.
Néospasmodyl Vély.	Spasmosédine.
Ouabaine Arnaud.	Sympathyl.
Passiflorine.	Valéramyl.
Passival.	Valériane Byla.
Paxène.	Valériflore.
Phosphobrom.	Valérinodor Malmanche.
Pulmocardine.	Valovarine.
Pulsamone.	Vaso-Neurine.
Quinicardine.	Véronidia Buisson.

GANGRÈNES, SYNDROME DE RAYNAUD

Acécoline.	Pragmoline.
Glycocarpine.	Tiodine Cognet.
Murones du Dr Robert Jacques.	

HÉMOPHILIE

Calcional.	Lugocalcion.
Coagulène Ciba.	Opochol.
Hématoéthylroïdine.	Opoferrine vitaminée.
Hémocalciopectine.	Séroma Rey.
Hémogénol Dausse.	Sérum Normet médical.
Hémosamine.	Sérum Oliviéro.
Hémostatique Goy.	Spectrol.
Hémostra « Roche ».	Splénarmone.
Hémostyl du Dr Roussel.	

HÉMORRAGIES

(Voir : Hémostatiques.)

HÉMORROIDES, VARICES, PHLÉBITES

Acésine Guillaumin.	Anusol Mialhe.
Adrépatine.	Aphloïne Trouette-Perret.
Aesculase.	Aristargol.
Airoglyce.	Arterio-Veineine.
Anoïde.	Bain Salvia.
Antirrhoïde.	Bande de crêpe Velpeau.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

HÉMORROIDES, VARICES, PHLÉBITES

Baume Aroma.
 Baume Suelta.
 Bi-Citrol Marinier.
 Bursol.
 Cantéine Bouteille.
 Catemenyl.
 Cipromarol.
 Citrosodine Longuet.
 Complextraits.
 Crayons antifissure D-
 mergue.
 Crème résolutive du Dr Rap.
 Créosoforme Lambiotte.
 Dermofagine.
 Désitin.
 Dioséine Prunier.
 Elixir de Virginie Nyr-
 dahl.
 Ergotine Lamante.
 Esculéol.
 Eugynol Grandval.
 Euretcol.
 Extrait Hamyd.
 Flusan.
 Fluveïnose Mauchant.
 Fluxine (gouttes).
 Fucoiodine.
 Glyco-Thymoline.
 Gouttes de Sérû.
 Hamaméline Roya.
 Hamamélis Gmet.
 Hamamélis Grandval.
 Hémamaxol.
 Hémodrome.
 Hémoluol.
 Hémopausine.
 Hémorroidine (gouttes).
 Hémorroidine (pommade).
 Hémorroidine (supposi-
 toires).
 Hémovéine.
 Hirudinase.
 Indhaméline Lejeune plu-
 riglandulaire.
 Indhaméline Lejeune
 simple.
 Insulanol.
 Intrait de marron d'Inde
 Dausse.
 Iodamélis Logeais.

Iodasclérine.
 Iodex.
 Iodométine.
 Keriol.
 Lacpinine.
 Ménatol.
 Mictasol.
 Néo-Collargol.
 Nestosyl.
 Oléo-Mel.
 Opochol.
 Ouataplasmé du Dr Lam-
 glebert.
 Paralaxol Tulivet.
 Parlax.
 Percaïnal Ciba.
 Phlébotonine.
 Pommade au Nestosyl.
 Pommade Logeais.
 Pommade Midy.
 Proveïnase Midy.
 Rectagine.
 Rectoline.
 Rectopanbiline.
 Rénovol.
 Salantale.
 Salvénase Legoux.
 Sclérosérum.
 Sel hépatique U. N. Arque-
 vaux.
 Suppo-Gynals.
 Suppositoires à l'Esculéol.
 Suppositoires au Nestosyl.
 Suppositoires Gonnon.
 Suppositoires Logeais.
 Suppositoires Midy.
 Suppositoires Pepet.
 Tablettes Zéva.
 Tot'Hamélis.
 Triglandine.
 Ulcéobalnéine.
 Ulcéosine.
 Varisclérine.
 Vari-Sérum Lebon.
 Vasculol.
 Vasolaxine.
 Veinoposine.
 Veinosérum.
 Veinosine.
 Veinotrope.



APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

HYPERTENSION

- Acécoline.
Acécoline camphre.
Acécoline spartéine.
Acécoline yohimbine.
Acoégénol.
Algatan.
Allisatine Sandoz.
Amphotonyl.
Ampoules de Théobryl Roche.
Androcalcion.
Angioxyl du Dr Roussel.
Antonal.
Artérase.
Artérion Vincardi.
Artério-Veinine.
Artoradine.
Athérollysine.
Bain carbogazeux Wolo.
Banikol.
Benzyanyl.
Benzylol.
Bi-Citrol Marinier.
Blocs Vécor.
Carboiodine.
Carboiodure Fraudin.
Cardialgine Dubois.
Cardiosthénine.
Chlorumagène.
Citrofluyl.
Citrophos.
Collo-Iode Dubois.
Cortiode.
Crataegus Gmet.
Curiode.
Curiode arsénié.
Dépuratif Rob Lechaux.
Dépuriode du Dr Roger Weber.
Détersyl.
Diasclérol.
Dicaliode.
Digitaline Nativelle.
Dioséine Prunier.
Diurétique Gmet.
Diurocalcine Gros.
Eniode Lefebvre.
Eranol.
Eufosyl Vély.
Eutensyl Grémy.
Fluvéinose Mauchant.
Formocitrine.
Freinospasmyl.
Fucoïdine.
Globules Fumouze à l'iodure de potassium.
Glycocarpine.
Gouttes antispasmodiques Dausse.
Gouttes hypotensives Fraisse.
Granions (Les).
Gui Byla.
Gui Gmet.
Guipsine.
Hémoductyl.
Hémofluidol.
Hypersan.
Hypotan.
Immunovaccin antirhumatismal.
Ioda.
Iodalose Galbrun.
Iodamélis Logeais.
Iodasclérine.
Iodassium.
Iode organique Boissy.
Iodinjectol Jammes.
Iodogénol Pépin.
Iodométine.
Iodo-Maisine globules.
Iodone Robin.
Iodonésyl.
Iodonucléol.
Iodosan Zambelletti.
Iodostarine Roche.
Iodo-Vitasine.
Iodural Novat.
Iodurase.
Iodure Pachaut.
Iodure Philippe.
Iodures Souffron.
Laminiodé.
Lipiodol Lafay.
Lipoiodine Ciba.
Magiodyl.
Mésothine.
Mésothorium Rhemda.
Natibaine.
Natirosé.
Néo-Riodine.
Normatensol Bouret.
Opotonine.
Orthogénol.
Ouabaine Arnaud.
Papavéryl.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

HYPERTENSION

Phlébotonine.
Phosoforme.
Pilules Philippe.
Pneumogéine Renard.
Pragmoline.
Protensène Lejeune.
Rénion Vincardi.
Rénocardine.
Rhocya Dyn.
Rhodazil.
Riodine.
Saint-Aré.
Santhéose.
Scillitrine.
Sclérosérol.
Sédotensyl.
Sérum hypotensif Fraisse.
Silguine.
Silicyl.
Silisode.

Solvosclérose.
Sornyal.
Spasmine Jolly.
Spasmosédine.
Théobromose Dumesnil.
Théoverine Laleuf.
Tétranitrol Roussel.
Tiodine Cognet.
Toritanol Lamo.
Tot Hamélis.
Ulécossine.
Uricémine.
Uroiodine.
Vagosédyl.
Valénal Novalls.
Valovarine.
Vascurol.
Verticurine.
Viscum Zyma.

HYPOTENSION

Adrénaline Invar.
Adrénine.
Adrénoïdes Béral.
Adréphédrine Béral.
Ampoules de Sécacornine Roche.
Anacamphre.
Arsécrinol.
Chlorumagène.
Éphédrine naturelle Béral.

Hydrocamphre.
Néo-Rhomnol.
Opoferrine vitaminée.
Phylla Dyn.
Rénaléptine.
Sanédrine.
Sérum Normet médical.
Solucamphre spartéiné Delalande.
Spasmine Jolly.
Visco-Sérum.

INSUFFISANCES CARDIAQUES HYPOSYSTOLIE — ASYSTOLIE

Adrénaline.
Adrénine.
Adrénoïdes Béral.
Adréphédrine Béral.
Alcamfétol.
Ampoules de Sécacornine Roche.
Anacamphre.
Bain carbogazeux Wolo.
Camphodausse.
Campho-Spartéine Dubois.
Camphostyl Lacroix.
Camphydryl Robin.

Cardialgine Dubois.
Cardibaine.
Cardion Vincardi.
Cardiosthénine.
Coramine Ciba.
Digalène Roche.
Digibaine.
Digiroline Ciba.
Digimialbaine.
Digitaline cristallisée Petit-Mialhe.
Digitaline Invar.
Digitaline Nativelle.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

INSUFFISANCES CARDIAQUES HYPOSYSTOLIE — ASYSTOLIE

Diurène.
Diurétique Gmet.
Diurocalcine Gros.
Dragées Lebrun toni-cardiaques.
Endopancrine.
Eupnine Vernade.
Génostrychnine.
Hydrocamphre.
Intraft de Strophantus.
Kola granulée Astier.
Kola Monavon.
Mialbaïne.
Natibaïne.
Ouabaïne Arnaud.
Pavérinol Laleuf.
Phlébotonine.
Pituilobine Byla.
Pneumogéine Renard.
Protensène Lejeune.
Quinoidine Duriez.
Rénaleptine.
Rénocardine.

Santhéose.
Scillarène Sandoz.
Sécacornine Roche.
Sérum Normet médical.
Solucamphre Delalande.
Solucamphre Spartéiné Delalande.
Spasmine Jolly.
Strophantine Catillon.
Strophantus Catillon.
Técarine.
Théisine Dubat.
Théobromine Invar.
Théobromose Dumesnil.
Théobryl Roche.
Théosalvose.
Théovadil.
Théoxantine.
Tonicardine Gonnon.
Vin diurétique végétal
amer Pyrola.
Visco-sérum.

LEUCÉMIE — LYMPHADÉNIE

Globéxine.
Hémo-phagostyl.
Hémostra « Roche ».
Hémostyl du Dr Roussel.
Iodométine.
Ixium Buisson.
Mésothorium Buisson.
Murones du Dr Robert
Jacques.

Néoarsite.
Néo-Arsycodille.
Néo-Calciline.
Opoferrine vitaminée
Quinquina Gmet.
Terpoxyl interne.
Thorium X. Rhemda.
Tréphonyl du Dr Roussel.
Vanadarsine Guillaumin.

OEDÈMES PÉRIPHÉRIQUES

Adoverne.
Ampoules Théobryl Roche.
Artérase.
Artoradine.
Camphodausse.
Campho-Spartéine Dubois.
Camphostyl Lacroix.
Camphydryl Robin.
Collo-Iode Dubois.
Crème résolutive du Dr Rap
Digalène Roche.
Digibaïne.
Digifoline Ciba.

Digimialbaïne.
Digitaline cristallisée
Mialhe Petit.
Digitaline Invar.
Digitaline Nativelle.
Diurène.
Diurétiques Gmet.
Diurocalcine Gros.
Dragées Lebrun toni-cardiaques.
Eupnine Vernade.
Féminadène.

APPAREIL CIRCULATOIRE. T. S.

OEDÈMES PÉRIPHÉRIQUES

Globules Fumouze à l'iodure de potassium.	Strophantus Catillon.
Iodométine.	Técarine.
Kola granulée Astier.	Théobromose Dumesnil.
Kola Monavon.	Théobryl Roche.
Neptal.	Théosalvose.
Orthogénol.	Théovadil.
Rénocardine.	Théoxantine.
Santhéose.	Tonicardine Gonnon.
Strophantine Catillon.	Vin Diurétique végétal amer Pyrola.

PURPURA

(Voir : Hémotatiques.)

SHOCK — ACCIDENTS SÉRIQUES

Adréphédrine Béral.	Hydrocamphre.
Anacamphre.	Pancréastase Defresne granulée.
Calcional.	Pommade au Nestosyl.
Calci-Sténine.	Sérum Normet chirurgical.
Camphydryl Robin.	Solucamphre Delalande.
Chloro-Calcion.	Solucamphre spartéiné Delalande.
Coramine Ciba.	Terpoxyl interne.
Emgé Lumière.	Visco-sérum.
Ephédrine naturelle Béral.	
Euphoryl.	
Hémosamine.	

APPAREIL DIGESTIF. T. G.

ALCALINS — SATURANTS

Alcalinose.	Chéralys (comprimés).
Alcasodine.	Citropaïne du Dr Fontal.
Alsodine.	Citrophos.
Alucol Wander.	Citrosodine Longuet.
Anacidase.	Comprimés Adrian.
Azym.	Comprimés Vichy-État.
Bis-Ka-Ma.	Digestil Harvey.
Bismusodine.	Doloma.
Bismuth Desleaux.	Gastrépatine.
Bismuth Tulasne.	Gastrocalcine.
Bradigastrine Ducloy.	Gastronaldine.
Calcomagnésie.	Gastro-Sodine.
Calmag-Na.	Hépatosodine.
Carbonate de bismuth.	Isotonyl Bouret.
Tablettes Perroud.	Kaobrol.
Carbonésie.	Lait de Magnésie Phillips.

APPAREIL DIGESTIF. T. G.

ALCALINS — SATURANTS

Magnésie bismurée.
Orthogastrine.
Pepsodia.
Poudre Bellada.
Poudre Paterson.
Poudre Stom.
Propeptase.
Sédogastrine.

Sel de Hunt.
Sel d'Ewald.
Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Stomarine Billault.
Stoméol Vichy.
Stomophile.
Tablettes Perroud.
Zymogastrine Kervan.

ANTIDIARRHÉIQUES

Acolitol.
Allisatine Sandoz.
Aloysine.
Alucol Wander.
Alunozal.
Amibiasine.
Amidal.
Amiphène Carron.
Ampho-Vaccins Ronchèse.
Ampoules de Sécacornine Roche.
Atural.
Bioentérase.
Biolactyl Fournier.
Bismuth Tulasne.
Bulgarine Thépenier.

Calcional.
Carbophos.
Chéralys (comprimés).
Elixir Godfrin.
Entéro-Antigènes.
Entérofagos.
Facmine Longuet.
Formocarbine.
Gélotanin.
Kerlactine.
Maltase Fanta.
Marrubiasé.
Oxyléine.
Pancarbo Hardy.
Stupho.

ANTIÉMÉTISANTS

Atural.
Bi-Citrol.
Bradygastrine.
Cétrarose Gigon.
Citrosodine Longuet.

Digestonic.
Lichénose Ducloy.
Vin Raimoa.
Zymogastrine Kervan.

ANTISEPTIQUES INTESTINAUX ANTIFERMENTESCIBLES

Acatar.
Acolitol.
Agarase.
Allisatine Sandoz.
Alucol Wander.
Alunozal.
Amibiasine.
Amidal.
Amiphène Carron.
Anacidase.
Aniodol.
Argion.
Azym.
Bacté-phages.
Bactériophages Leclerc.
Bensomine.

Benzophosphine Christiaens.
Bioentérase.
Biolactyl Fournier.
Bis-Ka-Ma.
Bismusodine.
Bismuth (Crème de) du Dr Quesneville.
Bismuth-Desleaux.
Bismuth Tulasne.
Boldoine Eparvier.
Boldorhéine.
Bolène.
Bulgarine Thépenier.
Carbalcaloïdes.
Carbolactyl simple.

APPAREIL DIGESTIF. T. G.

ANTISEPTIQUES INTESTINAUX ANTIFERMENTESCIBLES

Carbolactyl, billé.	Kerlactine.
Carbolin Midy.	Lac-Ser.
Carbonate de bismuth. —	Lactaris.
Tablettes Perroud.	Lacticholéine Tulivet.
Carbonésie.	Lactimase.
Carbophos.	Lactobacilline.
Caples.	Lactochol.
Carbocarbène.	Lactolaxine Fydau.
Catécol du Dr Lemay.	Lacto-Sérum Lavril.
Chébéne Fraudin.	Laminarol.
Chébéne Tissot.	Levuro Maltine Déjardin.
Cherats (comprimés).	Microlysine.
Chloramine Freyssinge.	Mucicarbos.
Chlorobacilline.	Naphtocarbène.
Chlorobyl.	Néo-Collargol.
Choléo-lactol Daguin.	Nigérine Vincent.
Citrocarbène.	Novolactol Daguin.
Complexes colloïdaux du Dr Riquoir.	OPOCHLORINE.
Comprimés Galac.	Oxyléine.
Comprimés Urbé.	Pancarbo Hardy.
Crésentyl.	Pangestyl Narty.
Cryptargol Lumière.	Pancrébile.
Digastrine.	Paralactine Byla.
Dragées Granules Elkin.	Poudre Paterson.
Elkin (dragées, granules).	Progaster.
Entériode.	Régyl.
Entéro-Antigènes.	Sanluol.
Entérobyl.	Splénocarbène.
Entérofagos.	Stomagyl.
Entérohépatine.	Stomaxines.
Entéroseptyl.	Stomophile.
Eugastrol.	Stomoxygène.
Exonérol.	Sulfobyl.
Facmine Longuet.	Sulfoidol Robin.
Formine Adrian.	Tapo.
Formocarbène.	Terpoxyl interne.
Formocarbos.	Triseptine.
Galabactéine.	Ur-Clar.
Gambéol.	Urisanine.
Glyco-Lactimase.	Urosalyl. — Urosalyl mé- thylé.
Glyco-Thymoline.	Uvargol.
Goménol.	Vigardyne.
Hopogan Bocquillon.	Wismuthane Vély.
Iodure d'amidon Lumière.	Yaourtine.
Kénol.	Zymatine Lescène.

ANTISPASMODIQUES ET SÉDATIFS

Acolitol.	Ampoules de Pantopon
Aérophagyl.	Roche.
Amibiasine.	Ampoules de Spasmalgine
Amphotonyl.	Roche.

APPAREIL DIGESTIF. T. G.

ANTISPASMODIQUES ET SÉDATIFS

Bellafoline Sandoz.	Kaobrol.
Benzylol.	Narcyl.
Bismuth (Crème de) du	Novatropin.
Dr Quesneville.	Pancarbo Hardy.
Bismuth Tulasne	Papavéryl.
Boldoïne Eparvier.	Paradoline.
Calcomagnésie.	Pavéron Dausse.
Calmag-Na.	Poudre Bellada.
Carbatropine.	Poudre Paterson.
Cétrarose Gigon.	Poudre Stom.
Chloridia.	Pulsamone.
Citrophos.	Scuroformie.
Codérax.	Sédarsan.
Condurango Gmet.	Sédatuline.
Crataegus Gmet.	Sédobrol Roche.
Dialacétine Ciba.	Sédogastrine.
Digastrine.	Sédosine.
Digestonic.	Sirop Teyssède.
Florhépatine.	Somnicones Béral.
Freinix Buisson.	Spasmacol.
Freinospasmyl.	Spasalgine Roche.
Gastrodium.	Spasmine Jolly.
Gastro-Sodine.	Stomaxines.
Génatropine.	Stomobrol.
Genhyoscyamine.	Suppositoires Pyrax.
Génomorphine	Vagosédyl.
Gmet (Extraits).	Valériane Gmet.
Gouttes antispasmodiques	Valérium Paul Thibault.
Dausse.	Zaryl.

CHOLAGOGUES

Acatar.	Caparlem.
Agocholine.	Capsules Bardet.
Amibiasine.	Carbolactyl bilé.
Anaclasine.	Cascarine Leprince.
Anégrine.	Catalyl Mg.
Bensomine.	Chloro-Magnésion.
Bi-Citrol Marinier.	Chlormagnésium Fisch.
Biléyl Fournier.	Chlorumagène.
Biliase Raby.	Cholécystine.
Biliboldo.	Choléo-Combretol boldi-
Biliuine.	nisé.
Biliogastrine Chevillon.	Choléokinase.
Bioentérase.	Choléo-lactol Daguin.
Boldine Houdé.	Chophytol Rosa.
Boldo Gmet.	Citrocarbine.
Boldoïne Eparvier	Citropaine du Dr Fontal.
Boldorhéine.	Citrosodine Longuet.
Boldo Verne.	Comprimés Vichy-État.
Boléase Monal.	Crypthiol.
Bridés (Sel naturel de. —	Cuscutine Foulon.
Tablettes. — Pilules de).	Cytomagnésium Lindeux.
Cachets Pachaut.	Delbiase.

APPAREIL DIGESTIF. T. G.

CHOLAGOGUES

Dolophos.	Laxocholéine Tulivet.
Dragées Elkin (et granules).	Lénicure Vichy.
Élixir Spark.	Magnésium Hardy.
Elkin (dragées, granules).	Magnéso-tubes Robinet.
Entéro-Antigènes.	Magnétone.
Entérobyl Dehaussy.	Magsalyl Mg.
Euchol.	Néotrophène.
Euonymine Paul Thibault.	Neubryne.
Evonyl.	Oléocidase.
Félamine Sandoz.	Oléoformine Corbière.
Fluobyl.	Oliricin.
Fluocholine.	Olivéol.
Formocitrine.	Opobyl.
Fucosine.	Opochol.
Gambéol.	Opothérapie Choay.
Gastro-Sodine.	Opothérapie du Dr Frayssé.
Gouttes Magalo.	Orthogastrine.
Grains d'Évian.	Panbiline.
Grains de Vals.	Pancrébile.
Héparbiline.	Peptalmine magnésinée.
Hépatie Efa du Dr Leca-	Pilules du Dr Debouzy.
cheux.	Polypeptonal.
Hépatismine.	Progaster.
Hépatobyl.	Prométhine.
Hépatodiase.	Romarène.
Hépatosodine.	Rylal Noyon.
Hépatozyl Caldo.	Saint-Aré.
Hexafel.	Salsanos.
Jécol.	Sel hépatique U. N. Arque-
Kénol.	vaux.
Kinéchol.	Sélunio.
Lac-Ser.	Stomoxygène.
Lacticholéine Tulivet.	Sulfobyl.
Lactobyl.	Thiocitran.
Lacto-Sérum Lavril.	Tonicalcine.
Laminarol.	Triseptine.
Laxadonal.	Vicéliase.
Laxatifs Miraton Châtel-	Vichy-purgatif.
Guyon.	Vulcase.
	Zymatine Lescène.

EUPEPTIQUES — STOMACHIQUES

Alcasodine.	Bi-Citrol Marinier.
Amunine.	Biliogastrine Chevallon.
Amylodiastase Thépenier.	Biophylactine Mg.
Anaclasine Ranson.	Bolcitrol.
Anapeptone Vassal.	Boldoine Éparvier.
Appetyl.	Cachets Roche de Thiocol.
Arrhénal Adrian.	Calcozymase.
Atural.	Carbocitrol.
Azym.	Carypaine.
Beef Lavoix.	Charbon Tissot.

APPAREIL DIGESTIF. T. G.

EUPEPTIQUES — STOMACHIQUES

Chéralys (comprimés).
Choléo-Combretol boldi-
nisé.
Citrocarbine.
Citropaïne du Dr Fontal.
Citropeptol.
Citrophos.
Citrosodine Longuet.
Complextraits.
Comprimés Roche de Thio-
col.
Condurango Gmet.
Diasto-pépsine Richepin.
Digestif Harvey.
Dolophos.
Dragées Elkin.
Dyspeptine Hepp.
Élixir Bonjean.
Élixir Ducro.
Élixir Dussaud.
Élixir Grez.
Élixir Spark.
Elkin (dragées, granules).
Emgé Lumière.
Enzypan.
Eugastrol.
Eupeptique Monavon.
Extrait de Malt français
Déjardin.
Fénucine.
Formocitrine.
Gastrodium.
Gastro-Sodine.
Gmet (Extraits).
Granules Elkin
Hépatodiase.
Maltéa Moser cristallisée.
Malt français Déjardin (Ex-
trait de).
Maltosan.

Malt pailleté.
Malt Wander ou Gloma.
Mangaine.
Marinol.
Mésogastrine.
Novolactol Daguin.
Pancréane.
Pancréastase Defresne gra-
nulée.
Pancréastase Idon.
Pangestyl Narty.
Papaïne Trouette-Perret.
Peptodiase.
Peptosthénine Choay.
Philogastrine.
Pluribiase.
Poudre Paterson.
Propeptase.
Proxytol.
Quassia Kina Rabot.
Quassine Houdé.
Quinquina Gmet.
Réalphène Buisson.
Reconstituant Mary.
Romarène.
Salsanos.
Selunic.
Sirop Roche au Thiocol.
Splénocarbine.
Stomagyl.
Sulfobyl.
Super-digestif Legrand.
Tachygastrine Ducloy.
Thiocol Roche.
Uvé (gouttes).
Vanadarsine Guillaumin.
Vin de Chassaing.
Viosten.
Zymogastrine Kervan.

LAXATIFS — PURGATIFS

Agarase.
Agocholone.
Aloïne Houdé.
Biléyl Fournier.
Biliase Raby.
Biliboldo.
Bilifluine.
Billogastrine Chevillon.
Bis-Ka-Ma.
Boldine Houdé.
Boldo Gmet.

Boldorhéine.
Boldo Verne.
Boléase Monal.
Bolène.
Brides (Sel naturel, ta-
blettes, pilules, thé de).
Cachets Pachaut.
Carbatropine.
Carbolactyl billé.
Carbolin Midy.
Cascara Midy.

APPAREIL DIGESTIF. T. G.

LAXATIFS — PURGATIFS

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Cascarine Leprince. | Mucilaxine. |
| Catalyl Mg. | Mucinum. |
| Cellu-Son. | Néotrophène. |
| Choléo-Combrétol boldi- | Normacol. |
| nisé. | Normalarine. |
| Choléokinase. | Nujol. |
| Comprimés de Pantolaxine | Nutrobiase Raisin vivant. |
| du D ^r Bovell. | Oléo-Mel. |
| Coprex. | Olrircin Hardy. |
| Coréine. | Opobyl. |
| Cristolax Wander. | Opochol. |
| Curoraisin. | Ostéliné. |
| Cuscutine Foulon. | Panbiline. |
| Dragées, granules Elkin. | Pancrèbile. |
| Élixir Spark. | Paralaxol Tulivet. |
| Elkin (dragées, granules). | Parlax. |
| Évolaxine. | Parolagar. |
| Évonyl. | Pasta Palm. |
| Exonérol. | Péristaltine Ciba. |
| Fluobyl. | Pilules du D ^r Debouzy. |
| Fucosine. | Poudre laxative de Vichy. |
| Gélor. | Poudre Rocher laxative. |
| Grains d'Évian. | Prostigmine Roche. |
| Grains de Vals. | Prunine Sentini. |
| Hépto-Byl. | Puragar. |
| Héptosodine. | Purganol Daguin. |
| Héptozyll Caldo. | Purgos. |
| Hexafel. | Rectopanbiline. |
| Hormobiline. | Régyl. |
| Huillaxine. | Riceyl Billault. |
| Huile Crolas. | Ricigel. |
| Innerclean. | Romarine. |
| Isacène Roche. | Rylal Noyon. |
| Kénol. | Saint-Aré. |
| Kinéchol. | Sel hépatique U. N. Arque- |
| Lactobyl. | vaux. |
| Lactolaxine Fyda. | Sirop Axaria. |
| Lacto-Sérum Lavril. | Sirop de la Maternité. |
| Lait de Magnésie Philipps. | Sirop Sentini. |
| Laminarol. | Sonagar. |
| Lansoyl. | Sonamel. |
| Laxadonal. | Sonène. |
| Laxamalt. | Stomaxines. |
| Laxatifs Miraton Châtel- | Stomoxigène. |
| Guyon. | Tamar Indien Grillon. |
| Laxocholéine Tulivet. | Tamarine. |
| Laxogélose Tulivet. | Taxol. |
| Laxopeptine Girard. | Thaolaxine. |
| Lientine Grémy. | Thé suédois. |
| Limonade Godfrin. | Thiocitran Thévenot. |
| Lin Tarin. | Vacuoline. |
| Listose Vicario. | Varilaxine. |
| Loraga. | Vasolaxine. |
| Magnélox. | Vichy purgatif. |

APPAREIL DIGESTIF. T. G.

LAXATIFS — PURGATIFS

Vulcase.
Yaourtine.

Zymatine Lescène.

PANSEMENTS GASTRIQUES

Alucol Wander.
Antinéase.
Bismuth (Crème de) du
D^r Quesneville.
Bismuth-Desleaux.
Bismuth Tulasne.
Calmag-Na.
Carbosanis.
Charbon Fraudin.
Formocarbène.
Gastrocaol.
Gastropansement du D^r Zi-
zine.
Gastrozymase.

Gélogastrine Licardy.
Gélo-Pansements gastro-
intestinaux.
Kaolinase.
Neutralcaol.
Pangastrol.
Poudre Paterson.
Sel d'Ewald.
Sel de Hunt.
Stal-Kosal.
Stomaxines.
Stomobrol.
Wismuthane Vély.

STIMULANTS DE LA SÉCRÉTION ET DE LA MOTILITÉ GASTRIQUE

Acécoline.
Adrénaline Invar.
Alcalinose.
Allisatine Sandoz.
Alsodine.
Amibiasine.
Bismuth Tulasne.
Boldoïne Éparvier.
Chloridia.
Chophytol Rosa.
Digastrine.
Dragées, granules Elkin.
Élixir du D^r Mialhe.
Elkin (dragées, granules).
Emgé Lumière.
Extrait de Malt français
Déjardin.
Fosfoxy Carron.
Gastrépatine.
Gastricine du D^r E. Duhour-
ceau.
Gastronaldine.
Gastrozymase.

G énésérine
Granulés de Pantofort du
D^r Bovell.
Hépatosodine.
Ionyl.
Isotonyl Bouret.
Malt français Déjardin (Ex-
trait de).
Orthogastrine.
Pancrébile.
Peptodiase.
Phylla Dyn.
Propeptase.
Polyferments.
Régyl.
Rénaleptine.
Romarène.
Sel d'Ewald.
Stomarol.
Strychnal Longuet.
Tridigestine Dalloz.
Tachygastrine Ducloy.
Viceliase.

VACCINOTHÉRAPIE

Ampho-Vaccins Ronchèse.
Antigénines.
Bilivaccin.
Bilivaccin anticolibacil-
laire.

Colitique.
Entéro Antigènes.
Entérofagès.
Entéroxin Leclerc.
Immunizols Grémy.

APPAREIL DIGESTIF. T. G.

VACCINOTHÉRAPIE

Institut Pasteur Vaccins.	Vaccinothérapie atoxique
Lysaxins L. M. L.	Cépède.
Probios.	Vaccins Ronchèse (Ampho-vaccins).

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

AÉROPHAGIE — DILATATION DE L'ESTOMAC

Alcalinose.	Formocarbos.
Alsodine.	Freinospasmyl.
Amphotonyl.	Gastrocalcine.
Appétyl.	Gastrocaol.
Azym.	Gastrodium.
Bi-Citrol Marinier.	Hépatodiase.
Bismusodine.	Hépatosodine.
Bismuth (Crème de) du Dr Quesneville.	Hopogan Bocquillon.
Bismuth (Crème de) Chl. magnésienne du Dr Quesneville.	Ionyl.
Bismuth Desleaux.	Isotonyl Bouret.
Bismuth Tulasne.	Kaobrol.
Blocs Vécór.	Magnésie bismutée.
Calcomagnésie.	Mésogastrine.
Calmag-Na.	Neutralcaol.
Carbocitrol.	Pancarbo Hardy.
Carbonate de Bismuth. — Tablettes Perroud.	Pancréatose Idon.
Carbonésie.	Pangastrol.
Carbophos.	Pangestyl Narty.
Carbosanis.	Peptsodia.
Charbon Fraudin.	Peptodiase.
Charbon Tissot.	Philogastrine.
Chéralys (Comprimés).	Phosphobrom.
Chloridia.	Polyferments Laleut.
Citrocarbène.	Poudre Bellada.
Citrofluyl.	Poudre Paterson.
Citropaine du Dr Fontal.	Propeptase.
Citropeptol.	Pulsamone.
Comprimés Vichy-État.	Régyl.
Digastrine.	Sédatuline.
Digestif Harvey.	Sel d'Ewald.
Digestonic.	Sel de Hunt.
Dyspeptine Hepp.	Sodolactine.
Élixir eupeptique Tisy.	Spasmine Jolly.
Élixir Grez.	Splénocarbène.
Élixir Spark.	Stal-Kosal.
Eupeptique Monavon.	Stomagyl.
Féminadène.	Stomarine Billault.
Formocarbène.	Stomaxines.
	Stomobrol.
	Stomophile.
	Vagosédyl.
	Wismuthane Vély.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ANAPHYLAXIE ALIMENTAIRE

Anaclasine Ranson.	Peptalmine magnésinée.
Anapeptone Vassal.	Pepticol.
Atural.	Peptogil A et L.
Biophylactine M. G.	Peptonal.
Calcozymase.	Peptone Vassal.
Emgé Lumière.	Phylactone Byla.
Entéro-Antigènes.	Polypeptonal.
Ephédrine naturelle Béral.	Prézymase.
Formocarbos.	Protidyne (dragées).
Pancréastase Defresne granulée.	Thiocitran Thévenot.
Peptalmine.	Triseptine.

ANOREXIE

Amunine.	Marimine.
Appétyl.	Marinol.
Arrhéna! Adrian.	Néoarsite.
Arsécrinol.	Néo-Arsycodile.
Arsycodile.	Oposérum.
Arsylène Roche.	Pancrinol du Dr Debat.
Ascoléine Rivier.	Pepticol.
Beef Lavoix.	Peptodiase.
Biocalcose.	Persodine Lumière.
Bionéol.	Phylla Dyn.
Biophylactine M. G.	Phytine Ciba.
Biotrignon.	Plasma de Quinton.
Boldoïne Éparvier.	Protonic.
Boldo-Verne.	Quassia-Kina Rabot.
Carnine Lefrancq.	Quassine Houdé.
Clupeyl.	Quinquina Gmet.
Colloidogénine du Dr Bayle.	Réalphène Buisson.
Condurango Gmet.	Reconstituant Mary.
Cytobiase.	Rylal Noyon.
Dyspeptine Hepp.	Sanas.
Élixir Duchamp.	Sirop Roche au Thiocol.
Élixir Ducro.	Solution Bardet.
Élixir Dussaud.	Stomobrol.
Élixir Eupeptique Tisy.	Tachygastrine Ducloy.
Élixir Spark.	Terpoxyl interne.
Fénucine.	Thyroidine et Radiopho-
Fœnugol.	rine Gory.
Gaduase.	Total-Tonic.
Gmet (Extraits).	Uvé (gouttes).
Héparbiline.	Vanadarsine Guillaumin.
Hormocline.	Vichy-purgatif.
I. A. M.	Viosten.
Insuline buccale Fornet.	Vitamyl.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

CHOLÉCYSTITES — ANGIOCHOLITES

Ampho-vaccins Ronchèse.

Anaclasine.

Baldisedan.

Bensamine.

Benzobromine.

Bi-Citrol Marinier.

Bilivaccin anticolibacillaire.

Boldo Gmet.

Boldoïne Éparvier

Boldorhéine.

Boldo Verne.

Boléase Monal.

Bolène.

Bucmine.

Bulgarine-Thépenier.

Caparlem.

Capsules Bardet.

Carbolactyl bilié.

Cholécystine.

Choléine lactique.

Choléo-Combretol boldinisé.

Choléokinase.

Chophytol Rosa.

Comprimés Urbé.

Delbiase.

Disolurane Vély.

Entéro-Antigènes.

Entérobyl Dehaussy.

Entérofagos.

Euchol.

Eugastrol.

Euonymine Paul Thibault.

Évonyl.

Fluobyl.

Fluocholine.

Formine Adrian.

Formocarbine.

Formocarbos.

Formocitrine.

Gouttes Halogènes du D^r Bern.

Granions.

Héparbiline.

Hépatie Efa du D^r Leca-
cheux.

Hépatosodine.

Hexotal.

Iodhéma.

Kénol.

Lacto-Sérum Lavril

Lénicure Vichy.

Lysaxins L. M. L.

Mésothine.

Microlyse.

Oléocidase.

Oléoformine Corbière.

Olivéol.

Opobyl.

Opochol.

Orthogénol.

Oxyléine.

Pancrébile.

Pangestyl Narty.

Peptalmine magnésinée.

Pilules du D^r Debouzy.

Probios.

Polyformine.

Pyrelaine Collas.

Radiotropine.

Romarène.

Saint-Aré.

Sodothiol.

Splénocarbine.

Thiocitran Thévenot.

Triseptine.

Uricémine.

Urisaninc.

Urobuccol Malmanche.

Uroformine Gobey.

Urométhyl.

Urométine Lambiotte.

Urosalyl. — Urosalyl méthylé.

Urosan Dufayard.

Vaccins Ronchèse (ampho-vaccins).

CIRRHOSES

Agocholine.

Anégrine.

Bi-Citrol Marinier.

Biléyl Fournier.

Biliase Raby.

Biliboldo.

Bilifluine.

Biliogastrine Chevillon.

Boldine Houdé.

Boldo Gmet.

Boldorhéine.

Boldo Verne.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

CIRRHOSES

■ Boléase Monal.	Hépatie Efa du Dr Leca-
■ Carbolactyl billé.	■ cheux.
■ Choléine lactique.	Kinéchol.
■ Choléo-Combretol boldi-	Lacto-Sérum Lavril.
■ nisé.	Lénicure Vichy.
■ Choléokinase.	Magnésium Hardy.
■ Chophytol Rosa.	Mégnésotubés Robinet.
■ Dépuriode du Dr Roger	Oléoformine Corbière.
■ Weber.	Oli véol.
■ Endopancrine.	Opochol.
■ Entérobyl Dehaussy.	Opothérapie Bouty.
■ Euchol.	Panbiline.
■ Euonymine Paul Thibault.	Rénocardine.
■ Fluobyl.	Romarène.
■ Hépatobyl.	Sodothiol.
■ Hépatozyl Caldo.	Tiodine Cognet.

CONGESTIONS DU FOIE — FOIE CARDIAQUE

■ Agarase.	Choléo-Combretol boldi-
■ Agocholone.	■ nisé.
■ Alcasodine.	Choléokinase.
■ Aloïne Houdé.	Chophytol Rosa.
■ Anégrine.	Citrosodine Longuet.
■ Bi-Citrol Marinière.	Comprimés Vichy-État.
■ Biléyl Fournier.	Crypthiol.
■ Biliase Raby.	Curoraisin.
■ Biliboldo.	Cuscutine Foulon.
■ Bilifluine.	Diurène.
■ Biliogastrine Chevillon.	■ Diurétique Gmet.
■ Boldine Houdé.	Dolophos.
■ Boldo Gmét.	Dragées, Granules Elkin.
■ Boldoine Éparvier.	Élixir Spark.
■ Boldorhéine.	Elkin (dragées, granules).
■ Boldo Verne.	Endopancrine.
■ Boléase Monal.	Entéro Antigènes.
■ Bolène.	Entérobyl Dehaussy.
■ Brides (sel naturel, ta-	■ Euonymine Paul Thibault.
■ blettes, pilules, thé de).	Évonyl.
■ Bucmine.	Fluobyl.
■ Caparlem.	Fluocholine.
■ Capsules Bardet.	Formocarbos.
■ Carbocitrol.	Gambéol.
■ Carbolactyl simple.	Gastrépatine.
■ Carbolactyl billé.	Gastronaldine.
■ Cascarine Leprince.	Gastro-Sodine.
■ Catalyl Mg.	Gouttes Magalo.
■ Chéralys (comprimés).	Grains de Vals.
■ Chloro-Magnésion.	Grains d'Évian.
■ Chlormagnésium Fisch.	Gravural.
■ Cholécystine.	Héparbiline.
■ Choléine Camus.	Hépatismine.
■ Choléine lactique.	Hépatobyl.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

CONGESTIONS DU FOIE — FOIE CARDIAQUE

Hépatodiase.
Hépatosodine.
Hépatozyl Caldo.
Hexafel.
Huile Crolas.
Jécol.
Kinéchol.
Lactolaxine Fydau.
Lacto-Sérum Lavril.
Laxadonal.
Lénicure Vichy.
Magnésium Hardy.
Magnésio-tubes Robinet.
Magnétone.
Magsalyl Mg.
Olliricin Hardy.
Opobyl.
Opochol.
Opothérapie Carrion.

Panbiline.
Pancrébile.
Peptalmine magnésinée.
Pilules du Dr Debouzy.
Polypeptonal.
Progaster.
Prométhine.
Romarantyl Trouette-Perret.
Romarène.
Rylal Noyon.
Saint-Aré.
Salsanos.
Sélunio.
Triseptine.
Vicéliase.
Vichy-Purgatif.
Vulcase.

CONSTIPATION

Agarase.
Agocholine.
Aloïne Houdé.
Amidal.
Anusol Mialhe.
Benzylol.
Bi-Citrol Marinier.
Biléyl Fournier.
Biliase Raby.
Biliboldo.
Bilifluine.
Biliogastrine Chevillon.
Bilivaccin anticolibacillaire.
Bis-Ka-Ma.
Bolcitol.
Boldine Houdé.
Boldo Gmet.
Boldoïne Éparvier.
Boldorhéine.
Boldo Verne.
Boléase Monal.
Bolène.
Brides (sel naturel, tablettes, pilules, thé).
Bulgarine Thépenier.
Cachets Pachaut.
Carbalcaloïdes.
Carbatropine.
Carbolactyl bilie.
Carbolin Midy.
Cascara Midy.

Cascarine Leprince.
Catalyl Mg.
Cellu-Son.
Céréales Bébé Favrichon.
Céréales granulées Favrichon.
Choléine Camus.
Choléine lactique.
Choléo-Combretol boldinisé.
Choléokinase.
Choléo-lactol Daguin.
Chlorumagène.
Citropeptol.
Citrophos.
Comprimés de Pantolaxine du Dr Boveil.
Coprex.
Coréine.
Cristolax Wander.
Curoraisin.
Cuscutine Foulon.
Delbiase.
Digastrine.
Digestonic.
Dragées Elkin (et granules).
Élixir Dussaud.
Elkin (dragées, granules).
Emgé Lumière.
Entéro-antigènes.
Entérobil Delhaussy.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

CONSTIPATION

Entérofagos.
Enzypan.
Euchol.
Euonymine Paul Thibault.
Eurectol.
Évolaxine.
Évonyl.
Exonérol.
Facmine Longuet.
Félamine Sandoz.
Fluobyl.
Formocarbène.
Fucosine.
Gambéol.
Gélor.
Grains d'Évian.
Grains de Vals.
Gravural.
Hépatismine.
Hépatosodine.
Hépatozyl Caldo.
Hexafel.
Hormobiline.
Huillaxine.
Huile Crolas.
Innerclean.
Isacène Roche.
Kénol.
Kinéchol.
Lactimase.
Lactobyl.
Lactolaxine Fyda.
Lacto-sérum Lavril.
Lait de magnésie Phillips.
Laminarol.
Laminolax.
Lansoyl.
Laxadonal.
Laxamalt.
Laxatifs Miraton Châtel-
Guyon.
Laxocholéine Tulivet.
Laxogélose Tulivet.
Laxopeptine.
Lénicure Vichy.
Lientine Grémy.
Limonade Godfrin.
Lin-Tarin.
Listose Vicario.
Loraga.
Magnelax.
Magnésium Hardy.
Magnésio-Tubes Robinet.
Mucicarbos.

Mucilaxine.
Mucinum.
Néotrophène.
Normacol.
Nujol.
Nutrobiase.
Oléo-Mel.
Olliricin Hardy.
Opobyl.
Opochlorine.
Opochol.
Ostéline.
Panbiline.
Pancrébile.
Papavéryl.
Paralaxol.
Parlax.
Parolagar.
Pasta-Palm.
Péristaltine Ciba.
Pilules du Dr Debouzy.
Pituitobiline, Byla.
Poudre Bellada.
Poudre laxative de Vichy.
Poudre Rocher laxative.
Probios.
Prostigmine Roche.
Prunine Sentini.
Puragar.
Purganol Daguin.
Purgos.
Rectopanbiline.
Ricéyl Billault.
Ricigel.
Romarène.
Rylal Noyon.
Saint-Aré.
Salvé.
Sel hépatique U. N. Arque-
vaux.
Selunic
Sirop Axaria.
Sirop de la Maternité.
Sirop Sentini.
Sonagar.
Sonamel.
Sonène.
Sornyal.
Stal-Kosal.
Stomoxygène.
Sulfobyl.
Suppositoires Chaumel.
Suppositoires Gonnon.
Suppositoires Pachaut.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

CONSTIPATION

Suppositoires Pepet.
Tamar Indien Grillon.
Tamarine.
Taxol.
Thaolaxine.
Thé Suédois.
Thiocitran Thévenot.
Vacuoline.

Varilaxine.
Vasolaxine.
Vichy-Purgatif.
Vulcase.
Wismuthane Vély.
Yaourtine.
Zymatine Lescène.

DYSENTERIES — CHOLÉRA

Absuric.
Acolitol.
Alucol Wander.
Alunozal.
Amibiasine.
Amidal.
Amiphène Carron.
Ampho-Vaccins Ronchèse.
Argion.
Bacté-phages,
Bactériophages Leclerc.
Bilivaccin.
Bioentérase.
Biolactyl Fournier.
Bismuth Desleaux.
Bismuth Tulasne.
Bulgarine Thépenier.
Carbalcaloides.
Carbolactyl simple.
Charbon Fraudin.
Charbon Tissot.
Chlorobacilline.
Chlorobyl.
Comprimés Galac.
Crésentyl.
Cryptargol Lumière.
Élixir Bonjean.
Élixir Godfrin.
Entéro-antigènes.
Entérofagos.
Entérohépatine.

Entéroxin Leclerc.
Facmine Longuet.
Formocarbène.
Gastrocaol.
Glyco-Lactimase.
Glyco-Thymoline.
Institut Pasteur Sérums.
Institut Pasteur Vaccins.
Iodure d'amidon Lumière.
Kerlactine.
Lactimase.
Lactobacilline.
Lactochol.
Lait Mont-Blanc.
Larosane Roche.
Leucoseptyl.
Levure B. 17 de H. Bou-
lard.
Ludin.
Malarsan.
Marrubiase.
Oxyléine.
Pancarbo Hardy.
Pâte Spécia.
Probios.
Splénocarbène.
Stupho.
Tapo.
Tréparsol.
Ultra-Levure.
Yaourtine.

DYSPEPSIES

Adrénaline Invar.
Agocholène.
Alcalinose.
Alcasodine.
Allisatine Sandoz.
Alsodine.
Amylodiastase Thépenier.
Anacidase.
Appétyl.

Azym.
Babeurre « La Faye ».
Bi-Citrol Marinier.
Biliogastrine Chevillon.
Biophylactine M. G.
Bismuth Desleaux.
Bismuth Tulasne.
Bolcitol.
Cachets Roche de Thiocol.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

DYSPEPSIES

Calcozymase.	Extrait de Malt français
Calmag-Na.	Déjardin.
Carbocitrol.	Fantine.
Carbonésie.	Farine maltée Favrichon.
Carbos.	Ferment pur de raisin.
Carbosanis.	Fluobyl.
Carypaine.	Formocarbine.
Cétrarose Gigon.	Formocarbo.
Charbon Fraudin.	Gastrepatine.
Charbon Tissot.	Gastricine du D ^r E. Duhour-
Chéralys (comprimés).	cau.
Chloridia.	Gastrocalcine.
Choléine Camus.	Gastrocaol.
Citrocarbaine.	Gastrodium.
Citrosluyl.	Gastronaldine.
Citropaine du D ^r Fontal.	Gastropansement du D ^r Zi-
Citropeptol.	zine.
Citrophos.	Gastro-Sodine.
Citrosodine Longuet.	Gastrozymase.
Complextraits.	Gélo-pansements gastro-
Comprimés Adrian.	intestinaux.
Comprimés Roche de Thio-	Génatropine.
col.	Génésérine.
Comprimés Vichy-État.	Gmet (Extraits).
Condurango Gmet.	Gouttes Magalo.
Crème de Bismuth Chl.	Grains de Vals.
magnésienne du D ^r Ques-	Grains d'Évian.
neville.	Grand Cidre Bol Régime.
Crème de Bismuth du D ^r	Hépatodiase.
Quesneville.	Hopogan Bocquillon.
Diasés.	Iodure d'amidon Lumière.
Diasto-pepsine Richepin.	Ionyl.
Digastrine.	Isotonyl Bouret.
Digestif Harvey.	Kaobrol.
Digestonic.	Kinéchol.
Doloma.	Lait de Magnésie Philipps.
Dolophos.	Lait Mont-Blanc.
Dragées Elkin (et gra-	Larosan Roche.
nules).	Levure fraîche Mycéta.
Dyspeptine Hepp.	Magnésie bismurée.
Élixir Bonjean.	Maltase Fanta.
Élixir Ducro.	Malt Barley.
Élixir du D ^r Mialhe.	Maltéa Moser cristallisée.
Élixir Dussaud.	Malt français Déjardin (Ex-
Élixir eupeptique Tisy.	trait de).
Élixir Grez.	Maltosan.
Élixir Spark.	Malt pailleté.
Elkin (dragées, granules).	Malt Wander ou Gloma.
Emgé Lumière.	Mangaine.
Entéro-Antigènes.	Mésogastrine.
Enzypan.	Mucicarbos.
Eugastrol.	Nigérine Vincent.
Eupeptique Monavon.	Novatropin.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

DYSPEPSIES

Novolactol Daguin.	Quassine Houdé.
Nutrobiase.	Régyl.
Opobyl.	Rénaleptine.
Opochlorine.	Romarène.
Opothérapie Bouty.	Salsanos.
Orthogastrine.	Sédarsan.
Orthogénol.	Sédobrol Roche.
Panbiline.	Sédogastrine.
Pancréanne.	Sel de Hunt.
Pancréastase Defresne granulée.	Sel d'Ewald.
Pancréatose Idon.	Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Pancrèbile.	Selunio.
Pangastrol.	Sirop Roche au Thiocol.
Pangestyl Narty.	Sodolactine.
Papaine Trouette-Perret.	Spasmacol.
Pepsodia.	Splénocarbine.
Peptalmine.	Staphylase du Dr Doyen.
Peptalmine magnésinée.	Stomagyl.
Pepticol.	Stomarine Billault.
Peptodiase.	Stomaryl.
Peptogil A et L.	Stoméol Vichy.
Peptonal.	Stomobrol.
Peptone Vassal.	Stomophile.
Peptosthénine Choay.	Stomoxygène.
Philogastrine.	Sulfohyl.
Phosoforme.	Super digestif Legrand.
Phytomarine.	Tablettes Perroud.
Pluribiase.	Tachygastrine Ducloy.
Polyferments Laleuf.	Tapo.
Polypeptonal.	Thiocitran Thévenot.
Poudre Bellada.	Thiocol Roche.
Poudre Paterson.	Tridigestine Dalloz.
Poudre Stom.	Vichy-purgatif
Propeptase.	Vin de Chassaing.
Protiodyne.	Vitaminol.
Proxytol.	Vitamyl.
	Zymogastrine.

ENTÉRITES AIGÜES — DIARRHÉES COLIQUES FERMENTATIONS INTESTINALES

Acolitol.	Amunine.
Allisatine Sandoz.	Amylodiastase Thépenier.
Aloysine.	Anaclasine Ranson.
Alsodine.	Anapeptone Vassal.
Alucol Wander.	Aniodol.
Alunozal.	Antigénines.
Ambiasine.	Argion.
Amidal.	Atural.
Amiphène Carron.	Azym.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Bacté-phages.
Ampoules de Sécacornine Roche.	Bactériophages Leclerc.
	Bellafofine Sandoz

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES AIGÜES — DIARRHÉES COLIQUES FERMENTATIONS INTESTINALES

Bensomine.	Entéroseptyl.
Benzophosphine Chris- tiaens.	Entéroxin Leclerc.
Benzylol.	Eugastrol.
Bioentérase.	Exonérol.
Biolactyl Fournier.	Facmine Longuet.
Bis-Ka-Ma.	Formine Adrian.
Bismuth (Crème de) du D ^r Quesneville.	Formocarbos.
Bismuth Desleaux.	Formocarbos.
Bismuth Tulasne.	Gastrépatine.
Boldoine Éparvier.	Gastrocaol.
Bulgarine Thépenier.	Gastrozymase.
Cachets Roche de Thiocol.	Gélo-pansements gastro-in- testinaux.
Carbolactyl simple.	Gélotanin.
Carbolin Midy.	Génatropine.
Carbonate de bismuth. — Tablettes Perroud.	Glaxo.
Carbonésie.	Glyco-Lactimase.
Carbophos.	Glyco-Thymoline.
Carbos.	Goménol.
Carbosanis.	Gouttes Daynoc.
Carypaine.	Hexafel.
Charbon Fraudin.	Hopogan Bocquillon.
Charbon Tissot.	Infra-rouges.
Chéralys (comprimés).	Iodure d'amidon Lumière.
Chloramine Freyssinge.	Kaolinase.
Chlorobacilline.	Kerlactine.
Chlorobyl.	Lac-Ser.
Citrocarbène.	Lactaris.
Citropaine du D ^r Fontal.	Lacticholéine Tulivet.
Citropeptol.	Lactimase.
Complexes colloïdaux du D ^r Riquoir.	Lactobacilline.
Comprimés Galac.	Lactochol.
Comprimés Roche de Thiocol.	Lactolaxine Fydau.
Coréine.	Lacto-Sérum Lavril.
Cryptargol Lumière.	Lait de magnésie Philipps.
Digastrine.	Lait Mont-Blanc.
Dyspeptine Hepp.	Larosan Roche.
Élixir Bonjean.	Levure B. 17.
Élixir Dussaud.	Levure Maltine Déjardin.
Élixir eupeptique Tisy.	Magnéla.
Élixir Godfrin.	Marrubiase.
Élixir Spark.	Mucicarbos.
Emgé Lumière.	Nigérine Vincent.
Entériode.	Novolactol Daguin.
Entéro-Antigènes.	Ouataplasme du D ^r Lan- glebert.
Entérobyl Dehaussy.	Oxyléine.
Entérofagos.	Pancarbo Hardy.
Entérohépatine.	Pancréatose Idon.
	Pancrébile.
	Pangastrol.
	Pangestyl Narty.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES AIGÜES — DIARRHÉES COLIQUES FERMENTATIONS INTESTINALES

Paralactine Byla.	Splénocarbine.
Pepsodia.	Stomagyl.
Peptogil A et L.	Stomaxines.
Phosoforme.	Stomobrol.
Plasma de Quinton.	Stovarsol.
Poudre Paterson.	Stupho.
Poudre Stom.	Super digestif Legrand.
Probios.	Tablettes Perroud.
Régyl.	Tapo.
Sanluol.	Thiocol Roche.
Sécacornine Roche.	Thoroxyl.
Sel d'Ewald.	Triseptine.
Septicémine Cortial.	Ultra-Levure.
Sirop phéniqué Vial.	Uvargol.
Sirop Roche au Thiocol.	Vaccinothérapie atoxique
Sirop Teyssèdre.	Cépède.
Sornyal.	Vigardyne.
Spasmalgine Roche.	Yaourtine.

ENTÉRITES CHRONIQUES APPENDICITE CHRONIQUE

Acolitol.	Bismusodine.
Agarase.	Bismuth (Crème de) du
Alcalinose.	D ^r Quesneville.
Allisatine Sandoz.	Bismuth Desleaux.
Alucol Wander.	Bismuth Tulasne.
Alunozal.	Bolcitol.
Amibiasine.	Boléase Monal.
Amidal.	Bolène.
Amiphène Carron.	Bulgarine Thépenier.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Carbalcaloïdes.
Amylodiasase Thépenier.	Carbatropine.
Anacidase.	Carbolactyl simple.
Anapeptone Vassal.	Carbolactyl bilié.
Aniodol.	Carbolin Midy.
Antigénines.	Carbonate de bismuth
Argion.	Perroud.
Atural.	Carbonésie.
Babeurre « La Faye ».	Carbophos.
Bacté-phages.	Carbos.
Bellafoline Sandoz.	Carbosanis.
Biléyl Fournier.	Charbon Fraudin.
Biliase Raby.	Charbon Tissot.
Biliboldo	Chéralys (comprimés).
Bilifluine.	Chloramine Freyssinge.
Biliogastrine Chevillon.	Chlorobacilline.
Bilivaccin anticolibacil-	Chlorobyl.
laire.	Chloro-Calcion.
Biolactyl Fournier.	Chlorumagène.
Bis-Ka-Ma.	Choléine Camus.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES CHRONIQUES APPENDICITE CHRONIQUE

Choléine lactique.
Choléo-Combretol boldi-
Chnisé.
Choléokinase.
Choléo-lactol Daguin.
Citrocarbine.
Citropaine du Dr Fontal.
Colitique.
Complexes colloïdaux du
Dr Riquoir.
Comprimés Galac.
Comprimés Roche de Thio-
col.
Comprimés Vichy-État.
Coprex.
Coréine.
Crème de bismuth Chl. ma-
gnésienne du Dr Quesné-
ville.
Crème de bismuth magné-
sienne du Dr Quesneville.
Crésentyl.
Cryptargol Lumière.
Cytomagnésium Lindeux.
Delbiase.
Diases.
Diasto-pepsine Richepin.
Digastrine.
Digestif Harvey.
Doloma.
Dolophos.
Dyspeptine Hepp.
Élixir Godfrin.
Élixir Spark.
Entériode.
Entérofagos.
Entéro-antigènes.
Entérohépatine.
Entéroseptyl.
Enzypan.
Eugastrol.
Évolaxine.
Exonérol.
Facmine Longuet.
Ferment pur de raisin.
Formine Adrian.
Formocarbine.
Formocarbos.
Galabactéine.
Gastrépatine.
Gélo-pansements gastro-in-
testinaux.
Génatropiné.

Génomorphine.
Glaxo.
Glyco-lactimase.
Glyco-Thymoline.
Goménol.
Gouttes Daynoc.
Grand Cidre Bol Régime.
Hépatobyl.
Hépatodiase.
Hépatozyl Caldo.
Hexafel.
Hopogan Bocquillon.
Hormobiline.
Huile Crolas.
Immunizols Grémy.
Infra-rouges.
Iodure d'amidon Lumière.
Jécol.
Kaolinase.
Kerlactine.
Lac-Ser.
Lactaris.
Lacticholéine Tulivet.
Lactimase.
Lactobacilline.
Lactochol.
Lactolaxine Fydan.
Lacto-Sérum Lavril.
Lait Mont-Blanc.
Laminarol.
Lansoyl.
Laxamalt.
Laxatifs Miraton Châtel-
Guyon.
Laxocholéine Tulivet.
Levure B. 17.
Lientine Grémy.
Lin-Tarin.
Listose Vicario.
Lysaxins L. M. L.
Maltase Fanta.
Malt Barley.
Maltea Moser cristallisée.
Malt pailleté.
Malt Wander ou Gloma.
Marrubiase.
Microlyse.
Mucicarbos.
Mucilaxine.
Naphtocarbine.
Néo-Collargol.
Nigérine Vincent.
Normacol.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ENTÉRITES CHRONIQUES APPENDICITE CHRONIQUE

Normalarine.	Sel d'Ewald.
Novatropin.	Selunic.
Novolactol Daguin.	Septicémine Cortial.
Nutrobiase Raisin vivant.	Sirop Roche au Thiocol.
Oloricin Hardy.	Spasmacol.
Opobyl.	Spasmalgine Roche.
Opochol.	Splénocarbine.
Opochlorine.	Stal-Kosal.
Orthogastrine.	Staphylase du Dr Doyen.
Oxyléine.	Stomagyl.
Panbiline.	Stomaxines.
Pancarbo Hardy.	Stomobrol.
Pancréanne.	Stomoxygène.
Papavéryl.	Sulf-Y.
Paralactine Byla.	Tablettes Perroud.
Paralaxol Tulivet.	Tapo.
Parlax.	Taxol.
Peptalmine.	Thiocol Roche.
Peptalmine magnésifiée.	Tonikéine Chevreton.
Peptogil A et L.	Tréparsol.
Phytomarine.	Tridynol.
Pilules du Dr Debouzy.	Triseptine.
Plasma de Quinton.	Ultra-Levure.
Polyferments Laleuf.	Uvargol.
Poudre Bellada.	Vaccinothérapie aloxique
Poudre Paterson.	Cépède.
Probios.	Vasolaxine.
Progaster.	Vichy-Purgatif.
Protiodyne dragées.	Vigardine.
Proxytol.	Vulcase.
Réalphène Buisson.	Wismuthane Vély.
Rylal Noyon.	Yaourtine.

GASTRALGIES

Alcasodine.	Citrosodine Longuet.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Codérax.
Bellafoline Sandoz.	Complexextraits.
Bi-Citrol Marinier.	Comprimés Adrian.
Bismuth (Crème de) du Dr Quesneville.	Comprimés Vichy-État.
Bismuth-Desleaux.	Condurango Gmet.
Calcomagnésie.	Dias.
Calmag-Na.	Digestif Harvey.
Carbonate de Bismuth (tablettes Perroud).	Élixir Eupeptique Tisy.
Carbonésie.	Eugastrol.
Cétrarose Gigon.	Eupeptique Monavon.
Charbon Tissot.	Florhépatine.
Chloridia.	Gastrocaol.
Citrofluyl.	Gastronaldine.
	Gastropansement du Dr Zl-zine.
	Gastro-Sodine.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

GASTRALGIES

Gastrozymase.	Sédatuline.
Gélogastrine Licardy.	Sédobrol Roche.
Génatropine.	Sédogastrine.
Gmet (Extraits).	Sel de Hunt.
Kaobrol.	Sel d'Ewald.
Kaolinase.	Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Lait de magnésie Philipps.	Spasmacol.
Magnésie bismurée	Stal-Kosal.
Mésogastrine.	Stomagyl.
Orthogastrine.	Stomarine Billault.
Pancarbo Hardy.	Stomaxines.
Pancréatose Idon.	Stoméol Vichy.
Pepsodia.	Stomobrol.
Poudre Paterson.	Stomophile.
Poudre Stom.	Super digestif Legrand.
Régyl.	Tablettes Perroud.
Salsanos.	Wismuthane Vély.

GASTRO-ENTÉRITES DE L'ENFANCE DIARRHÉES INFANTILES

Alunozal.	Entéro-Antigènes.
Amibiasine.	Entérofagos.
Amidal.	Entéroxin Leclerc.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Fantine.
Amylodiasase Thépenier.	Formocarbine.
Aniodol.	Gastrozymase.
Antigénines.	Gélogastrine Licardy.
Azym.	Gélotanin.
Babeurre La Faye.	Glaxo.
Babeurre Nutricia.	Glyco-lactimase.
Bacté-phages.	Goménol.
Bactériophages.	Gouttes Daynoc.
Biocéane.	Hopogan Bœcquillon.
Bioentérase.	Kymosine.
Biolactyl Fournier.	Lab Lacto Ferment.
Blédine Jacquemaire.	Lac-Ser.
Bulgarine Thépenier.	Lactaris.
Calcoléol.	Lacticholéine Tulivet.
Carbolactyl simple.	Lactimase.
Carbos.	Lactochol.
Carypaine.	Lacto-Sérum Lavril.
Céréales Bébé Favrichon.	Lait C. G.
Citrosodine Longuet.	Lait Mont-Blanc.
Complexes colloïdaux du D ^r Riquoir.	Larosan Roche.
Comprimés Galac.	Laxopeptine Girard.
Cryptargol Lumière.	Leucoseptyl.
Diasés.	Levure B. 17.
Diasto-pepsine Richepin.	Maltéa Moser cristallisée.
Dryco.	Maltosan.
Dyspepsine Hepp.	Marrubiase.
Élixir Bonjean.	Naphtocarbine.
Entériode.	Néo-physiosthénine. Physi- osthénine.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

GASTRO-ENTÉRITES DE L'ENFANCE DIARRHÉES INFANTILES

Novolactol Daguin.

Nutro.

Opochlorine.

Oxyléine.

Papaine Trouette-Perret.

Paralactine Byla.

Peptogil A et L.

Plasma de Quinton.

Poudre Paterson.

Probiols.

Proxyltol.

Sel de Hunt.

Sodolactine.

Stupho.

Suppositoires Pyrax.

Thoroxyl.

Tachygastrine.

Ultra-Levure.

Uvargol.

Vigardine.

Yaourtine.

Zymatine Lescène.

Zymogastrine Kervan.

HÉMATÉMÈSE — MELCÈNA

(Voir: Appareil circulatoire: Hémostatique).

HYPERCHLORHYDRIE

Alcalinose.

Alcasodine.

Alsodine.

Alucol Wander.

Anacidase.

Antinéase.

Azym.

Bi-Citrol Marinier.

Bis-Ka-Ma.

Bismusodine.

Bismuth (Crème de) du
D^r Quesneville.

Bismuth-Desleaux.

Bismuth-Tulasne.

Bradygastrine Ducloy.

Calmag-Na.

Carbonésie.

Carbophos.

Carbos.

Carbosanis.

Charbon Fraudin.

Charbon Tissot.

Chéralys (comprimés).

Citropaine du D^r Fontal.

Citrophos.

Citrosodine Longuet.

Comprimés Adrian.

Comprimés Vichy-État.

Digestif Harvey.

Digestonic.

Doloma.

Dolophos.

Formocarbène.

Gastrépatine.

Gastrocaol.

Gastrodium.

Gastronaldine.

Gastropansement du D^r Zi-
zine.

Gastro-Sodine.

Gastrozymase.

Gélogastrine Licardy.

Gélo-pansements gastro-
intestinaux.

Génatropine.

Hépatosodine.

Isotonyl Bouret.

Kaobrol.

Kaolinase.

Lait de magnésie Philipps

Magnésie bismurée.

Mésogastrine.

Neutralcaol.

Novatropin.

Orthogastrine.

Panbiline.

Pancarbo Hardy.

Pangastrol.

Pangestyl Narty.

Pepsodia.

Philogastrine.

Phylla Dyn.

Poudre Paterson.

Poudre Stom.

Propeptase.

Régyl.

Salsanos.

Sédogastrine.

Sel de Hunt.

Sel d'Ewald.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

HYPERCHLORHYDRIE

Sel digestif Bé-Mé-Cé.	Stomobrol.
Sodolactine.	Stomophile.
Stal-Kosal.	Super digestif Legrand.
Stomagyl.	Tablettes Perroud.
Stomarine.	Wismuthane Vély.
Stomaxines.	Zymatine Lescène.
Stoméol Vichy.	Zymogastrine Kervan.

HYPOCHLORHYDRIE — HYPOPEPSIE ATONIE GASTRIQUE

Acécoline.	Gastrozymase.
Alcalinose.	Génésérine.
Allisatine Sandoz.	Hépatodiase.
Alsodine.	Hépatosodine.
Azym.	Ionyl.
Bi-Citrol Marinier.	Isotonyl Bouret.
Bismuth (Crème de) du D ^r Quesneville.	Mésogastrine.
Bismuth magnésienne (Crème de) du D ^r Ques- neville.	Orthogénol.
Boldoine Éparvier.	Pancréastase Defresne gra- nulée.
Boldo-Verne.	Pangestyl Narty.
Calcomagnésie.	Papaine Trouette-Perret.
Carbocitrol.	Peptodiase.
Carbonate de bismuth, ta- blettes Perroud.	Peptosthénine Choay.
Chloridia.	Persodine Lumière.
Dyspeptine Hepp.	Phosoforme.
Élixir Bonjean.	Pluribiase.
Élixir du D ^r Mialhe.	Polyferments.
Élixir Dussaud.	Propeptase.
Élixir Grez.	Quassine Houdé.
Élixir Spark.	Sel d'Ewald.
Enzypan.	Sel de Hunt.
Eupeptique Monavon.	Selunic.
Gastricine du D ^r E. Duhour- cau.	Sodolactine.
Gastrocalcine.	Stomarol.
Gastrodium.	Stomaxines.
Gastronaldine.	Strychnal Longuet.
Gastropansement du D ^r Zi- zine.	Sulfobyl.
	Super digestif Legrand.
	Tachygastrine Ducloy.
	Vicéliase.
	Vin de Chassalng.

ICTÈRES — CHOLÉMIE

Adrénoïdes Béral.	Bi-Citrol Marinier.
Agarase.	Biléyl Fournier.
Agocholine.	Biliase Raby.
Alcasodine.	Biliboldo.
Anaclasine.	Bilifluine.
Anégrine.	Biliogastrine Chevillon.
Babeurre « La Faye ».	Bolcitrol.
Bensamine.	Boldine Houdé.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

ICTÈRES — CHOLÉMIE

Boldo Gmet.	Hépatismine.
Boldoine Éparvier.	Hépato-Byl.
Boldorhéine.	Hépatodiase.
Boldo Verne.	Hépatosodine.
Boléase Monal.	Hépatozyl Caldo.
Bolène.	Hormobiline.
Brides (Sel naturel, tablettes, pilules).	Huile Crolas.
Bucmine.	Kinéchol.
Bulgarine.	Lac-Ser.
Cachets Pachaut.	Lacticholéine Tulivet.
Caparlem.	Lacto-Sérum Lavril.
Capsules Bardet.	Laxocholéine Tulivet.
Carbolactyl simple.	Magnésium Hardy.
Carbolactyl bilité.	Magnésio-tubes Robinet.
Cascarine Leprince.	Magnétone.
Catalyl Mg.	Magsalyl Mg.
Chlormagnésium Fisch.	Malt pailleté.
Chloro-magnésion.	Normalarine.
Cholécystine.	Oléocidase.
Choléine Camus.	Oléoformine Corbière.
Choléine lactique.	Olivéol.
Choléo-Combretol boldinisé.	Oliricin Hardy
Choléokinase.	Opobyl.
Choléo-Lactol Daguin.	OPOCHLORINE.
Chophytol Rosa.	OPOCHOL.
Citropaine du Dr Fontal.	Opothérapie Bouty.
Comprimés Vichy-État.	Opothérapie du Dr Frayssé.
Crypthiol.	Orthogénol.
Curoraisin.	Panbiline.
Cytomagnésium Lindeux.	Pancrébille.
Dépuriole du Dr Roger Weber.	Pangestyl Narty.
Endopancrine.	Pilules du Dr Debouzy.
Entérobyl Dehaussy.	Poudre Bellada.
Entéroseptyl.	Progaster.
Euchol.	Prométhine.
Euonymine Paul Thibault.	Radiotropine.
Félamine Sandoz.	RévuIsoplasme.
Florhépatine.	Romarantyl Trouette-Perret.
Fluobyl.	Romarène.
Fluocholine.	Saint-Aré.
Formocitrine.	Selunic.
Gambéol.	Sodothiol.
Gastrépatine.	Stomagyl.
Gastrodium.	Thiocitrin.
Gastro-Sodine.	Tonicaleine.
Glyco-lactimase.	Triseptine.
Gouttes Magalo.	Ulcéosine.
Gravural.	Vichy-Purgatif.
Héparbiline.	Vulcase.
Hépatie Efa du Dr Lecaheux.	Yaourtine.
	Zymatine Lescène.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

INFECTIONS INTESTINALES

Acolitol.	Iodure d'amidon Lumière.
Amibiasine.	Kerlactine.
Amidal.	Lac-Ser.
Amiphène Carron.	Lactaris.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Lacticholène Tulivet.
Anacidase.	Lactimase.
Aniodol.	Lactobacilline.
Argion.	Lactochol.
Bensomine.	Lacto-Sérum Lavril.
Bismuth Desleaux.	Laminarol.
Bismuth Tulasne.	Leucoseptyl.
Boldoine Éparvier.	Levuro Maltine Déjardin.
Bolène.	Microlysine.
Carbophos.	Mucicarbo.
Céthocal du Dr Lemay.	Naphtocarbine.
Charbon Fraudin.	Néo-Physiosthénine. Physi-
Charbon Tissot.	osthénine.
Chloramine Freyssinge.	Nigérine Vincent.
Chlorobacilline.	Oléo-Mel.
Chlorobyl.	Pancarbo Hardy.
Choléo-Lactol Daguin.	Pancrébile.
Citrocarbène	Pangestyl Narty.
Colitique.	Poudre Paterson.
Colloïxols.	Probios.
Complexes colloïdaux du	Progaster.
Dr Riquoir.	Splénocarbène.
Comprimés Galacé.	Stomaxines.
Crésentyl.	Stomoxigène.
Cryptargol Lumière.	Sulfobyl.
Diasés.	Sulf-Y.
Emgé Lumière.	Terpoxyl interne.
Entéro-Antigènes.	Triseptine.
Entérofagos.	Ultra-Levure.
Entéroxin Leclerc.	Ur-Clar.
Facmine Longuet.	Urisanine.
Formocarbène.	Urométine Lambiotte.
Formocarbo.	Urosalyl. — Urosalyl mé-
Galabactéine.	thylé.
Gambéol.	Uvargol.
Glyco-Lactimase.	Vaccins Ronchèse (Ampho-
Goménol.	vaccins).
Gouttes Halogènes du	Vigardyne.
Dr Bern.	Wismuthane Vély.
Hopogan Bocquillon.	Yaourtine.
Immunizols Grémy.	

INSUFFISANCE HÉPATIQUE

Agarase.	Babeurre « La Faye ».
Agocholine.	Bi-Citrol Marinier.
Alcasodine.	Biléyl Fournier.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Biliase Raby.
Anaclasine Ranson.	Biliboldo.
Anégrine.	Biliduine.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

INSUFFISANCE HÉPATIQUE

Biliogastrine Chevillon.	Fluobyl.
Bolcitol.	Fluocholine.
Boldine Houdé.	Formocarbos.
Boldo Gmet.	Formocitrine.
Boldoine Éparvier.	Gambéol.
Boldorhéine.	Gastrépatine.
Boldo Verne.	Gastrodium.
Boléase Monal.	Gastro-Sodine.
Brides (Sel naturel, tablettes, pilules, thé de)	Glyco-Lactimase.
Bucmine.	Gouttes Halogènes du Dr Bern.
Cachets Pachaut.	Gouttes Magalo.
Calcozymase.	Grains de Vals.
Caparlem.	Grains d'Évian.
Capsules Bardet.	Grand Cidre Bol Régime.
Carbocitol.	Héparbiline.
Carbolactyl bilié.	Hépatismine.
Cascarine Leprince.	Hépto-Byl.
Catalyl Mg.	Hépatodiase.
Chéralys ((comprimés).	Hépatosodine.
Chloro-Magnésion.	Hépatozyl Caldo.
Chlormagnésium Fisch.	Hépatrol.
Chlorumagène.	Hépatrol injectable
Cholécystine.	Hexafel.
Choléine Camus.	Hormobiline.
Choléine lactique.	Jécol.
Choléo-Combretol boldinisé.	Kénol.
Choléokinase.	Kinéchol.
Choléo-Lactol Daguin.	Lac-Ser.
Cholergine.	Lacticholéine Tulivet.
Chophytol Rosa.	Lactobyl.
Citrocarbine.	Lactochol.
Citrofluyl.	Lactolaxine Fydau.
Citropaine du Dr Fontal.	Lacto-Sérum Lavril.
Citrophos.	Lait de magnésie Philipps.
Citrosodine Longuet.	Laminarol.
Comprimés Vichy-État.	Laxadonal.
Crypthiol.	Laxatifs Miraton Châtel-Guyon.
Cytomagnésium Lindeux.	Laxocholéine Tulivet.
Diasto-pepsine Richepin.	Lénicure Vichy.
Diurène.	Levure fraîche Mycéta.
Dolophos.	Magnésium Hardy.
Dragées, granules Elkin.	Magnésio-tubes Robinet.
Elixir Spark.	Magnétone.
Elkin (dragées, granules).	Magol Churchill.
Emgé Lumière.	Magsalyl Mg.
Entéro-antigènes.	Malt pailleté.
Enzypan.	Néotrophène.
Euchol.	Neubryne.
Euonymine Paul Thibault.	Nutrobiase, raisin vivant.
Evonyl.	Oléoformine Corbière.
Félamine Sandoz.	Olliricin Hardy.
Florhépatine.	Olivéol.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

INSUFFISANCE HÉPATIQUE

Opobyl.	Saint-Aré.
Opochol.	Salsanos.
Opothérapie Carrion.	Salvé.
Opothérapie Choay.	Sel hépatique U. N. Arques-vaux.
Opothérapie du D ^r Fraysse.	Selunic.
Orthogastrine.	Sodothiol.
Orthogénol.	Sonamel.
Panbiline.	Spléno-magnésium.
Pancréatose Idon.	Stomaxines.
Pancrébile.	Stomoxygène.
Pancrinol du D ^r Debat.	Sulfobyl.
Pangestyl Narty.	Tapo.
Peptalmine magnésiée.	Thiocitran Thévenot.
Peptogil A et L.	Tonicalcine.
Peptosthénine Choay.	Triseptine.
Phosoforme.	Ulcéosine.
Pilules du D ^r Debouzy.	Vaccins Ronchèse (ampho-vaccins).
Polyferments Laleuf.	Vicéliase.
Polypeptonal.	Vichy-Purgatif.
Poudre Bellada.	Vulcase.
Progaster.	Yaourtine.
Prométhine.	Zymatine Lescène.
Proxytol.	Zymogastrine Kervan.
Romarantyl Trouette-Perret.	
Romarène.	

INSUFFISANCE PANCRÉATIQUE

(Voir : Maladies de la nutrition : Diabète.)

Carbolactyl simple.	Enzypan.
Calcozymase.	Gambéol.
Choléokinase.	Opothérapie Carrion.
Choléo-Lactol Daguin.	Opothérapie Choay.
Diasto-Pepsine Richepin.	Pancrébile.
Dragées Elkin (et granulés).	Peptosthénine Choay.
Elixir Dussaud.	Polyferments Laleuf.
Elkin (dragées, granulés).	

INTOXICATIONS

Acolitol.	Charbon Tissot.
Alcasodine.	Dragées Elkin.
Ampho-vaccins Ronchèse	Elkin (dragées, granulés)
Anaclasine Ranson.	Entéro-antigènes.
Aniodol.	Formocarbène.
Azym.	Gambéol.
Biolactyl Fournier.	Gélo-Pansement gastro-intestinaux.
Boldo Gmet.	Lichénose Ducloy.
Carbolactyl bilie.	Métaformine.
Carbolactyl simple.	Nigérine Vincent.
Carbonésie.	Novolactol Daguin.
Carbos.	Opoferrine Vitaminée.
Carbosanis.	Orthogastrine.
Charbon Fraudin.	

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

INTOXICATIONS

Oxy-injecteur du Dr Fialip.	Régyl.
Oxyléine.	Rylal Noyon.
Pancarbo Hardy.	Yaourtine.

LITHIASÉ BILIAIRE — COLIQUES HÉPATIQUES

Acatar.	Formine Adrian.
Agocholone.	Formocarbène.
Ampoules de Pantopon Roche.	Formocitrine.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Génomorphine.
Anaclasine.	Gravural.
Baume Adol.	Héparbiline.
Baume Aroma.	Hépatif Efa du Dr Leca-
Baume Bengué.	cheux.
Bensamine.	Hépatosodine.
Benzylol.	Hépatozyl Caldo.
Bilexabol.	Hexafel.
Biléyl Fournier.	Hexotal.
Biliase Raby.	Kinéchol.
Biliboldo.	Lacto-Sérum Lavril.
Bilifluine.	Laxocholéine Tulivet.
Biliogastrine Chevallon.	Lénicure Vichy.
Boldine Houdé.	Lysarthrol.
Boldo Gmet.	Mésothine.
Boldoïne Éparvier.	Naphtocarbène.
Boldorhéine.	Neubryne.
Boldo Verne.	Oléocidase.
Boléase Monal.	Oléoformine Corbière.
Brides (Sel naturel, tablettes, pilules).	Olivéol.
Buccurol.	Opobyl.
Bucmine.	OPOCHLORINE.
Caparlem.	OPOCHOL.
Capsules Bardet.	Opothérapie Bouty.
Choléine Camus.	Panbiline.
Choléine lactique.	Pancrébile.
Choléo-Combretol boldi-	Pangestyl Narty.
nisé.	Papavéryl.
Cibalgine.	Paradoline.
Colhépatyl.	Phosoforme.
Comprimés Vichy-État.	Pilules du Dr Debouzy.
Cryptliol.	Pipérazine Midy.
Dialyl.	Potion Adol.
Diasclérol.	Prométhine.
Élixir Spark.	Pyrélaïne Collas.
Entérobyl Dehaussy.	Révuksoplasme.
Euonymine Paul Thibault.	Rhodazil.
Évonyl.	Romarène.
Félamine Sandoz.	Saint-Aré.
Florhépatine.	Salsanos.
Fluobyl.	Sédatuline Christlaens.
	Sel hépatique U. N. Arque-
	vaux.
	Sel de Lithine effervescent.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

LITHIASE BILIAIRE — COLIQUES HÉPATIQUES

Sodothiol.	Urométhyl.
Sornyal.	Urométine Lambiotte.
Spasmalgine Roche.	Uromil.
Thiocitrane Thévenot.	Urophile.
Uralysol.	Urosalyl. — Urosalyl mé-
Uraseptine Rogier.	thylé.
Urobuccol Malmanche.	Urozéa.
Uroformine Gobey.	Véralgine.

RECTITES — FISTULES ANALES FISSURES ANALES PRURIT ANAL

Acésine Guillaumin.	Iodex.
Adrépatine.	Kerlol.
Anusol Mialhe.	Mictasol.
Baume Suelta.	Néo-Collargol.
Bismuth (Crème de) du	Nestosyl.
D ^r Quesneville.	Oléo Mel.
Crayons Antifissure Do-	Percainal Ciba.
mergue.	Pommade au Nestosyl.
Créosoforme Lambiotte.	Pommade Logeais.
Dermo-Stalys du D ^r Wa-	Pyo-Amphogel Ronchèse
gon.	Rectagine.
Entéro-Antigènes.	Rhagadine Bracquemond.
Eurectol.	Salantale.
Glyco-Thymoline.	Suppo-Gynals.
Goménol.	Suppositoires au Nestosyl.
Hémorroïdine Pommade.	Suppositoires Logeais.
Hémorroïdine supposi-	Terpoxyl externe.
toires.	Triseptine.
Hirudinase.	

SATURNISME — COLIQUES DE PLOMB

Acécoline.	Dépuriode du D ^r Roger
Azufrol.	Weber.
Collubleu.	Opoferine vitaminée.
	Rhocya Dyn.

STÉNOSES DU PYLORE

Alcalinose.	Bradigastrine Ducloy.
Alsodine.	Calmag-Na.
Ampoules de Spasmalgine	Carbonésie.
Roche.	Digastrine.
Benzylol.	Gastropansement du D ^r Zi-
Bismusodine.	zine.
Bismuth (Crème de) du	Génatropine.
D ^r Quesneville.	Magnésie bismurée.
Bismuth-Desleaux.	Papavéryl.
Bismuth Tulasne.	Pepsodia.

APPAREIL DIGESTIF. T. S.

STÉNOSES DU PYLORE

Poudre Paterson.	Stal-Kosal.
Sel d'Ewald.	Wismuthane Vély.
Sodolactine.	

STOMATITES — GINGIVITES — MUGUET

(Voir : Maladies Parasitaires.)

Ampho-Tablettes Ronchèse.	Mésosome.
Bulgarine Thépenier.	Néol.
Colarsénol.	Pastilles M. B. C.
Collubleu.	Pharyngaseptyl.
Collutoire V. E. Doumer.	Probios.
Dentoline.	Pulvéol.
Dentoryl.	Sanogyl.
Fluosalyl Beaugourdon.	Sanoram.
Galform Lambiotte.	Sephydine.
Galliodine.	Septométrol Vély.
Glyco-M.	Solution huileuse au Nestosyl.
Glyco-Thymoline.	Staphylase du Dr Doyen.
Gosiérine Dalloz.	Staphylo-coccine Fraquet.
Gouttes Daynoc.	Stovalne.
Inolène.	Terpoxyl externe.

TUBERCULOSE INTESTINALE

Acatar.	Créositoires.
Acolitol.	Formocarbine.
Alucol.	Goménol.
Alunozal.	Hormocline.
Amibiasine.	Kerlactine.
Amidal.	Murones du Dr Robert
Amiphène Carron.	Jacques.
Bulgarine Thépenier.	Pilules V. E. Doumer.
Carbolactyl simple.	Stupho.
Carbophos.	Sulf-Y.
Colloïdogénine du Dr Bayle	Zimbyl.
Créoformine.	

ULCÈRES DE L'ESTOMAC ET DU DUODÉNUM

Alcalinose.	Chéralys (Comprimés).
Alucol Wander.	Complexes colloïdaux du Dr Riquoir.
Angioxyl du Dr Roussel.	Condurango Gmet.
Antinéase.	Crème de Bismuth Chl.
Bis-Ka-Ma.	magnésienne du Dr Quesneville.
Bismusodine.	Crème de Bismuth magnésienne du Dr Quesneville.
Bismuth Desleaux.	Digestonic.
Bismuth Tulasne.	Eugastrol.
Bradygastrine Ducloy.	Gastrocaol.
Calmag-Na.	
Carbonate de Bismuth. —	
Tablettes Perroud.	
Carbosanis.	

APPAREIL DIGESTIF, T. S.

ULCÈRES DE L'ESTOMAC ET DU DUODÉNUM

Gastronaldine.	Poudre Paterson.
Gastropansément du Dr Zl-zine.	Scuroforme.
Gélogastrine Licardy.	Sédogastrine.
Génomorphine.	Sel d'Ewald.
Kaolinase.	Sel de Hunt.
Larosan Roche.	Sodolactine.
Magnésie bismurée.	Stal-Kosal.
Néoplalysines.	Stomaxines.
Neutralcaol.	Stomobrol.
Pangastrol.	Stomophile.
Pepsodia.	Super-digestif Legrand.
Phytomarine.	Wismuthane Vély.
	Zymatine Lescène.

VOMISSEMENTS

Alcasodine.	Génatropine.
Atural.	Glaxo.
Azym.	Kinéchol.
Bi-Citrol Marinier.	Lait Mont-Blanc.
Biophylactine M. G.	Laxopeptine Girard.
Bismuth Desleaux.	Lichénose Ducloy.
Bismuth Tulasne.	Peptogil A. et L.
Bradygastrine Ducloy.	Poudre Paterson.
Carypaine.	Régyl.
Cétrarose Gligon.	Sel d'Ewald.
Citrofluyl.	Sel de Hunt.
Citropaine du Dr Fontal.	Sirop Teyssèdre.
Citrophos.	Sodolactine.
Citrosodine Longuet.	Somnicones Béral.
Digestonic.	Vin Raimoa Tonlé.
Élixir Bonjean.	Zymatine Lescène.
Élixir Eupeptique Tisy.	Zymogastrine Kervau.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE, T. G.

ALCALINS

Comprimés Vichy-État. | Sélamon.

ANTISEPTIQUES GYNÉCOLOGIQUES

Airoglyce.	Arsenos Solvant.
Aïrol Roche.	Asepto-poudre.
Anéxol.	Aseptone.
Aniodol.	Aseptovules.
Argycuprol.	Boricine Meissonnier.
Aristargol.	Borostyrol Schlatter.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

ANTISEPTIQUES GYNÉCOLOGIQUES

Céthocal du D ^r Lemay.	Métricine.
Chlocci.	Métritols.
Chloraseptine Optima.	Microlyse.
Clonazone Daufresne.	Natrosyl.
Ccaltar Saponiné Le Bœuf.	Néo-Collargol.
Comprimés d'Alibour.	Néol.
Comprimés Guillaumin.	Noviode.
Comprimés gynécologiques	Oléovules.
Merminod.	Ovules Chaumel.
Créosoforme Lambiotte.	Ovules Halogènes du
Cryptargol Lumière.	D ^r Bern.
Ektogan Bocquillon.	Péricols du D ^r Legros.
Eranol.	Poudre Chaumel.
Eugaline.	Salasényl (poudre).
Évine.	Salubrine Phénix.
Glucolactol.	Sanoformine.
Glyco M.	Sanoram.
Glyco-Thymoline.	Savons Mollard.
Gobérol.	Séphydine.
Goménol.	Septométrol Vély.
Hydralin.	Spyrolides.
Inolène.	Sulfarsénol.
Iodex.	Sunoxol.
Iodosan Zambeletti.	Terpovules.
Ixogyne.	Terpoxyl externe.
Lacto-Sérum Lavril.	Tochlorine.
Lacpinine.	Uvargol.
Laurénol médicinal.	Végétol externe.
Lusoforme.	Vioforme Ciba (et Ovules
Ménacrine.	au Vioforme).
Mésosome.	Vitargyl.
Métacuprol.	

ANTISEPTIQUES URINAIRES EXTERNES

Adrépatine.	Flavurool.
Airoglyce.	Glyco-Thymoline.
Airol Roche.	Goménol.
Anexol.	Gonacrine.
Aniodol.	Hermophényl Lumière.
Argycuprol.	Iodex.
Asepto-poudre.	Lacto-Sérum Lavril.
Bacté-phages.	Microlyse.
Boricine Meissonnier.	Rethragine.
Chlocci.	Salasényl (poudre).
Clonazone Daufresne.	Santal Monal.
Comprimés Guillaumin.	Séphydine.
Comprimés Gynécologiques	Terpoxyl externe.
Merminod.	Tochlorine.
Cryptargol Lumière.	Végétol externe.
Évine.	Vitargyl.

ANTISEPTIQUES URINAIRES INTERNES

Absuric..	Amibiasine.
Acatar.	Aniodol

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

ANTISEPTIQUES URINAIRES INTERNES

Argion.	Lacto-Sérum Lavril.
Arhéol.	Métaformine.
Arsenos-Solvant.	Microlyse.
Aseptone.	Mictasol.
Bacté-phages.	Mictophile Richer.
Bactériophages Leclerc.	Mictoseptol.
Baldisedan.	Mictualine.
Bensamine.	Oxyléine.
Benzobromine.	Phaguryl.
Benzophosphine Christiaens	Pilules V. E. Doumer.
Biliogastrine Chevillon.	Pyri-Pyridium.
Blennopiat.	Radiotropine.
Buccurol.	Santal Midy.
Bucmine.	Solvuric.
Caparlem.	Splénocarbine.
Capsules Bardet.	Sulfarsénol.
Capsules Franklin.	Terpine Gonnon.
Chloraseptine Optima.	Terpine granulée Baron
Cynurol Rosa.	Terpoxyl interne.
Dismine Favrot.	Triseptine.
Disolurane Vély.	Uraseptine Rogier.
Diurégine.	Ur-Clar.
Élatine Bouin.	Uriclarine.
Elgine Julien.	Urisanine.
Eumictine.	Urobuccol Malmanche.
Félicol.	Uroformine Gobey.
Fokiényl.	Uroiodine.
Formine Adrian.	Urométhyl.
Formocarbène.	Urométine Lambiotte.
Formocitrine.	Uromil.
Fosyls Carron.	Urophile.
Goménol.	Urosalyl-Urosalyl méthyle
Hexotal.	Urosan Dufayard.
Iodhema.	Uvargol.

BALSAMIQUES

Acatar.	Eumictine.
Arhéol.	Fokiényl.
Baldisedan.	Goménol.
Blennopiat.	Santal Midy.
Buccurol.	Terpine Gonnon.
Bucmine.	Terpine granulée Baron.
Caparlem.	Terpoxyl interne.
Capsules Bardet.	Urisanine.
Capsules Franklin.	

DÉCONGESTIFS PELVIENS

Adrépatine.	Extrait Hamyd.
Agomensine Ciba.	Fluxine (gouttes).
Ampoules de Sécarcornine	Fucoiodine.
Roche.	Hamamélis Gmet.
Cynurol Rosa.	Hamamélis Grandval.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

DÉCONGESTIFS PELVIENS

Hémaxol.	Mictasol.
Hémoluol.	Mictualine.
Hémopausine.	Opothérapie Choay.
Hexotal.	Ovules Chaumel.
Indhaméline Lejeune Plu- riglandulaire.	Prostatols Beauxis La- grave.
Indhaméline Lejeune sim- ple.	Sels du Jura.
Magnésouvules.	Suppositoires au Nestosyl.
Ménatol.	Tampol Roche.
	Tot'Hamélis.

DISSOLVANTS URIQUES

Absuric.	Solvuric.
Antisciaticque P. Cham- bon.	Triseptine.
Atoquinol Ciba.	Uralysol.
Bensomine.	Uraseptine Rogier.
Benzophosphine Chris- tiaens.	Urazine.
Billogastrine Chevillon.	Uricémine.
Comprimés Urbé.	Urifluine.
Cynurol Rosa.	Urisanine.
Dialyl.	Urobuccol Malmanche.
Diasclérol.	Uroclase.
Gravural.	Uroformine Gobey.
Mésothine.	Uroiodine.
Métaformine.	Urométhyl.
Neubryne.	Urométine Lambiotte.
Pipérazine Midy.	Uromil.
Radiotropine.	Urophile.
Sanoquinol Ciba.	Urosan Dufayard.
Sel hépatique U. N. Arque- vaux.	Urozea.
	Viophan.

DIURÉTIQUES

Adoverne.	Fluobyl.
Ampoules Théobryl Roche.	Fokiényl.
Antonal.	Gmet (Extraits).
Billogastrine Chevillon.	Grand Cidre « Bol » Ré- gime.
Calcional.	Gui Byla.
Calci-Sténine.	Gui Gmet.
Comprimés Urbé.	Guipsine.
Curoraisin.	Lacto-Sérum Lavril.
Cynurol Rosa.	Lysarthrol.
Dismine Favrot.	Métaformine.
Disolurane Vély.	Mictophile Richer.
Diurégine.	Neptal.
Diurène.	Nutrobiase, Raisin Vivant
Diurétique Gmet.	Paradoline.
Durocalcine Gros.	Pneumogéine Renard.
Élatine Bouin	

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

DIURÉTIQUES

Rénion Vincardi.	Théovadil.
Rénocardine.	Théoverine Laleuf.
Santhéose.	Théoxantine.
Scillarène Sandoz.	Tonicardine Gonnon.
Sclérosérol.	Urisanine.
Técarine.	Urobuccol Malmanche.
Théisine Dubat.	Uroiodine.
Théobromine Invar.	Uromil.
Théobromose Dumesnil.	Urosalyl.
Théobryl Roche.	Vin diurétique végétal
Théosalvose.	Amer Pyrola.

GALACTOGÈNES

Biotrignon.	Malt français Déjardin
Extrait de Malt français	(Extrait de).
Déjardin.	Malt pailleté.
Fantine.	Maltase Fanta.
Farine maltée Favrichon.	Maltosan.
Farine de Malt Heudebert.	Malt Wander ou Gloma.
Fosfoxyl Carron.	Maltéa Moser cristallisée.
Galactésia.	Opothérapie du Dr Frayssé.
Galactogil.	Phytine Ciba.
Malt Barley.	

HÉMOSTATIQUES UTÉRINS

Ampoules de Sécacornine	Hémaxol.
Roche.	Hémocalciopectine.
Arhémapectine.	Hémogénol Dausse.
Calcional.	Hémopausine.
Calcium Sandoz.	Hémosamine.
Capsellase.	Hémostatique Goy.
Clisemine Longuet.	Hémostyl du Dr Roussel.
Coagulène Ciba.	Hémovéine.
Dragées ferro-ergotées Man-	Lugocalcine.
net.	Néoplalysines.
Élixir ferro-ergoté Man-	Opothérapie du Dr Frayssé.
net.	Pituilobine Byla.
Ergotine Lamante.	Post-Hypophyse Choay.
Eugynol Grandval.	Sécarcornine Roche.
Fluxine (gouttes).	Tot'Hamélis.
Gynergène Sandoz.	Vari-Sérum Lebon.

RÉGULATEURS DES RÈGLES SÉDATIFS UTÉRO-OVARIENS

Agomensine Ciba.	Aphloïne Trouette-Perret.
Aigue d'or.	Apioline Chapoteaut.
Algocratine.	Asciatine.
Ampolases.	Basedowine.
Ampoules de spasmalgine	Benzylocalcium.
Roche.	Benzyloï.
Androstine Ciba.	Bursol.
Antélobine.	Cachets du Dr Boveil.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

RÉGULATEURS DES RÈGLES SÉDATIFS UTÉRO-OVARIENS

Cachets réparateurs.	Hémoluol.
Cantéine.	Hémopausine.
Capsellase.	Hémophiline Planché.
Capsules Joret et Homolle.	Hémosamine.
Catemenyl.	Hémovéine.
Cérébrine Fournier.	Hexaranol.
Chloral bromuré du Dr Du-	Hirudinase.
bois.	Holovarine.
Crédone Dehaussy.	Hormovarine Byla.
Curatine Brunet.	Indhaméline Lejeune plu-
Curogène.	riglandulaire.
Demalgon.	Indhaméline Lejeune
Dioséine Prunier.	simple.
Élixir de Virginie Nyrdahl.	Irénine Gonnon.
Eugynol Grandval.	Lutéovar.
Extrait Hamyd.	Ménatol.
Féminadène.	Ménosédine.
Fer Ovarine Vitals.	Mensuosédyl.
Florhépatine.	Mictasol.
Flusan.	Miroxyl.
Fluxine (gouttes).	Nadolor.
Folestrine Grémy.	Néospasmodyl Vely.
Follicormone buccale Hin-	Nestosyl.
glais.	Ovules Chaumel.
Folliculine Choay.	Phosphobrom.
Folliculine Crinex.	Pyréthane.
Folliculine Roussel.	Rénovol.
Gmet (extraits).	Sistomensine Ciba.
Grassyl Buisson.	Spasmalgine Roche.
Gynocalcion.	Stopral.
Gynœstryl.	Suppo-Gynals.
Gynopausine.	Suppositoires au Nestosyl
Hamamélis Gmet.	Tablettes Zéva.
Hamamélis Grandval.	Tot'Hamélis.
Hémagène, Tailleur.	Tristyl-Noyon.
Hémaxol.	Veinoposine.
Hémodrome.	Veinosine.
Hémoductyl.	Véralgine.

VACCINS

Ampho-Vaccins Ronchèse.	Gonagone.
Antigénines.	Gono-Vaclydun.
Antipiol.	Hétérollysine Oliviero.
Antivirus.	Immunizols Grémy.
Bilivaccin-anticolibacil-	Institut Pasteur Vaccins.
laire.	Lysaxins L. M. L.
Blennosine Fornet.	Néo-Dmégon.
Colitique.	Néo-Physiosthénine.
Coli-Vaclydun.	Physiosthénine.
Dmelcos.	Probios.
Entéro-antigènes.	Propidon.
Entérofagos.	Rhéantine Lumière.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. G.

VACCINS

Salantale.
Vaccin Demonchy.
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Vaccin pansement Virul-
tra.
Vaccins Bruschetti.
Vaccins atoxiques stabi-
lisés.

Vaccins bactériens I. O. D.
Vaccins Ronchèse. — Am-
pho-vaccins.
Vaccins Sténé.
Vaccins intra-dermiques et
Gelées Vaccins Ivago de
L. Goldenberg.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

ALBUMINURIES — ANURIE — URÉMIE AZOTÉMIE

Ampoules Théobryl Roche.
Benzobromine.
Blocs Vécot.
Calcional.
Calci-Sténine.
Calcium Sandoz.
Canol.
Cardiosthénine.
Chloro-Calcion.
Cynurot Rosa.
Dépuriode du Dr Roger
Weber.
Diurégine.
Diurétique Gmet.
Diurocalcine Gros.
Eupnine Vernade.
Fluobyl.
Gui Byla.
Gui Gmet.
Guipsine.
Inorénol.
Lacto-Sérum Lavril.
Lichénose Ducloy.
Lugocalcion.
Neptal.
Neubryne.
Pepto-Kola Robin.

Phosoforme.
Pneumogéine Renard.
Quinuryl.
Rénion Vincardi.
Rénocardine.
Santhéose.
Scillarène Sandoz.
Sclérosérol.
Sels de Lithine efferves-
cents.
Siltcyl.
Tapo.
Técarine.
Thésine Dubat.
Théobromine Invar.
Théobromose Dumesnil.
Théobryl Roche.
Théosalvose.
Théovadil.
Théovérine Laleuf.
Théoxantine.
Tonicalcine.
Trinitine-Papavérine La-
leuf.
Vin diurétique végétal
Amer Pyrola.
Viscum Zyma.

ALLAITEMENT — CREVASSES DU SEIN

Adrénocalcine.
Antipiol.
Babeurre « La Faye ».
Baume Delacour.
Baume de la Maternité.
Baume du Dr Baissade.
Beef Lavoix.
Benzylcalcium.

Biotrigon.
Borostyrol Schlatter.
Calci-Sténine.
Céréossine Dehaussy
simple.
Chloro-Calcion.
Crème Graziana.
Crescol Buisson.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

ALLAITEMENT — CREVASSES DU SEIN

Diadermine.
Dohyfral.
Extrait de Malt français
Déjardin.
Fenucine.
Fluoganèse.
Fosfoxyl Carron.
Gaduamine.
Galactésia.
Galactogil.
Génosthéniques.
Glandocalcyl.
Glycérophosphate Dalloz.
Glycérophosphate Robin.
Glyctone phosphatée Charrière.
Halocure irradié.
Hémofer.
Hémoglobine Deschiens.
Holos.
Holovarine.
Inotyol.
Iodex.
Limol Churchill.
Lugocalcion.
Maltase Fanta.
Malt Barley.
Malt français Déjardin
(Extrait de).
Malt pailleté.
Mancobène.
Méta-Titane.
Minergil.
Nutrobiase, raisin vivant.
Opocalcium du D^r Guersant.
Opocalcium irradié du
D^r Guersant.
Opocobalt.
Opodermyl.
Opophytol.
Ostéline.

Ostréine Buisson.
Percainal Ciba.
Phosphates du D^r Pinard.
Phosphate Vital de Jacquemaire.
Phosphatol vitaminé irradié.
Phospho-Fluor Beynet.
Phytine Ciba.
Polyminéral Fort.
Pommade au Nestosyl.
Pommade Logeais.
Pommade Noelline.
Poudre-Pélévine.
Prodynase.
Propidon Pansement.
Pyo-Amphogel Ronchèse.
Quina Baron.
Rhagadine Bracquemond.
Rozoderme.
Sénophile.
Splénomanganol.
Sténoxal.
Sur-bi-cal.
Tricalcine.
Ultraviamine 4.
Uvéphorine.
Uvéstérol.
Valovarine.
Végéphos.
Vigostérol.
Vin de Baudon.
Vitaminol.
Vitamastérol.
Vitène.
Vitergomine.
Vivoléol.
Zomine.
Zomo-musculosine Byla.
Zymatine irradiée.

BLENNORRAGIE — ORCHITE

Acatar.
Airoglyce.
Aïrol Roche.
Anexol.
Aniodol.
Argycuprol.
Arhéol.
Arsenos-Solvant.
Baldisedan.
Baume Adol.

Baume Aroma.
Baume Iki.
Bensomine.
Blennopiat.
Blennosine Fernet.
Bougies Franklin.
Buccurol.
Bucmine.
Capsules Franklin.
Comprimés Guillaumin.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

ELENNORRAGIE — ORCHITE

Comprimés Gynécologiques

Merminod.
Comprimés Urbé.
Cryptargol Lumière.
Cynurol Rosa.
Elgine Julien.
Eumictine.
Evine.
Flavurool.
Fokiényl.
Formine Adrian.
Fosyls Carron.
Gonacrine.
Gonagone.
Gono-Vaclydun.
Hermophényl Lumière.
Hétérolysine Oliviero.
Hexotal
Institut Pasteur Vaccins.
Iodex.
Ixium Buisson.
Métaformine.
Mictasol.
Microlyse.
Mictophile Richer.
Mictoseptol.
Mictualine.
Néo-Dmégon.
Néo-Physiosthénine.
Physiosthénine.
Oléovules.
Ovules Roche.
Phaguryl.
Pilules V. E. Doumer.
Prostatols Beauxis Lagrave
Pyri-Pyridium.

Rectagine.
Rethragine.
Rhéantine Lumière.
Salantale.
Santal Midy.
Santal Monal.
Séphydine.
Soluprotine Roche.
Solution huileuse au Nes
tosyl.
Sulfarsénol.
Terpoxyl externe.
Ur-Clar.
Uriclarine.
Urisanine.
Urobuccol Malmanche.
Uroformine Gobey.
Urométhyl.
Urométine Lambiotte.
Urosalyl. — Urosalyl mé-
thylé.
Urosan Dufayard.
Vaccin Demonchy.
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Vaccins atoxiques stabi-
lisés.
Vaccins bactériens I. O. D.
Vaccins Bruschettini.
Vaccins Intra-dermiques et
Gelées Vaccins Ivago de
L. Goldenberg.
Vaclydun.
Végétol externe.
Vitargyl.
Zimbyl.

CHANGRE MOU

Airol Roche.
Dmelcos.
Gonagone.
Hexotal.

Nitium Buisson.
Séphydine.
Vioforme Ciba (et ovules
au Vioforme).

CYSTITES — PROSTATISME

Absuric.
Acatar.
Adrépatine.
Airoglyce.
Ampho-Vaccins Ronchèse.
Anexol.
Aniodol.
Anusol Mialhe.

Arhéol.
Bacté-phages.
Bactériophages.
Baldisedan.
Bensamine.
Bilivaccin anticolibacil-
laire.
Biolactyl Fournier.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

CYSTITES — PROSTATISME

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Blennopiat. | Naphtocarbine. |
| Blennosine Fornet. | Néo-Collargol. |
| Buccurol. | Nestosyl. |
| Bucmine. | Neubryne. |
| Canol. | Orthogénol. |
| Caparlem. | Phaguryl. |
| Capsules Bardet. | Pilules V. E. Doumer. |
| Capsules Franklin. | Pneumo-Lipase. |
| Catalyl Mg. | Probios. |
| Chloraseptine Optima. | Prostatols Beauxis Lagrave. |
| Colitique. | Pyri-Pyridium. |
| Comprimés gynécologiques | Radiotropine. |
| Merminod. | Rectagine. |
| Comprimés Urbé. | Rethragine. |
| Cryptargol Lumière. | Salasényl (poudre). |
| Cynurol Rosa. | Santal Midy. |
| Cytomagnésium Lindeux. | Santal Monal. |
| Disimine Favrot. | Solution huileuse au Nes- |
| Elatine Bouin. | tosyl. |
| Elgine Julien. | Solvuric. |
| Eumictine. | Suppo-Gynals. |
| Extrait Hamyd. | Suppositoires au Nestosyl. |
| Félicol. | Terpine Gonnon. |
| Flavurool. | Terpine granulée Baron. |
| Fokiényl. | Tot'Hamélis. |
| Formine Adrian. | Triseptine. |
| Formocarbine. | Uralysol. |
| Formocitrine. | Uraseptine Rogier. |
| Glyco-Thymoline. | Ur-Clar. |
| Goménol. | Uriclarine. |
| Gonagone. | Urisanine. |
| Gono-Vaclydun. | Urobuccol Malmanche. |
| Gravural. | Uroformine Gobey. |
| Guipsine. | Urolodine. |
| Hamamélis Gmet. | Urométhyl. |
| Hamamélis Grandval. | Urométine Lambiotte. |
| Hémypnal Ciba. | Uromil. |
| Hermophényl Lumière. | Urophile. |
| Hétérolysine Oliviero. | Urosalyl. — Urosalyl mé- |
| Hexotal. | thylé. |
| Immunizols Grémy. | Urosan Dufayard. |
| Lacto-Sérum Lavril. | Uvargol. |
| Lysaxins L. M. L. | Vaccins Bruschettini. |
| Magnésium Hardy. | Vaccins Ronchèse (am- |
| Magnéso-tubes Robinet. | pho-vaccins). |
| Mésothine. | Vaccins intra-dermiques et |
| Métaformine. | gelées-vaccins Ivago de |
| Microlysine. | L. Goldenberg. |
| Mictasol. | Vaclydun. |
| Mictophile Richer. | Végétol externe. |
| Mictoseptol. | Vicéliase. |
| Mictualine. | Zimbyl. |

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

ÉCLAMPSIE VOMISSEMENTS INCOERCIBLES

Adrénoides Béral.	Insuline buccale Fornet.
Alsodine.	Lacto-Sérum Lavril.
Belladénal Sandoz.	Lichénose Ducloy.
Bromiase.	Phosoforme.
Cétrarose Gigon.	Phosphobrom.
Élixir du D ^r Mialhe.	Plasma de Quinton.
Folliculine Roussel.	Sédatine Christiaens.
Gouttes antispasmodiques	Sel d'Ewald.
Dausse.	Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Gui Byla.	Somnicones Béral.
Gui Gmet.	Somnifène Roche.
Guipsine.	Valérium Paul Thibault.
Gynœstryl.	Vin Raimoa Tonic.

FIBROMES

Backérine.	Hamamélis Grandval.
Bain Carré.	Hémaxol.
C. 40.	Hémostyl du D ^r Roussel.
Complexes colloïdaux du	Ioda.
D ^r Riquoir.	Iodalose Galbrun.
Complexextraits.	Leucagine.
Ergotine Lamante.	Néophalysines.
Évine.	Opothérapie du D ^r Frayssé.
Extrait Hamyd.	Oxydothyryne Pâris.
Fluxine (gouttes).	Péricols du D ^r Legros.
Fucoolodine.	Sels du Jura.
Gynergène Sandoz.	Tot'Hamélis.
Hamamélis Gmet.	

GROSSESSE — ACCOUCHEMENTS AVORTEMENTS

Adrénocalcine.	Céréossine Dehaussy
Ampho-vaccins Ronchèse.	simple.
Ampoules de Sécacornine	Céréossine irradiée.
Roche.	Chloraseptine Optima.
Ampoules de Spasmalgine	Chloro-Calcion.
Roche.	Clonazone Daufresne.
Amunine.	Comprimés Guillaumin.
Anexol.	Crescol Buisson.
Aniodol.	Curoène.
Antivirius.	Cynurol Rosa.
Arhémapectine.	Dohyfral.
Arsécrinol.	Dragées ferro-ergotées Man-
Bande de crêpe Velpeau.	net.
Beef Lavoix.	Ektogan Bocquillon.
Belhémine.	Élixir Ducro.
Benzylcalcium.	Élixir du D ^r Mialhe.
Boricine Meissonnier.	Élixir ferro-ergoté Man-
Calci-Sténine.	net.
Calcoléol.	Ergotine Lamante.
Cérébro-Lipase.	Evine.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

GROSSESSE — ACCOUCHEMENTS AVORTEMENTS

Fénucine.	Phosphate Vital de Jacquemaire.
Fixase.	Phosphatol vitaminé irradié.
Fixase irradiée.	Phospho-Fluor Beynet.
Fluoganèse.	Physocrisine.
Fosfoxyl Carron.	Phytine Ciba.
Génosthéniques.	Phyto-Lécithine.
Glandocalcyl.	Pituitobine Byla.
Globexine.	Plasma de Quinton.
Glycérophosphate Dalloz.	Polyminéral Fort.
Glycérophosphate Robin.	Post Hypophyse Choay.
Glyco-Thymoline.	Prodynase.
Glyctone phosphatée Charrière.	Pyréthane.
Halocure irradié.	Quina Baron.
Hémagène Tailleur.	Rectopanbiline.
Hémofer.	Salubrine Phénix.
Hémoglobine Deschiens.	Sécacornine Roche.
Hémosamine.	Sédol.
Hémypnal Ciba.	Séphydine.
Holos.	Spasalgine Roche.
Holovarine.	Splénomanganol.
Ixogyne.	Spyrolides.
Laurénol médicinal.	Stérogyl.
Lichénose Ducloy.	Sthénoxal.
Liposplénine du Dr Groc.	Sur-Bi-Cal.
Lugocalcion.	Tonique Gonnon.
Lusoforme.	Tricalcine.
Mancobène.	Uvéphorine.
Mésosome.	Uvésterol.
Méta-Vaccin.	Vaccins Ronchèse (ampho-vaccins.)
Minergil.	Vagosédyl.
Noviode.	Valovarine.
Nutrobiase, Raisin Vivant.	Végétol.
Oléo-Mel.	Vigostérol.
Opocalcium du Dr Guersant.	Vin de Baudon.
Opocalcium irradié du Dr Guersant.	Vitaminol.
Opocobalt.	Vitastérol.
Opophytol.	Vitène.
Opothérapie Fournier.	Vitergomine.
Ostéline.	Vivoléol.
Ostréine Buisson.	Zimbyl.
Ovo-Lécithine Billon.	Zomine.
Phosoforme.	Zomo-musculosine Byla.
Phosphates du Dr Pinard.	Zymatine irradiée.

HÉMATURIES

(Voir : Appareil circulatoire, Hémostatiques.)

IMPUISSANCE — SPERMATORRHÉE

Alexime.	Androcaltion H.
Ampolases.	Androstine Ciba.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

IMPUISSANCE — SPERMATORRHÉE

Diasthénine Grémy.	Phosoforme.
Eufosyl « Vély ».	Phospharsol.
Fosfoxyl Carron.	Sécacornine Roche.
Fosyls Carron.	Sérodausse antitoxisényl.
Globules Romon.	Strychnal Longuet.
Granulés de Pantofort du	Triglandine.
D ^r Boveil.	Vicéliasé.
Neuropol.	Yo-Androl.
Oposynergines.	Yohimbine Vicario.
Opothérapie du D ^r Frayssé.	

INCONTINENCE D'URINE

Ampoules de Sécacornine	Fer Bravais.
Roche.	Fosfoxyl Carron.
Benzylol.	Ionyl.
Borocalcyl Thévenot.	Métaformine.
Borosodine Lumière.	Mictasol.
Cynurol Rosa.	Phosoforme.
Dragées ferro-ergotées Man-	Plasma de Quinton.
net.	Sécacornine Roche.
Élixir ferro-ergoté Man-	Spasmine Jolly.
net.	Urosalyl. — Urosalyl mé-
Épicral.	thylé.
Ergotine Lamante.	Vagosédyl.

INFECTION PUERPÉRALE

Ampho-vaccins Ronchèse.	Pyoformine.
Aniodol.	Salasényl (poudre).
Antigénines.	Séphydine.
Antivirus.	Septicémine Cortial.
Arsénos-Solvant.	Solucamphre Delalande.
Cynurol Rosa.	Sulfarsénol.
Eucalyptine Lebrun.	Terpoxyl interne.
Goménol.	Vaccinothérapie atoxique
Liposeptine.	Cépède.
Néo-Physiosthénine.	Vaccins Bruschettini.
Physiosthénine.	Vaccins bactériens I. O. D.
Neubryne.	Vaccins Ronchèse (ampho-
Nucléatol.	vaccins).
Oléovules.	Vaclydun. — Staphylo-
Probios.	Vaclydun.
Protiodyne.	Zimbyl.

INSUFFISANCES RÉNALES

NÉPHRITES CHRONIQUES

NÉPHRITES AIGÜES

Absuric.	Calci-Sténine.
Acatar.	Canol.
Adoverne.	Chloro-Calclon.
Ampoules Théobryl Roche.	Comprimés Urbe.
Antonal.	Cynurol Rosa.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

INSUFFISANCES RÉNALES NÉPHRITES CHRONIQUES NÉPHRITES AIGÜES

Dépuriode du Dr Roger
Weber.
Détersyl.
Diurégine.
Diurène.
Diurétique Gmet.
Diurocalcine Gros.
Eutensyl Grémy.
Fluobyl.
Formine Adrian.
Grand Cidre « Bol » Régime.
Gui Byla.
Gui Gmet.
Guipsine.
Lugocalcion.
Mictasol.
Neubryne.
Normatensol Bouret.
Nutrobiase Raisin Vivant.
Opothérapie Bouty.
Pneumogéine Renard.
Radiotropine.
Rénion Vincardi.

Rénocardine.
Santal Midy.
Santal Monal.
Scillarène Sandoz.
Sclérosérol.
Silguine.
Silicyl.
Técarine.
Theisine Dubal.
Théobromine Invar.
Théobromose Dumesnil.
Théobryl Roche.
Théosalvose.
Théovadil.
Théovérine Laleuf.
Théoxantine.
Tonicardine Gonnon.
Urisantine.
Urosalyl. — Urosalyl méthylé.
Vin diurétique végétal
Amer Pyrola.
Zimbyl.

LITHIASÉ RÉNALE COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

Absuric.
Aigue d'Or.
Ampoules de Pantopon
Roche.
Ampoules de Spasmalgine
Roche.
Baume Adol.
Baume Aroma.
Baume Bengué.
Bensamine.
Benzophosphine
tiaens. Chris-
Benzylol.
Biliogastrine Chevallon.
Buccurol.
Canol.
Caparlem.
Capsules Bardet.
Cibalgine.
Crypthiol.
Cynurol Rosa.
Dialyl.
Diasclérol.
Dismine Favrot.
Disolurane Vély.

Diurétique Gmet.
Élatine Boulin.
Elgine Julien.
Florhépatine.
Formine Adrian.
Formocitrine.
Génomorphine.
Gravural.
Hexotal.
Lacto-Sérum Layril.
Lysarthrol.
Mésothine.
Métaformine.
Mictoseptol.
Nestosyl.
Neubryne.
Papavéryl.
Paradoline.
Phosoforme.
Pipérazine Midy.
Potion Adol.
Pyrélaïne Collas.
Pyréthane.
Radiotropine.
Rhodazil.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

LITHIASÉ RÉNALE COLIQUES NÉPHRÉTIQUES

Salsanos.
Santal Midy.
Santal Monal.
Sel hépatique U. N. Arque-
vaux.
Sels de Lithine efferves-
cent.
Sodolithol.
Solvuric.
Sornyal.
Spasmalgine Roche.
Suppositoires au Nestosyl.
Théosalvose.
Théovadil.
Théoxanthine.
Uralysol.
Uraseptine Rogier.

Urazine.
Uricémine.
Urifluine.
Urisanine.
Urobuccol Malmanche.
Uroclase.
Uroformine Gobey.
Uroiodine.
Urométhyl.
Urométine Lambiotte.
Uromil.
Urophile.
Urosalyl.
Urosalyl méthylé.
Urosan Dufayard.
Urozea.
Véralgine.

MÉTRITES — LEUCORRHÉE

Absuric.
Agomensine Ciba.
Airoglyce.
Airol Roche.
Anexol.
Antigénines.
Argycuprol.
Aristargol.
Asepto-poudre.
Aseptone.
Aseptovules.
Bacté-Phages.
Bactériophages Leclerc.
Bain Carré.
Biolactyl Fournier.
Boricine Meissonnier.
Borotsyrol Schlatter.
Céthocal du Dr Lemay.
Chlocci.
Chloraseptine Optima.
Clonazone Daufresne.
Coaltar Saponiné Le Beuf.
Complextraits.
Comprimés d'Alibour.
Comprimés Guillaumin.
Comprimés gynécologiques
Merminod.
Créosoforme Lambiotte.
Cryptargol Lumière.
Cynurool Rosa.
Désitin.
Ektogan Bocquillon.

Élixir ferro-ergoté Mannet.
Ergotine Lamante.
Eugaline.
Évine.
Extrait Hamyd.
Fer Bravais.
Flavurool.
Fluxine (gouttes).
Fosyls Carron.
Glucolactol.
Glyco-M.
Glyco-Thymoline.
Gobérol.
Goménol.
Gonagone.
Gono-Vaclydun.
Gynopausine.
Hamamélis Gmet.
Hamamélis Grandval.
Hémaxol.
Hémostyl du Dr Roussel.
Hydralin.
Immunizols Grémy.
Indhaméline Lejeune plu-
riglandulaire.
Indhaméline Lejeune sim-
ple.
Inolène.
Iodex.
Iodosan Zambeletti.
Ixogyne.
Lacpinine.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

MÉTRITES — LEUCORRÉE

Lacto-Sérum Lavril.

Lauréol Médicinal.

Leucagine.

Lusoforme.

Lysaxins L. M. L.

Magnésouvules.

Ménacrine.

Mésosome.

Métacuprol.

Métricine.

Métritols.

Microlyse.

Mictasol.

Natrosyl.

Néo-Collargol.

Néol.

Néothorium Millot.

Nitium Buisson.

Nuclhémose.

Oléovules.

Opothérapie du D^r Fraysse.

Ovules Chaumel.

Ovules halogènes du
D^r Bern.

Ovules Rhemda radio-
actifs.

Ovules Roche.

Péricols du D^r Legros.

Pilules Hélénienne Naud.

Pituilobine Byla.

Poudre Chaumel.

Probios.

Propidon.

Rectagine.

Salantale.

Salasényl (poudre).

Salubrine Phénix.

Sanoformine.

Sanoram.

Sécacornine Roche.

Sels du Jura.

Sephydine.

Septométrol Vély.

Spyrolides.

Sunoxol.

Suppo-Gynals.

Tampol Roche.

Terpovules.

Terpoxyl externe.

Urométhyl.

Uvargol.

Vaccins intra-dermiques et
gelées vaccins Ivago de
M. L. Goldenberg.

Vaccins Sténé.

Vaclydun.

Végétol externe

Vioforme Ciba (ovules au
Vioforme).

Vitargyl.

Zimbyl.

PUBERTÉ — MENSTRUATION — MÈNOPAUSE

Aigue d'Or.

Algoécrate.

Amphotonyl.

Ampolase.

Ampoules Boissy d'iodure
de potassium.

Ampoules de Sécacornine
Roche.

Ampoules de Spasalgine
Roche.

Androstine Ciba.

Angioxyl du D^r Roussel.

Antélobine.

Antonal.

Aphloïne Trouette-Perret.

Apioline Chapoteauf.

Arhémapectine Gallier.

Artérase.

Artério Veinine.

Asciatine.

Basedowine.

Benzylocalcium.

Benzylol.

Bionéol.

Bursol.

Cachets réparateurs.

Cantéine Bouteille.

Capsellase.

Capsules Joret et Homolle.

Catéményl.

Cérébrine Fournier.

Chloral bromuré du D^r Du-
bois.

Collo-iodé Dubois.

Crataegine.

Credone Dehaussy.

Curatine Brunet.

Curogène.

Demalgon.

Dépuriode du D^r Roger
Weber.

Détensyl.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

PUBERTÉ — MENSTRUATION — MÉNOPAUSE

- Dioséine Prunier.
Dragées ferro-ergotées Mannet.
Elixir de Virginie Nyrdahl.
Elixir ferro-ergoté Mannet.
Endopancrine.
Entéro-antigènes.
Ergotine Lamante.
Eugynol Grandval.
Extrait Hamyd.
Féminadène.
Fer Bravais.
Fer ovarine Vitalis.
Florhépatine.
Flusan.
Fluveinose Mauchant.
Fluxine (gouttes).
Folestrine Grémy.
Follicormone buccale Hinglais.
Folliculine Choay.
Folliculine Crinex.
Folliculine Roussel.
Fosfoxyll Carron.
Fucoïodine.
Globules Fumouze à l'Iodure de potassium.
Glycocarpine.
Gmet (Extraits).
Gouttes de Serü.
Gouttes Nican.
Grassyl Bulsson.
Gui Byla.
Gui Gmet.
Guipsine.
Gynocalcion.
Gynœstryl.
Gynopausine.
Hamaméline Roya.
Hamaméliode.
Hamamélis Gmet.
Hamamélis Grandval.
Hémagène Tailleux.
Hémaxol.
Hémodrome.
Hémoductyl.
Hémoluol.
Hémopausine.
Hémophiline Planche.
Hémosamine.
Hémovaine.
Hexaranol.
Hirudinase.
Holvovarine.
Hormovarine Byla.
Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.
Indhaméline Lejeune simple.
Inogyl.
Iodamélis Logeais.
Iodasclérine.
Iodassium.
Iode organique Boissy.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Maisine Globules.
Iodone Robin.
Iodonucléol.
Iodostarine Roche.
Iodo-vitasine.
Iodural Novat.
Iodurase.
Iodure Philippe.
Iodure Pachaut.
Iodures Souffron.
Irénine Gannon.
Lachésine.
Laminode.
Lipiodol Lafay.
Lipiodine Olba.
Lugocalcion.
Luteovar.
Magiodyl.
Magnésium Hardy.
Magnésio-tubes Robinet.
Magol Churchill.
Mangratinés.
Ménatol.
Ménosédine.
Mensuosédyl.
Mictasol.
Miroxyl.
Nadolor.
Néo-Riodine.
Néospasmodyl Vély.
Nestosyl.
Neurinase.
Neuropol.
Nuchlérose.
Ocréine Grémy.
Opoferrine Vitaminée.
Oposérum.
Opothérapie Bouty.
Opothérapie Byla associée.
Opothérapie Choay.
Opothérapie du Dr Frayssé.
Orthogénol.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. 6.

PUBERTÉ — MENSTRUATION — MÉNOPAUSE

Ovarine Optima.	Sérodausse ovarien.
Ovaro-thyroidine Optima.	Silguine.
Ovules Chaumel.	Sistomensine Ciba.
Oxydovarine Paris.	Spasmalgine Roche.
Panglandine Couturieux.	Stopral.
Papavéryl.	Suppo-Gynals.
Phléboguil.	Suppositoires au Néstosyl.
Phlébotonine.	Sympathyl.
Phosphobrom.	Tablettes Hova.
Phytergol.	Tablettes Zéva.
Phyto-Lécithine.	Théinol.
Pilules Philippe.	Thyroidine et Radiopho-
Protonic.	rine Gory.
Proveinase Midy.	Tot'Hamélis.
Pulsamone.	Triglandine.
Pyréthane.	Tristyl-Noyon.
Quinovarine Optima.	Vagosédyl.
Quinquina Gmet.	Valériane Byla.
Rénovol.	Valovarine.
Rhocya Dyn.	Valovosan.
Rhodazil.	Vascurol.
Riodine.	Veinoposine.
Sanédrine.	Veinosérum.
Sécacornine Roche.	Veinosine.
Sédarsan.	Veinotrope.
Sédotensyl.	Véralgine.
Sels du Jura.	Verticurine.

PYÉLONÉPHRITES

Absuric.	Dismine Favrot.
Acatar.	Disolurane Vély.
Amibiasine.	Élatine Bouin.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Elgine Julien.
Aniodol.	Entérofagos.
Antigénines.	Eumictine.
Argion.	Félicol.
Arhéol.	Flavuro.
Bacté-phages.	Fokiényl.
Bactériophages Leclerc.	Formine Adrian.
Baldisedan.	Formocarbine.
Bensamine.	Formocitrine.
Benzobromine.	Gonagone.
Bilivaccin anticolibacillaire.	Gravural.
Buccurol.	Hétérolysine Oliviéro.
Bucmine.	Hexotal.
Canol.	Immunizols Grémy.
Caparlem.	Iodhema.
Capsules Bardet.	Lacto-sérum Lavril.
Capsules Franklin.	Lysaxins L. M. L.
Colitique.	Mésothine.
Coli-Vaclydun.	Métaformine.
Comprimés Urbé.	Microlyse.
Cynurol Rosa.	Mictasol.

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

PYÉLONÉPHRITES

Mictophile Richer.	Ur-Clar.
Mictoseptol.	Uricémine.
Mictualine.	Uriclarine.
Naphtocarbène.	Urisanine.
Oxyléine.	Urobuccol Malmanche.
Pilules V. E. Doumer.	Uroformine Gobey.
Pneumo-Lipase.	Uroiodine.
Probios.	Urométhyl.
Pyoformine.	Urométine Lambiotte.
Pyrelaine Collas.	Uromil.
Pyri-Pyridium.	Urosalyl. — Urosalyl méthylé.
Quinquina Gmet.	Urosan Dufayard.
Radiotropine.	Uvargol.
Santal Midy.	Vaccins Bruschettini.
Santal Monal.	Vaccins Ronchèse. — Ampho-vaccins.
Septicémine Cortial.	Vaclydun.
Solvuric.	Zimbyl.
Terpine granulée Baron.	
Terpoxyl externe.	
Uraseptine Rogier.	

SALPINGO-OVARITES

Ampho-vaccins Ronchèse.	Métricine.
Aristargol.	Microlyse.
Aseptone.	Mictasol.
Aseptovules.	Ovules Chaumel.
Colloïxols.	Ovules Halogènes du Dr Bern.
Complexes colloïdaux du Dr Riquoir.	Péricols du Dr Legros.
Comprimés gynécologiques Merminod.	Pituilobine Byla.
Désitin.	Propidon.
Evine.	Rectagine.
Extrait Hamyd.	Salantale.
Glésol.	Sanoformine.
Glucolactol.	Sels du Jura.
Glyco-Thymoline.	Sephydine.
Goménol.	Septométrol Vély.
Gynopausine.	Soluprotine Roche.
Hémaxol.	Spyrolides.
Immunizols Grémy.	Tampol Roche.
Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.	Terpovules.
Indhaméline Lejeune simple.	Terpoxyl externe.
Ixogyne.	Themsaline.
Lysaxins L. M. L.	Tridynol.
Magnésovules.	Uvargol.
Ménacrine.	Vaccins Bruschettini.
Mésosome.	Vaccins Sténé.
	Végétol externe.
	Vioforme Ciba (et ovules)
	Zimbyl.

SYPHILIS RÉNALE

(Voir : Syphilis.)

APPAREIL GÉNITO-URINAIRE. T. S.

TUBERCULOSE RÉNALE

(Voir : Tuberculose.)

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

ANTIDYSPNÉIQUES

Adoverne.	Eusomnine Bélières.
Adrénaline Invar.	Freinospasmyl.
Adrénine.	Génomorphine.
Alepsal Genévrier.	Globules Rebaud.
Ampoules Boissy.	Hypophédrine.
Ampoules de Pantopon Roche.	Iodéine Montagu.
Anaclasine Ranson.	Murones du Dr Robert Jacques.
Anapeptone Vassal.	Oxy-injecteur du Dr Flailip.
Antasthme Cibrand	Pneumogéine Renard.
Antiasmathique Domergue.	Poudre Escouflaire.
Antiasthme Bengalais.	Poudre et cigarettes Zani.
Antiasthmine Dehaussy.	Pulmocardine.
Asthmo-Actine.	Renaleptine.
Benzoquinol.	RévuIsoplasme.
Coramine Ciba.	Sanex inhalant.
Crataegus Gmet.	Sérum antiasthmatique de Heckel.
Cytophédrine.	Terpoxyl interne.
Détensyl.	Tiodine Cognet.
Élixir Thiogalacolé Arquevaux.	Valériane Gmet.
Éphédrine naturelle Béral.	Zaryl.
Eupnine Vernade.	
Eupnogénol.	

ANTISEPTIQUES DES VOIES RESPIRATOIRES

Alcamfetol.	Capsules Dartois.
Allisatine Sandoz.	Capsules Noguès.
Aloysine.	Codocol.
Amborhinol.	Comprimés Roche de Thiocol.
Anaquinine Lescène.	Créosote soluble Vacheron.
Aniodol.	Créositoires.
Antiasthmatique Domergue.	Élixir thiogalacolé U. N. Arquevaux.
Antiphymique Vadam.	Emgé Lumière.
Arcanan.	Eucalyptine Lebrun.
Azufrol.	Formint Merminod.
Balmiga.	Gatercodéine Domergue.
Balsamol Lescène.	Goménol.
Benzoquinol.	Gouttes Daynoc.
Boréol.	Gouttes Scandinaves.
Bronchodermine.	Holaseptine.
Bronchoseptol Lauriat.	Hyl.
Cachets Kapytan.	Inhalation Lancosme.
Cachets Roche de Thiocol.	

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

ANTISEPTIQUES DES VOIES RESPIRATOIRES

Inhalol.	Rosalyl A et B.
Inhalone.	Sanex Inhalant.
Inhalo-Sel.	Sirop de créosote Vacheron.
Inhaloxyl.	Sirop de Gaiarsol.
Iodex.	Sirop de Glycérophosphates
Marrucol.	Vacheron.
Murones du D ^r Robert	Sirop Famel.
Jacques.	Sirop Gribell.
Oxymenthol Perraudin.	Sirop Mircille.
Perles Jeka.	Sirop phénique Vial.
Perles Taphosote.	Sirop Roche au Thiolcol.
Perubore.	Solution Pautauberge.
Phosote Lamblotte.	Terpine granulée Baron.
Pneumostyl Daguin.	Terpoxyll externe.
Pulmosérum.	Terpoxyll interne.
Pulvéol.	Tubérol.
Résyl.	Zaryl.

ANTISPASMODIQUES — SÉDATIFS DE LA TOUX

Acobella.	Élixir thiogaiacolé Arque-
Aethone.	vaux.
Alepsal Genevrier.	Éphédrine naturelle Béral.
Amphostène.	Eucalyptine Le Brun.
Amphotonyl.	Eupavéryll Pachaut.
Ampoules Spasmalgine	Euphon.
Roche.	Germose.
Anaquinine Lescène.	Glottyl.
Aquintol Petit-Mialhe.	Gouttes antispasmodiques
Balsamol Lescène.	Dausse.
Bellafoline Sandoz.	Gouttes Blagny.
Benzoquinol.	Gouttes Malone.
Benzyamyl.	Gouttes Nican.
Benzylol.	Gouttes Pilka.
Béxinine.	Granulés des Vosges.
Bronchoforme.	Guéthural.
Bronchseptol Lauriat.	Hergénol.
Broncosol.	Hypophédrine.
Cachets Kapytan.	Infangyl Carlier.
Cachets « Roche » de Thio-	Iodéine Montagu.
col.	Kluchol Remeaud.
Capsules et sirop Préga.	Lucodal.
Capsules Nogués.	Miroxyl.
Chloral bromuré du D ^r Du-	Murones du D ^r Robert
bois.	Jacques.
Codérax.	Narcyl.
Codocol.	Néopulmine.
Codoforme.	Papavéryll.
Comprimés « Roche » de	Pâte Mireille.
Thiolcol.	Phosphogaiacol Mary.
Créoformine.	Pilules bronchotoniques
Créositoires.	Arco.
Elatine Boulin.	Pneumogénol.

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

ANTISPASMODIQUES — SÉDATIFS DE LA TOUX

Pulmodion.
Pulmosérum.
Pulmoverne.
Quinthéryl.
Révulsoplasme.
Rosalyl A et B.
Salypitol Narty.
Sédosine.
Sirop Brahma.
Sirop de Castanol.
Sirop Famel.
Sirop de Gaïarsol.
Sirop Gribell.
Sirop Mireille.

Sirop Nogués.
Sirop phéniqué Vial.
Sirop Vacheron au Gaïacol.
Terkal Monal.
Thiosote.
Thio-terpine Dalin.
Toni-pectoral Adrian.
Toussyl Py.
Tubérol.
Valériflore.
Valérinodor Malmanche.
Valérobromine Legrand.
Valthène.
Zaryl.

HÉMOSTATIQUES

(Voir : Appareil circulatoire.)

MODIFICATEURS SÉCRÉTOIRES BALSAMIQUES

Acatar.
Alcamfétol.
Bronchitol.
Broncosol.
Cachets Roche de Thio-col.
Capsules Dartois.
Capsules Nogués.
Comprimés Roche de Thio-col.
Créosal Dubois.
Créositoires.
Créosote soluble Vacheron.
Élatine Bouin.
Eucalyptine Lebrun.
Goménol.
Gouttes livoniennes de Trouette-Perret.
Murones du Dr Robert Jacques.

Perles Taphosote.
Phosote Lambiotte.
Phosphogaiacol Mary.
Pulmosérum.
Pulmoverne.
Rosalyl A et B.
Séroléine granulée Baron.
Sirop de Gaïarsol.
Sirop de Glycérophosphates Vacheron.
Sirop Famel.
Sirop Gribell.
Sirop Mireille.
Sirop Vacheron au gaïacol.
Terkal Monal.
Terpine Gannon.
Thio-col Roche.
Thiosote.
Thio-Terpine Dalin.

MODIFICATEURS SÉCRÉTOIRES EXPECTORANTS

Bronchoseptol Lauriat.
Cachets Kapytan.
Codocol.
Créositoires.
Marrubène.
Miroxyl.

Murones du Dr Robert Jacques.
Résyl.
Sirop de Gaïarsol.
Solution Pautauberge

RÉVULSIFS

(Voir Chirurgie : Révulsifs.)

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. G.

SÉROTHÉRAPIE — VACCINOTHÉRAPIE

Ampho-vaccins Ronchèse.	Vaccin anti-pneumonique
Avistyl.	du professeur Minet.
Broncho-Vaclydun.	Vaccin de Weill et Dufourt.
Entéro-Antigènes.	Vaccinothérapie atoxique
Immunizols Grémy.	Cépède.
Institut Pasteur Sérums.	Vaccins atoxiques stabi-
Institut Pasteur Vaccins.	lisés.
Néo-Dmétys.	Vaccins bactériens I. O. D.
Probios.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Vaccin anti-asthmatique du	pho-vaccins.
professeur Minet.	Vaclydun.

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

ADÉNOPATHIE TRACHÉO-BRONCHIQUE

Banikol.	Infangyl Carlier.
Baume Iki.	Ioda.
Bronchitol.	Iodalose Galbrun.
Bronchodermine.	Iodarsenic Guiraud ou
Broncosol.	gouttes Paidophiles.
Brumarsyl.	Iodasclérine.
Capsules et sirop Préga.	Iodassium.
Collo-iodé Dubois.	Iodex.
Curiode.	Iodocalcium.
Curiode arsénié.	Iodogénol Pépin.
Cytobiase.	Iodo-Maisine Globules.
Cyto-Manganol Corbière.	Iodométine.
Dicaliode.	Iodonésyl.
Énergie iodée de Berck.	Iodo-vitasine.
Éniode Lefebvre.	Laminiode.
Entéro-antigènes.	Lipiodol Lafay.
Éranol.	Lipiodine Ciba.
Fludiose.	Mancobène.
Fucoglycine du D ^r Gressy.	Marimine.
Gaduamine.	Marinol.
Gaduase.	Miroxyl.
Germose.	Morisland irradié.
Glottyl.	Morrhualène Gautier.
Gouttes Malone.	Morrhuetine Jungken et
Gouttes Nican.	Morrhuetine Jungken vi-
Gouttes Pilka.	taminée.
Hémagénine Giraud.	Morrhuel.
Hémato-iodine.	Morruxine.
Hormocline.	Morubiase.
Huile de foie de morue	Moruxase.
médicinale suractivée	Murones du D ^r Robert
Rhône-Poulenc.	Jacques.
Huile iodée Scientia.	Narcyl.
I. A. M.	Opocobalt.

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

ADÉNOPATHIE TRACHÉO-BRONCHIQUE

Phosphogalacol Mary.
Phospholéose Demasles.
Quinquina Gmet.
Rhocya Dyn.
Riodine.
Salyptol Narty.
Sanas.
Séroléine granulée Baron.
Sirop Brahma.

Sirop de glycérophosphates
Vacheron.
Sirop Gribell.
Sirop Mireille.
Sirop Tinardon.
Stérogyl.
Tanno-Calceine.
Uroiodine.
Vin Girard.

ASTHME — ASTHME DES FOINS

Adrénaline Invar.
Adrénine.
Adréphédrine Béral.
Alepsal Genevrier.
Algatan.
Amborhinol.
Amphostène.
Amphotonyl.
Ampho-vaccins Ronchèse.
Ampoules Boissy iodure de
potassium.
Ampoules de Pantopon
Roche.
Anaclasine Ranson.
Anapeptone Vassal.
Antasthme Cibrand.
Antiasthmatique Domergue
Anti-asthmine Dehaussy.
Arrhéнал Adrian.
Arséniodé Buriat.
Artoradine.
Asthmo-Actine.
Avistyl.
Azigol Thévenot.
Balsamol Lescène.
Belladénal Sandoz.
Bellafoline Sandoz.
Benzoquinol.
Benzyanyl.
Benzylol.
Biophylactine M. G.
Bronchitol.
Bronchodermine.
Bronchoforme.
Broncosol.
Cachets Kapytan.
Cachets Roche de Thiocol.
Cacodyle Gonnon.
Calcozymase.
Capsules Bardet.
Capsules et sirop Préga.
Carboiodine.

Carboiodure Fraudin.
Céthocal du Dr Lemay.
Cinalose.
Collo-iodé Dubois.
Comprimés Roche de Thio-
col.
Curiode.
Curiode arsénié.
Cytophédrine.
Dépuriode du Dr Roger
Weber.
Désensibilysine.
Dicaliodé.
Élatine Bouin.
Élixir thiogalacolé Arque-
vaux.
Éniode Lefebvre.
Entéro-antigènes.
Éphédrine naturelle Béral.
Éranol.
Ergotine Lamante.
Essoforme.
Eupavéryl Pachaut.
Eupnine Vernade.
Eupnogénol.
Freinix Buisson.
Freinospasmyl.
Fucoiodine.
Gaduase.
Génomorphine.
Globules Fumouze iodure
de potassium.
Globules Rebaud.
Gouttes antispasmodiques
Dausse.
Gouttes Blagny.
Gouttes Nican.
Gouttes Pilka.
Gouttes scandinaves.
Hectine.
Héparbiline.
Hépatismine.

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

ASTHME — ASTHME DES FOINS

Hergénol.
Hypophédrine.
I. A. M.
Immunizols Grémy.
Ioda.
Iodalose Galbrun.
Iodamélis Logeais.
Iodasclérine.
Iodassium.
Iodéine Montagu.
Iode organique Boissy.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Maisine globules.
Iodométine.
Iodone Robin.
Iodonésyl.
Iodonucléol.
Iodostarine Roche.
Iodo-Vitasine.
Iodural Novat.
Iodurase.
Iodure Philippe.
Iodure Pachaut.
Iodures Souffron.
Kluchol Remeaud.
Laminiode.
Liplodol Lafay.
Lipiodine Ciba.
Magiodyl.
Mangarsenic.
Marrucol.
Miroxyl.
Murones du Dr Robert
Jacques.
Nalodine Logeais.
Néopancarpine.
Néopulmine.
Néo-Riodine.
Opothérapie Byla associée.
Opothérapie Fournier.
Oxy-injecteur du Dr Fialip.
Oxymenthol Perraudin.
Papavéryl.
Peptalmine.
Pepticol.
Perles Jeka.
Pilules bronchotoniques
Arco.
Pilules Philippe.
Pneumogéine Renard.
Pneumogénol.

Pneumo-Lipase.
Polyodure Gonnon.
Poudre Escouffaire.
Poudre et Cigarettes Zani.
Probios.
Protiodyne.
Protiodyne dragées.
Pulmocardine.
Pulvéol.
Pyréthane.
Quinthéryl.
Rénaleptine.
Révulsif liquide Boudin.
Révulsoplasme.
Rhocya Dyn.
Rhodazil.
Riodine.
Sanédrine. —
Sanex-Inhalant.
Sédoneurol Dehaussy.
Sérum antiasthmatique de
Heckel.
Sirop minéral sulfureux
Crosnier.
Sirop Mireille.
Sirop Noguès.
Sirop phéniqué Vial.
Sornyal.
Stovédrine.
Sulfur concentré Dax.
Sulfureux Pouillet.
Sympathyl.
Syncrines Choay.
Thio-Terpine Dalin.
Tiodine Cognet.
Toussyl.
Triglandine.
Trinitrine-Papavérine La-
leuf.
Uricémine.
Uroiodine.
Vaccin antiasthmatique du
professeur Minet.
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Vaccins Ronchèse. — Am-
pho-vaccins.
Vagosédyl.
Valthène.
Vioxyl Mouneyrat.
Zaryl.

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

BRONCHITE FÉTIDE GANGRÈNE PULMONAIRE ABCÈS DU POUMON

Acatar.
Alcamfétol.
Allisatine « Sandoz ».
Aloysine.
Bronchodermine.
Bronchoseptol Lauriat.
Eucalyptine Le Brun.
Gaiarsol.
Goménol.

Murones du Dr Robert
Jacques.
Mycolysine du Dr Doyen.
Résyl.
Séroléine granulée Baron.
Sirop phéniqué Vial.
Terpoxyl interne.
Tubérol.
Zimbyl.

CONGESTIONS PULMONAIRES PNEUMONIE FRANCHE AIGÜE BRONCHO-PNEUMONIES

Alcamfétol.
Ampho-vaccins Ronchèse.
Ampoules de Sécacornine
Roche.
Anacamphre.
Antiphymique Vadam.
Arrhéнал Adrian.
Avistyl.
Balsamol Lescène.
Benzobromine.
Bi-Citrol.
Bronchitol.
Bronchodermine.
Bronchoseptol Lauriat.
Broncho-Vaclydun.
Broncosol.
Cachets Kapytan.
Cachets Roche de Thiocol.
Cacodyle Gonnon.
Camphodausse.
Campho-Spartéine Dubols.
Camphostyl Lacroix.
Camphydryl Robin.
Carboiodine.
Cinalose.
Citrofluyl.
Citrophos.
Citrosodine Longuet.
Comprimés Roche de Thio-
col.
Créositoires.
Créosote soluble Vacheron.
Diurétique Gmet.
Elbon Ciba.
Ercehrinol.
Eucalyptine Le Brun.
Germose.

Goménol.
Gouttes Blagny.
Gouttes Pilka.
Holaseptine.
Institut Pasteur Sérums.
Institut Pasteur Vaccins.
Iodex.
Lantol.
Leucoseptyl.
Lobéline Sandoz.
Lugocalcion.
Marrucol.
Murones du Dr Robert
Jacques.
Mycolysine du Dr Doyen.
Myothermine.
Néo-Physiosthénine—Phy-
siosthénine.
Oxy-injecteur du Dr Fia-
lip.
Papier Iodogène Eymonnet.
Perles Jeka.
Phosote Lambiotte.
Prévalidine.
Probios.
Protiodyne.
Pulmosérum.
Pulmoverne.
Pyoformine.
Quinquina Gmet.
Résyl.
Révulsif liquide Boudin.
Révulsif Milko.
Révulsif Procipha.
Révulsoplasme.
Salyptol Narty.
Sécacornine Roche.

APPAREIL RESPIRATOIRE, T. S.

CONGESTIONS PULMONAIRES PNEUMONIE AIGÜE BRONCHO-PNEUMONIES

Sédoneurol Dehaussy.
Septicémine Cortial.
Séroléine granulée Baron.
Sinaseptic.
Sirop Famel.
Sirop de Gaïarsol.
Sirop Gribell.
Sirop Mireille.
Sirop Noguès.
Sirop Roche au Thiocol.
Sirop Vacheron au Gaïacol.
Solucamphre Delalande.
Staphylase du D^r Doyen.
Terkal Monal.
Terpoxyl interne.
Thiocol Roche.

Thiosote.
Thio-Terpine Dalin.
Toussyl Py.
Tubérol.
Vaccin anti-pneumonique du professeur Minet.
Vaccin de Weill et Dufourt.
Vaccinothérapie atoxique Cépède.
Vaccins bactériens I. O. D.
Vaccins Ronchèse (ampho-vaccins).
Vaclydun.
Vaso-Neurine.
Vésicatoire rose Beslier.
Zimbyl.

COQUELUCHE — TOUX SPASMODIQUE

Acobella.
Adrénaline Invar.
Adrénargol.
Adrénine.
Aéthone.
Amphosthène.
Ampoules Boissy.
Anaquintine.
Antilasthmatique Domergue
Aquantol Petit Mialhe.
Avistyl.
Balsamol Lescène.
Bellafoline Sandoz.
Benzoquinol.
Benzylanil.
Benzylol.
Bexinine.
Bronchitol.
Bronchodermine.
Bronchoforme.
Cachets Roche de Thiocol.
Capsules et sirop Préga.
Capsules Küchner au Mécapitol.
Céthocal du D^r Lemay.
Chloral bromuré du D^r Du-bois.
Cocaïne Midy.
Codérax.
Codocol.
Codoforme.

Comprimés Roche de thio-col.
Coramine Ciba.
Créoformine.
Curiode.
Curiode arsenié.
Dicaliodé.
Élixir thiogaïacolé Arquevaux.
Ergotine Lamante.
Eupavéryl Pachaut.
Euphon.
Fornose.
Gatercodéine.
Germose.
Glottyl.
Glycocarpine.
Goménol.
Gouttes antispasmodiques Dausse.
Gouttes Blagny.
Gouttes Daynoc.
Gouttes Malone.
Gouttes Nican.
Gouttes Pilka.
Hergénol.
Holaseptine.
Hylol.
Infangyl Carlier.
Inhalone.
Kluchol Remeaud.

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

COQUELUCHE — TOUX SPASMODIQUE

Lucodal.	Sirop de glycérophosphates Vacheron.
Miroxyl.	Sirop Famel.
Murones du Dr Robert Jacques.	Sirop Gribell.
Narcyl.	Sirop Mireille.
Néo-Dmétys.	Sirop Noguès.
Néopancarpine.	Sirop phéniqué Vial.
Papavéryl.	Sirop Roche au Thiocol.
Paroxyl.	Sirop Vacheron au Gaïacol.
Perles Jeka.	Soderséine.
Phytinate de quinine Ciba.	Solution Pautauberge.
Pilules bronchotoniques Arco.	Sornyal.
Poudre Escouffaire.	Sulfoléine du Dr Rozet.
Poudre et Cigarettes Zani.	Sulfuryl Monal.
Prévalidine.	Suppositoires Pyrax.
Pulmodion.	Terpine granulée Baron.
Pulmoverne.	Thiocol Roche.
Pulvéol.	Thio-Terpine Dalin.
Quinthéryl.	Toussyl.
Rénaleptine.	Tubérol.
Révuksif Milko.	Vaccinothérapie atoxique Cépède.
Révuksif Procipha.	Vaccins atoxiques stabilisés.
Revulsoplasme.	Vaccins bactériens I. O. D.
Rosalyl A et B.	Valériflore.
Salyptol Narty.	Valérinodor Malmanche.
Sanex-Inhalant.	Valérobromine Legrand.
Sédoneurol Dehaussy.	Valthène.
Sédosine.	Véganine.
Sirop Brahma.	Zaryl.
Sirop Castanol.	

EMPHYSÈME PULMONAIRE SCLÉROSE PULMONAIRE

Algatan.	Curiode.
Ampoules Boissy.	Curiode arsenié.
Antasthme Cibrand.	Cytophédrine.
Antiasthmatique Dommargue.	Dépuriodide du Dr Roger Weber.
Anti-Asthmine.	Désensibilysine.
Arséniodide Buriat.	Dicaliodide.
Asthmo-Actine.	Élatine Bouin.
Avistyl.	Élixir thiogaïacolé Arquevaux.
Benzoguinol.	Eniode Lefebvre.
Cachets Kapytan.	Entéro-Antigènes.
Capsules Küchner au Mécaptol.	Éranol.
Carbolodine.	Eupnine Vernade.
Carbolodure Fraudin.	Eupnogénol.
Cinalosé.	Fondant iodotannique Dausse.
Collo-Iode Dubois.	Freinix Buisson.
Coramine Ciba.	Freinospasmyl.
Cortiodide	

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

EMPHYSÈME PULMONAIRE SCLÉROSE PULMONAIRE

Fucoolodine.
Globules Fumouze iodure
de Potassium.
Globules Rebaud.
Gouttes Blagny.
Gouttes Scandinaves.
Hypophédrine.
Inhalation Lancosme.
Ioda.
Iodalose Galbrun.
Iodamélis Logeais.
Iodasclérine.
Iodassium.
Iodéine Montagu.
Iode organique Boissy.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Malsine (Globules.)
Iodométine.
Iodone Robin.
Iodonésyl.
Iodonucléol.
Iodostarine Roche.
Iodo-Vitasine.
Iodural Novat.
Iodurase.
Iodure Pachaut.
Iodure Philippe.
Iodures Souffron.
Laminiodé.
Lipiodol Lafay.
Lipiodine Ciba.
Magiodyl.
Mangarsenic.
Miroxyl.
Murones du Dr Robert
Jacques.

Nalodine Logeais.
Néo-Riodine.
Opotonine.
Oxy-injecteur du Dr Fla-
lip.
Oxymenthol Perraudin.
Perles Jeka.
Pilules bronchitiques Arco.
Pilules Philippe.
Pneumogéline Renard.
Pneumogénol.
Pneumo-Lipase.
Prévalidine.
Pulmocardine.
Pulmosérum.
Quinthéryl.
Révulsif liquide Boudin.
Révulsoplasme.
Rhocya Dyn.
Riodine.
Séroléine granulée Baron.
Sirop Gribell.
Sirop minéral sulfureux
Crosnier.
Sirop Mireille.
Sirop Noguès.
Sulfur concentré Dax.
Sulfureux Pouillet.
Terpine Gonnon.
Terpine granulée Baron.
Tiodine Cognet.
Uroiodine.
Vaccin antiasthmatique du
professeur Minet.
Zaryl.

ŒDÈME AIGU DU POUMON

Adoverne.
Ampoules Boissy.
Ampoules de Sécarconine
Roche.
Coramine Ciba.
Digitaline Nativelle.
Diurétique Gmet.

Natibaïne.
Natirose.
Ouabaïne Arnaud.
Révulsoplasme.
Tétranitrol Roussel.
Trinitrine caféinée Dubois.
Zimbyl.

PLEURÉSIES

Antiphymique Vadam.
Avistyl.
Balsamol Lescène.
Baume Adol.
Baume Aroma.

Baume Bengué.
Bronchodermine.
Chloro-Calcion.
Cinalose.
Créositoires.

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

PLEURÉSIES

Diurétique Gmet.
Gaduase.
Goménol.
Iodex.
Lipodéterpénol.
Marrucol.
Murones du Dr Robert
Jacques.
Myothermine.
Néo-Physiosthénine—Phy-
siosthénine.
Neptal.

Oxy-injecteur du Dr Fialip.
Papier Iodogène Eymon-
net.
Perles Jeka.
Pneumo-Lipase.
Révulsif liquide Boudin.
Révulsif Milko.
Révulsif Procipha.
Révulsoplasme.
Sirop de Gaïarsol.
Vésicatoire Rose Beslier.
Zimbyl.

TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGÜES, BRONCHITES CHRONIQUES

Acatar.
Acobella.
Aethone.
Alcamfétol.
Algatan.
Algostérine.
Allisatine Sandoz.
Aloysine.
Amborhinol.
Ampho-vaccins Ronchèse.
Amphostène.
Anaquintine Lescène.
Aniodol.
Antasthme Cibrand.
Antiasthme Bengalais.
Anti-Asthmine.
Antiphymique Vadam.
Arcanan.
Ascoléine Rivier.
Asthmo-Actine.
Avistyl.
Azufrol.
Balmiga.
Balzamol Lescène.
Banikol.
Benzoquinol.
Bexinine.
Boréol.
Bronchitol.
Bronchodermine.
Bronchoforme.
Bronchoseptol Lauriat.
Broncho-Vaclydun.
Broncosol.
Brumarsyl.
Cachets Kapytan.
Cachets « Roche » de Thiocol.

Cacodyle Gonnon.
Capsules Dartois.
Capsules Küchner au Mé-
captol.
Capsules et sirop Préga.
Capsules Nogués.
Carbolodure Fraudin.
Céthocal du Dr Lemay.
Cinalose.
Codérax.
Codocol.
Codoforme.
Comprimés « Roche » de
Thiocol.
Cortiode.
Coryphédrine.
Créoformine.
Créosal Dubois.
Créosote soluble Vacheron.
Curiode.
Curiode arsenié.
Dépuriode du Dr Roger
Weber.
Dicaliode.
Élatine Bouin.
Elbon Ciba.
Élixir thio-gaïacolé Ar-
quevaux.
Embrocation Salas.
Éniode Lefebvre.
Eranol.
Ercérhinol.
Euphon.
Eupnine Vernade.
Eupnogénol.
Fondant iodotannique
Dausse.

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGÜES — BRONCHITES CHRONIQUES

- | | |
|--|--|
| Fornose. | Iodurase. |
| Gaduase. | Iodure Philippe. |
| Germose. | Iodure Pachaut. |
| Gernal. | Iodures Souffron. |
| Glottyl. | Laminiode. |
| Glyco-Thymoline. | Léniforme. |
| Goménol. | Limol Churchill. |
| Gouttes Blagny. | Lipiodol Lafay. |
| Gouttes Daynóc. | Lipolodine Ciba. |
| Gouttes Livoniennes de
Trouette-Perret. | Lucodal. |
| Gouttes Nican. | Magiodyl. |
| Gouttes Pilka. | Malt Wander ou Gloma. |
| Gouttes scandinaves. | Mangarsenic. |
| Granulés des Vosges. | Marinol. |
| Guéthural. | Marrubène. |
| Guttoléol. | Marrucol. |
| Hépatine Gad. | Mégathion Oliviero. |
| Hergénol. | Méthylarsinate Bouty. |
| Histogénol. | Miroxyl. |
| Holaseptine. | Morrhuel. |
| Huile de foie de morue mé-
dicinale suractivée Rhône-
Poulenc. | Morrhuxine. |
| H yol. | Morrubiase. |
| Hypophédrine. | Moruxase. |
| I. A. M. | Murones du D ^r Robert
Jacques. |
| Immunizols Grémy. | Myothermine. |
| Infangyl Carlier. | Nasobore. |
| Inhalation Lancosme. | Néo-Physiosthénine. — |
| Inhalol. | Physiosthénine. |
| Inhalone. | Néopulmine. |
| Inhalo-Sel. | Néo-Riodine. |
| Inhaloxyl. | Nucléophorine. |
| Ioda. | Opocalcium du D ^r Guer-
sant. |
| Iodalose Galbrun. | Opocobalt. |
| Iodarsenic Guiraud ou
Gouttes Païdophiles. | Opotonine. |
| Iodascérine. | Oxymenthol Perraudin. |
| Iodassium. | Papier iodogène Eymonnet. |
| Iodéine Montagu. | Pâte Mireille. |
| Iodex. | Perles Jeka. |
| Iodorganique Boissy. | Perles Taphosote. |
| Iodogénol Pépin. | Perubore. |
| Iodo-Maisine Globules. | Pharyngaseptyl. |
| Iodométine. | Phosote Lambiotte. |
| Iodone Robin. | Phosphogaiacol Mary. |
| Iodonésyl. | Phytomarine. |
| Iodonucléol. | Pilules bronchotoniques
Arco. |
| Iodosan Zambelletti. | Pneumogéine Renard. |
| Iodostarine Roche. | Pneumogénol. |
| Iodo-Vitasine. | Pneumo-Lipase. |
| Iodural Novat. | Pneumoseptyl Daguin. |
| | Polyiodure Gonnon. |

APPAREIL RESPIRATOIRE. T. S.

TRACHÉITES — TRACHÉO-BRONCHITES AIGÜES — BRONCHITES CHRONIQUES

Poudre Escoufflaire.	Sirop Vacheron au Gaïacol.
Poudre et Cigarettes Zani.	Sodothermol.
Prévalidine.	Solution Pautauberge.
Probios.	Staphylase du D ^r Doyen.
Pulmocardine.	Sulfa.
Pulmodion.	Sulfoidol Robin.
Pulmosérum.	Sulfoléine du D ^r Rozet.
Pulmo-verne.	Sulfo-Thiorine.
Pulvéol.	Sulfur concentré Dax.
Quintheryl.	Sulfureux Pouillet.
Résyl.	Sulfuryl Monal.
Révlusif liquide Boudin.	Sulf Y.
Révlusif Milko.	Terkal Monal.
Révlusif Procipha.	Terpine Gonnon.
Révlusoplasme.	Terpine granulée Baron.
Rhino-Liposeptine.	Thiocol Roche.
Rhocya Dyn.	Thiorine.
Riodine.	Thiosote.
Rosalyl A et B.	Thio-Terpine Dalin.
Salyptol Narty.	Thymo-menthol eupnique
Sanex-Inhalant.	Belhomme.
Sédorhinol.	Tiodine Cognet.
Séroléine granulée Baron.	Toni-pectoral Adrian.
Sérum Oliviero.	Total-Tonic.
Sinaseptic.	Toussyl.
Sirop de Créosote Vacheron.	Tubérol.
Sirop de Gaïarsol.	Vaccin anti-asthmatique du
Sirop de glycérophosphate	professeur Minet.
Vacheron.	Vaccin de Weill et Du-
Sirop Famel.	fourt.
Sirop Gribell.	Vaccins Ronchèse-Am-
Sirop minéral sulfureux	pho-Vaccins.
Crosnier.	Vaclydun.
Sirop Mireille.	Vésicatoire rose Beslier.
Sirop Noguès.	Zaryl.
Sirop phéniqué Vial.	Zimbyl.
Sirop Roche au Thiocol.	

CHIRURGIE THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

ANESTHÉSISQUES

(Voir : *Système nerveux central.*)

Allocaïne Lumière.	Delcaïne Roques.
Chloréthyle Bengué.	

CHIRURGIE

THERAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

ANTISEPTIQUES EXTERNES — COMPRIMÉS

Aloysine.	Comprimés d'Alibour.
Anexol.	Comprimés Guillaumin.
Aniodol.	Métacuprol.
Chlocci.	Noviode.
Chloraseptine optima.	Sanoram.
Clonazone Daufresne,	Tinctiode.

ANTISEPTIQUES EXTERNES — LIQUIDES

Alibourine.	Kerlol.
Bacté-phages.	Laurenol Médicinal.
Bactériophages Leclerc.	Lusoforme.
Biolactyl Fournier.	Néol.
Boricine Meissonnier.	Pennès (Produits).
Borostyrol Schlatter.	Pyroléol Edet.
Camphydryl Robin.	Salubrine Phénix.
Coaltar saponiné Le Beuf.	Séphydine.
Entéroxin Leclerc.	Septométrol Vély.
Glyco-Thymoline.	Stannoxy.
Goménol.	Sunoxol.
Gouttes Daynoc.	Teinture de Sunoxol.
Hermophényl Lumière.	Terpoxyl externe.
Holaseptine.	Thigénol Roche.
Inolene.	Tochlorine.
Iodex.	Végétol (externe).

ANTISEPTIQUES EXTERNES — POMMADES

Acéclex.	Iodex.
Alibourine.	Iodo-Maisiné (pommade).
Baume du D ^r Baissade.	Iodure d'Amidon Lumière.
Baume Py.	Méta-Titane.
Borostyrol Schlatter.	Méta-Vaccin.
Créosoforme Lambiotte.	Néo-Collargol.
Dermo-Stalys du D ^r Wagon.	Pommade au Nestosyl.
Désitin.	Poudre Pelévine.
Détergine du D ^r Bourdeau.	Rozoderme.
Dithioléine.	Stannoxy.
Ektogan Bocquillon.	Steramine.
Goménol.	Uvéoline.
Guérysipèle.	Vioforme Ciba.

ANTISEPTIQUES EXTERNES — POUDRES

Airol Roche.	Créosoforme Lambiotte.
Biolactyl Fournier.	Désitin.
Boricine Meissonnier.	Ektogan Bocquillon.
Bulgarine Thépenier.	Évine.
Clonazone Daufresne.	Iodure d'Amidon Lumière.

CHIRURGIE

THERAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

ANTISEPTIQUES EXTERNES — POUDRES

Poudre Chaumel.	Septométrol Vély.
Poudre Pelévine.	Vioforme Ciba (et ovules
Salasenyl (poudre).	au Vioforme).

ANTISEPTIQUES EXTERNES SAVONS — OVULES

Créosoforme Lambiotte.	Goménol.
Ektogan Bœquillon.	Savon Mollard.
Evine.	Savon Pérusol.

ANTISEPTIQUES INTERNES

Acétar.	Leucoseptyl.
Bacté-phages.	Métaformine.
Bactériophages Leclerc.	Murones du D ^r Robert
Bensomine.	Jacques.
Boldo Gmet.	Oxyléine.
Bulgarine Thépenier.	Stanlon.
Carbolactyl simple.	Stannoxyl.
Cynurol Rosa.	Staphylocide Audras.
Eranol.	Staphylothanol.
Entérofagös.	Terpoxyl interne.
Eucalyptine.	Themsaline.
Glesol.	Uraseptine.
Gouttes Daynoc.	Urosalyl.

BAINS

Bain Carré.	Pennès (produits).
Bain de Brides.	Salvenase Legoux.
Bain Salvia.	Sulfureux Pouillet.
Borisme Meissonnier.	Sulfurine du D ^r Langlebert.
Laépinine.	Ulcéobainéine.
Laminiodé.	

CATAPLASMES — RÉVULSIFS

Cataplasme du D ^r Lelièvre.	Révulsif liquide Boudin.
Embrocation Salas.	Révulsif Milko.
Fango Fisch et C ^{ie} .	Révulsif Procipha.
Myothermine.	Révulsoplasme.
Novlode.	Sinaplasme.
Quataplasme du D ^r Langlebert.	Sinaseptic.
Papier Iodogène Eymonnet.	Tinctiode.

CICATRISANTS

Acécolex.	Antipiol.
Albuplast Vigier.	Baume Py.
Aïrol Roche.	Baume Selenia.

CHIRURGIE

THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. G.

CICATRISANTS

Coaltar saponiné Le Beuf	Poudre et pommade d'insuline Phyloze.
Créosoforme Lambiotte.	Poudre Pelévine.
Dermoradol.	Pyroléol Edet.
Désitin.	Radiobaume Adrian.
Dithioléine.	Rozoderme.
Eczéda.	Séphydine.
Goménol.	Sérum Oliviero.
Insuline Byla.	Terpoxyl externe.
Insuline Phylose.	Ulcérophile Nosan.
Méta-Titane.	Végétol externe.
Néoplalysines.	Vioforme Ciba (et ovules au Vioforme).
Opodermyl.	Vulnérine du Dr Bergen.
Plagéine Soulas.	
Pommade Raimoa.	
Pommade V. E. Doumer.	

HÉMOSTATIQUES

(Voir : Appareil circulatoire.)

STÉRILISATION

Comprimés Aqua-Pura.	Salasenyl (poudre).
Novlode.	Tochlorine.

VACCINOTHÉRAPIE

Ampho-vaccins Ronchèse.	Staphylagone.
Anthraxone Fernet.	Staphylo-Vaclydun.
Antigénines.	Vaccinothérapie atoxique Cépède.
Antipiol.	Vaccins Bruschetti.
Antivirus.	Vaccins atoxiques stabilisés
Arapal.	Vaccins bactériens I. O. D.
Immunizols Grémy.	Vaccins Ronchèse. — Ampho-vaccins.
Institut Pasteur (Vaccins).	Vaccins Sténé.
Lysaxins L. M. L.	Vaccins intradermiques et gelées-vaccins. Ivago de L. Goldenberg.
Probios.	Vaccins Pansement Virultra.
Propidex.	Vaclyderm.
Propidon.	Vaclydun.
Propidon Pansement.	
Pyo-Amphogel Ronchèse.	
Pyo-Vaclydun.	
Pyo-Vaclydun Pansement.	
Salantale.	
Stalysine.	

CHIRURGIE

THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

ADÉNITES

Banikol.	Iodarsenic Guiraud ou
Baume Iki.	Gouttes Païdophiles.
Brumarsyl.	Iodaseptine Cortial.
Curiodé.	Iodex.
Curiodé Arsénié.	Iodo-Maisine Pommade.
Cytobiase.	Iodométine.
Cyto-Manganol Corbière.	Iodonésyl.
Dépuriodé du D ^r Roger	Iodonucléol.
Weber.	Iosorbine.
Dicaliodé.	Laminiode.
Énergine iodée de Berck.	Marimine.
Eniode Lefebvre.	Marinol.
Éranol.	Opocobalt.
Fludiose.	Phospholéose Demasles.
Gaduamine.	Pilules Philippe.
Galliodine.	Polyiodure Gonnon.
Glandocalcyl.	Propidon pansement.
Hémato-iodine.	Sterogyl.
Hormocline.	Tanno-Calcine.
Huile iodée Scientia.	Uroiodine.
Infra-rouges.	

BRULURES

Acécolex.	Méta-Titane.
Airol Roche.	Méta-Vaccin.
Antipiol.	Néo-Collargol.
Arapal.	Néol.
Baume Daynoc.	Nestosyl.
Belhemine.	Opodermyl.
Boricine Meissonnier.	Ouataplasme du D ^r Lan-
Borostyrol Schlatter.	glebert.
Camphydryl Robin.	Percaïnal Ciba.
Cataplasme du D ^r Lelièvre.	Pommade au Nestosyl.
Coaltar saponiné Le Boeuf.	Pommade Bertol-Vichy.
Créosoforme Lambiotte.	Pommade Raimoa.
Dermoradol.	Pommade V. E. Doumer.
Désitin.	Poudre Pelévine.
Diadermine.	Probios.
Dithioléine.	Propidex.
Eczéda	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Ektogan Bocquillon.	Pyroléol Edet.
Gaze Néolée.	Radiobaume Adrian.
Glyco-Thymoline.	Rhagadine Bracquemond.
Goménol.	Rozoderme.
Immunizols Gremy.	Salasensyl (poudre).
Inotyol.	Sanoram.
Insulanol.	Scuroforme.
Iodex.	Sénophile.
Iosorbine.	Septométrol Vély.
Lauréol Médicinal.	Sérum Oliviero.
Lyzacrème L. M. L.	Solution huileuse au Nes-
Métacuprol.	tosyl.

CHIRURGIE

THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

BRULURES

Stéramine.	Tulle rose Beslier.
Terpoxyl externe.	Ulcérophile Nosan.
Thigénol Roche.	Vioforme Ciba.
Tulle gras Lumière.	Vulnérine du D ^r Bergen.

CICATRICES VICIEUSES

Chéloïdine.	Tiodine Cognet.
-------------	-----------------

ENTORSES, FRACTURES, HYDARTHROSES

Baume Adol.	Opocalcium irradié du
Baume Aroma.	D ^r Guersant.
Baume Bengué.	Opophytol.
Benzylcalcium.	Parathyrocalcine Moncour.
Biosine Le Perdriel.	Phosphates du D ^r Pi-
Cataplasme du D ^r Le-	nard.
lièvre.	Phosphate Vital de Jac-
Crème résolutive du	quemaire.
D ^r Rap.	Phosphatol vitaminé irra-
Curiodé.	dié.
Curiodé arsenié.	Phospho-Fluor Beynet.
Dohyfral.	Pommade au Nestosyl.
Embrocation Salas.	Prodynase.
Fortossan irradié.	Propidon pansement.
Fosfoxyl Carron.	Pyo-Vaclydun.
Gaurol.	Silicyl.
Génomorphine.	Sterogyl.
Glandocalcyl.	Sylcase.
Holos.	Tricalcine.
Iodex.	Uvéphorine.
Iosorbine.	Vésicatoire rose Beslier.
Mancobène.	Vitastérol.
Nestosyl.	Vitergomine.
Opocalcium du D ^r Guer-	Vivoléol.
sant.	

FURONCLES — FURONCULOSE — ANTHRAX ABCÈS — PANARIS — PHLEGMONS PIQURES D'INSECTES

Albuplast Vigier.	Arapal.
Airol Roche.	Aseptoradol.
Alibourine.	Bacté-phages.
Ampho-vaccins Ronchese.	Bactériophages.
Anasetol.	Baume du D ^r Baissade.
Anexol.	Baume Py.
Aniodol.	Boricine Meissonnier.
Anthraxone Fornet.	Borostyrol Schlatter.
Antifurunculoux Domérgue	Bulgarine Thépenier.
Antigénines.	Cataplasme du D ^r Le-
Antipiol.	lièvre.
Antivirus.	Chloraseptine Optima.

CHIRURGIE

THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

FURONCLES — FURONCULOSE — ANTHRAX ABCÈS — PANARIS — PHLEGMONS PIQURES D'INSECTES

- | | |
|--|--|
| <p>Coaltar saponiné Le Bœuf.
Colloïxols.
Complexes colloïdaux du Dr Riquoir.
Comprimés d'Alibour.
Comprimés Guillaumin.
Comprimés Levure Mycète.
Dépurlode du Dr Roger Weber.
Dermostalys du Dr Wagon.
Désitin.
Elastoplaste.
Emplâtres Rogé Cavaillès.
Entéro-Antigènes.
Évolaxine.
Facmine Longuet.
Ferment pur de Raisin.
Fosyls Carron.
Furonculase.
Ganderma.
Glésol.
Glyco-thymoline.
Gaménol.
Gouttes Daynoc.
Guérýsipèle.
Hermophényl Lumière.
Immunizols Grémy.
Inolène.
Inosepta.
Institut Pasteur, — Vaccins.
Iodex.
Iodo-Malsine (pommade).
Kerlol.
Levure B. 17.
Levure de bière Adrian.
Levure fraîche Mycète.
Levurine extractive.
Levuro-Maltine Déjardin.
Lipodéterpénol.
Lysacrème L. M. L.
Lysaxins L. M. L.
Métacuprol.
Méta-Vaccin.
Mycolysine du Dr Doyen.
Nestosyl.
Ouataplasma du Dr Langlebert.
Physiosthénine. Néo-Physiosthénine.</p> | <p>Plagéine Soulas.
Polyiodure Gannon.
Pommade au Nestosyl.
Probios.
Propidex.
Propidon.
Propidon Pansement.
Protiodyne.
Pyo-Amphogel Ronchèse.
Pyo-Vaclydun.
Quinquina Gmet.
Salantale.
Salasényl (poudre).
Séphydine.
Septicémine Cortial.
Soluprotine Roche.
Stalysine.
Stanion.
Stannoxy.
Staphylagone.
Staphylase du Dr Doyen.
Staphylocide Audras.
Staphylo-Coccine Fraquet.
Staphyloethanol.
Staphylo-Vaclydun.
Sulfodermol Flahaut.
Tapo.
Terpoxyl externe.
Themsaline.
Thiophyl.
Triseptine.
Tulle Rose Beslier.
Ultra-Levure.
Uvéoline.
Vaccinothérapie atoxique Cépède.
Vaccins Bruschetti.
Vaccins atoxiques stabilisés.
Vaccins Bactériens I. O. D.
Vaccins Ronchèse. — Ampho-Vaccins.
Vaccins Sténé.
Vaccins intra-dermiques et gelées-vaccins Ivago de L. Goldenberg.
Vaclyderm.
Vaclydun.
Végétol externe.</p> |
|--|--|

CHIRURGIE

THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

OSTÉITES — OSTÉO-MYÉLITES

Ampho-Vaccins Ronchèse.	Staphylagone.
Antipiol.	Staphylase du D ^r Doyen.
Bacté-phages.	Staphylo-coccine Fraquet.
Bactériophages Leclerc.	Staphylothanol.
Benzylocalcium.	Sylcase.
Dicallode.	Terpoxyl externe.
Éléodermine.	Uvéphorine.
Eranol.	Vaccinothérapie atoxique
Fosfoxyl Carron.	Cépède.
Furunculase.	Vaccins Bruschettini.
Immunizols Grémy.	Vaccins bactériens I. O. D.
Institut Pasteur Vaccins.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Iodo-Malsine Pommade.	pho-Vaccins.
Lipodéterpénol.	Vaccins intra-dermiques et
Liposeptine.	gelées-vaccins Ivago de
Phospho-Fluor Beynet.	L. Goldenberg.
Séphydine.	Vaclydun.
Septicémine Cortial.	

PANSEMENTS — PLAIES — FISTULES ULCÈRES

Acécolex.	Comprimés Guillaumin.
Airol Roche.	Créosoforme Lambiotte.
Albuplast Vigier.	Dermoradol.
Alibourine.	Dermostalys du D ^r Wa-
Aloysine (pommade).	gon.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Désitin.
Anexol.	Détergine du D ^r Bour-
Aniodol.	deau.
Antigénines.	Dithioléine.
Antipiol.	Ektogan Bocquillon.
Antivirus.	Élastoplast.
Arapal.	Emplâtres Rogé Cavallès
Bactériophages Leclerc.	Eranol.
Bande de crêpe Velpeau.	Francoplaste.
Baume Daynoc.	Gaze Néolée.
Baume Py.	Glyco-Thymoline.
Baume Sélénia.	Goménol.
Baume Tanex.	Gouttes Daynoc.
Belhémine.	Guérysipèle.
Biolactyl Fournier.	Hémostyl du D ^r Roussel.
Boricine Meissonnier.	Hermophényl Lumière.
Borostyrol Schlatter.	Holaseptine.
Bulgatine Thépenier.	Infra-rouges.
Camphydryl Robin.	Inolène.
Cataplasme du D ^r Le-	Inosepta.
lièvre.	Inotyol.
Chlocci.	Insulanol.
Chloraseptine Optima.	Insuline Byla.
Clonazone Daufresne.	Insuline Phylose.
Coaltar saponiné Le Boeuf.	Iodex.
Comprimés d'Alibour.	Iodure d'amidon Lumière.

CHIRURGIE

THÉRAPEUTIQUE EXTERNE. T. S.

PANSEMENTS — PLAIES — FISTULES ULCÈRES

Iosorbine.	Rhagadine Bracquemond.
Kerlol.	Rozoderme.
Lactosérum Lavril.	Salasenyl (poudre).
Laurénol médicinal.	Salubrine Phénix.
Ludin.	Sanoram.
Lusoforme.	Scuroforme.
Lyzacréme L. M. L.	Séphydine.
Méta-Vaccins.	Septométrol Vély.
Néo-Collargol.	Sérum Oliviero.
Néol.	Solution huileuse au Nes-
Nestosyl.	tosyl.
Nitium Buisson.	Stéramine.
Noviode.	Sunoxol.
Opodermyl.	Teinture de Sunoxol.
Ouataplasme du D ^r Lan-	Terpoxyl externe.
glebert.	Themsaline.
Plagéine Soulas.	Tochlorine.
Pommade au Nestosyl.	Tulle gras Lumière.
Pommade Fornet.	Tulle rose Besliér.
Pommade Raimoa.	Ulcéoplaque. — Ulcéo-
Poudre Chaumel.	bande.
Poudre et pommade d'In-	Ulcéosine.
suline Phyloze.	Ulcérophile Nosan.
Poudre Pelévine.	Uvéoline.
Probios.	Vaccins Sténé.
Propidex.	Végétol externe.
Propidon Pansement.	Veinotrope.
Pyo-Amphogel Ronchèse.	Vioforme Ciba (et ovules au
Pyo-Vaclydun.	Vioforme).
Pyo-Vaclydun Pansement.	Vulnérine du D ^r Bergen.
Pyroléol Édet.	

TUBERCULOSES OSSEUSES

(Voir : Tuberculose.)

DIÉTÉTIQUE

Adral.	Benzylocalcium.
Aliment Tinardon.	Biotrignon.
Amino-sel Byla.	Blédine Jacquemaire.
Atural.	Calcoléol.
Babeurre « La Faye ».	Caoglands.
Babeurre « Nutricia ».	Carottase.
Bain Carré.	Carypaine.
Beef Lavoix.	Céréales Bébé Favrichon.
Bemax.	Céréaline Tulivet.

DIÉTÉTIQUE

Chocolate Milk C. G.	Holos.
Composé Gmet.	Kymosine Rogier.
Curoraisin.	Lab-Lacto Ferment Mialhe.
Decorpa.	Lacto-sérum Lavril.
Diabétuline.	Lait Sec C. G.
Diases.	Lait Mont-Blanc.
Dryco.	Levuro-Maltine Déjardin.
Élixir Dussaud.	Malt Barley.
Enterofagos.	Malt paillété.
Ergorone.	Maltase Fanta.
Évine (Thé).	Maltéa Moser cristallisé.
Fantine.	Maltosan.
Farines de Malt Heudebert.	Malt Wander ou Gloma.
Farines de Régime Bloch.	Minergine.
Farines maltées Favri- chon.	Murones du Dr Robert Jacques.
Fénugrène.	Nergine.
Féroxal Buisson.	Normalarine.
Fludiose.	Nutrobiase.
Forcival.	Oléo-Mel.
Fortossan.	Orthozomine.
Fucus Gmet.	Ozobiase.
Galactésia.	Pain essentiel.
Galactogil.	Pain Massé « Sana ».
Gastrozymase.	Pains spéciaux Heudebert.
Gaurol.	Peptalac.
Génosthéniques.	Phosphogène Favrichon.
Glandocalcyl.	Quinquina Gmet.
Glaxo.	Raisin « Quotidien ».
Glycérophosphate Dalloz.	Ultracao Laurençon.
Glycérophosphate Robin.	Veguva.
Glyctone phosphatée Char- rière.	Vitaminol.
Hémofer.	Yaourtine.
Hémoglobine Deschiens.	Zomine.

INSTRUMENTATION — APPAREILS

Albuplast Vigier.	Inhalo-Bol.
Boules Quies.	Infra-Rouges.
Compressif Beslier.	Oxy-injecteur du Dr Fialip.
Diathermie.	Poudre Oytisia.
Dosurine (trousses).	Ultra-Violets.
Gobillettes Hypnos.	Velpeau (Bandes de crêpe).

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE, T. G.,

ACCÉLÉRATEURS DE LA NUTRITION

- | | |
|--|---|
| <p>Algatan.
Androstine Ciba.
Ardogène.
Arrhéнал Adrian.
Arrhénuclène Bergevin.
Arsécrinol.
Arséniode Buriat.
Arsi-strychnal Longuet.
Arsycodile.
Arsylène Roche.
Avantol.
Biocéane.
Biogénol Demasles.
Bionéol.
Boldofne Éparvier.
Cacodyle Gonnon.
Cacodyline Jammes.
Chophytol Rosa.
Créagénol.
Créosal Dubois.
Curiode arsenié.
Cyto-Manganol Corbière.
Cytopan.
Diasténine Grémy.
Diastogène Dehaussy.
Diastogène F. Dehaussy.
Énergine iodée de Berck.
Extrait de Malt français Déjardin.
Fénucine.
Ferrocol.
Fluoganèse.
Fludiose.
Fondant mangano-ferreux.
Forxol.
Fosfoxyl Carron.
Fosyls Carron.
Gaduase.
Gouttes arsénosthéniques Dausse.
Granules de Pantofort du Dr Bovell.
Hémagénine Giraud.
Hémo-Cyto-Sérum Corbière.
Hémotonine Bulsson.
Huile de foie de morue Rhône-Poulenc.
I. A. M.
Iodarsenic Cuiraud ou gouttes Paidophiles.
Lécithine Vacheron.</p> | <p>Malt français Déjardin (Extrait de).
Malt Wander ou Gloma.
Mancobène.
Manganésia.
Mangano-phosphal Julien.
Mangarsenic.
Mangratinés.
Marinol.
Méthylarsinates Bouty.
Morrhualène Gautier.
Morrhuetine Jungken et Morrhuétine Jungken vitaminée.
Morrhuel.
Morrhuxine.
Moruxase.
Muronex du Dr Robert Jacques.
Néoarsite.
Néo-Arsycodile.
Néo-Rhomnol.
Nervocithine Tissot.
Neuroplasma Fort.
Neuroplasma Massif.
Neurotrol.
Neurotrophol Byla.
Nucléarsitol Robin.
Nucléasine.
Nucléophorine.
Oposérum.
Opothérapie Choay.
Ovo-Lécithine Billon.
Phosoforme.
Phospharsol.
Phospholéose Demasles.
Phylla Dyn.
Phytomarine.
Phytosplénol Plé.
Phytine Ciba.
Prodynase.
Progaster.
Quinquina Gmet.
Reconstituant Mary.
Sanguil.
Serifer Laurençon.
Sérum névrosthénique Fraisse.
Sthénoxal.
Strychnal Longuet.
Strychnarsitol Robin.
Tonudol.</p> |
|--|---|

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

ACCÉLÉRATEURS DE LA NUTRITION

Uvéphorine.	Vioxyl Mouneyrat.
Vanadarsine Guillaumin.	

DISSOLVANTS URIQUES ANTI-GOUTTEUX

Absuric.	Neubryne.
Algophagine.	Novacétine Prunier.
Ampoules Reipar.	Pipérazine Midy.
Anégrine.	Radiotropine.
Antalgol Dalloz.	Rhocya Dyn.
Antialgos Christiaens.	Salsanos.
Antisciatique P. Chambon.	Salysérum.
Ascéine.	Sambul.
Atophan Cruet.	Sanoquinol Ciba.
Atophanyl.	Sel hépatique U. N. Arque- vaux.
Atoquinol Ciba.	Sels de Lithine effervescents.
Banikol.	Solvuric.
Benzo phosphine Chris- tiaens.	Triseptine.
Biliogastrine Chevillon.	Uralysol.
Capsules Bardet.	Uraseptine.
Colchi-Sal-Midy.	Urazine.
Complexes colloïdaux du D ^r Riquoir.	Uricémine.
Comprimés Urbé.	Urifluine.
Crypthiol.	Urisanine.
Cynurol Rosa.	Urobuccol Malmanche.
Dialyl.	Uroclase.
Diasclérol.	Uroformine Gobey.
Disolurane Vély.	Uroiodine.
Diurétique Gmet.	Urométhyl.
Dolysine.	Urométine Lambiotte.
Fosfoxyl Carron.	Uromil.
Gravural.	Urophényl.
Mésothine.	Urophile.
Métaformine.	Urozan Dufayard.
Métophan.	Urozéa.
	Viophan.

MÉDICAMENTS D'ÉPARGNE

Antidiabétique Monavon.	Fondant de Cola Dausse.
Biophorine Girard.	Glykolaine Robin.
Biotrigon.	Gmet (Extraits).
Complexextraits.	Kola granulée Astier.
Composé Gmet.	Kola Monavon.
Diastogène Dehaussy.	Kreptol.
Diastogène F. Dehaussy.	Pepto-Kola-Robin.
Élixir Ducro.	

PRODUITS VITAMINÉS — PRODUITS IRRADIÉS

Algostérine Oliviero.	Avantol.
Amylodiastase Thépenier.	Bémex.
Ascoléine Rivier.	Benzylocalcium.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. G.

PRODUITS VITAMINÉS — PRODUITS IRRADIÉS

Blédine Jacquemaire.	Oponuclyl irradié Trouette-Perret.
Calcoléol.	Opophytol.
Carottase.	Ostéline.
Crescol Buisson.	Pangaduine.
Cytobiase.	Phosphates du D ^r Pinard.
Diasés.	Phosphatol vitaminé irradié.
Dohyfral.	Phytergol.
Ergorone.	Polyminéral Fort.
Extrait de céréales Adrian.	Provitol.
Extrait de Malt français Déjardin.	Sanas.
Fixase irradiée.	Sanguine irradiée.
Fortossan irradié.	Splénomanganol.
Gaduamine.	Stérogyl.
Halocure irradié.	Ultravitamine 4.
Huile de foie de morue médicinalesuractivée Rhône-Poulenc.	Uvé (gouttes).
Irrastérine.	Uvéphorine.
Levuro Maltine Déjardin.	Uvestérol.
Malt Barley.	Véguya.
Malt Français Déjardin (Extrait de).	Vigostérol.
Malt Wander ou Gloma.	Vin « Lux Gaillac mousseux ».
Marimine.	Viosten.
Minergil.	Vitacalcine Moncour.
Morisland irradié.	Vitadone.
Morrhuéline Jungken et Morrhuéline Jungken vitaminée.	Vitaminol.
Morubiase.	Vitamorrhueine.
Nucléigène.	Vitamyl.
Opocalcium irradié du D ^r Guersant.	Vitastérol.
Opoferrine vitaminée.	Vitène.
	Vitergomine.
	Vivoléol.
	Zomine.
	Zymatine irradiée.

RÉGULATEURS DE LA NUTRITION

Antisciastique P. Chambon.	Fosfoxyl Carron.
Arsécrinol.	Fucoilodine.
Boldoine Éparvier.	Fucus Gmet.
Chophytol Rosa.	Globules Fumouze a
Colloïdine Laleuf.	l'Iodure de potassium.
Colloïdogénine du D ^r Bayle.	Ioda.
Colloïde Dubois.	Iodalose Galbrun.
Curiodé.	Iodascérine.
Curiodé arsenié.	Iodassium.
Dicaliodé.	Iode organique Boissy.
Éniode Lefebvre.	Iodinjectol Jammes.
Éranol.	Iodogénol Pépin.
Extrait de Malt français Déjardin.	Iodomaisine Globules.
Fondant iodotannique.	Iodométine.
	Iodone Robin.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RÉGULATEURS DE LA NUTRITION

Iodonucléol.	Malt français Déjardin (Extrait de).
Iodostarine.	Néo-Riodine.
Iodo-Vitasine.	Opothérapie Bouty.
Ionyl.	Phosoforme.
Laminiode.	Pilules Philippe.
Lipiodol Lafay.	Rhocya Dyn.
Lipiodine Ciba.	Riodine.
Magiodyl.	Tanno-Calcing.
Magnésium Hardy.	Triglandine.
Magnéso-Tubes Robinet.	Vicéliase.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ACÉTONÉMIE

Comprimés Vichy-État.	Juglane.
Insuline-Buccale Fornet.	Salvé.

ALCALOSE

Génacide.	Saint-Aré.
Ionyl.	Uroclase.
Phosoforme.	Véguya.

ARTHRITISME

Absuric.	Boldo Gmet.
Algophagine.	Calcozymase.
Ampoules Boissy iodure de potassium.	Caparlem.
Anaclasine Ranson.	Capsules Bardet.
Antisciatique P. Chambon.	Carboliodure Fraudin.
Arrhéнал Adrian.	Céthocal du Dr Lemay.
Arséniode Buriat.	Choléme lactique.
Artoradine.	Citrophos.
Atophan Cruet.	Collo-iodé Dubois.
Atoquinol Ciba.	Colloïxols.
Azurol.	Complexes colloïdaux du Dr Riquoir.
Bain carbogazeux Wolo.	Comprimés Vichy-État.
Bain Carré.	Curiodé.
Bain Salvia.	Curiodé arsenié.
Banikol.	Cynurol Rosa.
Baumolacpinine.	Dépuratif Rob Lechaux.
Benzobromine.	Dépuriodé du Dr Roger Weber.
Benzophosphine Christlaens.	Dialyl.
Bi-Citrol Marinier.	Diasclérol.
Biliogastrine Cheyillon.	Disolurane Vély.
Bolcitol.	

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ARTHRITISME

Dolophos.	Novacétine Prunier.
Dolysine.	Nutrobiase raisin vivant.
Elginé Julien.	Opochol.
Eniade Lefebvre.	Opothérapie Bouty.
Éranol.	Orthogénol.
Extrait de Malt français	Phosoforme.
Déjardin.	Pilules Philippe.
Fondant iodotannique	Pipérazine Midy.
Dausse.	Progaster.
Fosfoxyl Carron.	Pyrelaine Collas.
Globules Fumouze à l'iodure	Radiotropine.
de potassium.	Rhocya Dyn.
Grand Cidre « Bol » Ré-	Riodine.
gime.	Romarène.
Gravural.	Salsanos.
Hépatismine.	Sanoquinol Ciba.
Héxotal.	Sel hépatique U. N. Arque-
Hopogan Bocquillon.	vaux.
Hydroxydase.	Sels de Lithine efferves-
Immunovaccin antirhuma-	cents.
tismal.	Sel naturel de Brides.
Ioda.	Sodothiol.
Iodalose Galbrun.	Solvuric.
Iodasclérine.	Stopral.
Iodassium.	Sulfobyl.
Iode organique Boissy.	Sulfoïdol Robin.
Iodex.	Sulfo-Thiorine.
Iodinectol Jammes.	Sulfur concentré Dax.
Iodogénol Pépin.	Sulfureux Pouillet.
Iodo-Maisine Globules.	Sulfurine du D ^r Langlebert.
Iodone Robin.	Tablettes-Pilules de Brides.
Iodonucléol.	Thé de Brides.
Iodostarine Roche.	Thiocitran Thévenot.
Iodonésyl.	Thiorine.
Iodo-Vitasine.	Thyroidine et radiopho-
Ionyl.	rine Gory.
Laminiodé.	Tiodine Cognet.
Laxadonal.	Triglandine.
Levure fraîche Mycéta.	Ulmarène Gigon.
Lipiodol Lafay.	Uralysol.
Lipiodine Ciba.	Uraseptine.
Litharsyne.	Urazine.
Lysarthrol.	Uricémine.
Magiodyl.	Urifluine.
Magnésium Hardy.	Uroclase.
Magnéso-Tubes Robinet.	Uroïodine.
Malt français Déjardin	Urométhyl.
(Extrait de).	Urométine Lambiotte.
Mésothorium Rhemda.	Uromil.
Métaformine.	Urophényl.
Myoden.	Urophile.
Néo-Riodine	Urozan Dufayard.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ARTHRITISME

Vénécine.
Véralgine.
Viophan.

Vonol.
Vulcase.
Zymatine Lescène.

ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Adral.
Adrénoides Béral.
Alexime.
Aliment Tinardon.
Ampoules Névrosthéniques
Dausse.
Aminine.
Anacamphre.
Antasthène.
Antiphi.
Ardogène.
Arrhénal Adrian.
Arrhénuclène Bergevin.
Arsécrinol.
Arséniode Buriat.
Arsi-Strychnal Longuet.
Arsylène Roche.
Ascoléne Rivier.
Avantol.
Bain Carré.
Baumolacpinine.
Beef Lavoix.
Bemax.
Benzylocacium.
Biocalcose.
Biocéane.
Biodynamine.
Biogénol Demasles.
Bionéol.
Biophorine Girard.
Biosine Le Perdriel.
Biotrigon.
Blédine Jacquemaire.
Cachets réparateurs.
Cacodyle Gonnon.
Cacodyline Jammes.
Calcional.
Calci-Sténine.
Calcium Sandoz.
Carnine Lefrancq.
Catalyl Mg.
Cérébro-Lipase.
Cérébrosthénine Dalin.
Céréossine Dehaussy simple
Céthocal du D^r Lemay.
Cholergine.

Cinalose.
Clupeyl.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Complextraits.
Composé Gmet.
Créagénol.
Crino-sthényl.
Curoraisin.
Cyto-Manganol Corbière.
Cyto-Sérum Corbière.
Cytopan.
Delbiase.
Dialyl.
Diasés.
Diasténine Grémy.
Diastogène Dehaussy.
Diastogène F. Dehaussy.
Dolophos.
Dragées névrosthéniques
Yse.
Dysthène.
Élixir Duchamp.
Élixir Ducro.
Élixir Dussaud.
Énergine iodée de Berck.
Énergine phosphorée de
Berck.
Eufosfyl Vély.
Extrait de Malt français
Déjardin.
Fa-Ner-Val.
Fantine.
Fénucne.
Fenugrène.
Fer Bravais.
Fer intraveineux Fraisse.
Fer Lacarde.
Fer ovarine Vitalis.
Ferroxal Buisson.
Ferrocól.
Ferrophytine Ciba.
Fixase.
Fixase irradiée.
Fludiose.
Fluodyle.
Fluoganèse.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Fœnugol. | Hipposarcine Roy. |
| Fondant de Cola Dausse. | Histogénol. |
| Fondant mangano-fer- | Holos. |
| reux Dausse. | Huile de foie de morue |
| Fortossan Ciba. | médicinale suractivée |
| Fortossan irradié. | Rhône-Poulenc. |
| Forxol | I. A. M. |
| Fosfoxyl Carron. | Ionyl. |
| Fosyls Carron. | Jemalt Wander. |
| Gaduase. | Kola granulée Astier. |
| Gaurol. | Kola Monavon. |
| Génergosine. | Kreptol. |
| Génosthéniques. | Lécithine Vacheron. |
| Génostrychnine. | Limol Churchill. |
| Glandocalcyl. | Lioncyl. |
| Globexine. | Lipocérébrine Chevreton. |
| Glycérophosphate Dalloz. | Liposplénine du D ^r Groc. |
| Glycérophosphate Robin. | Liqueur pepto-phospho- |
| Glyctone phosphatée Char- | rique Adrian. |
| rière. | Magnésio-Cacodyline |
| Glykolaïne Robin. | Jammes. |
| Glyphosphér. | Magnésium Hardy. |
| Gouttes phosphosténiques | Magnésio-tubes Robinet. |
| Dausse. | Malt Barley. |
| Gouttes arsénosthéniques | Maltase Fanta. |
| Dausse. | Malt français Déjardin (Ex- |
| Gouttes halogènes du | trait de). |
| D ^r Bern. | Malt Wander ou Gloma. |
| Gouttes Magalo. | Mancobène. |
| Granoxyl. | Mangano-phosphal Julien. |
| Granules de Pantofort du | Mangarsenic. |
| D ^r Bovell. | Mangratines. |
| Hectine. | Marinol. |
| Hémagénine Giraud. | Maté Douglas. |
| Hémoantitoxine Sofos | Malt Pailleté. |
| Hémo-Cyto-Sérum Cor- | Mésothorium Buisson. |
| bière. | Mésothorium Rhemda. |
| Hémogénol Dausse. | Méthylarsinates Bouty. |
| Hémoglobine Deschiens. | Minergil. |
| Hémopanbiline. | Morisland irradié. |
| Hémo-phagostyl. | Morrhualène Gautier. |
| Hémoplase Lumière. | Morrhuéline Jungken et |
| Hémostra Roche. | morrhuéline Jungken vi- |
| Hémostyl du D ^r Roussel. | taminée. |
| Hémotal. | Morrhual. |
| Hémotonine Buisson. | Morrhuxine. |
| Hépaphos. | Morublaste. |
| Hépatine Gad. | Moruxase. |
| Hépatrol. | Musculosine Byla. |
| Hépatrol injectable. | Néoarsite. |
| Héracléol. | Néo-Arsycodile. |

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Néo-Calciline.	Phostyl.
Néo-Neurosine Prunier.	Phylla Dyn.
Néo-Rhomnol.	Phytergol.
Néotrophène.	Phytine Ciba.
Nergine Heudebert.	Phyto-Lécithine.
Nervocithine Tissot.	Phytosplénol Plé.
Neurolipase.	Plurion Couturieux.
Neuroplasma Fort.	Pneumo-Lipase.
Neuroplasma Massif.	Poliol Churchill.
Neuropol.	Prodynase.
Neurosine Prunier.	Progaster.
Neurotrol.	Prosthénase Galbrun.
Neurotrophol Byla.	Protonic.
Névrosthénine Freyssinge.	Quassia Kina Rabot.
Nucléarsitol Robin.	Quergémol.
Nucléasine.	Quina Baron.
Nucléatol Robin.	Quinarsol antianémique.
Nucléigène.	Quinéine.
Nucléophorine.	Quinquina Gmet.
Nuclhémose.	Réalphène Buisson.
Oenophos.	Reconstituant Mary.
Opocalcium du D ^r Guer-	Rhomnol.
sant.	Sanas.
Opocalcium irradié du	Sanguil.
D ^r Guersant.	Sanguine irradiée.
Opocobalt.	Sels du Jura.
Opoferrine vitaminée.	Sérifer Laurençon.
Oponuclyl irradié Trouette-	Séroma Rey.
Perret.	Séro-Sérum Rivier.
Opophytol.	Sérum Neuropsychique.
Oposérum.	Sérum névrosthénique
Oposynergines.	Fraisse.
Opothérapie Choay.	Sérum Oliviéro.
Opothérapie du D ^r Fraysse.	Solution Bardet.
Orthogénol.	Spectrol.
Orthozomine.	Splénarmone.
Ostéline.	Spléno-Magnésium.
Ovo-Lécithine Billon.	Splénomanganol.
Pancrinol du D ^r Debat.	Sterogyl.
Panostyl.	Sthénoxal.
Panxylon.	Strychnal Longuet.
Pepto-Kola Robin.	Strychnarsitol Robin.
Persodine Lumière.	Sulfurine du D ^r Langle-
Phagostyl Mangané.	bert.
Phosoforme.	Supernucléine Legrand.
Phospharsol.	Synergyl Vadam.
Phosphatol vitaminé irra-	Taburol Monal.
dié.	Tanno-Calciine.
Phospho-Fluor Beynet.	Terpoxyl interne.
Phospholéose Demasles.	Thalassotonine Vadam.
Phosphopinal Juin.	Tonicalciine.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE, T. S.

ASTHÉNIE — SURMENAGE CONVALESCENCES

Tonikéine Chevretn.
Tonique Gonnon.
Tonique Roche.
Tonudol.
Total-Tonic.
Tréphonyl du Dr Roussel.
Ultra-Violets.
Ultravitamine 4.
Uvé (gouttes).
Uvéphorine.
Vanadarsine Guillaumin.
Végéphos.
Véguva.
Vénecine.
Vicéliase.
Vigostérol.
Vin de Baudon.
Vin de Bugeaud.

Vin de Carnéose.
Vin Girard.
Vin Lux Gaillac Mous
seux.
Vin Raimoa Tonic.
Viosten.
Vioxyl Mouneyrat.
Vitacalcine Moneour.
Vitaminol.
Vitamorrhuline.
Vitastérol.
Vitène.
Vivoléol.
Zimbyl.
Zohol.
Zomine.
Zomo-Musculosine Byla.

ATHREPSIE

Amunine.
Arsenos Solvant.
Bemax.
Biocéane.
Blédine Jacquemaire.
Carottase.
Élixir Dussaud.
Élixir eupeptique Tisy.
Ergorone.
Fixase.
Fixase irradiée.
Fortossan Ciba.
Fortossan irradié.
Fosfoxyll Carron.
Glaxo.
Huile de foie de morue
médicinale suractivée
Rhône-Poulenc.

Hoglandol Roche.
Insulyl du Dr Roussel.
Lait Mont-Blanc.
Laroson Roche.
Mangarsenic.
Marimine.
Marinol.
Opothérapie Choay.
Ozobiase.
Pancréastase Defresne gra-
nulée.
Plasma de Quinton.
Polyminéral Fort.
Quinquina Gmet.
Sulfarsénol.
Zymatine irradiée.
Zymatine Lescène.

AVITAMINOSE — CARENCE EN VITAMINES

Algostérine Oliviero.
Amunine.
Amylodiastase Thépénier.
Ascoléine Rivier.
Bemax.
Benzylcalcium.
Blédine Jacquemaire.
Calcoléol.

Carottase.
Comprimés Levure Mycéta.
Crescol Buisson.
Cytobiase.
Extrait de Malt français
Déjardin.
Fantine.
Fortossan irradié.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

AVITAMINOSE — CARENCE EN VITAMINES

Halocure irradié.
Huile de foie de morue
médicinale suractivée
Rhône Poulenc.
Lait Mont Blanc.
Levuro-Maltine Déjardin.
Malt français Déjardin (Ex-
trait de).
Malt Wander ou Gloma.
Marimine.
Opocalcium irradié du
Dr Guersant.
Oponucyl irradié Trouette-
Perret.
Ostéline.
Phylla Dyn.

Provitol.
Ultravitamine 4.
Uvéphorine.
Uvestérol.
Véguva.
Viosten.
Vitacalcine Moncour.
Vitadone.
Vitaminol.
Vitamorrhaine.
Vitamyl.
Vitastérol.
Vitergomine.
Vivoléol.
Zymatine irradiée.
Zimbyl.

CARENCE CALCIQUE — CARENCE PHOSPHATÉE

(Voir: Tuberculose, Reminéralisants).

CARENCE MAGNÉSIENNE

(Voir: Cancer.)

DIABÈTE

Androstine Ciba.
Antidiabétique Monavon.
Canol.
Carbolactyl bilé.
Catalyl Mg.
Chophytol Rosa.
Comprimés Vichy-État.
Cynurol Rosa.
Diabétalim.
Diabétifuge.
Diabétuline.
Diasclérol.
Endopancrine.
Fénucine.
Ferment pur de Raisin.
Fosfoxyl Carron.
Fosyl Carron.
Foénugol.
Grand Cidre « Bol » Ré-
gime.
Hépatismine.
Hydroxydase.
Iloglandol Roche.
Insuline-Buccale Fornet.
Insuline Byla.

Insulyl du Dr Roussel.
Juglane.
Lécithine Vacheron.
Levure fraîche Mycéta.
Lioncyl.
Litharsyne.
Lobuline.
Magol Churchill.
Manganésia.
Mangarsenic.
Minergil.
Neubryne.
Neurotrol.
Opochol.
Opothérapie Bouty.
Orthogénol.
Ostréine Buisson.
Ozobiase.
Pain Massé « Sana ».
Pancréanne.
Pancrépatine Laleuf.
Pepto-Kola Robin.
Phytinate de Quinine Ciba.
Pilules du Dr Debouzy.
Pilules du Dr Séjournet.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

DIABÈTE

Pilules lithuranées du	Sulfuriné du D ^r Langlebert
D ^r Boveil.	Synthaline B.
Pipérazine Midy.	Thyroidine et Radiopho-
Post-Hypophyse Choay.	rine Gory.
Prodynase.	Total-Tonic.
Progaster.	Ulcéosine.
Quinarsol antianémique.	Vin de Bugeaud.
Sels de Lithine efferves-	Vin « Lux » Gaillac Mous-
cent.	seux.
Sinahin.	Vioxyl Mouneyrat.
Sucre Edulcor.	Vitamyl.

GOUTTE

Absuric.	Dépuriodé du D ^r Roger
Algatan.	Weber.
Ampoules Boissy iodure	Dialyl.
de potassium.	Diasclérol.
Algophagine.	Dicaliodé.
Ampoules Reipar.	Disolurane Vély.
Anaclasine.	Diurétique Gmet.
Anégrine.	Dolysine.
Antialgol Christiaens.	Elgine Julien.
Ascéine.	Embrocation Salas.
Atophan Cruet.	Eranol.
Atophanyl.	Fucolodine.
Atoquinol Ciba.	Globules Fumouze. Iodure
Banikol.	de Potassium.
Baume Adol.	Grand Cidre « Bol » régime.
Baume Aroma.	Gravural
Baume Bengué.	Guipsine.
Benzobromine.	Hépatismine.
Benzophosphine Chris-	Hexaranol.
tiaens.	Hexotal.
Bétul-Ol Midy.	Hydroxydase.
Bi-Citrol Marinier.	Ioda.
Biliogastrine Chevallon.	Iodalose Galbrun.
Buccurol.	Iodasclérine.
Bulgarine Thépenier.	Iodassium.
Cachets du D ^r Boveil.	Iode organique Boissy.
Calcozymase.	Iodex.
Carboliodure Fraudin.	Iodhéma.
Citrofluyl.	Iodinjectol Jammes.
Colchi-Sal Midy.	Iodogénol Pépin.
Collo-Iode Dubois.	Iodo-Maisine Globules.
Colloïxols.	Iodométine.
Complexes colloïdaux du	Iodone Robin.
D ^r Riquoir.	Iodonésyl.
Cryogénine Lumière.	Iodonucléol.
Crypthiol.	Iodosan Zambeletti.
Cynurol Rosa.	Iodostarine Roche.
Dépuratif Rob Lechaux.	Iodo-Vitasine.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. 8.

GOUTTE

Iodural Novat.
Iodurase.
Iodure Pachaut.
Iodure Philippe.
Iodures Souffron.
Irénine Gonnon.
Ixium Buisson.
Laminiodé.
Levure fraîche Mycéta.
Lipiodol Lafay.
Lipiodine Ciba.
Magiodyl.
Magnésium Hardy.
Magnéso-Tubes Robinet.
Métophan.
Mésothine.
Mésothorium Rhemda.
Métaformine.
Myoden.
Neubryne.
Novacétine Prunier.
Opochol.
Opothérapie Bouty.
Orthogénol.
Pilules Philippe.
Pipérazine Midy.
Polyiodure Gonnon.
Pyrelaine Collas.
Pyréthane.
Radiotropine.
Rhésal Vicario.
Rhocya Dyn.
Riodine.
Salène Ciba.
Salénal Ciba.
Salsanos.
Salyserum.

Sambul.
Sanoquinol Ciba.
Santhéose.
Sel hépatique U. N. Arqu-
vaux.
Sels de Lithine effervés-
cents.
Sodothiol.
Solvuric.
Spécifique Béjean.
Stopral.
Sulfo-Thiorine.
Sulfurion.
Théosalvose.
Théovadil.
Théoxantine.
Thiorine.
Tiodine Cognet.
Uralysol.
Urazine.
Uricémine.
Urisanine.
Urobuccol Malmanche.
Uroclase.
Uroformine Gobey.
Uroiodine.
Urométhyl.
Urométine Lambiotte.
Uromil.
Urophényl.
Urophyle.
Urosan Dufayard.
Urozéa.
Venécine.
Véralgine.
Viophan.
Vonol.

OBÉSITÉ

Algatan.
Ampolases.
Androstine Ciba.
Baniol.
Brides (Sel naturel, ta-
blettes, pilules, thé (do).
Bi-Citrol Marinier.
Calcozymase.
Carboioduré Fraudin.
Chophytol Rosa.
Colloïdine Laleuf.

Collo-iodé Dubois.
Crypthiol.
Curiode.
Cuscutine Foulon.
Cynuroi Rosa.
Dépuratif Rob Lechaux.
Dépuriode du Dr Roger
Weber.
Dialyl.
Diasclérol.
Diasténine Grémy.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

OBÉSITÉ

Dicaliode.	Iodurase.
Disolurane Vély.	Iodure Pachaut.
Eniode Lefebvre.	Iodure Philippe.
Éranol.	Iodures Souffron.
Évine.	Laminiodé.
Fer-Ovarine Vitalis.	Lipiodol Lafay.
Folliculine Crinex.	Lipoiodine Ciba.
Fondant iodotannique	Lysarthrol.
Dausse.	Magiodyl.
Fucoiodine.	Magnésium Hardy.
Fucus Gmet.	Magnéso-tubes Robinet.
Globules Fumouze iodure	Néo-Riodine.
de potassium.	Opochol.
Gravural.	Opothérapie Bouty.
Hépatismine.	Opothérapie Byla associé.
Holovarine.	Opothérapie du D ^r Fraysse.
Hormovarine Byla.	Ovaro-Thyroidine Optima.
Hydroxydase.	Oxydothyryne Paris.
Ioda.	Panglandine Couturieux.
Iodalose Galbrun.	Phosoforme.
Iodasclérine.	Pilules Philippe.
Iodassium.	Rhocya Dyn.
Iode organique Boissy.	Riodine.
Iodinfectol Jammes.	Salsanos.
Iodogénol Pépin.	Sanoquinol.
Iodo-Maisine Globules.	Selunic.
Iodométine.	Thyroxine Roche.
Iodone Robin.	Tiodine Cognet.
Iodonésyl.	Triglandine.
Iodonucléol.	Uroiodine.
Iodosan Zambeletti.	Uromil.
Iodostarine Roche.	Valovarine.
Iodo-Thyroidine Catillon.	Vascurol.
Iodo-Vitasine.	Vichy-purgatif.
Iodural Novat.	

PHOSPHATURIE

Adrénocalcine.	Holos.
Arsécrinol.	Ionyl.
Avantol.	Lécithine Vacheron.
Biocéane.	Limol Churchill.
Comprimés Urbé.	Liqueur pepto-phospho-
Cynuroi Rosa.	rique Adrian.
Doloma.	Mangano-Phosphal Julien.
Doloma injectable.	Mancobène.
Dolophos.	Neuropol.
Fixase.	Neurosine Prunier.
Fixase irradiée.	Œnophos.
Fosfoxyl Carron.	Opocalcium du D ^r Guer-
Glyphospher.	sant.
Halocure irradié.	Opocalcium irradié du
Hexotal.	D ^r Guersant.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

PHOSPHATURIE

Opocobalt.	Phytine Ciba.
Opophytol.	Phytogénine Byla.
Ostréine Buisson.	Phytosplénol Plé.
Ovo-Lécithine Billon.	Poliol Churchill.
Pangaduine.	Polyminéral Fort.
Parathyrocalcine Moncour.	Prodynase.
Phosoforme.	Rhomnol.
Phospharsol.	Sanas.
Phosphates du D ^r Pinard.	Sanguil.
Phosphate Vital de Jacquemaire.	Sur-bi-cal.
Phosphatol vitaminé irradié.	Tanno-Calcine.
Phospho-Fluor Beynet.	Urosan Dufayard.
Phostyl.	Uvéphorine.
	Vitène.
	Zohol.

RACHITISME — LYMPHATISME TROUBLES DE LA CROISSANCE

Adrénaline Invar.	Calcional.
Adrénine.	Calcium Sandoz.
Adrénocalcine.	Calcoléol.
Adrénoides Béral.	Carnine Lefrancq.
Algatan.	Carottase.
Algostérine Oliviero.	Cérébrosthénine Dalin.
Aliment Tinardon.	Céréossine Dehaussysimple.
Amunine.	Céréossine irradiée.
Amylodiastase Thépénier.	Chloro-calcion.
Antiphi.	Clupéyl.
Ardogène.	Collo-iode Dubois.
Arrhéнал Adrian.	Colloïxols.
Arsécrinol.	Comprimés « Roche » de Thiocol.
Arséniode Buriat.	Créagénol.
Arsycodile.	Crescogénol.
Arsylène Roche.	Crescol Buisson.
Ascoléine Rivier.	Crino-Stényl.
Avantol.	Curiode.
Bactioxync.	Curiode arsenié.
Bain Carré.	Curoraisin.
Banikol.	Cyto-Manganol Corbière.
Baumolacpinine.	Cytopan.
Bemax.	Cyto-Sérum Corbière.
Benzylocalcium.	Dépuriodé du D ^r Roger Weber.
Biocalcose.	Diasthénine Grémy.
Biocéane.	Diastogène Dehaussy.
Bionéol.	Diastogène F. Dehaussy.
Biosine Le Perdriel.	Dicaliodé.
Biotrignon.	Dohyfral.
Blédine Jacquemaire.	Doloma.
Cachets « Roche » de Thiocol.	Doloma injectable.
Calci Sténine.	

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RACHITISME — LYMPHATISME TROUBLES DE LA CROISSANCE

Dolophos.	Hémotal.
Élixir Duchamp.	Hépaphos.
Énergine iodée de Berck.	Hépatergol.
Énergine phosphorée de Berck.	Hépatine Gad.
Éniode Lefebvre.	Héracléol.
Épicral.	Histogénol.
Éranol.	Holos.
Érgerone.	Huile de foie de morue mé-
Extrait de céréales Adrian.	dichinalesuractivéeRhône-
Extrait de Malt français Déjardin.	Poulenc.
Fantine.	I. A. M.
Féminadène.	Ioda.
Fenugrène.	Iodalose Galbrun.
Ferrocyl.	Iodarsénic Guiraud ou
Ferrophytine Ciba.	gouttes Paidophiles.
Fixase.	Iodascérine.
Fixase irradiée.	Iodaseptine Cortial.
Fludiose.	Iodassium.
Fluoganèse.	Iodocalcium.
Fœnugol.	Iodogénol Pépin.
Fondant iodotannique Dausse.	Iodo-Maisine Globules.
Fortossan Ciba.	Iodométine.
Fortossan irradié.	Iodo-vitasine.
Forxol.	Iodosan Zambeletti.
Fosfoxyl.	Irrastérine.
Fosyls.	Jemalt Wander.
Fucoglycine du D ^r Gressy.	Lait Mont Blanc.
Gaduamine.	Laminiodé.
Gaduase.	Lécithine Vacheron.
Galliodine.	Limol Churchill.
Gaurol.	Lioncyl.
Génosthéniques.	Lipiodol Lafay.
Glandocalcyl.	Lipiodine Ciba.
Globexine.	Liposplénine du D ^r Groc.
Glycérophosphate Dalloz.	Liqueur pepto-phospho-
Glycérophosphate Robin.	rique Adrian.
Glyctone phosphatée Charrière.	Lugocalcion.
Gmet (Extraits).	Magol Churchill.
Granoxyl.	Malt Barley.
Granulé Caremel.	Malt français Déjardin (Ex-
Granules de Pantofort du D ^r Boveil.	trait de).
Halocure irradié.	Malt Wander ou Gloma.
Hémagénine Giraud.	Mancobène.
Hémato-iodine.	Mangano-phosphal Julien.
Hémoantitoxine « Sofos ».	Mangratinés.
Hémo-Cyto-Sérum Corbière.	Marimine.
	Marinol.
	Marrucol.
	Mésothorium Rhemda.
	Minergil.
	Morisland irradié.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RACHITISME — LYMPHATISME TROUBLES DE LA CROISSANCE

Morrhualène Gautier.	Phosphates du Dr Pinard.
Morrhuéline Jungken et	Phosphate Vital de Jacquemaire.
Morrhuéline Jungken vitaminée.	Phosphatol vitaminé irradié.
Morrhual.	Phospho-Fluor Beynet.
Morrhuxine.	Phosphogaiacol Mary.
Morubiasé.	Phospholéose Demasles.
Moruxase.	Phostyl.
Murones du Dr Robert	Phylla Dyn.
Jacques.	Phytergol.
Musculosine Byla.	Phytine Ciba.
Néo-Calculine.	Phytogénine.
Neurolipase.	Phyto-Lécithine.
Neuropol.	Phytomarine.
Neurosine Prunier.	Phytosplénol Ple.
Nucléarsitol Robin.	Plasma de Quinton.
Nucléasine.	Poliol Churchill.
Nucléigène.	Polyminéral Fort.
Nucléophorine.	Prodynase.
Nuclémose.	Protonic.
Opocalcium du Dr Guersant.	Provitol.
Opocalcium irradié du Dr Guersant.	Quinquina Gmet.
Opocobalt.	Reconstituant Mary.
Oponuclyl irradié Trouette-Perret.	Rénaleptine.
Opophytol.	Rhocya Dyn.
Oposynergines.	Rhomnol.
Opothérapie Byla associée.	Riodine.
Opothérapie Bouty.	Sanas.
Opothérapie Choay.	Sanguil.
Opothérapie du Dr Frayssé.	Sanguine irradiée.
Opothérapie Fournier.	Sels du Jura.
Opotonine.	Serifer Laurençon.
Orthozomine.	Sérodausse infantile.
Ostéline.	Séro-sérum Rivier.
Ostéoglandulol.	Sérum Oliviero.
Ostreine Buisson.	Sirop de glycérophosphates Vacheron.
Ovo-lécithine Billon.	Sirop de Lovel.
Pancréastase Defresne granulée.	Sirop minéral sulfureux Crosnier.
Pancrinol du Dr Debat.	Sirop Roche au Thiocol.
Pangaduine.	Sirop Tinardon.
Panglandine Couturieux.	Solution Bardet.
Panostyl.	Solution Pantauberge.
Panxylon.	Spectrol.
Parathyrocalcine Moncour.	Splénarmone.
Persodine Lumière.	Splénomanganol.
Phosoforme.	Sterogyl.
	Sthénoxal.
	Sulfurine du Dr Langlebert.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RACHITISME — LYMPHATISME TROUBLES DE LA CROISSANCE

Sulfuryl Monal.
Suppositoires Pyrax.
Sur-bi-cal.
Sylcase.
Tanno-Calcine.
Thiocol Roche.
Thyroidine et radiophorine
Gory.
Thyroxine Roché.
Tonique Gonnôn.
Tonudol.
Toritanol Lamo.
Tréphonyl du Dr Roussel.
Tricalciné.
Triglandine.
Ultra-Violets.
Ultravitaminé 4.
Uvéphorine.
Uvestérol.
Valovarine.
Vanadarsine Guillaumin.
Végéphos.

Véguva.
Vénecine.
Vigostérol.
Vin de Baudon.
Vin de Carnéosé.
Vin Girard.
Viosten.
Vioxyl Mouffeyrat.
Vitacalcine Moncœur.
Vitadoné.
Vitaminol.
Vitamorrhéine.
Vitamyl.
Vitastérol.
Vitène.
Vitergominé.
Vivoléol.
Vonol.
Zomine.
Zomo-Musculosine Byla.
Zymatine irradiée.
Zymatine Lescène.

RHUMATISMES CHRONIQUES ALGIES RHUMATISMALES — LUMBAGO

Absuric.
Alcacyl.
Alcamifétol.
Algatan.
Algophagine.
Allochrysine Lumière.
Ampho-Vaccins Ronchèse.
Ampoules Boissy d'iodure
de potassium.
Ampoules Reipar.
Anacrasiné.
Anégrine.
Antalgol Dalloz.
Antialgo-Christiaens.
Antisciatique P. Chambon.
Ascéine.
Asciatine.
Atophañ Œruet.
Atophanyl.
Atoquinol Ciba.
Azufrol.
Bain Carré.
Bain Salvia.
Bande de crepe Velpeau.
Banikol.

Baume Adol.
Baume Aroma.
Baume Bengué.
Baume Iki.
Baume Rhodia.
Baumolacpinine.
Bénsaminé.
Benzobromine.
Benzophosphine Chris-
tiaens.
Betul-Ol Midy.
Bi-Citrol Marigier.
Billogastrine Chevilleon.
Cachet du Dr Bovell.
Calcozymase.
Carboiodure Fraudin.
Cérébrine Fournier.
Chéloidine.
Citrofluyl.
Colchi-Sal Midy.
Collé-iodé Dubois.
Colloïxols.
Complexes colloïdaux du
Dr Riquoir.
Comprimés Urbé.

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RHUMATISMES CHRONIQUES ALGIES RHUMATISMALES — LUMBAIGO

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Crédone Dehaussy. | Iodo-Maisine (globules et pommade). |
| Crésopirine. | Iodométine. |
| Cryogénine Lumière. | Iodone Robin. |
| Crypthiol. | Iodonésyl. |
| Curatine Brunet. | Iodonucléol. |
| Curiode. | Iodosan Zambeletti. |
| Curogène. | Iodostarine Roche. |
| Cynurol Rosa. | Iodo-Vitasine. |
| Dépuratif Rob Lechaux. | Iodural Novat. |
| Dépuriode du Dr Roger Weber. | Iodurase. |
| Dialacétine Ciba. | Iodure Pachaut. |
| Dialyl. | Iodure Philippe. |
| Diasclérol. | Iodures Souffron. |
| Dicaliode. | Iosorbine. |
| Disolurane Vély. | Irénine Gonnon. |
| Dolysine. | Ixium Buisson. |
| Elgine Julien. | Laminiode. |
| Embrocation Salas. | Laxadonal. |
| Eniode Lefebvre. | Lipiiodol Lafay. |
| Entéro-Antigènes. | Lipoiodine Ciba. |
| Éranol. | Lysarthrol. |
| Erythra Dyn. | Magiodyl. |
| Fango Fisch et Co. | Magnésium Hardy. |
| Ferment pur de raisin. | Magnéso-tubes Robinet. |
| Fondant iodotannique Dausse. | Mégathion Oliviero. |
| Fosfoxyl Carron. | Mésothinè. |
| Fucoiodine. | Mésothorium Buisson. |
| Globules Fumouze iodure de potassium. | Mésothorium Rhemda. |
| Granions (Les). | Métaformine. |
| Grand Cidre Bol Régime. | Métophan. |
| Gravural. | Mitigans. |
| Hexonéral. | Morrhualène Gautier. |
| Hexotal. | Myoden. |
| Hydroxydase. | Myothermine. |
| Immunizols Grémy. | Nadolor. |
| Immunovaccin antirhumatisme. | Naiodine Logeals. |
| Infra-rouges. | Néo-Riodine. |
| Ioda. | Neubryne. |
| Iodalose Galbrun. | Névorol Rafey. |
| Iodasclérine. | Névralgol Brossard. |
| Iodaseptine Cortial. | Nopirine Vicario. |
| Iodassium. | Novacétine Prunier. |
| Iode organique Boissy. | Opothérapie Bouty. |
| Iodex. | Opotonine. |
| Iodhéma. | Orthogénol. |
| Iodinfectol Jammes. | Ovaro-Thyroidine Optima. |
| Iodogénol Pépin. | Papier iodogène Eymonet. |
| | Paradoline. |
| | Phosoforme. |

MALADIES DE LA NUTRITION ET PAR CARENCE. T. S.

RHUMATISMES CHRONIQUES ALGIES RHUMATISMALES — LUMBAGO

Pilules Philippe.
Pilules V. E. Doumer.
Pipérazine Midy.
Polyiodure Gonnon.
Potion Adol.
Pyrelaine Collas.
Pyréthane.
Quinsal.
Radiotropine.
Révulsif liquide Boudin.
Révulsif Procipha.
Rhésal Vicario.
Rhocya Dyn.
Rhoféine.
Riodine.
Salène Ciba.
Salénal Ciba.
Salsanos.
Salysérum.
Sambul.
Sanoquinol Ciba.
Santhéose.
Sédatine Christiaens.
Sel hépatique U. N. Arque-
vaux.
Sels de Lithine efferves-
cents.
Sodóthiol.
Soluprotine Roche.
Solvuric.
Spécifique Béjean.
Sulfodermol Flahaut.
Sulfoidol Robin.
Sulfo-Thiorine.
Sulfur concentré Dax.

Sulfureux Pouillet.
Sulfurine du D^r Lenglebert.
Sulfurion.
Sulfuryl Monal.
Théinol.
Théosalvose.
Théovadil.
Théoxantine.
Thigénol Roche.
Thiorine.
Thorium X Rhemda.
Tiodine Cognet.
Triglandine.
Ulcéosine.
Ulmarène Gigon.
Uralysol.
Urazine.
Uricémine.
Urisfluine.
Urobuccol Malmanche.
Uroclase.
Uroformine Gobey.
Uroiodine.
Urométhyl.
Urométine Lambiotte.
Uromil.
Urophényl.
Urophile.
Urosan Dufayard.
Urozéa.
Véganine.
Vénécine.
Véralgine.
Viophan.
Vonol.

MALADIES DE LA PEAU. T. G.

ANTIPRURIGINEUX

Acécoléx.
Albuplast Vigier.
Amphotonyl.
Anasectol.
Antipiol.
Baume du D^r Baissade.
Baume Py.
Baume Sélénia.

Baume Tanex.
Borocalcyl Thévenot.
Camphydryl.
Crataegus Gmet.
Dermofagine.
Dermo-plastol Dumesnil.
Désitin.
Eczéda.

MALADIES DE LA PEAU. T. G.

ANTIPRURIGINEUX

Eczosec.
Entéro-antigènes.
Guérysipôle.
Nestosyl.
Poudre Pelévine.
Percaïnal Ciba.

Pommade au Nestosyl.
Sapolan.
Sarcoptol.
Solution huileuse au Nestosyl.

ANTISEPTIQUES

Acécolex.
Aïrol Roché.
Alibourine.
Aloysine (pommade).
Anasectol.
Anaxéryl.
Aniodol.
Antipiol.
Aristargol.
Azufrol.
Baume du Dr Baissade.
Baume Duret.
Baume Py.
Baume Sélénia.
Baume Tanex.
Boricine Meissonnier.
Borostyrol Schlatter.
Camphyril Robin.
Comprimés d'Alibour.
Créosoforme Lambiotte.
Cryptargol Lumière.
Dermofagine.
Dermo-Stalys du Dr Wagon.
Désitin.
Dithioléine.
Évine.
Ganderma.

Goménol.
Gouttes Daynoff.
Guérysipôle.
Iodex.
Laurenol Médicinal.
Métacuprol.
Méta-Vaccin.
Néo-Collargol.
Olkalan.
Pommade Klébs.
Pyodermase.
Pyroléol Édet.
Savons Mollard.
Séphydine.
Sunoxol.
Stannoxyl.
Staphylécide Audras.
Staphylothanol.
Stéramine.
Teinture de Sunoxol.
Terpoxyl externe.
Terpoxyl interne.
Thigénol Roche.
Tubes Chauvin.
Uvéolène.
Vioforme Ciba (et ovules au Vioforme).

KÉRATOPLASTIQUES

Acécolex.
Aïrol Roche.
Albuplast Vigier.
Aloplastine.
Belhémine.
Borostyrol Schlatter.
Dermo-plastol Dumesnil.
Dermoradol.
Eczosec.
Emplâtres Rogé Cavaillès.
Insuline Phyloze.
Iosorbine.
Méta-Titane.

Opodermyl.
Plagénine Soulas.
Pommade Raimoa.
Pommade V. E. Doumer.
Poudre et pommade d'Insuline Phyloze.
Poudre Pelévine.
Rozoderme.
Sapolan.
Silicyl.
Vioforme Ciba.
Vulnérine du Dr Bergen.

MALADIES DE LA PEAU. T. G.

VACCINS

Ampho-Vaccins Ronchèse.
Antipiol.
Arapal.
Entéro-antigènes.
Immunizols Grémy.
Probios.
Propidon Pansement.
Pyo-Amphogel Ronchèse.
Stalysine.
Staphylagone.

Vaccins atoxiques stabilisés.
Vaccins bactériens I. O. D.
Vaccins Ronchèse. — Ampho-Vaccins.
Vaccins Sténé.
Vaccins intra-dermiques et gelées-vaccins Ivago de L. Goldenberg.
Vaclyderm.
Vaclydun.

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ACNÉ

Ampho-Vaccins Ronchèse.
Anasectol.
Anaxéryl.
Antipiol.
Aseptoradol.
Azufrol.
Baume du D^r Baissade.
Baume Duret.
Camphydryl Robin.
Carbolactyl simple.
Comprimés Levure Mycéta.
Delbiase.
Dépuriode du D^r Roger Weber.
Dermo-plastol Dumesnil.
Dermoradol.
Dermo-Stalys du D^r Wagon.
Désitin.
Dragées Elkin.
Éléodermine.
Entéro-antigènes.
Évolaxine.
Facmine Longuet.
Furonculase.
Ganderma.
Glésol.
Glyco-Thymoline.
Immunizols Grémy.
Inotyol.
Iodex.
Levure de Bière Adrian.
Levure fraîche Mycéta.
Levurine extractive.
Magnésium Hardy.
Magnésio-Tubes Robinet.

Mégathion Oliviero.
Néobiol.
Néotrophène.
Paralactine Byla.
Pommade au Nestosyl.
Pommade Kléos.
Probios.
Pyo Amphogel Ronchèse
Pyrelaine Collas.
Sapolan.
Savons Mollard.
Séphydine.
Sirop minéral sulfureux Crösnier.
Sodothioli.
Stalysine.
Stanion.
Stannoxyli.
Staphylagone.
Staphylase du D^r Doyen.
Staphylocide Audras.
Staphylo-Coccine Fraquet.
Staphylothanol.
Sulfa.
Sulfobyl.
Sulfocadol.
Sulfocrème Liless.
Sulfo-Thiorine.
Sulfodermol Flahaut.
Sulfur concentré Dax.
Sulfureux Pouillet.
Sulfurine du D^r Langlébert.
Sulfurion.
Sulfuryl Monal.
Tergyl Lamo.
Terpoxyl interne.

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ACNÉ

Terpoxyl externe.
Thiophyl.
Thiorine.
Ultra-Violets.
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Vaccins atoxiques stabi-
lisés.
Vaccins bactériens I. O. D.

Vaccins intra-dermiques et
gelées-vaccins Ivago de
L. Goldenberg.
Vaccins Ronchèse. — Am-
pho-Vaccins.
Vaccins Sténé.
Vacludun.
Vénecine.
Yaourtine.

ALOPÉCIES

Acépilline.
Carbolactyl simple.
Glycocarpine.
Iodex.
Néobiol.

Sapolan.
Savons Mollard.
Séphydine.
Sulfodermol Flahaut.
Terpoxyl externe.

CREVASSES — GERÇURES — ENGELURES

Acécollex.
Acésine Guillaumin.
Androstine Ciba.
Antipiol.
Baume Daynoc.
Baume Delacour.
Baume de la Maternité.
Baume du Dr Baissade.
Baume Tanex.
Borostyrol Schlatter.
Carbolactyl simple.
Cataplasme du Dr Le-
lièvre.
Crème Graziana.
Crésoforme Lambiotte.
Dermofagine.
Dermo-Stalys du Dr Wa-
gon.
Désitin.
Diadermine.
Dialine.
Eczéda.
Eczosec.
Ektogan Bocquillon.

Fludiose.
Goménol.
Inotyol.
Iodex.
Linadéline.
Lysacrème L. M. L.
Méta-Titane.
Myothermine.
Nestosyl.
Olkalan.
Percaïnal Ciba.
Pommade au Nestosyl.
Poudre Pelévine.
Propidex.
Pyo-Amphogel Ronchèse.
Pyroléol Édet.
Sapolan.
Savons Mollard.
Sénophile.
Séphydine.
Stéramine.
Ultra-Violet.
Vulnérine du Dr Bergen.

ECZÉMAS

Acécollex.
Alcasodine.
Alibourine.
Aloplastine.
Anaclatine Ranson.
Anapeptone Vassal.

Anasectol.
Anaxeryl.
Antipiol.
Aseptoradol.
Azigol Thévenot.
Azufrol.

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ECZÉMAS

Baume du D ^r Baissade.	Guérýsipéle.
Baume Duret.	Héparbiline.
Baume Py.	Hépatie Efa du D ^r Leca-
Baume Sélénia.	cheux.
Baume Tanex.	Hépatismine.
Biophylactine Mg.	I. A. M.
Boldo Gmet.	Immunizols Gréiny.
Brumarsyl.	Inotyol.
Carbolactyl simple.	Inoxémol.
Cataplasme du D ^r Lelièvre.	Iodarsenic Guiraud ou
Céthocal du D ^r Lemay.	Gouttes Paidophiles.
Chlormagnésium Fisch.	Iodex.
Chloro-Magnésion.	Iodo-Maisine (Pommade.)
Chophytol Rosa.	Iodonésyl.
Colloïdogénine du D ^r Bayle.	Iosorbine.
Comprimés Galac.	Kerlol.
Comprimés Levure Mycéta.	Laccodermes.
Coprex.	Levurine extractive.
Crème Graziana.	Levuro-Maltine Déjardin.
Créscogénol.	Ludin.
Cytomagnésium Lindeux.	Lysacrème L. M. L.
Delbiase.	Magnésium Hardy.
Dépuride du D ^r Roger	Magnéso-Tubes Robinet.
Weber.	Mégathion Oliviéro.
Dermofagine.	Métacuprol.
Dermo-Plastol Dumesnil.	Méta-Titane.
Dermoradol.	Néopancarpine.
Dermosplénine.	Néotrophène.
Dermo-Stalys du D ^r Wa-	Nestosyl.
gon.	Neubryne.
Désitin.	Nisameline Trouette-Perret.
Détergine du D ^r Bourdeau.	Nitium Buisson.
Dialyl.	Normatensol Bouret.
Diases.	Oikalan.
Dicallode.	Opodermyl.
Dithioléine.	Opothérapie Bouty.
Dolophos.	Opothérapie Choay.
Dragées Elkin.	Opothérapie Fournier.
Eczéda.	Orthogénol.
Eczosec.	Ouataplasme du D ^r Lan-
Ektogan Bocquillon.	glebert.
Elkin (dragées, granules).	Pancréastase Defresne gra-
Emplâtres Rogé Cavallès.	nulée.
Entéro-Antigènes.	Pancréatose Idon.
Euphoryl.	Paralactine Byla.
Euskine.	Peptalmine.
Facmine Longuet.	Peptogil A. et L.
Fer Intra-Veineux Fraisse.	Percaïnal Ciba.
Fondant iodotannique	Phosoforme.
Dausse.	Pipérazine Midy.
Ganderma.	Plasma de Quinton.
Glyco-Thymoline.	Polypeptonal.
Gouttes Daynoc.	Pommade Bertol-Vichy.
Granulés Elkin.	Pommade Kléos.

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ECZÉMAS

Pommade L'noir.
Pommade au Nestosyl.
Pommade Raimoa.
Pommade V. E. Doumer.
Poudre Pelévine.
Prézymase.
Protiodyne.
Protiodyne dragées.
Pyo-Amphogel Ronchèse.
Pyrelaine Collas.
Pyroléol Édet.
Rozoderme.
Salvé.
Sapolan.
Sarcoptol.
Sénophile.
Sirop minéral sulfureux
Crosnier.
Sodothioli.
Solution huileuse au Nes-
tosyl.
Splénocrisine.
Stomagyl.
Sulfa.
Sulfarsénol.
Sulfobyl.
Sulfocadol.
Sulfodermol Flahaut.

Sulfo-Thiorine.
Sulfur concentré Dax.
Sulfureux Pouillet.
Sulfurine du Dr Langlebert.
Sulfurion.
Sulfuryl Monal.
Tapo.
Tergyl Lamo.
Terpoxyl externe.
Terpoxyl interne.
Thigénol Roche.
Thiocitran Thévenot.
Thiophyl.
Thiorine.
Triseptine.
Ulcéosol Pommade.
Ulcéosol Poudre.
Ulcérophile Nosan.
Ultra-Levure.
Uricémine.
Vénecine.
Vioforme Ciba et Ovules au
Vioforme.
Vitamyl.
Vulcase.
Vulnérine du Dr Bergen.
Yaourtine.
Zymatine Lescène.

ÉRYTHÈMES — INTERTRIGO

Airol Roche.
Albuplast Vigier.
Aloplastine.
Antipiol.
Baume de la Maternité.
Baume de Dr Baissade.
Borostyrol Schlatter.
Carbolactyl simple.
Crème Graziana.
Dermofagine.
Dermo-plastol Dumesnil.
Dermoradol.
Dermo-Stalys du Dr Wa-
gon.
Désitin.
Diadermine.
Dialine.
Dithioléine.
Eczéda.
Eczosec.
Ektogan Bocquillon.
Ganderma.
Inotyol.

Iodex.
Linadéline.
Méta-Titane.
Nestosyl.
Olkalan.
Opodermyl.
Opothérapie Bouty.
Percainal Ciba.
Pommade Bertol-Vichy.
Pommade Kléos.
Pommade Noëlline.
Pommade au Nestosyl.
Poudre Cutirexine.
Poudre Noëlline.
Poudre Pelévine.
Poudre Satine.
Pyo-Amphogel Ronchèse.
Rhagadine Bracquemond.
Rozoderme.
Sapolan.
Sénophile.
Tergyl Lamo.

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

HERPÈS

Anasectol.
Antipiol.
Baume Tanex.
Carbolactyl simple.
Dermofagine.
Dermo-plastol Dumesnil.
Dermoradol.
Désitin.
Facmine Longuet.
Ganderma.
Iodo-Thyroidine Catillon.
Levurine extractive.
Nestosyl.

Nitium Buisson.
Opothérapie Bouty.
Paralactine Byla.
Pommade au Nestosyl.
Pommade Lenoir.
Poudre Pelévine.
Pyodermase.
Sanoquinol Ciba.
Sulfureux Pouillet.
Sulfurine du D^r Langlebert.
Sulfurion.
Sulfuryl Monal.

IMPETIGO

Acécolex.
Allbourine.
Ampho-Vaccins Ronchèse.
Anasectol.
Aniodol.
Antipiol.
Arapal.
Aristargol.
Baume du D^r Baissade.
Boricine Meissonnier.
Borostyrol Schlatter.
Brumarsyl.
Carbolactyl simple.
Comprimés d'Alibour.
Dépuriode du D^r Roger Weber.
Dermofagine.
Dermo-Plastol Dumesnil.
Dermô-Stalys du D^r Wagon.
Dithioléine.
Emplâtres Rogé-Cavaillès.
Entéro-Antigènes:
Fludiose.
Fondant Iodotannique Dausse.
Furunculase.
Ganderma.
Guéryspèle.
Inotyl.
Iodarsénic Guiraud ou Gouttes Paidophiles.
Iodex.
Iodo-Maisine (Pommade.)

Laccodermes.
Laurenol Médicinal.
Levuro-Maltine Déjardin.
Métacuprol.
Méta-Titane.
Méta-Vaccin.
Morrhualéne. Gautier.
Nestosyl.
Oikalan.
Opothérapie Bouty.
Percaïnal Ciba.
Pommade au Nestosyl.
Fropidon Pansement.
Pyo-Amphogel Ronchèse.
Pyodermase.
Sarcoptol.
Stalysine.
Stanion.
Stannoxyll.
Staphylagone.
Staphylase du D^r Doyen.
Staphylocide Audras.
Staphylo-Coccine Fraquet.
Staphyloethanol.
Sulfodermol Flahaut.
Tapo.
Terpoxyl externe.
Thiophyl.
Vaccins Ronchèse Ampho-Vaccins.
Vaclyderm.
Vaclydun.
Vulnérine du D^r Bergen.

MYCOSES — SYCOSES

Anaxéryll.
Antipiol.

Baume du D^r Baissade.
Baume Sélénia.

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

MYCOSES — SYCOSIS

Carboiodure Fraudin.	Levure fraîche Mycéta.
Collo-Iode Dubois.	Levurine extractive.
Cortiode.	Lipiodol Lafay.
Crescogénol.	Lipoiodine Ciba.
Dépuriodé du D ^r Roger Weber.	Magiodyl.
Dermo-Stalys du D ^r Wa-gon.	Méta-Vaccin.
Dicaliode.	Néo-Riodine.
Eniode Lefebvre.	Percaïnal Ciba.
Éranol.	Pilules Philippe.
Ganderma.	Pommade au Nestosyl.
Globules Fumouze à l'io-dure de Potassium.	Pommade Lenoir.
Guéryspèle.	Probios.
I. A. M.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Iodassium.	Pyodermase.
Iode organique Boissy.	Rhocya Dyn.
Iodex.	Riodine.
Iodogénol Pépin.	Sapolan.
Iodo-Maisine Globules.	Savons Mollard.
Iodo-Maisine Pommade.	Soluprotine Roche.
Iodone Robin.	Stalysine.
Iodonésyl.	Stanion.
Iodonucléol.	Stannoxyd.
Iodosan Zambelletti.	Staphylagone.
Iodostarine Roche.	Staphylase du D ^r Doyen.
Iodo-Vitasine.	Staphylocide Audras.
Iodural Novat.	Staphylo-Coccine Fraquet.
Iodurase.	Staphyloethanol.
Iodure Pachaut.	Sulfodermol Flahaut.
Iodure Philippe.	Sulfurion.
Iodures Souffron.	Sulfuryl Monal.
Laminiode.	Sunoxol.
Levure de bière Adrian.	Teinture de Sunoxol.
	Tiodine Cognet.
	Toritanol Lamo.

PHTIRIASE — TEIGNE — GALE

Alibourine.	Pommade au Nestosyl.
Anaxéryl.	Pommade Lenoir.
Nestosyl.	Sarcoptol.
Onction Angélini.	

PITYRIASIS

Acécolex.	Iodex.
Anaxéryl.	Magnésium Hardy.
Baume Tanex.	Néobiol.
Dermofagine.	Pommade Lenoir.
Dermo-Plastol Dumesnil.	Pyrelaine Collas.
Désitin.	Sapolan.
Eczéda.	Savons Mollard.
Eczosec.	Sulfobyl.
Ektogan Bocquillon.	Sulfodermol Flahaut.
Ganderma.	

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

PRURIGO — DARTRES PRURITS

(Voir : *Système nerveux, Sédatifs.*)

Agocholine.	Magnésium Hardy.
Anasectol.	Magnéso-Tubes Robinet.
Antipiol.	Mégathion Oliviero.
Aseptoradol.	Méta-Titane.
Azigol Thévenot.	Néotrophène.
Baume du D ^r Baissade.	Nestosyl.
Baume Duret.	Neubryne.
Biophylactine M. G.	Nisaméline Trouette-Perret.
Borocalcyl Thévenot.	Olkalan.
Borostyrol Schlatter.	Opodermyl.
Camphydryl Robin.	Opothérapie Fournier.
Comprimés Galac.	Orthogénol.
Crème Graziana.	Pancréatose Idon.
Cytomagnésium Lindeux.	Peptalmine.
Delbiase.	Pepticol.
Dépuriodé du D ^r Roger Weber.	Peptogil A. et L.
Dermo-Plastol Dumesnil.	Percainal Ciba.
Dermoradol.	Polypeptonal.
Dermosplénine.	Pommade au Nestosyl.
Désitin.	Pommade Bertol-Vichy.
Dialine.	Pommade Fornet.
Eczéda.	Poudre Pelévine.
Eczosec.	Prézymase.
Entéro-Antigènes.	Protiodyne dragées.
Entérobyl Dehaussy.	Salvé.
Euphoryl.	Sapolan.
Facmine Longuet.	Sarcoptol.
Ganderma.	Savons Mollard.
Guérysipèle.	Silicyl.
Héparbiline.	Sodothiol.
Hépatismine.	Splénocrisine.
Inotyol.	Sufo-Thiorine.
Inoxémol.	Thiocitran Thévenot.
Insulanol.	Thiophyl.
Kerlol.	Thiorine.
Kinéchol.	Ulcéosol pommade.
Laccodermes.	Ulcéosol poudre.
Levuro-Maltine Déjardin.	Yaourtine.
Linadéline.	Zymatine Lescène.

PSORIASIS

Acécalex.	Brumarsyl.
Anaxéryl.	Cacodyle Gonnon.
Antipiol.	Chophytol Rosa.
Arrhénal Adrian.	Crescogénol.
Arsylène Roche.	Delbiase.
Aseptoradol.	Dépuriodé du D ^r Roger Weber.
Baume du D ^r Baissade.	Dermo-Plastol Dumesnil.
Baume Duret.	

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

PSORIASIS

Dermoradol.	Phagostyl.
Dicaliode.	Phagostyl Mangané.
Dolophos.	Phosoforme.
Eczéda.	Plasma de Quinton.
Emplâtres Rogé Cavaillès.	Pommade au Nestosyl.
Entéro-Antigènes.	Pommade Fornet.
Euphoryl.	Pommade Lenoir.
Fer intraveineux Fraisse	Psoréon.
Ganderma.	Psothanol.
Granions (Les).	Sapolan.
I. A. M.	Savons Mollard.
Immunizols Grémy.	Sirop minéral sulfureux
Inoxemol.	Crosnier.
Iodarsenic Guiraud ou	Sulfarsénol.
Gouttes Paidophiles.	Sulfobyl.
Iodo-Maisine Pommade.	Sulfodermol Flahaut.
Iosorbine.	Thorium X. Rhemda.
Ixium Buisson.	Tiodine Cognet.
Levure de Bière Adrian.	Ultra-Levure.
Levure fraîche Mycéta.	Ultra-Violet.
Levurine extractive.	Uricémine.
Magnésium Hardy.	Vénécine.
Magnéso-Tubes Robinet.	

PYODERMITES

Acécolex.	Néo-Physiosthénine. --
Alibourine.	Physisthénine.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Olkalan
Aniodol.	Pommade au Nestosyl.
Antipiol.	Probios.
Arapal.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Aristargol.	Pyodermase.
Baume Sélénia.	Pyo-Vaclydun.
Boricine Meissonnier.	Séphydine.
Borostyrol Schaltter.	Stalysine.
Comprimés d'Alibour.	Stanion.
Créosoforme Lambiotte.	Stannoxyd.
Dermo-plastol Dumesnil.	Staphylagone.
Dermo-Stalys du Dr Wa-	Staphylase du Dr Doyen.
gon.	Staphylocide Audras.
Dithioléine.	Staphylo-Coccine Fraquet.
Furunculase.	Staphylothanol.
Ganderma.	Tapo.
Guérysipèle.	Terpoxyl externe
Inotyol.	Uvéoline.
Iosorbine.	Vaclyderm.
Lauréol médicinal.	Vaclydun.
Lysacrème L. M. L.	Vitadone.
Méta-Vaccin.	

SÉBORRHÉE

Azufrol.	Désitin.
Baume du Dr Baissade.	Eczéda.

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

SÉBORRHÉE

Eczosec.
Ganderma.
Inoxémol.
Néobiol.
Pommade Lenoir.
Pyrelaine Collas.
Sapolan.

Sarcoptol.
Savons Mollard.
Sodothiol.
Sulfocrème Liless.
Sulfodermol Flahaut.
Terpoxyl externe.

TUBERCULOSE CUTANÉE — LUPUS

Aloysine (pommade).
Céthocal du D^r Lemay.
Cinalose.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Colloïxols.
Créositoires.
Dicaliode.
Huile iodée Scientia.
Iodex.
Molène.

Murones du D^r Robert.
Jacques.
Nitium Buisson.
Percaïne Ciba.
Plasma de Quinton.
Pommade au Nestosyl.
T. B. X. Métacrysine.
Ultra-Violets.
Vulnérine du D^r Bergen.
Zimbyl.

TUMEURS DE LA PEAU — VERRUES

Baume Iki.
C. 40.
Catalyl Mg.
Chlormagnésium Fisch.
Chloro-Magnésion.
Cytomagnésium Lindeux.
Delbiase.
Dolophos.

Gouttes Halogènes du
D^r Bern.
Gouttes Magalo.
Magnésium Hardy.
Magnéso-Tubes Robinet.
Phosphomagnésium.
Silicyl.
Verrulyse.
Vicéliase.

ULCÈRES VARIQUEUX

Acécoline.
Acécolex.
Aïrol Roche.
Alibourine.
Anasectol.
Angioxyl du D^r Roussel.
Antipiol.
Baume Py.
Baume Tanex.
Belhémine.
Borostyrol Schlatter.
Céthocal du D^r Lemay.
Dermo-plastol Dumesnil.
Dermoradol.
Désitin.
Eczéda.
Élastoplaste.
Emplâtres Rogé-Cavaillès.
Endopancrine.
Entéro-antigènes.

Glyco-Thymoline.
Gouttes de Sérû.
Hamaméline Roya.
Hamamélis Gmet.
Hamamélis Grandval.
Hémorroidine gouttes.
Hémovéine.
Immunizols Grémy.
Inotyol.
Insulanol.
Insuline Phyloze.
Iodassium.
Iodex.
Lysacrème L. M. L.
Néo-Collargol.
Nestosyl.
Nitium Buisson.
Percaïne Ciba.
Phléboguil.
Plagéine Soulas.

MALADIES DE LA PEAU. T. S.

ULCÈRES VARIQUEUX

Pommade Bertol-Vichy.	Rozoderme.
Pommade au Nestosyl.	Sénophile.
Pommade Fornet.	Séphydine.
Pommade Raimoa.	Stéramine.
Pommade V. E. Doumer.	Terpoxyl externe.
Poudre et pommade d'insuline Phyloze.	Tulle rose Beslier.
Propidon Pansement.	Ulcéoplaque. — Ulcéobande.
Provénase Midy.	Ulcérophile Nosan.
Pyo-Amphogel Ronchèse.	Uvéoline.
Pyroléol Édet.	Veinotrope.
Rénovol.	Veinotrope poudre.
Rhagadine Bracquemond.	Vioforme Ciba.

URTICAIRE

Agocholine.	Iosorbine.
Albuplast Vigier.	Kinéchol.
Aloysine.	Levure fraîche Mycéta.
Amphotonyl.	Levurine extractive.
Anaclasine Ranson.	Lugocalcion.
Anapeptone Vassal.	Néopancarpine.
Antipiol.	Nestosyl.
Aseptoradol.	Pancréastase Defresne granulée.
Azigol Thévenot.	Pancréatose Idon.
Biophylactine Mg.	Pancrébile.
Boldo Gmet.	Paralactine Byla.
Calci-Sténine.	Peptalmine.
Calcozymase.	Pepticol.
Carbolactyl billé.	Peptogil A et L.
Chophytol-Rosa.	Peptonal.
Comprimés Galac.	Peptone Vassal.
Dépuriodé du Dr Roger Weber.	Phylactone Byla.
Dermosplénine.	Polypeptonal.
Dragées Elkin.	Pommade au Nestosyl.
Eczosec.	Prézymase.
Elkin (dragées, granules).	Protiodyne.
Entéro-Antigènes.	Protiodyne dragées.
Entérobyl Dehaussy.	Sénophile.
Entéroseptyl.	Sulfodermol Flahaut.
Euchol.	Sulfo-Thlorine.
Euphoryl.	Stomagyl.
Facmine Longuet.	Thiocitran Thévenot.
Granulés Elkin.	Triseptine.
Héparbilline.	Yaourtine.
Hépatismine.	Zymatine Lescène.
Iodarsenic Guiraud ou gouttes Psidophiles.	

MALADIES INFECTIEUSES. T. G.

ANTIPYRÉTIQUES

Alcacyl.	Panfèbrine.
Antigrippine Midy.	Phytinate de quinine Ciba.
Arcanon.	Pyréthane.
Cachets du D ^r Boveil.	Quino-Thorium.
Cryogénine Lumière.	RévuIsoplasme.
Curatine Brunet.	Rhoféine.
Erythra Dyn.	Septicémine cortial.
Eucalyptine.	Solution Bardet.
Gouttes Daynoc.	Stopral.
Irénine Gonnon.	Suppositoires Pyrax.
Murones du D ^r Robert	Terpoxyl interne.
Jacques.	Thermocédone.
Névorai Rafey.	Véganine.
Névralgol Brossard.	Véralgine.

ANTISEPTIQUES EXTERNES

Acécolex.	Gouttes Daynoc.
Alibourine.	Guérysipèle.
Amborhinol.	Pennès (Produits).
Ampho-Tablettes Ronchèse	Rhinodrops Béral.
Anaquinine Lescène.	Rhino-Liposeptine.
Antipiol.	Séphydine.
Balmiga.	Séro-Comprimés Mérieux.
Clearol.	Terpoxyl externe.
Désitin.	

ANTISEPTIQUES INTERNES

Acatar.	Cynurol Rosa.
Alcacyl.	Dicaliodé.
Alcamfétol.	Dioradin.
Algophagine.	Elgine Julien.
Ampoules Reipar.	Eucalyptine Le Brun.
Aniodol.	Formine Adrian.
Antalgol Dalloz.	Formocitrine.
Antigrippine Midy.	Gambéol.
Antiphymique Vadam.	Glyco-Thymoline.
Arcanan.	Goménol.
Argion.	Gonacrine.
Arsenos-Solvant.	Granions.
Ascéine.	Iodex.
Atophan Cruet.	Iodinjectol Jammes.
Atophanyl.	Lantol.
Bensamine.	Mictoseptol.
Benzobromine.	Néo-Collargol.
Biopulmol.	Oxyléine.
Boricine Meissonnier.	Panxylon.
Bucmine.	Pennès (Produits).
Canol.	Radiotropine.
Carboiodine.	Septicémine Cortial.
Chloramine Freyssinge.	Sulfarsénol.
Chlorobacilline.	Themsaline.
Colloïd-Iode Dubois.	Urisanine.
Cryptargol Lumière.	Uroformine Gobey.

MALADIES INFECTIEUSES. T. G.

ANTISEPTIQUES INTERNES

Uroiodine.	Urosan Dufayard.
Urométhyl.	Urozéa.
Urométine Lambiotte.	Uvargol.

BACTÉRIOPHAGES

Bacté-Phages.	Entérofagos.
Bactériophages Leclerc.	Probios.

BACTÉRIOTHÉRAPIE FERMENTS LACTIQUES

Biolactyl Fournier.	Lactimase.
Bulgarine Thépenier.	Lactobacilline.
Galabactéine.	Lactochol.
Kerlactine.	Levuro-Maltine Déjardin.
Lactaris.	Yaourtine.
Lacticholéine Tulivet.	

BALNÉOTHÉRAPIE

(Voir : Chirurgie.)

CHIMIOTHÉRAPIE — COLLOIDES

Alcamfétol.	Leucoseptyl.
Algocratine.	Ifranol.
Antiphymique Vadam.	Mésothorium Buisson.
Colloixols.	Mycolysine du D ^r Doyen.
Diénol.	Néo-Collargol.
Dioradin.	Néoplalysines.
Elgine Julien.	Orargol Amicros.
Eranol.	Septicémine Cortial.
Erythra Dyn.	Stanion.
Granions.	

DIAPHORÉTIQUES

Acodros.	Alcacyl.
----------	----------

SÉRUMS — VACCINS

Amphovaccins Ronchèse.	Institut Pasteur Vaccins.
Antigénines.	Lysaxins L. M. L.
Antivirus.	Néo-Physiosthénine. —
Avistyl.	Physiosthénine.
Bilivaccin.	Probios.
Broncho-Vaclydun.	Propidon.
Colitique.	Stalysine.
Coli-Vaclydun.	Staphylagone.
Entéro-antigènes.	Strepto-Vaclydun.
Entérovaccin Lumière.	Vaccin anti-grippal du pro-
Entéroxin Leclerc.	fesseur Minet.
Hétérolysine Oliviero.	Vaccinothérapie atoxique
Immunizols Grémy.	Cépède.
Institut Pasteur Sérums.	Vaccins Bruschettini.

MALADIES INFECTIEUSES. T. G.

SÉRUMS — VACCINS

Vaccins atoxiques stabilisés.	Vaccin pansement Virultra.
Vaccins bactériens I. O. D.	Vaccins Ronchèse Ampho-vaccins.
Vaccins intra-dermiques et gelées-vaccins Ivago de L. Goldenberg.	Vaccins Sténé.
	Vaclyderm.
	Vaclydun.

MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

COLIBACILLOSE

Amiphène Carron.	Lantol.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Leucoseptyl.
Bensamine.	Levure B. 17.
Biocéane.	Métaformine.
Carbolactyl bilé.	Microlyse.
Carbolactyl simple.	Naphtocarbine.
Chloramine Freyssinge.	Néo-Collargol.
Chrysémine.	Néo-Physiosthénine.
Colitique.	Physiosthénine.
Coli-Vaclydun.	Oxyléine.
Colloïxols.	Phosoformé.
Cryptargol Lumière.	Probios.
Cynuroil Rosa.	Pyoformine.
Dioradin.	Sélamon.
Elgine Julien.	Stomoxygène.
Entéro-antigènes.	Terpoxyl externe.
Entérofagos.	Terpoxyl interne.
Entéroseptyl.	Thoroxyl.
Entérovaccin Lumière.	Triseptine.
Entéroxin Leclerc.	Ultra-Levure.
Félicol.	Uvargol.
Formocarbine.	Vaccinothérapie atoxique
Formocarbos.	Cépède.
Galabactéine.	Vaccins Bruschettini.
Géranine.	Vaccins bactériens I. O. D.
Hétérolysine Oliviero.	Vaccins intra-dermiques et
Hexotal.	gelées-vaccins Ivago de
Immunizols Grémy.	L. Goldenberg.
Kerlactine.	Vaclydun.
Lacto-sérum Lavril.	Vonol.

DIPHTÉRIE

Voir Oto-rhino-laryngologie, Angines.)

Ampho-tablettes Ronchèse.	Néo-Physiosthénine.
Colarsénol.	Physiosthénine.
Fornose.	Rhino-Liposeptine.
Institut Pasteur Sérums.	Séro-comprimés Mérieux.
Institut Pasteur Vaccins.	

MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

ÉRYSIPÈLE.

Acéclex.
Alibourine.
Amphovaccins Ronchèse.
Aniodol.
Antigénines.
Antipiol.
Antivirus.
Arsenos-Solvant.
Bucmine.
Collo-iode Dubois.
Elgine Julien.
Glyco-Thymoline.
Goménol.
Guérysipèle.
Gouttes Daynoc.
Leucoseptyl.
Levuro-Maltine Déjardin.
Liposeptine.
Lysaxins L. M. L.
Naso-Sulfolarsan.
Nucléatol Robin.

Pommade au Nestosyl.
Probios.
Propidon.
Pyo-Amphogel de Ronchèse.
Sephydine.
Septicémine Cortial.
Staphylase du D^r Doyen.
Staphylo-coccine Fraquet.
Strepto-Vaclydun.
Sulfarsénol.
Themsaline.
Thigénol Roche.
Vaccinothérapie atoxique Cépède.
Vaccins Bruschettini.
Vaccins Ronchèse Ampho-Vaccins.
Vaclyderm.
Vaclydun.
Vulnérine du D^r Bergen.

FIÈVRES ÉRUPTIVES — LÈPRE

Adrénargol.
Ampho-vaccins Ronchèse.
Aniodol.
Baume du D^r Baissade.
Benzobromine.
Bucmine.
Créositoires.
Elgine Julien.
Erythra Dyn.
Goménol.
Gouttes Daynoc.
Lantol.
Leucoseptyl.
Liposeptine.
Métaformine.
Mictoseptol.

Mycolysine du D^r Doyen.
Orargol Amicros.
Panfébrine.
Phytinate de quinine Ciba.
Pyréthane.
Quinquina Gmet.
Rhino-liposeptine.
Septicémine Cortial.
Suppositoires Pyrax.
Terpoxyl interne.
Théosalvose.
Tubérol.
Urisanine.
Zimbyl.

GRIPPE

Acodros.
Adrénargol.
Aigue d'or.
Alcacyl.
Alcamfétol.
Algocratine.
Amberhinol.
Ampho-vaccins Ronchèse.
Anaquintine Lescène.
Aniodol.
Antalgot Dalloz.

Antigénines.
Antigrippine Midy.
Antiphymique Vadam.
Arcanan.
Ardogène.
Arrhénal Adrian.
Arsécrinol.
Arsi-Strychnal Longuet.
Ascéine.
Asciatine.
Avistyl.

MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

GRIPPE

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Bacté-phages. | Granules des Vosges. |
| Balmiga. | Guttoléol. |
| Balsamol Lescène. | Hexaranol. |
| Benzobromine. | Hexotal. |
| Bexinine. | Holaseptine. |
| Bronchitol. | H yol. |
| Bronchodermine. | Ifranol. |
| Bronchoforme. | Immunizols Grémy. |
| Bronchoseptol Lauriat. | Inhalation Lancosme. |
| Broncho-Vaclydun. | Iodométine. |
| Broncosol. | Irénine Gonnon. |
| Bucmine. | Kola granulée Astier. |
| Cachets du Dr Bovell. | Kola Monavon. |
| Cachets Kapytan. | Kreptol. |
| Cachets « Roche » de Thio-
col. | Lantol. |
| Cacodyle Gonnon. | Léniforme. |
| Camphodausse. | Leucoseptyl. |
| Campho-spartéine Dubois. | Marrubène. |
| Camphydryl Robin. | Marrucol. |
| Carboliodine. | Métaformine. |
| Cérébrine Fournier. | Mictoseptol. |
| Cérébrosthénine Dalin. | Miroxyl. |
| Chlorobacilline. | Mycolysine du Dr Doven. |
| Citrolargol. | Myothermine. |
| Codocol. | Nadolor. |
| Collo-iode Dubois. | Nasargine. |
| Comprimés « Roche » de
Thiocol. | Nazinette. |
| Coryphédrine. | Néo-Collargol. |
| Crédone Dehaussy. | Néo - Physiosthénine. |
| Créoformine. | Physiosthénine. |
| Créositoire. | Néopulmine. |
| Crésopirine. | Neubryne. |
| Cryogénine Lumière. | Névorol Rafey. |
| Curatine Brunet. | Névralgol Brossard. |
| Curogène. | Nopirine Vicario. |
| Cynurol Rosa. | Orargol Amicros. |
| Dépuriole du Dr Roger
Weber. | Oxymenthol Perraudin. |
| Diénol. | Panfèbrine. |
| Dioradin. | Pâte Mireille. |
| Elgine Julien. | Phagostyl. |
| Élixir Bonjean. | Phagostyl Mangané. |
| Élixir Duchamp. | Phosoforme. |
| Élixir Ducro. | Phosote Lambiotte. |
| Erцерhinol. | Phytinate de quinine Ciba. |
| Érythra Dyn. | Pilules V. E. Doumer. |
| Eucalyptine Le Brun. | Pneumo-Lipase. |
| Ferment pur de raisin. | Potion Adol. |
| Germose. | Prévalidine. |
| Goménol. | Probios. |
| Gouttes Daynoc. | Protiodyne. |
| Gouttes Nican. | Protonic. |
| | Pulvéol. |
| | Pyoformine. |
| | Pyréthane. |

MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

GRIPPE

Quergémol.
Quinarsol.
Quinéine.
Quinoïdine Duriez.
Quino-Thorium.
Quinquina Gmet.
Quinsal.
Radiotropine.
Résyl.
Révulsoplasme.
Rhino-Liposeptine.
Rhoféine.
Salyptol Narty.
Sanex-Inhalant.
Septicémine Cortial.
Sérum Oliviero.
Sinaseptic.
Sirop Brahma.
Sirop de créosote Vacheron.
Sirop de Gaïarsol.
Sirop Famel.
Sirop phénique Vial.
Sirop Roche au thiocol.
Sirop Vacheron au gaïacol.
Solucamphre Delalandé.
Solution Pautauberge.
Staphylase du D^r Doyen.
Staphylo-coccine Fraquet.
Stopral.
Sulfuryl Monal.
Suppositoires Pyrax.

Tanno-Calceine.
Tapo.
Terpoxyl interne.
Themsaline.
Thiocol.
Toussyl.
Tubérol.
Urisanine.
Uroformine Gobey.
Uroïodine.
Urométhyl.
Urométine Lamblotte.
Urosan Dufayard.
Uvargol.
Vaccin anti-grippal du professeur Minet.
Vaccinothérapie atoxique Cépède.
Vaccins atoxiques stabilisés.
Vaccins intra-dermiques et gelées-vaccins Ivago de L. Goldenberg.
Vaccins Ronchèse. — Ampho-vaccins.
Vaclodyun.
Véganine.
Véralgine.
Zaryl.
Zimbyl.

OREILLONS

Baume Iki.
Bucmine.
Elgine Julien.
Iodex.
Liposeptine.

Suppositoires Pyrax.
Terpoxyl interne.
Tubérol.
Véganine.

[RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

Alcacyl.
Algophagine.
Ampho-vaccins Ronchèse.
Ampoules Boissy d'iodure de potassium.
Ampoules Reipar.
Anégrine.
Ascéine.
Atophan Cruet.
Atophanyl Cruet.
Atoquinol Ciba.
Bande de crêpe Velpeau.

Banikol.
Baume Adol.
Baume Aroma.
Baume Bengué.
Baume Rhodia.
Bucmine.
Cachets du D^r Boveil.
Crédone Dehaussy.
Crésopirine.
Curatine Brunet.
Cynurool Rosa.
Dolysine.

MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

Elgine Julien.	Rhésal Vicario.
Entéro-antigènes.	Rhocya Dyn.
Erythra Dyn.	Salénal Ciba.
Immunizols Grémy.	Salène Ciba.
Immunovaccin antirhumatismal.	Salysérum.
Iodex.	Sambul.
Iodinjectol Jammes.	Septicémine Cortial.
Iodométine.	Spécifique Béjean.
Magsalyl Mg.	Sulfur concentré Dax.
Myoden.	Sulfureux Pouillet.
Nalodine Logeais.	Sulfurion.
Nopirine Vicario.	Triglandine.
Opothérapie Bouty.	Ulmarène Gigon.
Paradoline.	Uromil.
Pyréthane.	Véganine.
Révulsif liquide Boudin.	Véralgine.
Révulsif Procipha.	Viophan.

ROUGEOLE

Benzobromine.	Pyroléol Édet.
Erythra Dyn.	Rhino Liposeptine.

SEPTICÉMIES

Alcamfétol.	Mycolysine du D ^r Doyen.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Néo-Physiosthénine. —
Aniodol.	Physiosthénine.
Antigénines.	Orargol Amicros.
Bactériophages Leclerc.	Oxy-injecteur du D ^r Fialip.
Bensamine.	Probios.
Bucmine.	Propidon.
Camphodausse.	Pyoformine.
Campho-spartéine Dubois.	Quinquina Gmet.
Camphostyl Lacroix.	Septicémine Cortial.
Camphydryl Robin.	Solucamphre Delalande.
Dicaliode.	Soluprotine Roche.
Diénol.	Stalysine.
Dioradin.	Stanion.
Elgine Julien.	Staphylagone.
Goménol.	Staphylo-Vaclydun.
Gonacrine.	Strepto-Vaclydun.
Granions.	Terpoxyd interne.
Institut Pasteur Sérums.	Themsaline.
Iodinjectol Jammes.	Vaccins bactériens I. O. D.
Iodométine.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Lantol.	pho-vaccins.
Leucoseptyl.	Vaclydun.
Lipodéterpénol.	Zimby
Métaformine.	

TÉTANOS

Institut Pasteur Sérums.	Somnifène Roche.
Institut Pasteur Vaccins.	

MALADIES INFECTIEUSES. T. S.

TYPHOIDES ET PARATYPHOIDES

Acolitol.	Immunizols Grémy.
Amiphène Carron.	Institut Pasteur Vaccins.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Kerlactine.
Aniodol.	Lantol.
Antigénines.	Leucoseptyl.
Benzobromine.	Liposeptyne.
Bensamine.	Néo-Physiosthénine. —
Bilivaccin.	Physiosthénine.
Biolactyl Fournier.	Nergine Heudebert.
Bulgarine.	Nucléatol Robin.
Carbolactyl bilié.	Panbilline.
Carbolactyl simple.	Pancarbo Hardy.
Chloramine Freyssinge.	Panfébrine.
Chlorobacilline.	Protidyne.
Colloixols.	Pyoformine.
Cryogénine Lumière.	Quinquina Gmet.
Cryptargol Lumière.	Septicémine Cortial.
Cynuról Rosa.	Solucamphre Delalande
Dioradin.	Tapo.
Elgine Julien.	Urisanine.
Entérofagos.	Urosan Dufayard.
Formocarbène.	Uvargol.
Formocitrine.	Vaccins bactériens I. O. D.
Galabactéine.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Goménol.	pho-vaccins.

ZONA

Acécolex.	Néo-Physiosthénine — Phy-
Algocratine.	siosthénine.
Arsenos-Solvant.	Nestosyl.
Baume Adol.	Névoral Rafey.
Baume Aroma.	Névrargol Brossard.
Baume Bengué.	Percainal Ciba.
Cachets du D ^r Boveil.	Pommade au Nestosyl.
Cataplasme du D ^r Lelièvre.	Poudre Pélévine.
Érythra Dyn.	Rozoderme.
Glyco-Thymoline.	Sénophile.
Hexaranol.	Sulfarsénol.
Nalodine Logeais.	Suppositoires Pyrax.
Néopancarpine.	Véganine.
	Véralgine.

MALADIES PARASITAIRES.

AMIBIASÉ

Amibiassine.	Amiphène Carron.
Amidal.	Bismuth Desleaux.

MALADIES PARASITAIRES.

AMIBIASE

Bismuth Tulasne.
Carbalcaloides.
Chrysémine,
Colloïxols.
Crésentyl.
Géranine.
Ludin.

Malarsan.
Pâte Spécia.
Prévarsyl.
Sanluol.
Stovarsol.
Suppositoires Corbière.
Tréparsol.

HELMINTHIASE

Bismuth Desleaux.
Bismuth Tulasne.
Carbonate de Bismuth.
Chénantol.
Chrysémine.
Crésentyl.
Curoxyure.
Gambéol.
Géranine.
Glyco-Thymoline.
Oxyléine.
Salvé.

Stovarsol.
Sulfa.
Sulfureux Pouillet.
Tablettes Perroud.
Taenifuge Bardet.
Taenifuge du D^r Jacquème.
Taenifuge français du
D^r E. Duhourcau.
Taenifuge Kirn.
Vermifuge Cornet.
Vermirène Audibert.

MALADIE DU SOMMEIL

Prévarsyl.
Trilues.

Tséamine.

MYCOSES

Algatan.
Carboiodure Fraudin.
Collo-iodé Dubois.
Cortiodé.
Dépuriode du D^r Roger
Weber.
Dicaliodé.
Éniode Lefebvre.
Éranol.
Géranine.
Globules Fumouze à l'io-
dure de Potassium.
Iodascérine.
Iodassium.
Iode organique Boissy.
Iodogénol Pépin.
Iodo Maisine Globules.
Iodone Robin.
Iodonucléol.

Iodosan Zambeletti.
Iodostarine Roche.
Iodo-Vitasine.
Iodural Novat.
Iodurase.
Iodure Pachaut.
Iodure Philippe.
Iodures Souffron.
Laminiodé.
Lipiodol Lafay.
Lipiodine Ciba.
Magiodyl.
Néo-Riodine.
Pilules Philippe.
Rhocya Dyn.
Riodine.
Tiodine Cognet.
Toritanol Lamo.

PALUDISME

Agamétol.
Algatan.
Arrhéнал Adrian.

Arsénos-Solvant.
Arsylène Roche.
Boldo Verne.

MALADIES PARASITAIRES.

PALUDISME

Bionéol.
Cachets du D^r Boveil.
Cacodyl Gonnou.
Catalyl Mg.
Chophytol Rosa.
Colloïxols.
Diéménal.
Euchol.
Ferrocodile et Ferricodile.
Ferrocyl.
Florhépatine.
Gamétoxyl.
Gouttes Daynoc.
Hectargyre.
Hectine.
Hémoglobine Deschiens.
Hémostyl du D^r Roussel.
Iodaseptine Cortial.
Iodonesyl.
Ifranor.
Lioncyl.
Magnésio-Cacodyline
Jammes.
Malarsan.
Mangratinés.
Néarsite.
Néo-Arsycodile.
Neurotrol.
Nucléarsitol Robin.
Nuclémose.

Opothérapie du D^r Frayssé.
Panbiline.
Panfébrine.
Phagosthyl.
Phagosthyl Mangané.
Phytinate de Quinine Ciba.
Pilules V. E. Doumer.
Plurion Couturieux.
Prévarsyl.
Pyréthane.
Quergémol.
Quinarsol Antianémique.
Quinarsol Fébrifuge.
Quinéine.
Quinocardine.
Quinio-Stovarsol.
Quinoforme Lacroix.
Quinoïdine Duriez.
Quino-Thorium.
Quinquina Gmet.
Septicémine Cortial.
Serifer Laurençon.
Séroma Rey.
Solution Bardet.
Sulfarsénol.
Taburol Monal.
Trilues.
Vanadarsine Guillaumin.
Vin de Bugeaud.
Zimbyl.

PARASITES DE L'INTESTIN ET DES VOIES BILIAIRES

Bismuth Desleaux.
Bismuth Tulasne.
Carbalcaloïdes.
Carbonate de Bismuth.
Chénantol.
Chrysémine.
Crésentyl.
Curoxyure.
Gambéol.
Géranine.
Glyco-Thymoline.
Goménol.
Kerlactine.

Oxyléine.
Pyrelaine Collas.
Rectagine.
Rectopanbiline.
Salvé.
Sulfureux Pouillet.
Tablettes Perroud.
Taenifuge Bardet.
Taenifuge français du
D^r E. Duhourcau.
Vermifuge Cornet.
Vermirène Audibert.

OPHTALMOLOGIE.

ANESTHÉSIIQUES LOCAUX

Allocaïne Lumière.	Pommades ophtalmologi-
Collyres Chibret.	ques Chibret Optima.
Comprimés d'Alibour.	Scurocaïne.
Delcaïne Roques.	Thigénol Roche.
Larocaïne Roche.	Tubes Blache.
Nestosyl.	Tubes Dulcis.
Panthésine Sandoz.	Tubes du D ^r Guiraud.
Percaïne Ciba.	Tubes ophtalmologiques
	Ferlux.

ANTISEPTIQUES LOCAUX

Anibdol.	Optraex Famel.
Aristargol.	Pommades ophtalmologi-
Boricine Meissonnier.	ques Chibret Optima.
Chloraseptine Optima.	Poudre Chaumel.
Clearol.	Tubes Blache.
Collyres Chibret.	Tubes Dulcis.
Conjonctol.	Tubes du D ^r Guiraud.
Cryptargol Lumière.	Tubes ophtalmologiques
Glyco-Thymoline.	Ferlux.
Goménol.	Végétol externe.
Ophtalmine.	Vitargyl.

BAINS D'YEUX

Aristargol.	Optraex Famel.
Clearol.	Poudre Chaumel.

INSTILLATIONS — COLLYRES

Antipiol.	Orargol Amicros.
Collyres Chibret.	Panthésine Sandoz.
Ephédrine naturelle Béral.	Percaïne Ciba.
Larocaïne Roche.	Rhinofluine.

POMMADES

Antipiol.	Pommades ophtalmologi-
Eczeda.	ques Chibret Optima.
Eczosec.	Salantale.
Goménol.	Tubes Blache.
Méta-Vaccin.	Tubes du D ^r Guiraud.
Ophtalmine.	Tubes Dulcis.
Percaïne Ciba.	Tubes ophtalmologiques
	Ferlux.

VACCINS

Vaccinothérapie atoxique	Vaccins Ronchèse. — Am-
Cépède.	pho-vaccins.
Vaccins Polyvalents du	Vaccins Pansement Virul-
D ^r Renard.	tra.

OPOTHÉRAPIE.

Agomensine.
Ampolases.
Androcalcion H et E.
Androstine Ciba.
Antélobine.
Arsécrinol.
Carbolactyl bilié.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Collo-iode Dubois.
Détersyl.
Féminadène.
Folestrine Grémy.
Follicormone buccale Hinglais.
Folliculine Choay.
Gynopausine.
Gynocalcion.
Hématoéthyrôïdine.
Holovarine.
Hormovarine Byla.
Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.
Lipoides Iscovesco.
Lutéovar.
Neurovarol.
Ocréine Iscovesco.
Opoferrine vitaminée.
Opothérapie Bouty.
Opothérapie Byla associée.

Opothérapie Byla simple.
Opothérapie Carrion.
Opothérapie Choay.
Opothérapie du D^r Fraysse.
Opothérapie Fournier.
Opothérapie Moncour.
Opothérapiques Meurice.
Opothérapiques Pellissier.
Opozones Lumière.
Orchidine Optima.
Ovaire Fournier.
Ovarine Optima.
Ovarine Tisy.
Ovaro-Thyrôïdine Optima.
Oxydothyryne Paris.
Oxydovarine Paris.
Pancrebile.
Panglandine Couturieux.
Peptosthénine Choay.
Post-hypophyse Choay.
Proxýtases.
Quinovarine Optima.
Sistomensine Ciba.
Syncrines Choay.
Thyrôïdine et radiophorine Gory.
Triglandine.
Valovarine.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.

ANALGÉSQUES GÉNÉRAUX

Acobella.
Acodros.
Acoégenol.
Alcacyl.
Antigrippine Midy.
Apsophol.
Arcanan.
Cachets du D^r Boveil.
Cibalgine.

Credone Dehaussy.
Curatine Brunet.
Curogène.
Pyréthane.
Somnicones Béral.
Suppositoires Pyrax.
Véganine.
Véralgine.

ANALGÉSQUES LOCAUX

Allocaïne Lumière.
Amborhinol.
Baume Bengué.
Camphydryl Robin.
Cocaïne Midy.

Delcaïne Roques.
Dragées Bengué au menthol.
Fornose.
Larocaïne Roche.
Otalgol.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.

ANALGÉSIIQUES LOCAUX

Pastilles M. B. C.
Pâte Mireille.
Pharyngaseptyl.
Scuroforme.

Solution huileuse au Nes-
tosyl.
Stovaine.
Stovédrine.

ANTISEPTIQUES

Amborhinol.
Ampho-Tablettes Ron-
chèse.
Anexol
Aniodol.
Argion.
Argybil.
Arhine.
Aristargol.
Arsenos-Solvant.
Boricine Meissonnier.
Bulgarine Thépenier.
Camphydryl Robin.
Chloraseptine Optima.
Clonazone Daufresne.
Collubleu.
Dentoline.
Dentoryl.
Dragées Bengué au Menthol
Filtrat Inosepta.
Formint Merminod.
Fornose.
Galform Lambiotte.
Galliodyne.
Gernal.
Glyco-M.
Glyco Thymoline.
Goménol.

Gosierine Dalloz.
Gouttes Daynoc.
Iodex.
Iodosan Zambelletti.
Léniforme.
Mésoforme.
Mucosodine.
Nasargine.
Nazinette.
Néo-Chloral Nau.
Océallade.
Pastilles M. B. C.
Pâte Neyret.
Pharyngaseptyl.
Rhinaspir.
Rhinodrops Béral.
Salasényl (poudre).
Séphydine.
Septométrol Vély.
Séro-comprimés Mérieux.
Terpoxyl externe.
Thigénol Roche.
Vaso-Rhinol adréna-lisé.
Vaso-Rhinol (simple et
mentholé).
Végétol externe.
Vitargyl.
Zaryl.

GARGARISMES — COLLUTOIRES — LAVAGES

Ampho-Tablettes Ronchèse
Anexol.
Boréol.
Chloraseptine Optima.
Clonazone Daufresne.
Colarsénol.
Collubleu.
Collutoire V. E. Doumer.
Édistol.
Évine.
Formint Merminod.
Glyco-M.
Gobérol.
Goménol.
Hyal.
Inhalation-gargarisme Vo-
caldop.

Inolène
Iodassium.
Iodosan Zambelletti.
Mucosodine.
Nasobore.
Néo-Chloral Nau.
Néol.
Noxylode.
Perubore.
Pharyngaseptyl.
Pulvéol.
Sédorhinol.
Séphydine.
Septométrol Vély.
Terpoxyl externe.
Vocaldop.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.

INHALATIONS

Balmiga.	Inhaloxyl.
Boréol.	Nasobore.
Créosote soluble Vacheron.	Perubore.
Édistol.	Pharyngaseptyl.
Goménol.	Pulvéol.
H yol.	Sanex-Inhalant.
Inhalation.-Gargarisme Vo-	Sédorhinol.
caldop.	Thymo-Menthol Eupnique
Inhalation Lancosme.	Belhomme.
Inhalol.	Vocaldop.
Inhalone.	Zaryl.
Inhalo-Sel.	

INSTILLATIONS — PULVÉRISATIONS

Acécoline.	Iodex.
Adénoseptyl.	Léniforme.
Adrénargol.	Nasargine.
Amborhinol.	Néo-Collargol.
Ampho-vaccins Ronchèse.	Oéréliode.
Anaquintine Lescène.	Orargol Amicros.
Antigénines.	Otalgol.
Antipiol.	Perubore.
Argybil.	Pharyngaseptyl.
Bacté-Phages.	Rhinaspir.
Biolactyl Fournier.	Rhinodrops Béral.
Citrolargol.	Rhinofluine.
Créosote soluble Vacheron.	Rhino-Liposeptine.
Édistol.	Rhino-Vaclydun Corbière.
Éphédrine naturelle Béral.	Sinuzyl.
Ercérhinol.	Sulfa.
Essoforme.	Terpoxyl externe.
Glyco-M.	Tubérol.
Goménol.	Vaso-Rhinol (simple et
Guttoléol.	mentholé).
H yol.	

POMMADES

Acécolex.	Naso-Sulfolarsan.
Aniodol.	Percaïnal Ciba.
Antipiol.	Phosorine.
Baume Tanex.	Pyo-Amphogel Ronchèse.
Dermo-Stalys du Dr Wa-	Sédorhinol.
gon.	Sinuzyl.
Eczéda.	Stovédrine.
Eczosec.	Tubes Chauvin.
Fornose.	Tubes Ophtalmologiques
Goménol.	Ferlux.
Iodex.	Vaso-Rhinol adrénalisé.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. G.

POUDRES

Arhine Lambiotte.
Aristargol.
Biolactyl Fournier.
Boricine Meissonnier.
Bulgarine Thépenier.
Cimatryl.
Inhalation-Gargarisme Vo-
caldop.

Kydalose.
Pharyngaseptyl.
Pulvéol.
Rhinaspir.
Salasényl (poudre).
Vioforme Ciba.

VACCINS

Ampho-vaccins Ronchèse.
Antigénines.
Antipiol.
Entéro-Antigènes.
Immunizols Grémy.
Lysaxins L. M. L.
Probios.
Pyo-Amphogel Ronchèse.
Rhino-Vaclydun Corbière.
Salantale.

Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Vaccin Pansement Virul-
tra.
Vaccins intra-dermiques et
Gelées Vaccins Ivago de
L. Goldenberg.
Vaccins Ronchèse. — Am-
pho-Vaccins.
Vaccins Sténé.
Vaclydun.

VASO-CONSTRICTEURS — DÉCONGESTIFS

Adrénaline Invar.
Adrénine.
Allocaïne Lumière.
Amborhinol.
Déstensyl.
Ergotine Lamante.
Fornose.

Kidoline.
Otalgol.
Rénaleptine.
Rhinodrops Béral.
Stovédrine.
Vaso-Rhinol adrénalisé.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

ANGINES AIGÜES

Adénoseptyl.
Adrénergol.
Alcacyl.
Ampho-Tablettes Ron-
chèse.
Ampho-Vaccins Ronchèse.
Anexol.
Argion.
Arhine Lambiotte frères.
Baume Bengué.
Baume Iki.
Boréol.
Camphydryl Robin.
Capsules Kuchner au Mé-
captol.

Chloraseptine Optima.
Cibalgine.
Clonazone Daufresne.
Cocaine Midy.
Colarsénol.
Collubleu.
Collutoire V. E. Doumer.
Crédone Dehaussy.
Dentoline.
Dentoryl.
Dragées Bengué au Men-
thol.
Édistol.
Embrocation Salas.
Formint Merminod.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

ANGINES AIGÜES

Galform Lambiotte.	Rhino-Liposeptine.
Galliodine.	Rhino-Vaclydun Corbière.
Glyco-M.	Salasényl (poudre).
Glyco-Thymoline.	Sédorhinol.
Gobérol.	Séphydine.
Goménol.	Septicémine Cortial.
Gosiérine Dalloz.	Septométrol Vély.
Gouttes Daynoc.	Séro-Comprimés Mérieux.
Hamamélis Gmet.	Sérum Oliviero.
Inolène.	Sinaseptic.
Iodassium.	Staphylase du D ^r Doyen.
Mésosome.	Staphylo-Coccine Fraquet.
Mucosodine.	Staphylothanol.
Nasobore.	Stovaine.
Néo-Chloral Nau.	Sulfo-Thiorine.
Néol.	Terpoxyl externe.
Néo-Physiosthénine. —	Themsaline.
Physiosthénine.	Thiophyl.
Noviode.	Thiorine.
Oéréliode.	Thymo-Menthol Eupnique
Oxymenthol Perraudin.	Belhomme.
Pastilles M. B. C.	Vaccins Sténé.
Pâte Mireille.	Vaclydun.
Perubore.	Vaso-Rhinol adrénalisé.
Pharyngaseptyl.	Vaso-Rhinol. simple et
Pulvéol.	mentholé.
Quinquina Gmet.	Véralgine.
RévuIsoplasme.	

ANGINE DE VINCENT

Ampho-Tablettes Ronchèse.	RévuIsoplasme.
Anexol.	Rhino-Liposeptine.
Arsenos-Solvant.	Rhino-Vaclydun Corbière.
Baume Iki.	Septicémine Cortial.
Boréol.	Septométrol Vély.
Colarsénol.	Séro-Comprimés Mérieux.
Collubleu.	Sérum Oliviero.
Collutoire V. E. Doumer.	Sulfarsénol.
Dragées Bengué au Menthol.	Suppositoires Corbière.
Néo-Chloral Nau.	Terpoxyl externe.
Néo-Physiosthénine. —	Themsaline.
Physiosthénine.	Tréparsol.
Noviode.	Trilues.
Pharyngaseptyl.	Véralgine.

BOURDONNEMENTS D'OREILLES — SURDITÉ

Acécoline.	Globules Fumouze à l'io-
Acoégénol.	dure de Potassium.
Apsophol.	Glycocarpine.
Collo-iode Dubois.	Hamamélis Gmet.
Détensyl.	Hémoductyl.
Dicaliode.	Nazinette.
Féminadène.	Silguine.
Fornose.	Silicyl.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

BOURDONNEMENTS D'OREILLES — SURDITÉ

Solvosclérose.
Spasmosédine.
Tiodine Cognet.

Vaso-Neurine.
Verticurine.

CORYZAS (AIGUS, CHRONIQUES)

Acodros.
Adénoseptyl.
Adrénaline Invar.
Adrénargol.
Adrénine.
Aniodol.
Antigrippine Midy.
Arcanan.
Argion.
Argybil.
Arhine.
Aristargol.
Avanazol Couturieux.
Bacté-Phages.
Biolactyl Fournier.
Boréol.
Bulgarine Thépenier.
Citrolargol.
Coryphédrine.
Delcaine Roques.
Édistol.
Éphédrine naturelle Béral.
Erцерhinol.
Essoforme.
Fornose.
Gernal.
Glyco-M.
Glyco-Thymoline.
Goménol.
Granulés des Vosges.
Guttoléol.
Hydrorrhéol.
Hyal.
Hypophédrine.
Inhalations Lancosme.
Inhalol.
Inhalone.
Inhalo-Sel.
Inhaloxyl.
Iodex.
Kydalose.
Léniforme.
Mucosodine.

Narsargine.
Nasobore.
Naso-Sulfarsan.
Néo-Chloral Nau.
Néo-Collargol.
Oéréliode.
Orargol Amicros.
Pérubore.
Phosorine.
Probios.
Pulvéol.
Rénaleptine.
Rhinaspir.
Rhinodrops Béral.
Rhinofluine.
Rhino-Liposeptine.
Rhino-Vaclydun Corbière.
Salantale.
Sédorhinol.
Séphydine.
Sinuzyl.
Staphylase du D^r Doyen.
Staphylo-Coccine Fraquet.
Staphylothanol.
Stopral.
Stovédrine.
Terpoxyl externe.
Thymo-Menthol eupnique
Belhomme.
Tubérol.
Vaccins intra-dermiques et
Gelées Vaccins Ivago de
L. Goldenberg.
Vaccins Ronchèse. — Am-
pho-Vaccins.
Vaccins Sténé.
Vaclydun.
Vaso-Rhinol adrénalisé.
Vaso-Rhinol (simple et men-
tholé).
Vitargyl.
Zaryl.

CORYZA SPASMODIQUE — RHUME DES FOINS

Acatar.
Amborhinol.
Amphotonyl.

Anaclasine Ranson.
Anapeptone Vassal.
Anaquintine Lescène.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

CORYZA SPASMODIQUE — RHUME DES FOINS

Antiasthme Bengalais.
Balmiga.
Benzylol.
Biophylactine Mg.
Coryphédrine.
Delcaine Roques.
Entéro-Antigènes.
Éphédrine naturelle Béral.
Essoforme.
Fornose.
Freinix Buisson.
Glyco-M.
Glyco-Thymoline.
Goménol.
Hectine.
Hydrorrhéol.

Hypophédrine.
Iodex.
Kidoline.
Kinectine.
Lugocalcion.
Mucosodine.
Nazinette.
Néopancarpine.
Pyréthane.
Rhinaspir.
Rhinodrops Béral.
Rhinofluine.
Sanex-Inhalant.
Stovédrine.
Zaryl.

ÉPISTAXIS

(Voir : Appareil circulatoire, Hémostatiques).

LARYNGITES AIGÜES, CHRONIQUES

Acobella.
Adénoseptyl.
Adrénargol.
Ampho-Tablettes Ronchèse
Antigrippine Midy.
Arcanan.
Asthmo-Actine.
Balmiga.
Biolactyl Fournier.
Boréol.
Bronchoforme.
Capsules Kuchner au Mé-
captol.
Cataplasmes du D^r Lelièvre.
Citrolargol.
Cocaine Midy.
Coderax.
Codoforme.
Créositoires.
Créosote soluble Vacheron.
Curiode.
Curiode arsenié.
Dragées Bengué au Men-
thol.
Édistol.
Euphon.
Formint Merminod.
Fornose.
Galform Lambiotte.
Galliodine.
Gatercodéine Domergue.
Gernal.

Glottyl.
Glyco-M.
Glyco-Thymoline.
Goménol.
Gosiérine Dalloz.
Gouttes Daynoc.
Gouttes Nican.
Gouttes Pilka.
Granulés des Vosges.
Guttoléol.
Hyol.
Infangyl Carlier.
Inhalation-Gargarisme Vo-
caldop.
Inhalation Lancosme.
Inhalol.
Inhalone.
Inhalo-Sel.
Inhaloxyl.
Iodex.
Léniforme.
Mégathion Oliviéro.
Miroxyl.
Mucosodine.
Muronès du D^r Robert
Jacques.
Narcyl.
Nasargine.
Nasobore.
Néol.
Néo-Physiosthénine. —
Physiosthénine.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

LARYNGITES AIGÜES, CHRONIQUES

Néopulmine.
Oéréliode.
Papier iodogène Eymonnet.
Pastilles M. B. C.
Pâte Mireille.
Pérubore.
Pharyngaseptyl.
Pilules Bronchotoniques
Arco.
Pulmodion.
Quinthéryl.
Réstyl.
Révulsif liquide Boudin.
Révulsif Milko.
Révulsif Procipha.
Révulsoplasme.
Salyptol Narty.
Sédorhinol.
Séphydine.
Sinaseptic.

Sinuzyl.
Sirop Brahma.
Sirop de créosote Vacheron.
Sirop de Sirtal.
Sirop Phéniqué Vial.
Sirop Vacheron au Galacol.
Stovaïne.
Sulfoléine du D^r Rozet.
Sulfo-Thiorine.
Sulfureux Pouillet.
Terpine granulée Baron.
Thiorine.
Thymo-Menthol Eupnique
Belhomme.
Toussyl.
Valthène.
Vaso-Rhinol (simple et mentholé).
Vocaldop.
Zaryl.

LARYNGITE STRIDULEUSE

Cataplasme du D^r Lelièvre.
Fornose.
Gouttes Malone.
Infangyl Carlier.

Kidoline.
Lobéline Sandoz.
Révulsoplasme.
Sédoneurol Dehaussy.

OTITES — MASTOÏDITES

Amborhinol.
Ampho-vaccins Ronchèse.
Anaquintine Lescène.
Anexol.
Aniodol.
Antigénines.
Antipiol.
Argybil.
Bacté-Phages.
Boricine Meissonnier.
Cachets du D^r Boveil.
Cibalgine.
Citrolargol.
Dermo-Stalys du D^r Wagon.
Édistol.
Ektogan Bocquillon.
Ercérhinol.
Filtrat Inosepta.
Fornose.
Guttoléol.
Immunizols Grémy.
Kydalose.
Lysaxins L. M. L.

Mucosodine.
Nasargine.
Naso-Sulfolarsan.
Nazinette.
Néo-Physiosthénine. —
Physiosthénine.
Oéréliode.
Orargol Amicros.
Otalgol.
Probios.
Pyréthane.
Rhinaspir.
Sédorhinol.
Séphydine.
Solution huileuse au Nestosyl.
Terpoxyl externe.
Ultra-Violets.
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Vaccins Ronchèse —
Ampho-Vaccins.
Vaso-Rhinol (simple et mentholé).

OTITES — MASTOÏDITES

Véganine.
Véralgine.

Vitargyl.

OZÈNE

Acécosex.
Acécoline.
Anexol.
Anozyl.
Antipiol.
Argion.
Argybil.
Arhine Lambiotte.
Biolactyl Fournier.
Boricine Meissonnier.
Bulgarine Thépenier.
Cimatryl.
Cortiode.
Ektogan Bocquillon.
Fornose.
Goménol.
Inhalation Lancosme.
Kydalose.
Mucosodine.

Naso-Sulfolarsan.
Nazinette.
Probios.
Rhinaspir.
Rhinosluine.
Rhino-Liposeptine.
Séphydine.
Sinuzyl.
Sulfo-Thiorine.
Sulfureux Pouillet.
Terpoxyl externe.
Thiorine.
Vaccinothérapie atoxique
Cépède.
Vaccins intra-dermiques et
Gelées Vaccins ivago de
L. Goldenberg.
Vaccins Sténé.
Zaryl.

PHARYNGITES AIGÜES

Adénoseptyl.
Amborhinol.
Ampho-Tablettes Ronchèse.
Antigrippine Midy.
Arcanan.
Argybil.
Arhine Lambiotte.
Bacté-Phages.
Balmiga.
Boréol.
Camphydryl Robin.
Citrolargol.
Cocaïne Midy.
Collubleu.
Dentoline.
Dragées Bengué au menthol.
Édistol.
Ercérhinol.
Euphon.
Formint Merminod.
Fornose.
Galform Lambiotte.
Galliodine.
Gaterccéine Domergue.
Gernal.
Glyco-M.
Glyco-Thymoline.

Gobérol.
Goménol.
Gosierine Dalloz.
Gouttes Daynoc.
Granulés des Vosges.
Guttoléol.
HyoI.
Immunizols Grémy.
Inhalation-Gargarisme Vo-
caldop.
Inhalation Lancosme.
Inhalol.
Inhalone.
Inhale-Sel.
Inhaloxyl.
Inolène.
Léniforme.
Nasargine.
Naso-Sulfolarsan.
Nazinette.
Néo-Chloral Nau.
Néol.
Néo-Physiosthénine.—
Physiosthénine
Oéréliode.
Oxymenthol Perraudin.
Pastilles M. B. C.
Pâte Mireille.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

PHARYNGITES AIGÜES

Pérubore.	Terpine granulée Baron.
Pharyngaseptyl.	Terpoxyl externe.
Phosorine.	Thymo-Menthol eupnique
Pulvéol.	Belhomme.
RévuIsoplasme.	Tubérol.
Rhinofluine.	Vaccins Sténé.
Rhino-Liposeptine.	Vaclydun.
Rhino-Vaclydun Corbière.	Vaso-Rhinol adrénaIsé.
Scuroforme.	Vaso-Rhinol (simple et
Séphydine.	mentholé).
Sérum OIiviero.	Vocaldop.
Stovaine.	Zaryl.
Sulfoléine du D ^r Rozet.	

RHINO-PHARYNGITES CHRONIQUES

Acatar.	Oériode.
AdrénaIine Invar.	Oxymenthol Perraudin.
Adrénine.	Pastilles M. B. C.
Amborhinol.	Pâte Mireille.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Pharyngaseptyl.
Argybil.	RévuIsoplasme.
Arhine Lambiotte.	Rhinofluine.
Bacté-Phages.	Rhino-Liposeptine.
Balmiga.	Rhino-Vaclydun Corbière.
Biolactyl Fournier.	Sanex-Inhalant.
Boréol.	Séphydine.
Brumarsyl.	Stovédrine.
Cocaïne Midy.	Sulfa.
Dragées Bengué au Men-	Sulfoidol Robin.
thol.	Sulfoléine du D ^r Rozet.
Edistol.	Sulfo-Thiorine.
Entéro-antigènes.	Sulfureux Pouillet.
Euphon.	Sulfurion.
Fornose.	Sulfuryl Monal.
Galform Lambiotte.	Terpoxyl externe.
Galliodine.	Thiorine.
Goménol.	Vaccins Ronchèse. — Am-
Gosiérine Dalloz.	pho-Vaccins.
Immunizols Grémy.	Vaclydun.
Inhalation-Gargarisme Vo-	Vaso-Rhinol adrénaIsé.
caldop.	Vaso-Rhinol simple et men-
Inhaloxyl.	tholé.
Marinol.	Yaourtine.
Néo-Physiosthénine. —	Zaryl.
Physiosthénine.	

SINUSITES

AdrénaIgol.	Aniodol.
Amborhinol.	Antigénines.
Ampho-Vaccins Ronchèse.	Antipiol.
Anaquentine Lescène.	Argybil.
Anexol.	Arhine Lambiotte.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. T. S.

SINUSITES

Bacté-Phages.
Balmiga.
Biolaetyl Fournier.
Boréol.
Bulgarine Thépenier.
Cibalgine.
Citrolargol.
Colloixols.
Édistol.
Ektogan Bocquillon.
Éphédrine naturelle Béral.
Ercérhinol.
Essoforme.
Fornose.
Fosyls Carron.
Glyco-Thymoline.
Goménol.
Guttoléol.
Immunizols Grémy.
Inhalol.
Iphalone.
Inhalo-Sel.
Inhaloxyl.
Kydalose.
Léniforme.
Mucosodine.
Nasargine.
Nasobore.

Naso-Sulfolarsan.
Nazinette.
Néo-Physiosthénine. —
Physiosthénine.
Orargol Amicros.
Pérubore.
Pharyngaseptyl.
Problos.
Pulvéol.
Pyréthane.
Rhinaspir.
Rhino-Liposeptine.
Salantale.
Sanex-Inhalant.
Séphydine.
Sédorhinol.
Sinuzyl.
Stovédrine.
Terpoxyl externe.
Thymo-Menthol Eupnique
Belhomme.
Vaccins Ronchèse Ampho-
Vaccins.
Vaso-Rhinol (simple et men-
tholé).
Véganine.
Vitargyl.
Zaryl.

VÉGÉTATIONS ADÉNOÏDES — ADÉNOÏDITES

Adénoseptyl.
Amborhinol.
Anaquintine Lescène.
Anexol.
Aniodol.
Argybil.
Aristargol.
Baume Iki.
Citrolargol.
Collubleu.
Curlode.
Curlode arsenié.
Dicaliode.
Édistol.
Ercérhinol.
Glyco-M.
Glyco-Thymoline.
Goménol.
Guttoléol.
I. A. M.
Iodométine.

Kidoline.
Marinol.
Morrhualène Gautier.
Nasargine.
Naso-Sulfolarsan.
Nazinette.
Opocalcium irradié du
D^r Guersant.
Phosorine.
Rhinodrops Béral.
Rhino-Vaclydun Corbière.
Sédorhinol.
Sulfo-Thiorine.
Thiorine.
Tubérol.
Uroiodine.
Vaclydun.
Vaso-Rhinol adréna-lisé.
Vaso-Rhinol simple et men-
tholé.
Vitargyl.

RADIOGRAPHIE.

Diagnothorine.
Forlod.
Gélobarine.

Lipiodol Lafay.
Radiopaque Heudebert.
Radiotétrane Gérard.

STOMATOLOGIE.

Ampho-Tablettes Ronchèse.
Boricine Meissonnier.
Chloraseptine Optima.
Clonazone Daufresne.
Coaltar Saponiné Le Beuf.
Collubleu.
Dentoline.
Dentoryl.
Dragées Bengué au Menthol.
Elzevir Dentition.
Fluosalyl Beaugourdon.
Glyco-Thymoline.
Goménol.
Gosiérine Dalloz.
Gouttes Daynoc.
Iodosan Zambeletti.
Lait de magnésie Phillips.
Larocaine Roche.
Mésoforme.

Néo-Chloral Nau.
Néol.
Pastilles M. B.C.
Percaïne Ciba.
Pharyngaseptyl.
Probios.
Salasényl (poudre).
Sanogyl.
Sanoram.
Scuroforme.
Séphydine.
Septicémine Cortial.
Septométrol Vély.
Solution huileuse de Nes-
tosyl.
Stovaine.
Sulfarsénol.
Terpoxyl externe.
Tochlorine.

SYPHILIS.

PRÉVENTIFS

Préventyl.
Épicral.

Salvatyl.

TRAITEMENT ARSENICAL

Acétylarsan.
Arsénos-Solvant.
Arsylène Roche.
Brumarsyl.
Cacodyline Jammes.
Crescogénol.
Élixir Spès du D^r Guiraud.
Galyl.
Hectine.
Myovarsyl.
Néoarsite.
Néo-Arsycodile.
Novarsénobenzol Billon.

Nucléarsitol Robin.
Phagosthyl.
Plurion Couturieux.
Prévarsyl.
Rhodarsan.
Rob Oberlin.
Sirop Morlas.
Stovarsol.
Sulfarsénol.
Suppositoires Corbière.
Tréparsol.
Trilues.
Uclarsyl.

SYPHILIS.

TRAITEMENT BISMUTHIQUE

Benzo-Bismuth Millot.	Néo-Trépol.
Biazan.	Olbia.
Bismhydral.	Oxymuth Saca.
Bismutartrol.	Quinimuthol Saca.
Bismuthion Couturieux.	Quinby.
Bismuthoidol.	Quinby soluble.
Bivatol.	Rubyl.
Granions.	Sol-Bi Fraisse.
Iodo-Bismuthate de Quinine Fraisse.	Solmuth.
Iodo-Bismuth Ercé.	Trépobiur.
Lipobismuth Ercé.	Trépol.
Muthanol.	Trépoquinol.

TRAITEMENT IODURÉ

Ampoules Boissy iodure de potassium.	Iodone Robin.
Banikol.	Iodonésyl.
Brumarsyl.	Iodonucléol.
Carboiodure Fraudin.	Iodosan Zambelletti.
Collo-Iode Dubois.	Iodostarine Roche.
Curiode.	Iodo-Vitasine.
Curiode arsénié.	Iodural Novat.
Dépuriodure du Dr Roger Weber.	Iodurase.
Dicaliodure.	Iodure Pachaut.
Éranol.	Iodure Philippe.
Fucoiodine.	Iodures Souffron.
Globules Fumouze à l'iodure de Potassium.	Laminiodure.
Granions.	Lipiodol Lafay.
Ioda.	Lipoiodine Ciba.
Iodalose Galbrun.	Magiodyl.
Iodasclérine.	Néo-Riodine.
Iodassium.	Pilules Philippe.
Iode organique Boissy.	Rhocya Dyn.
Iodogénol Pépin.	Riodine.
Iodo-Maisine Globules.	Rob Cabanès.
	Rob Oberlin.
	Tiodine Cognet.
	Uroiodine.

TRAITEMENT MERCURIEL

Arquéritol Lesure.	Iodure Souffron.
Bismhydral.	Novargyre.
Colloïxols.	Novolug.
Cyanhermine.	Pilules Lémery.
Élixir Spès du Dr Guiraud.	Pilules Myosotis.
Épicral.	Rob Cabanès.
Gambéol.	Rob Oberlin.
Granions.	Salvé.
Hermophényl Lumière.	Sirop Morlas.
Huile grise Argentine S. F. E. A. T.	Supparyres du Dr Faucher.
Huile grise Ercé.	Suppositoires Hymel.

SYPHILIS.

TRAITEMENT MERCURIEL

Suppositoires Rocav.	Torigyre Lamo.
Suppositoires S. F. E. A. T.	

TRAITEMENT MIXTE

Bi-Iodural Novat.	Phosoforme.
Bismhydral.	Rob Cabanès.
Élixir Hymel.	Rob Oberlin.
Élixir Iodépuratif Pépin.	Salvé.
Épicral.	Sirop Nevra.
Hectargyre.	Toritane Lamo.
Ludin.	

SYSTÈME NERVEUX. T. G.

ANALGÉSQUES EXTERNES

Allocaïne Lumière.	Percaïnal Ciba.
Baume Adol.	Pommade au Nestosyl.
Baume Aroma.	Rhésal Vicario.
Baume Bengué.	Salène Ciba.
Baume Rhodia.	Salénal Ciba.
Bétul-Ol Midy.	Solution huileuse au Nes-
Dolysine.	tosyl.
Génomorphine.	Suppositoires au Nestosyl.
Iodex.	Suppositoires Pyrax.
Nisaméline Trouette-Per-	
ret.	

ANALGÉSQUES INTERNES

Aigue d'or.	Campho-Salyl Fournier.
Alcacyl.	Cérébrine Fournier.
Algocratine.	CibalGINE.
Algophagine.	Complexes Colloïdaux du
Allonal Roche.	D ^r Riquoir.
Allophagina.	Condurango Gmet.
Amphotonyl.	Crataegus Gmet.
Ampoules de Pantopon	Crédone Dehaussy.
Roche.	Crésopirine.
Ampoules Reipar.	Cryogénine Lumière.
Anégrine.	Curatine Brunet.
Antalgol Dalloz.	Curogène.
Antigrippine Midy.	Demalgon.
Ascéine.	Dialacétine Ciba.
Asciatine.	Didial Ciba.
Atophan Cruet.	Dolysine.
Atophanyl.	Emerson's Bromo-Seltzer.
Broméine Montagu.	Érythra Dyn.
Cachets du D ^r Boveil.	Génomorphine.

SYSTÈME NERVEUX. T. G.

ANALGÉSQUES INTERNES

Hémypnal Ciba.	Pyréthane.
Hexaranol.	Quinoidine Duriez.
Hypalène.	Quinsal.
Irénine Gonnon.	Rhoféine.
Mensuosédyl.	Salysérum.
Métophan.	Sambul.
Mitigans.	Sédatine Christlaens.
Nadolor.	Sirop du D ^r Gélinau.
Nalodine Logeais.	Somnicones Béral.
Neubryne.	Soporigène Delqué.
Neuréol.	Spécifique Béjean.
Névorol Rafey.	Stopral.
Névralgol Brossard.	Thébaïl.
Nisaméline Trouette-Perret.	Théinol.
Nopirine Vicario.	Thermocédone.
Optalidon Sandoz.	Véganine.
Pantopon Roche.	Véralgine.
Pavéron Dausse.	Viophan.
Potion Adol.	Vonol.

ANESTHÉSQUES GÉNÉRAUX

Balsoforme.	Rectanol.
-------------	-----------

ANESTHÉSQUES LOCAUX

Allocaïne Lumière.	Percaïne Ciba.
Chloréthyle Bengué.	Scurocaïne.
Delcaïne Roques.	Scuroforme.
Larocaïne Roche.	Solution huileuse au Nestosyl.
Nestosyl.	Stovaïne.
Panthésine Sandoz.	

ANESTHÉSQUES RACHIDIENS

Delcaïne Roques.	Scurocaïne.
Panthésine Sandoz.	Stovaïne.
Percaïne Ciba.	

ANTISPASMODIQUES

Adonal.	Benzylol.
Alepsal.	Borocalcyl Thévenot.
Amphosthène.	Borosodine Lumière.
Amphotonyl.	Comitol.
Ampoules Spasmalgine Roche.	Dragées Lumeval.
Anaural.	Eupavéryl Pachaut.
Angiosédine.	Freinospasmyl.
Anxiosédine.	Genhyoscyamine.
Apsophol.	Génoscopolamine.
Azigol Thévenot.	Gouttes Malone.
Belladénal Sandoz.	Grassyl Buisson.
Bellafoleline Sandoz.	Hyoscyamine Houdé.
Benzoflorine Julien.	Intrait de Valériane Dausse.

SYSTÈME NERVEUX. T. G.

ANTISPASMODIQUES

Lobéliane Laleuf.
Narcyl.
Néospasmodyl Vély.
Neurène.
Neuréol.
Neurobore.
Neurocalcium.
Névrosan.
Novo-Brol.
Passiflorine.
Passival.
Paxène.
Plexorine Vély.
Poudre anti-épileptique
Cassarini.
Pulsamone.
Rhodazil.
Sédosine.
Somnicones Béral.

Spasmalgine Roche.
Spasmine Jolly.
Spasmosédine.
Sympathyl.
Valbornine Rogier.
Valbrol.
Valédyl.
Valérianate Grignon.
Valérianate Pierlot.
Valériane Byla.
Valériane Gmet.
Valérianose Pachaut.
Valérianose Gigon.
Valérinodor Malmanche.
Valérium Paul Thibault.
Valénal Novalis.
Valéramyl.
Valovarine.
Véganine.

HYPNOTIQUES

Adonal.
Alepsal Genevrier.
Allonal Roche.
Amphotonyl.
Ampoules de Pantopon
Roche.
Anaural.
Angiosédine.
Anxiosédine.
Aphosal.
Asciatine.
Béatol.
Bromadyl Vicario.
Chloral bromuré du Dr Du-
bois.
Chloralosane.
Codérox.
Dial Ciba.
Dialacétine Ciba.
Didial Ciba.
Eusomnine Bélières.
Gardénal.
Hyoscyamine Houdé.
Hypalène.
Lobéliane Laleuf.
Magbromyl.
Neuréol.
Neurinase.
Neuroflorine.
Noctysédyl.
Novo-Brol.
Optalidon Sandoz.

Pantopon Roche.
Passiflorine.
Passival.
Pavéron Dausse.
Paxène.
Phénacodine.
Phosphobrom.
Polybromure Gonnon.
Rutonal.
Sandoptal.
Sédobrol Roche.
Sédormid Roche.
Sédosine.
Sirop du Dr Gelineau.
Somnifène Roche.
Somnicones.
Somnopol.
Somnothyryl.
Sonéryl.
Soporalose.
Soporigène Delqué.
Spasmine Jolly.
Thébaïl.
Valbornine Rogier.
Valédyl.
Valéramyl.
Valériflore.
Valérinodor Malmanche.
Valérium Paul Thibault.
Valéronal.
Valovarine.
Vérianne Buriat.

SYSTÈME NERVEUX. T. G.

MODIFICATEURS DU SYMPATHIQUE ET DU PARASYMPATHIQUE

Acécoline.	Euphytose.
Acécoline Yohimbine.	Fosfoxyl.
Adonal.	Freinix.
Adrénaline Invar.	Freinospasmyl.
Adrépine.	Génatropine.
Adréphédrine Béral.	Génésérine.
Alepsal Genevrier.	Glycocarpine.
Amphosthène	Gynergène Sandoz.
Amphotonyl.	Hypotan.
Ampoules Spasmalgine	Lobéliane Laleuf.
Roche.	Magnésium Hardy.
Anaclasine Ranson.	Magnésio-tubes Robinet.
Anaural.	Néospasmodyl Vély.
Androcalcion E.	Névrosan.
Androcalcion H.	Novo-Brol.
Angiosédine.	Plexorine Vély.
Ballotyl.	Pragmoline.
Belladénal Sandoz.	Pyréthane.
Bellafoleline Sandoz.	Rénaleptine.
Chlorumagène.	Sédosine.
Crataegus Gmet.	Spasmine Jolly.
Delhiase.	Sympathyl.
Ephédrine naturelle Béral.	Vagosédyl.
Eupavéryl.	Valénal Novalis.

NEURO-TONIQUES

Adrénoides Béral.	Chlorumagène.
Alxime.	Chophytol Rosa.
Ampolases.	Clupeyl.
Ampoules névrosthéniques	Composé Gmet.
Dausse.	Créagénol.
Androcalcion E.	Cyto-Magnésium Lindeux.
Androcalcion H.	Cytopan.
Antasthène.	Cyto-Sérum Corbière.
Antiphi.	Diastogène Dehaussy.
Ardogène.	Diastogène F. Dehaussy.
Arrhénal Adrian.	Doloma injectable.
Arrhénuclène Bergevin.	Dragées névrosthéniques
Arsécrinol.	Yse.
Arsi-Strychnal Longuet.	Dysthène.
Arsylène Roche.	Eufosyl « Vély ».
Biodynamine.	Fa-Ner-Val.
Biogénol Demasles.	Fer Bravais.
Bionéol.	Fer Ovarine Vitalis.
Biophorine Girard.	Ferocol.
Biosine Le Perdriel.	Fondant de Cola Dausse.
Blotrigon.	Fortossan irradié.
Cérébro-Lipase.	Forxol.
Cérébrosthénine Dalin.	Fosfoxyl Carron.
Céthocal du D ^r Lemay.	Fosyls Carron.
Chlormagnésium Fisch.	Gaurol.
Chloro-Magnésion.	Génergosine.

SYSTÈME NERVEUX. T. G.

NEURO-TONIQUES

Génosthéniques.	Nucléasine.
Génostrychnine.	Nucléophorine.
Glycérophosphate Dalloz.	Cénophos.
Glycérophosphate Robin.	Opocalcium du D ^r Guer-
Glykolaine Robin.	sant.
Glyphospher.	Opocalcium irradié du
Gouttes phosphosthéniques	D ^r Guersant.
Dausse.	Opocobalt.
Gouttes arsénosthéniques	Oponucyl irradié Trouette-
Dausse.	Perret.
Gouttes Halogènes du	Opothérapie du D ^r Frayssé.
D ^r Bern.	Ovo-Lécithine Billon.
Granulé Caresmel.	Phagosthyl.
Granules de Pantofort du	Phagosthyl Mangané.
D ^r Boveil.	Phosoforme.
Halocure irradié.	Phospharsol.
Hémotal.	Phosphate Vital de Jacque-
Hémotonine Buisson.	maire.
Histogénol.	Phosphatol vitaminé irra-
I. A. M.	dié.
Ionyl.	Phospho-Fluor Beynet.
Kola granulée Astier.	Phospholéose Demasles.
Kola Monavon.	Phosphopinal Juin.
Kreptol.	Phostyl.
Lécithine Vacheron.	Phytine Ciba.
Limol Churchill.	Phytogénine Ciba.
Lioncyl.	Phyto-Lécithine.
Lipocérébrine Chevreton.	Phytomarine.
Liqueur pepto-phosphori-	Phytosplénol Plé.
que Adrian.	Poliol Churchill.
Magnésio-Cacodyline	Rhomnol.
Janmes.	Sanguil.
Magnésium Hardy.	Sérum neuropsychique.
Magnéso-Tubes Robinet.	Sérum névrosthénique
Mangano-Phosphal Julien.	Fraisse.
Maté Douglas.	Spasmine Jolly.
Malt Wander ou Gloma.	Strychnal Longuet.
Néo-Rhomnol.	Strychnarsitol Robin.
Nergine Heudebert.	Synergyl Vadam.
Neuroplasma Fort.	Valériane Gmet.
Neuro-Plasma massif.	Végéphos.
Neuropol.	Vioxyl Mouneyrat.
Neurosine Prunier.	Vicéliase.
Neurotrol.	Visco-Sérum.
Neurotropol Byla.	Vitacalcine Moncour.
Névrosthénine Freyssinge.	Vitène.
Nucléarsitol Robin.	

SÉDATIFS

Acodros.	Allonal Roche.
Adonal.	Amphosthène.
Alepsal Genevrier.	Amphotonyl.

SYSTÈME NERVEUX. T. G.

SÉDATIFS

Ampoules de Pantopon Roche.	Optalidon Sandoz.
Anaural.	Pantopon Roche.
Angioséline.	Passiflorine.
Anxioséline.	Passival.
Anti-épileptique de Liège.	Pavéron Dausse.
Apsophol.	Paxène.
Ascéine.	Phosphobrom.
Azigol Thévenot	Plexorine Vély.
Béatol.	Polybromure Gonnon.
Belladénal Sandoz.	Pommade au Nestosyl.
Benzylol.	Poudre anti-épileptique Cassarini.
Borocalcyl Thévenot.	Rénovol.
Borosodine Lumière.	Rutonal.
Broméine Montagu.	Sédarsan.
Bromiase.	Sédatose.
Bromogénol Pépin.	Sédatuline.
Bromo-Maisine.	Sédobrol Roche.
Bromone Robin.	Sédol.
Bromovose.	Sédoneurol Dehaussy.
Bromures Souffron.	Sédosine.
Cachets du D ^r Boveil.	Sirop du D ^r Gélinau.
Cantéine Bouteille.	Sirop Myrianis.
Chloral bromuré du D ^r Du-bois.	Sirop Teyssèdre.
Cibalgine.	Solution huileuse au Nestosyl.
Comitol.	Somnicones.
Complextraits.	Somnopol.
Comprimés Kléos.	Somnothyrl.
Dial Ciba.	Soporalose.
Dialacétine Ciba.	Spasmine Jolly.
Didial Ciba.	Spasmoséline.
Dragées du D ^r Gélinau.	Stopral.
Dragées Lumeval.	Suppositoires au Nestosyl.
Eczéda.	Suppositoires Pyrax.
Eczosec.	Tablettes Hova.
Eusomnine Béllères.	Tartrate borico-potassique Pachaut.
Féminadène.	Thébaïl.
Gardénal.	Tribromure Gigon.
Génomorphine.	Valbornine Rogier.
Grassyl Buisson.	Valéramyl.
Hypalène.	Valérianate Gigon.
Intrait de Valériane Dausse	Valérianate Pierlot.
Kalmobrol.	Valériane Byla.
Lobéliane Laleuf.	Valériane Gmet.
Magbromyl.	Valériane Pachaut.
Neurène.	Valérianose Gigon.
Neuréal.	Valérillore.
Neurinase.	Valérinodor Malmanche.
Neurobore.	Valérium Paul Thibault.
Neurocalcium.	Valérobromine Legrand.
Neuroflorine.	Valéromenthol.
Névrosan.	Valéronal.
Novo-Brol.	

SYSTÈME NERVEUX. T. G.

SÉDATIFS

Valovosan.
Véganine.

Vériane Buriat.
Véronidia Buisson.

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

ALGIES — CÉPHALÉES — MIGRAINES NÉVRALGIES SCIATIQUES — NÉVRITES

Acodros.
Adonal.
Agocholine.
Aigue d'Or.
Alcacyl.
Alepsal Genevrier.
Algocratine.
Algophagine.
Allonal Roche.
Allophaquina.
Amphotonyl.
Ampoules Boissy d'Iodure
de Potassium.
Ampoules de Pantopon
Roche.
Ampoules Reipar.
Anaclasine Ranson.
Anapeptone Vassal.
Anégrine.
Antalgol Dalloz.
Antalgos Christiaens.
Antigrippe Midy.
Antisciatique P. Chambon.
Arsi-strychnal Longuet.
Ascéine.
Asciatine.
Atophan Cruet.
Atophanyl.
Atoquinol.
Bain Carré.
Bande de crêpe Velpeau.
Baume Aroma.
Baume Bengué.
Baume Ciba.
Baume Rhodia.
Bétal-Ol-Midy.
Biophorine.
Biophylactine M. G.
Broméine Montagu.
Bromiase.

Bromogénol Pépin.
Bromo-Maisine.
Bromone Robin.
Bromovose.
Bromures Souffron.
Cachets du D^r Bovell.
Camphro-Salyl Fraisse.
Cérébrine Fournier.
Chloral Bromuré du D^r Du-
bois.
Chloréthyle Bengué.
Cholécystine.
Chophytol-Rosa.
Cibalgine.
Colloïxols.
Complexes colloïdaux du
D^r Riquoir.
Comprimés Urbé.
Crédone Dehaussy.
Crésopirine.
Cryogénine Lumière.
Curatine Brunet.
Curogène.
Demalgon.
Dépuriode du D^r Roger
Weber.
Détensyl.
Dialacétine Ciba.
Dialyl.
Didial Ciba.
Dolysine.
Dragées Lumeval.
Embrocation Salas.
Emerson's Bromo Seltzer.
Entéro-antigènes.
Erythra Dyn.
Euphoryl.
Eusomnine Bélières.
Fosfoxyll Carron.
Freinoaspmyl.

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

ALGIES — CÉPHALÉES — MIGRAINES NÉVRALGIES SCIATIQUES — NÉVRITES

Génomorphine.
Glykolaïne Robin.
Glyphospher.
Granions.
Gui Byla.
Gynergène Sandoz.
Hexaranol.
Hypalène.
Infra-Rouges.
Iodex.
Iodinfectol Jammes.
Iodométine.
Iosorbine.
Irénine Gonnon.
Ixium Buisson.
Lipiodol Lafay.
Lysarthrol.
Magbromyl.
Mesothine.
Mensuosédyl
Métophan.
Mitigans.
Myoden.
Nadolor.
Nalodine Logeais.
Neubryne.
Neurène.
Neuréol.
Névorol Rafey.
Névrалgol Brossard.
Nisaméline Trouette-Perret.
Noctisédy.
Nopirine Vicario.
Normatensol Bouret
Novo-Brol.
Optalidon Sandoz.
Papier iodogène Eymonnet.
Pavéron Dausse.
Peptamine.
Peptogil A et L.
Peptonal.
Peptone Vassal.
Percaïne.
Phylactone Byla.
Phytinate de Quinine Ciba.
Pilules V. E. Doumer.
Pipérazine Midy.
Plasma de Quinton.
Polypeptonal.
Potion Adol.
Prézymase.

Protiodyne.
Protiodyne dragées.
Pyréthane.
Quinoldine Duriez.
Quinsal.
Révulsif liquide Boudin
Révulsif Procipha.
Rhésal Vicario.
Rhoféine.
Salène Ciba.
Salénal Ciba.
Salicéral.
Salysérum
Sambul.
Sédatine Christiaens.
Sédatuline.
Sédobrol Roche.
Sédoneurol Dehaussy.
Sel hépatique U. N. Arquevaux.
Sirop du Dr Gelineau.
Somnicones Béral.
Spasalgine Roche.
Spécifique Béjean.
Stopral.
Strychnal Longuet.
Suppositoires Pyrax.
Théinol.
Thermocédone.
Thorium Rhemda.
Thyroidine et Radiophorine Gory.
Triseptine.
Tristyl Noyon.
Ulmarène Gigon.
Uricémine.
Vagosédyl.
Valéramyl.
Valérianate Grigon.
Valérianate Pierlot.
Valériane Byla.
Valériane Gmet.
Valérianose Gigon.
Valérium Paul Thibault.
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.
Valovarine.
Valovosan.
Vaso-Neurine.
Véganine.
Veinoposine.
Véralgine

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

ALGIES — CÉPHALÉES — MIGRAINES NÉVRALGIES SCIATIQUES — NÉVRITES

Vésicatoire rose Beslier. | Vonol.
Viophan.

CONGESTION CÉRÉBRALE — HÉMORRAGIE CÉRÉBRALE — RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL HÉMIPLÉGIE

Acécoline.	Détensyl.
Ampoules de Sécacornine Roche.	Diurétique Gmet.
Antonal.	Pragmoline.
Artérase.	RévuIsoplasme.
Artériou Vincardi.	Sécacornine Roche.
Artério-Veinine.	Silguine.
Cuscutine Foulou.	Silicyl.
Dépuriole du Dr Roger Weber.	Tiodine Cognet.

ENCÉPHALITE AIQUÉ SÉQUELLES D'ENCÉPHALITE

Acécoline.	Génoscopalamine.
Adonal.	Hyoscyamine Houde.
Alepsal Genevrier.	Naïodine.
Antasthène.	Néo-Physiosthénine. — Phy- siosthénine.
Belladénal Sandoz.	Pyoformine.
Bellafoline Sandoz.	Pyréthane.
Benzoflorine Julien.	Septicémine Cortial.
Ephédrine naturelle Béral.	Uroformine Gobey.
Eranol.	

GOITRE EXOPHTALMIQUE

Acécoline.	Iodométine.
Ampoules Boissy (à l'iodure d'éthyle).	Iodone Robin.
Angioxyl du Dr Roussel.	Iodonucléol.
Basedowine.	Iodo-Vitasine.
Baume Iki.	Laminiole.
Belladénal.	Lipiodol Lafay.
Bellafoline Sandoz.	Lipiodine Ciba.
Benzoflorine.	Magbromyl.
Cardiosthénine.	Néo-Riodine.
Cratégine.	Neurène.
Eranol.	Neuréol.
Glycocarpine.	Neurinase.
Gynérgène Sandoz.	Novo-Brol.
Héματοéthéroïdine.	Opothérapie Bouty.
Iodascérine.	Opothérapie Byla associée.
Iodassium.	Paxène.
Iode organique Boissy.	Pilules Philippe.
Iodogénol Pépin.	Rhocya Dyn.
Iodo-Malsine Globules.	Riodine.
	Sédoneurol Dehaussy.

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

GOITRE EXOPHTALMIQUE

Somnifène Roche.

Somnothyrid.

Spasmine Jolly.

Vénecne.

Vérilane Buriat.

HYSTÉRIE — ÉPILEPSIE — CHORÉE

Adonal.

Alepsal Genevriér.

Allonal Roche.

Amphosthène.

Amphotonyl.

Ampoules Boissy.

Ampoules de Spasmalgine
Roche.

Anaural.

Anglosédine.

Anti-épileptique de Liège.

Anxiosédine.

Arsylène Roche.

Azigol Thévenot.

Baumolacpinine.

Béatol.

Belladénal Sandoz.

Bellafoline Sandoz.

Benzoflorine Julien.

Biosine Le Perdriel.

Borocalcyl Thévenot.

Borosodine Lumière.

Broméine Montagu.

Bromiase.

Bromogénol Pépin.

Bromo-Malsine.

Bromone Robin.

Bromovose.

Bromures Souffron.

Chloral bromuré du Dr Du-
bois.

Comitrol.

Complextraits.

Comprimés Kléos.

Dialacétine Ciba.

Dragées du Dr Gelineau.

Eusonnine Bélières.

Freinospasmyl.

Gardénal.

Genhyoscyamine.

Glyphospher.

Granulé Caresmel.

Intrait de Valériane Dausse

Kalmobrol.

Lipocérébrine.

Lobéliane Laleuf.

Magbromyl.

Neurène.

Neuréol.

Neurinase.

Neurobore.

Neurocalcium.

Neuroflorine.

Neurolipase.

Novo-Brol.

Paxène.

Phosphobrom.

Plexorine Vély.

Polybromure Gonnon.

Poudre anti-épileptique
Cassarini.

Pulsamone.

Rutonal.

Sédarsan.

Sédatose.

Sédatuline.

Sédobrol.

Sédoneurol Dehaussy.

Sédosine.

Sirop du Dr Gelineau.

Sirop Myrianis.

Somnicones Béral.

Somnifène Roche.

Somnopol.

Somnothyrid.

Soporalse.

Spasmalgine Roche.

Spasmine Jolly.

Suppositoires Pyrax.

Tablettes Hova.

Tartrate borico-potassique
Pachaut.

Thyroidine et Radiophorine
Gory.

Tribromure Gigon.

Valbromine Rogier.

Valbrol.

Valédyl.

Valénal Novalis.

Valéramyl.

Valérianate Grignon.

Valérianate Pierlot.

Valériane Byla.

Valériane Gmet.

Valériane Pachaut.

Valérianose Gigon.

Valériflore.

Valérinodor Malmanche.

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

HYSTÉRIE — ÉPILEPSIE — CHORÉE

Valérium Paul Thibault.
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.
Valéronal.
Vanadarsine Guillaumin.

Valovarine.
Valovosan.
Vérianne Buriat.
Véronidia Buisson.
Viscum Zyma.

INSOMNIES — NERVOSISME

Adonal.
Alepsal Genevrier.
Allonal Roche.
Amphosthène.
Amphotonyl.
Ampoules de Pantopon
Roche.
Anaclasine Ranson.
Anaural.
Angiosédine.
Anti-épileptique de Liège.
Anxiosédine.
Aphosal.
Asclatine.
Bain Carré.
Ballotyl.
Baumolacpinine.
Béatol.
Belladénal Sandoz.
Bellafoline Sandoz.
Benzoflorine Julien.
Borocalcyl Thévenot.
Borosodine Lumière.
Boules Quiès.
Bromadyl Vicario.
Broméine Montagu.
Bromiase.
Bromogénol Pépin.
Bromo-Malsine.
Bromone Robin.
Bromovose.
Bromures Souffron.
Cachets du Dr Boveil.
Cantéine Bouteille.
Chloral bromuré du Dr Du-
bois.
Chloralosane.
Codérox.
Complextraits.
Crataegus Gmet.
Crésopirine.
Dialacétine Ciba.
Dial Ciba.
Didial Ciba.
Dragées du Dr Gelineau.
Dragées Gmet.

Dragées Lumeval.
Dragées Névrosthéniques
Yse.
Dysthène.
Euphytose.
Eusomnine Bélières.
Féminadène.
Fosfoxyll Carron.
Fosyls Carron.
Gardénal.
Génomorphine.
Gobillettes Hypnos.
Granulé Caresmel.
Grassyl Buisson.
Hématoéthéroïdine.
Hypalène
Intrait de Valériane Dausse
Kalmobrol.
Lipocérébrine Chevreton.
Lobéliane Laleuf.
Magbromyl.
Néospasmodyl Vély.
Neurène.
Neuréol.
Neurinase.
Neurobore.
Neurocalcium.
Neuroflorine.
Névrosan.
Noctisédyll.
Novo-Brol.
Optalidon Sandoz.
Passiflorine.
Passival.
Pavéron Dausse.
Paxène.
Phénacodine.
Phosphobrom.
Phytine Ciba.
Plexorine Vély.
Polybromure Gonnon.
Poudre anti-épileptique
Cassarini.
Pulsamone.
Rutonal.
Sandoptal.

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

INSOMNIES — NERVOSISME

Sédarsan.	Thébaïl.
Sédatuline.	Tribromure Gigon.
Sédobrol Roche.	Vagosédyl.
Sédol.	Valbornine Rogier.
Sédoneurol Dehaussy.	Valbrol.
Sédormid Roche.	Valédyl.
Sédosine.	Valénal Novalis.
Sirop du D ^r Gelineau.	Valéramyl.
Sirop Myrrianis.	Valérianate Grignon.
Sirop Teyssèdre.	Valérianate Pierlot.
Somnicones Béral.	Valériane Byla.
Somnifène Roche.	Valériane Gmet.
Somnopol.	Valériane Pachaut.
Somnothyrid.	Valérianose Gigon.
Sonéryl.	Valériflore.
Soporalose.	Valérinodor Malmanche.
Soporigène Delqué.	Valérium Paul Thibault.
Spasalgine Roche.	Valérobromine Legrand.
Spasmine Jolly.	Valéromenthol.
Suppositoires Pyrax.	Valéronal.
Sympathyl.	Valovarine.
Tablettes Hova.	Véganine.
Tartrate Borico-potassique	Vériane Buriat.
Pachaut.	Véronidia Buisson.

MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE

Goménol.	Mycolysine du D ^r Doyen.
Institut Pasteur Sérums.	Pyoformine.
Institut Pasteur Vaccins.	Pyréthane.
Métaformine.	Somnicones Béral.

MÉNINGITE TUBERCULEUSE

Colloidogénine du D ^r Bayle.	Pneumo-Lipase.
Colloïxols.	Pyoformine.
Créositoires.	Somnicones Béral.

MIGRAINE OPHTALMIQUE

Acécoline.	Baume Bengué.
Adonal.	Cachets du D ^r Boveil.
Alepsal Genevrier.	Cibalgine.
Algocratine.	Crésopirine.
Allonal Roche.	Curatine Brunet.
Allophaguina.	Pyréthane.
Ascème.	Rhinofluine.
Baume Adol.	Véralgine.
Baume Aroma.	

NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

Adonal.	Allonal Roche.
Alepsal Genevrier.	Amphosthène.
Alexime.	Amphotonyl.

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

Ampolases.	Composé Gmet.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Créagénol.
Ampoules Névrosthéniques Dausse.	Cytomagnésium Lindeux.
Anaural.	Cytopan.
Androcalcion H.	Cyto-Sérum Corbière.
Androcalcion E.	Demalgon.
Angiosédine.	Détensyl.
Angioxyl du D ^r Roussel.	Dialacétine Ciba.
Antasthène.	Dial Ciba.
Anti-épileptique de Liège.	Didial Ciba.
Antiphi.	Diastogène Dehaussy.
Anxiosédine.	Diastogène F. Dehaussy.
Ardogène.	Doloma injectable.
Arrhénal Adrian.	Dragées du D ^r Gelineau.
Arrhénuclène Bergevin.	Dragées Lumeval.
Arsécrinol.	Dragées Névrosthéniques Yse.
Arsi-Strychnal Longuet.	Dysthène.
Arsylène Roche.	Entéro-antigènes.
Baumolacpinine.	Eufosfyl Vély.
Béatol.	Euphytose.
Belladéal Sandoz.	Eusomnine Bélières.
Bellafoline Sandoz.	Extrait de céréales Adrian.
Benzoflorine Julien.	Fa-Ner-Val.
Biodynamine.	Fer Bravais.
Biogénol Demasles.	Fer Ovarine Vitalis.
Bionéol.	Ferocol.
Biophorine Girard.	Fortossan irradié.
Biosine Le Perdriel.	Forxol.
Biotrignon.	Fosfoxyl Carron.
Borocalcyl Thévenot.	Fosyls Carron.
Borosodine Lumière.	Gardénal.
Broméine Montagu.	Gaurol.
Bromiase.	Génergosine.
Bromogénol Pépin.	Génomorphine.
Bromo-Maisine.	Génosthéniques.
Bromone Robin.	Génostrychnine.
Bromovose.	Glycérophosphate Dalloz.
Bromures Souffron.	Glycérophosphate Robin.
Cantéine Bouteille.	Glykolaine Robin.
Carbolactyl simple.	Glyphospher.
Cérébro-Lipase.	Gouttes phosphosthéniques Dausse.
Cérébrosthénine Dalin.	Gouttes arsénosthéniques Dausse.
Céthocal du D ^r Lemay.	Gouttes halogènes du D ^r Bern.
Chloral bromuré du D ^r Du-bois.	Granulé Caremel.
Chloralosalane.	Granules de Pantofort du D ^r Boveil.
Chlormagnésium Fisch.	Grassyl Buisson.
Chloro-Magnésion.	Halocure irradié.
Chlorumagène.	Hemotal.
Clupéyl.	Hémotonine Buisson.
Comitiot.	
Complextraits.	

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

Histogénol.
Hypalène.
I. A. M.
Intrait de Valériane Dausse
Ionyl.
Ixium Buisson.
Kalmobrol.
Kola granulée Astier.
Kola Monavon.
Kreptol.
Lacpinine.
Lécithine Vacheron.
Limol Churchill.
Lioncyl.
Lipocérébrine Chevreton.
Liposplénine du D^r Groc.
Liqueur pepto-phospho-
rique Adrian.
Lobéliane Laleuf.
Magbromyl.
Magnésio-Cacodyline
Jammes.
Magnésium Hardy.
Magnésio-tubes Robinet.
Mancobène.
Mangano-Phosphal Julien.
Maté Douglas.
Malt Wander ou Gloma.
Musculosine Byla.
Néo-Neurosine Prunier.
Néo-Rhomnol.
Néospasmodyl Vély.
Néotrophène.
Nérgine Heudebert.
Neurène.
Neuréol.
Neurinase.
Neurobore.
Neurocalcium.
Neuroflorine.
Neurolipase.
Neuroplasma Fort.
Neuroplasma Massif.
Neuropol.
Neurosine Prunier.
Neurotrol.
Neurotrophol Byla.
Névrosan.
Névrosthénine Freyssinge.
Noctisédy.
Novo-Brol.
Nucléarsitol Robin.
Nucléasine.
Nucléophorine.

Cenophos.
Opocalcium du D^r Guer-
sant.
Opocalcium irradié du
D^r Guersant.
Opocobalt.
Oponuclyl irradié Trouette-
Perret.
Opophytol.
Opothérapie du D^r Fraysse.
Orchitine Optima.
Orthogénol.
Ostéoglandulol.
Ovo-Lécithine Billon.
Panglandine Couturieux.
Passiflorine.
Passival.
Pavéron Dausse.
Paxène.
Pepto-Kola Robin.
Persodine Lumière.
Phagocytine Bureau.
Phagosthyl.
Phagosthyl Mangané.
Phosoforme.
Phospharsol.
Phosphates du D^r Pinard.
Phosphate Vital de Jacque-
maire.
Phosphate Vitaminé irradié.
Phosphobrom.
Phospho-Fluor Beynet.
Phospholéose Demasles.
Phosphopinal Juin.
Phostyl.
Phytine Ciba.
Phytogénine Byla.
Phyto-Lécithine.
Phytomarine.
Phytosplénol Plé.
Plasma de Quinton.
Plexorine Vély.
Polliol Churchill.
Polybromure Gonnon.
Poudre anti-épileptique
Cassarini.
Protonic.
Pulsamone.
Rhomnol.
Rutonal.
Sanguil.
Sédarsan.
Sédatuline.
Sédobrol Roche.

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

NEURASTHÉNIE — NÉVROSE D'ANGOISSE

Sédoneurol Dehaussy.
Sédormid Roche.
Sédosine.
Sérum Neuropsychique.
Sérum Névrosthénique.
Fraise.
Somnifène Roche.
Somnicones Béral.
Somnopol.
Somnothyrl.
Soporalse.
Spasmalgine Roche.
Spasmine Jolly.
Splénomanganol.
Strychnal Longuet.
Strychnarsitol Robin.
Sympathyl.
Synergyl Vadam.
Tablettes Hova.
Taburol Monal.
Thalassotonine Vadam.
Thébaïl.
Thyroïdine et Radiopho-
rine Gory.
Tonikéine Chevreton.
Tonique Gonnon.
Tonique Roche.
Total-Tonic.
Tribromure Gigon.
Ultravitamine 4.
Vagosédyl.

Valbornine Rogier.
Valbrol.
Valédyl.
Valénal Novalis.
Valéramyl.
Valérianate Grignon.
Valérianate Pierlot.
Valériane Byla.
Valériane Gmet.
Valériane Pachaut.
Valérianose Gigon.
Valériflore.
Valérinodor Malmanche.
Valérium Paul Thibault.
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.
Valéronal.
Valovarine.
Valovosan.
Vanadarsine Gulllaumin.
Véganine.
Végéphos.
Vénécine.
Vériane Buriat.
Véronidia Buisson.
Vicéliase.
Vioxyl Mouneyrat.
Visco-Sérum.
Vitacalcine Moncour.
Vitène.
Zomo-Musculosine Byla.

PARALYSIE AGITANTE

Arsylène Roche.
Belladéal Sandoz.
Bellafoline Sandoz.
Chloro-Magnésion.
Comitiol.
Delbiase.

Endopancrine
Génoscopolamine.
Naiodine.
Sédol.
Sédoneurol Dehaussy.
Valériane Gmet.

PARALYSIES PÉRIPHÉRIQUES

Arsi-Strychnal Longuet.
Dépuriode du Dr Roger
Weber.
Génostrychnine.

Gouttes arsénosténiques
Dausse.
Strychnal Longuet.

TABÈS

(Voir : Syphilis.)

Acécoline.
Ampoules Boissy.
Banikol.

Bismuthion Couturieux.
Cibalgine.
Crédone Dehaussy.

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

TABÈS

(Voir: Syphilis.)

Curatine Brunet.	Pyréthane.
Dépuriodé du Dr Roger Weber.	Rhocya Dyn.
Didial Ciba.	Sédol.
Erythra Dyn.	Somnicones Béral.
Gambéol.	Soporalose.
	Tiodiné Cognet.

TICS — CONVULSIONS — DÉLIRES

Adonal.	Kalmobrol.
Alepsal Genevrier.	Lipocérébrine Chevreton
Allonal Roche.	Lobéliane Laleuf.
Amphotonyl.	Magbromyl.
Ampoules de Pantopon Roche.	Ncurène.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Neuréol.
Anaural.	Neurinase.
Anglosédine.	Neurobore.
Anti-épileptique de Liège.	Neurocalcium.
Azigol Thévenot.	Neuroflorine.
Baumolacpinine.	Novo-Brol.
Béatol.	Pavéron Dausse.
Belladénal Sandoz.	Paxène.
Benzoflorine Julien.	Phosphobrom.
Benzylol.	Plexorine Vély.
Biosine Le Perdriel.	Polybromure Gonnon.
Borocalcyl Thévenot.	Poudre anti-épileptique Cas-sarini.
Borosodine Lumière.	Pulsamone.
Bromiase.	Pyréthane.
Bromogénol Pépin.	Rutonal.
Bromo-Malsine.	Sédarsan.
Bromone Robin.	Sédatuline.
Bromovose.	Sédobrol Roche.
Bromures Souffron.	Sédoneurol Dehaussy.
Chloral bromuré du Dr Du-bois.	Sédosine.
Comitrol.	Sirop Teyssèdre.
Complextraits.	Somnifène Roche.
Comprimés Kléos.	Somnopol.
Dialacétine Ciba.	Somnothyrid.
Dial Ciba.	Spasmalgine Roche.
Didial Ciba.	Spasmine Jolly.
Dragées du Dr Gélinau.	Suppositoires Pyrax.
Dragées Lumeval.	Tablettes Hova.
Épicral.	Tartrate borico-potassique Pachaut.
Eusomnine Bélières.	Thébaïl.
Gardenal.	Thyroidine et Radiopho-rine Gory.
Genhyosclamine.	Tribromure.
Génomorphine.	Valbornine Rogler.
Gouttes Malone.	Valbrol.
Intrait de Valériane Dausse	Valédyl.

SYSTÈME NERVEUX. T. S.

TICS — CONVULSIONS — DÉLIRES

Valénal Novallis.
Valéramyl.
Valérianate Grignon.
Valérianate Pierlot.
Valériane Byla.
Valériane Gmet.
Valériane Pachaut.
Valérianose Gigon.

Valériflore.
Valérinodor Malmanche.
Valérium Paul Thibault.
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.
Valéronal.
Vériane Buriat.
Véronidia Buisson.

TROUBLES VAGO-SYMPATHIQUES

Acécoline.
Acécoline Yohimbine.
Adonal.
Adrénaline Invar.
Adrénine.
Adréphédrine Béral.
Alepsal Genevrier.
Amphosthène.
Amphotonyl.
Ampoules de spasmalgine Roche.
Anaclasine Ranson.
Anaual.
Androcalcion H.
Androcalcion E.
Angiosédine.
Ballotyl.
Belladénal Sandoz.
Bellafofine Sandoz.
Benzylol.
Calcional.
Chlorumagène.
Crataegus Gmet.
Delbiase.
Ephédrine naturelle Béral.
Eupavéryl Pachaut.

Euphytose.
Fosfoxyl Carron.
Freinix Buisson.
Freinospasmyl.
Génatropine.
Génésérine.
Glycocarpine.
Gynergène Sandoz.
Hypotan.
Kalmobrol.
Lobéliane Laleuf.
Magnésium Hardy.
Magnésio-tubes Robinet.
Néospasmodyl Vély.
Novo-Brol.
Plexorine Vély.
Pragmoline.
Pyréthane.
Rénaleptine.
Sédosine.
Spasmine Jolly.
Sympathyl.
Theinol.
Vagosédyl.
Valénal Novallis.

TUBERCULOSE

AMAIGRISSEMENT

Adral.
Algatan.
Aliment Tinardon.
Amunine.
Angiolymphé du Dr Rous.
Ardogène.
Arrhéнал Adrian.
Arsécrinol.
Arséniode Buriat.
Arsi-Strychnal Longuet.

Arsycodile.
Arsylène Roche.
Ascoléine Rivier.
Bemax.
Benzylocalcium.
Biocalcose.
Biodynamine.
Biogénol Demasles.
Bioplasmyl.
Biotrigon.

TUBERCULOSE

AMAIGRISSEMENT

Cacodyline Jammes.
Carnine Lefrancq.
Clupeyl.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Créagénol.
Curiode Arsenié.
Cytobiase.
Cyto-Manganol Corbière.
Cytopan.
Cyto-Sérum Corbière.
Diases.
Diastogène Dehaussy.
Diastogène F. Dehaussy.
Extrait de Malt français
Déjardin.
Fénucine.
Fénugrène.
Foenugol.
Fosfoxyll Carron.
Globexine.
Fucus Gmet.
Gouttes arsénosthéniques
Dausse.
Hémo-Cyto Sérum.
Hémofer.
Hormocline.
Insuline-Buccale Fornet.
Insulyl du D^r Roussel.
Jemalt Wander.
Liposplénine du D^r Groc.
Malt Barley.

Malt français Déjardin (Ex-
trait de).
Mangarsenic.
Minergil.
Muronum du D^r Robert
Jacques.
Nucléasine.
Nuclhémose.
Opocalcium irradié du
D^r Guersant.
Opoferrine Vitaminée.
Oposérum.
Orthozomine.
Ozobiase.
Ozobiase Opothérapique.
Pancrinol du D^r Debat.
Phagosthyl Mangané.
Phosoforme.
Phosphates du D^r Pinard.
Phylla Dyn.
Phytine Ciba.
Réalphène Buisson.
Splénomanganol.
Sulf-Y.
Terpoxyll interne.
Total-Tonic.
Uvéphorine.
Viosten.
Vioxyll Mouneyrat.
Vitadoné.
Zimbyl.
Zomine.

ANTISEPTIQUES GÉNÉRAUX

Acatar.
Alcamfétol.
Algatan.
Allisatine « Sandoz ».
Allochrysine Lumière.
Aloysine.
Aniodol.
Antiphymique Vadam.
Azotyl.
Cachets « Roche » au Thio-
col.
Capsules Dartois.
Cholergine.
Collo-Iode Dubois.
Colloïxols.
Comprimés « Roche » de
Thiocol.
Créosal Dubois.
Créositoires

Créosote Soluble Vacheron
Curiode.
Curiode Arsenié.
Dicaliode.
Dioradin.
Énolode Lefebvre.
Éranol.
Eucalyptine Le Brun.
Goménol.
Gouttes Daynoc.
Granions.
Holaseptine.
Huile Gallina.
Ioda.
Iodalosé Galbrun.
Iodascérine.
Iodaseptine Cortiat.
Iodassium.
Iode organique Boissy.

TUBERCULOSE

ANTISEPTIQUES GÉNÉRAUX

Iodogénol Pepin.
Iodo-maisine (globules).
Iodométine.
Iodone Robin.
Iodonésyl.
Iodonucléol.
Iodo-Vitasine.
Laminiode.
Lipiodol Lafay.
Lipiodine Ciba.
Lita.
Mésothorium Buisson.
Métaformine.
Méthylarsinates Bouty.

Murones du D^r Robert
Jacques.
Néo-Riodine.
Oxyléine.
Panxylon.
Prévalidine.
Pulmosérum.
Rhocya Dyn.
Riodine.
Solution Pautauberge.
Triradol.
Uroiodine.
Zimbyl.

MÉDICATIONS LOCALES

Balmiga.
Benzoquinol.
Bronchodermine.
Créosoforme Lambiotte.
Eranol.
Eucalyptine Lebrun.

Goménol.
Révulsif Liquide Boudin.
Révulsoplasme.
Sinaseptic.
T. B. X. Métacrysine.
Ultra-Violet.

TONIQUES — RÉMINÉRALISANTS RÉCALCIFIANTS

Adrénaline Invar.
Adrénine.
Adrénocalcine.
Adrénoïdes Béral.
Alexime.
Algostérine Oliviéro.
Aliment Tinardon.
Amunine.
Amylodiastase Thépenier.
Angiolymphe du D^r Rous.
Antasthène.
Antiphi.
Ardogène.
Arrhénal Adrian.
Arsécrinol.
Arséniode Buriat.
Arsi-Strychnal Longuet.
Arsycodile.
Arsylène Roche.
Ascoléne Rivier.
Avantol.
Bactioxyne.
Beef Lavoix.
Bemax.
Benzylocalcium.
Biocalcose.
Biocéane.
Biodynamine.
Biogénol Demasles.

Bionéol.
Biophorine Girard.
Biosine Le Perdriel.
Biotrignon.
Cachets réparateurs
Cacodyle Gonnon.
Cacodyline Jammes.
Calcional.
Calci-Sténine.
Calcium Sandoz.
Calcoléol.
Carnine Lefrancq.
Cérébrosthénine.
Céréossine Dehaussy simple
Céréossine irradiée.
Chloro-Calcion.
Cinalose.
Clupeyl.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Composé Gmet.
Créagénol.
Créosal Dubois.
Crescogénol.
Crescol Buisson.
Curiode Arsenié.
Cytobiase.
Cyto-Manganol Corbière.
Cytopan.
Cyto-Sérum Corbière.

TUBERCULOSE

TONIQUES — RÉMINÉRALISANTS RÉCALCIFIANTS

Dépuriodé du D ^r Roger Weber.	Glucalcium R. X.
Diastogène Dehaussy.	Glycérophosphate Dalloz.
Diastogène F. Dehaussy.	Glycérophosphate Robin.
Doloma.	Glyctone phosphatée Charrière.
Doloma injectable.	Glykolaïne Robin.
Dolophos.	Glyphospher.
Dragées Hecquet.	Gouttes phosphosthéniques Dausse.
Dysthène.	Gouttes Arsénosthéniques Dausse.
Élixir Duchamp.	Gouttes Paidophiles.
Élixir Ducro.	Granions.
Énergine iodée de Berck.	Granoxyl.
Énergine phosphorée de Berck.	Granulé Caresmel.
Eufosyl « Vély ».	Granulé de Pantofort du D ^r Boveil.
Extrait de Céréales Adrian.	Halocure irradiée.
Extrait de Malt français Déjardin.	Hectine.
Fa-Ner-Val.	Hémagénine Giraud.
Fantine.	Hémato-Iodine.
Fénucine.	Hémoantitoxine « Sofos ».
Fénugrène.	Hémo-Cyto-Sérum Corbière
Fer Bravais.	Hémofer.
Fer Lacarde.	Hémogénol Dausse.
Fer Ovarine Vitalis.	Hémoglobine Deschiens.
Féroxal Buisson.	Hémopaniline.
Ferocol.	Hémo-Phagosthyl.
Fixase.	Hémoplase Lumière.
Fixase irradiée.	Hémostra « Roche ».
Fludiose.	Hémostyl du D ^r Roussel.
Fluodyle.	Hémotal.
Fluoganèse.	Hémotonine Buisson.
Fœnugol.	Hépanème.
Fondant de Cola Dausse.	Héparphos.
Fondant Iodotannique Dausse.	Héparmone.
Fondant Mangano-Ferreux Dausse.	Hépatergol.
Fortossan Ciba.	Hépathémo.
Fortossan irradié.	Hépatine Gad.
Forxol.	Hépatrol.
Fosfoxyl Carron.	Hépatrol injectable.
Fosyls Carron.	Heracléol.
Fucoglycine du D ^r Gressy.	Hipposarcine Roy.
Fucus Gmet.	Histogénol.
Gaduamine.	Holos.
Gaduase.	Huile de foie de Morue médicinalesuractivéeRhône-Poulenc.
Gaurol.	Huile Gallina.
Génergosine.	I. A. M.
Génosthéniques	Iodarsénic Guiraud ou
Génostrychnine.	Gouttes Paidophiles.
Glandocalcyl.	Iodentérol.
Globexine.	

TUBERCULOSE

TONIQUES — RÉMINÉRALISANTS RÉCALCIFIANTS

- | | |
|---|--|
| Iodocalcium. | Neurosine Prunier. |
| Ionyl. | Neurotrol. |
| Irrastérine. | Neurotrophol Byla. |
| Jemalt Wander. | Névrosthénine Freyssinge. |
| Kola granulée Astier. | Nucléarsitol Robin. |
| Kola Monavon. | Nucléasine. |
| Kreptol. | Nucléigène. |
| Lécithine Vacheron. | Nucléophorine. |
| Levuro-Maltine Déjardin. | Nuclhémose. |
| Limol Churchill. | Œnophos. |
| Lioncyl. | Opocalcium du D ^r Guersant. |
| Lipocérébrine Chevreton. | Opocalcium irradié du D ^r Guersant. |
| Liposplénine du D ^r Groc. | Opocobalt. |
| Liqueur Pepto Phosphorique Adrian. | Opoferrine Vitaminée. |
| Lugocalcion. | Oponuclyl irradié Trouette-Perret. |
| Magnécythine. | Opophytol. |
| Malt français Déjardin (Extrait de). | Oposérum. |
| Malt Wander ou Gloma. | Opothérapie du D ^r Fraysse. |
| Mancobène. | Ostéline. |
| Mangano-Phosphat Julien. | Ostréine Buisson. |
| Mangarsenic. | Ovo-Lécithine Billon. |
| Mangratinés. | Ozobiase. |
| Marimine. | Ozobiase Opothérapique. |
| Marinol. | Pancrinol du D ^r Debat. |
| Marrucol. | Pangaduine. |
| Maté Douglas. | Panostyl. |
| Méthylarsinates Bouty. | Panxylon. |
| Minergil. | Parathyrocalcine Moncour. |
| Morlsland irradié. | Pélospanine. |
| Morrhualène Gautier. | Pepto-Kola Robin. |
| Morrhuéine Jungken et Morrhuéine Jungken vitaminée. | Phagosthyl. |
| Morrhual. | Phagosthyl Mangané. |
| Morrhuxine. | Phosoforme. |
| Morubiase. | Phospharsol. |
| Moruxase. | Phosphates du D ^r Pinard. |
| Murones du D ^r Robert Jacques. | Phosphate Vital de Jacquemaire. |
| Musculosine Byla. | Phosphatol Vitaminé Irradié. |
| Néoarsite. | Phospho-Fluor Beynet. |
| Néo-Arsycodile. | Phospholéose Demasles. |
| Néo-Calciline. | Phosphopinal Juin. |
| Néo-Neurosine Prunier. | Phostyl. |
| Néo-Rhomnol. | Phylla Dyn. |
| Nergine Heudebert. | Phytergol. |
| Nervocithine Tissot. | Phytine Ciba. |
| Neuroplasma Fort. | Phytogénine Ciba. |
| Neuroplasma Massif. | Phyto-Lécithine. |
| Neuropol. | Phytomarine. |
| Neurolipase. | Phytosplénol Plé. |
| | Plasma de Quinon. |

TUBERCULOSE

TONIQUES — RÉMINÉRALISANTS RÉCALCIFIANTS

Pneumo-Lipase.
Poliol Churchill.
Polyminéral Fort.
Prodynase.
Protonic.
Pulmosérum.
Quina Baron.
Quinarsol Antianémique.
Quinquina Gmet.
Reconstituant Mary.
Rénaleptine.
Rhonnol.
Sanas.
Sanguil.
Sanguine Irradiée.
Sérifer Laurençon.
Séroma Rey.
Séro-Sérum, Rivier.
Sérum Neuropsychique.
Sérum Névrosthétique
Fraise.
Sérum Oliviero.
Silicyl.
Sirop de Galarsol.
Sirop de Glycérophosphate
Vacheron.
Sirop de Lovel.
Sirop Famel.
Sirop Tinardon.
Soluprotine Roche.
Solution Bardet.
Solution Pautauberge.
Spectrol.
Splénarmone.
Spléno-Magnésium.
Splénomanganol.
Stérogyl.
Sthénoxal.
Strychnal Longuet.
Strychnarsitol Robin.
Supernucléine Legrand.

Sur-Bi-Cal.
Synergyl Vadam.
Taburoi Monal.
Tanno-Calceine.
Thalassétonine Vadam.
Tonikéine Chevreton.
Tonique Gonnon.
Tonique Roche.
Tonudol.
Total-Tonic.
Tréphonyl du Dr Roussel.
Tricalceine.
Tridynol.
Ultraviamine 4.
Uvé (Gouttes).
Uvéphorine.
Uvéstérol.
Vanadarsine Guillaumin.
Végéphos.
Vigostérol.
Vin de Baudon.
Vin de Bugeaud.
Vin de Carnéose.
Vin Girard.
Viosten.
Vioxyl Mouneyrat.
Visco-Sérum.
Vitalcalcine Moncour.
Vitadone.
Vitamorrhéine.
Vitamyl.
Vitalstérol.
Vitène.
Vitergomine.
Vivoléol.
Zimbyl.
Zohol.
Zomine.
Zomo-Musculosine Byla.
Zymatine irradiée.

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Avistyl.
Biocholone.
Bronchitol.
C. B. K.
Choline Roche.
Cinalose.
Colloïdogénine du Dr Bayle.
Colloïxols.
Complexes colloïdaux du
Dr Riquoir.

Créositoires.
Créosote soluble Vacheron.
Crisalbine.
Crysiodal.
Cyto-Choline.
Dioradin.
Hémoantitoxine « Sofos ».
Hormocline.
Institut Pasteur Vaccins
B. C. G.

TUBERCULOSE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Lipaurol.
Molène.
Moréthyl Dausse.
Pulvita.
Résyl.
Sérum de Jousset.

Sérum Végétal du D^r Cu-
guillière.
Tébéphaguine Fornet.
T. B. X. Métacrysine.
Zimbyl.

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE ANOREXIE

Amunine.
Appetyl.
Ardogène.
Arrhéнал Adrian.
Arsécrinol.
Arsycodile.
Arsylène Roche.
Ascoléine Rivier.
Beéf Lavoix.
Biocalcose.
Biotrignon.
Carnine Lefranco.
Chophytol Rosa.
Colloïdogénine du D^r Bayle.
Cytobiase.
Cyto-Sérum Corbière.
Dyspeptine Hepp.
Élixir Ducro.
Fénucine.

Fœnugol.
Hormocline.
Marinol.
Murones du D^r Robert
Jacques.
Pancrinol du D^r Debat.
Persodine Lumière.
Phylla Dyn.
Phytine Ciba.
Quassia-Kina-Rabot.
Quinquina Gmet.
Solution Bardet.
Terpoxyl interne.
Tonikéine Chevreton.
Uvé (Gouttes).
Vanadarsine Guillaumin.
Viosten.
Vitamyl irradié.
Zimbyl.

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DIARRHÉE

Acatar.
Acolitol.
Alucol Wander.
Alunozal.
Amidal.
Amiphène Carron.
Ampoules Spasalgine
Roche.
Amylodiastase Thépenier.
Carbolactyl simple.
Carbophos.
Colloïxols.
Entérofagos.

Formocarbène.
Gastrocaol.
Gélotanin.
Goménol.
Kerlactine.
Lait Mont-Blanc.
Maltase Fanta.
Mucicarbos.
Oxyléine.
Spasalgine Roche.
Stupho.
Tréparsol.
Zimbyl.

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DYSPNÉE

Ampoules Boissy.
Ampoules de Pantopon
Roche.
Antasthme Cibrand.

Benzoquinol.
Élixir Thiogalacolé Arque-
vaux.
Hypophédrine.

TUBERCULOSE

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DYSPNÉE

Murones du Dr Robert | Oxy-injecteur du Dr Fialip.
Jacques. | Zimbyl.

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE EXPECTORATION

Alcamfétol.	Murones du Dr Robert
Allisatine « Sandoz ».	Jacques.
Aloysine.	Néopulmine.
Bronchitol.	Perles Jeka.
Bronchodermine.	Perles Taphosote.
Bronchoseptol Lauriat.	Phosote Lambiotte.
Broncosol.	Phosphogalaccol Mary.
Cachets Kapytan.	Pulmosérum.
Cachets « Roche » de Thio- col.	Pulmoverne.
Capsules Dartois.	Résyl.
Capsules et Sirop Préga.	Séroléine Granulée Baron.
Codocol.	Sirop Brahma.
Comprimés « Roche » de Thiocol.	Sirop de Créosote Vacheron.
Créoformine.	Sirop de Glycérophosphates Vacheron.
Créosal Dubois.	Sirop Famel.
Créositoires.	Sirop Gribell.
Créosote soluble Vacheron.	Sirop Mireille.
Élatine Bouin.	Sirop Noguès.
Élixir Thiogalaccolé Arque- vaux.	Sirop Phéniqué Vial.
Eucalyptine Le Brun.	Sirop Vacheron au Galaccol.
Galarsol.	Solution Pautauberge.
Goménol.	Sulfoléine du Dr Rozet.
Gouttes Daynoc.	Sulfo-Thiorine.
Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret.	Sulf-Y.
Gouttes Scandinaves.	Terkal Monal.
Guéthural.	Terpine Gonnon.
Marrubène.	Thiocol Roche.
Marrucol.	Thiorine.
Miroxyl.	Thiosote.
	Thio-Terpine Dalin.
	Tubérol.
	Zimbyl.

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE FIÈVRE

Cachets du Dr Boveil.	Panfèbrine.
Colloïdogénine du Dr Bayle.	Pyréthane.
Cryogénine Lumière.	Solution Bardet.
Elbon Ciba.	Suppositoires Pyrax.
Eucalyptine Lebrun.	Terpoxyl interne.
Gouttes Daynoc.	Zimbyl.
Murones du Dr Robert Jacques.	

TUBERCULOSE

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE HÉMOPTYSIES

(Voir : Appareil circulatoire. Hémostatiques).

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE SUEURS

Acécoline.	Murones du D ^r Robert
Ampoules de Sécacornine Roche.	Jacques.
Ampoules de Spasmalgine Roche.	Novatropin.
Génatropine.	Pragmoline.
Genhyoscamine.	Sécacornine Roche.
Gouttes Daynoc.	Spasmalgine Roche.
	Zimbyl.

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE TOUX

Acobella.	Gouttes Malone.
Aethone.	Gouttes Nican.
Ampoules de Pantopon Roche.	Gouttes Pilka.
Balmiga.	Gouttes Scandinaves.
Balsamol Lescène.	Guéthural.
Benzoquinol.	Hergénol.
Bexinine.	Hypophédrine.
Bronchitol.	Inhalation Lancosme.
Bronchodermine.	Lucodal.
Bronchoseptol Lauriat.	Marrubène.
Broncosol.	Marrucol.
Cachets Kapytan.	Miroxyl.
Cachets « Roche » de Thiocol.	Murones du D ^r Robert
Capsules Dartois.	Jacques.
Capsules Kuchner au Mécaptol.	Narcyl.
Codocol.	Néopulmine.
Codoforme.	Oxymenthol Perraudin.
Comprimés « Roche » de Thiocol.	Perles Taphosote.
Créoformine.	Perles Jeka.
Créosal Dubois.	Phosote Lamblotte.
Créositoires.	Phosphogaiacol Mary.
Créosote Soluble Vacheron.	Pneumogénol
Élatine Bouin.	Pneumostyl Daguin.
Elbon Ciba.	Pulmosérum.
Elixir Thiogafacolé Arquevaux.	Pulmoverne.
Eucalyptine Le Brun.	Quinthéryl.
Formint Merminod.	Résyl.
Germose.	Rosalyl A et B.
Glottyl.	Salypitol Narty.
Goménol.	Sirop Brahma.
Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret.	Sirop Castanol.
	Sirop de Créosote Vacheron.
	Sirop de Gafarsol.
	Sirop de Glycérosphosphates Vacheron.
	Sirop Famel.



Deuxième Partie

**DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES**



83218

ABSURIC

Le meilleur solvant de l'acide urique.
Le plus puissant antiseptique urinaire.

Composition. — Citro-lactate de lithine.
Pipérazine, urotropine, sulfosalicylate de
quinoléine.

Indications. — Affections des reins et
de la vessie (néphrites, pyélo-néphrites,
cystites, urétrites, etc.). Gouttes, arthri-
tisme, gravelle, rhumatismes, artério-
sclérose, dysenterie amibienne.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par
jour dans un demi-verre d'eau sucrée.
Le flacon : 16 fr.

Laboratoire de l'ABSURIC

17, rue de Provence — PARIS (IX^e)

ACATAR

(*à* privatif, contre le catarrhe).

Médication balsamique par excellence.

Composition. — Pilules glutinisées à base de
Baume de Tolu, Terpènes d'Abiès, Cinnamo-
benzoate de soude, Goudrons de pinus et Juni-
perus (Harlem), Argent colloïdal.

Indications thérapeutiques. — Véritable bal-
samique très doux n'irritant pas les reins, médi-
cation antiseptique et anti-infectieuse, modifiant
les sécrétions, applicable dans tous les écoule-
ments aigus ou chroniques, toutes manifesta-
tions catarrhales irritatives ou douloureuses des
voies urinaires, bronchiques, biliaires, intestinales
(cystites, cystalgies, gonorrhées, prostatorrhées,
néphrites, toutes pyélo-néphrites, tuberculose
rénale ou intestinale, etc...).

Mode d'emploi. — Dose moyenne : 9 pilules par
jour, en 3 fois.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

74, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).

Tél. : Botzaris 38-78.

ACÉCOLINE

Chlorure d'Acétylcholine stabilisé.

Substance dilatatrice des artérioles de la périphérie et des membres, sédative des spasmes artériels, excitante de la musculature lisse.

L'Acécoline est présentée sous deux formes :

Acécoline-Solution : Solution anhydre et stable de chlorure d'acétylcholine directement injectable par la voie sous-cutanée ou intra musculaire.

Acécoline-Poudre : chlorure d'acétylcholine associé au glucose anhydre, à dissoudre avant l'emploi. C'est le produit bien connu des premières applications cliniques.

Boîtes de 6 ampoules dosées à 2, 5, 10 ou 20 cgr. de chlorure d'acétylcholine.

Indications et posologie.

Hypertension artérielle : Accidents, manifestations et troubles fonctionnels, dose quotidienne : 1 ou 2 injections de 10 cgr.

Troubles vasculaires : a) Par spasmes artériels ou artériolaires (Ictus hémiplegique, syndrome de Raynaud, spasmes des artères rétiniennes et labyrinthiques, angine de poitrine, acrocyanose, migraines ophtalmiques).

Dose quotidienne : 10 à 20 cgr.

b) Par lésions anatomiques (Artérites avec ou sans troubles trophiques, gangrènes, claudication intermittente).

Dose quotidienne : 1 ou 2 injections de 20 cgr.

c) Avec troubles trophiques (Ulcères des moignons, ulcères variqueux, sclérodermie).

Dose quotidienne : 10 ou 20 cgr.

Déséquilibre vago-sympathique : dose 10 cgr.

Hypochlorhydrie : 20 à 40 cgr. pendant 12 à 15 jours.

Coliques de plomb : 10 à 20 cgr. toutes les 10 minutes.

Sueurs des tuberculeux : Dose quotidienne 2 à 4 cgr.

Mode d'emploi :

Injectons sous-cutanées ou intramusculaires. Ni intolérance, ni contre-indication.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS

Adresse télégraphique : Chevrematte 90-Paris.

ACÉCOLINE-SPARTÉINE

Vaso-dilatateur et Toni-cardiaque

Acécoline (Chlorure d'Acétylcho-
line) 0 gr. 10
Spartéine (Sulfate) 0 gr. 05

*Hypertension avec insuffisance cardiaque. Accidents
d'insuffisance ventriculaire gauche.*

Posologie. — Injection d'une à 3 ampoules par
jour.

ACÉCOLINE-CAMPBRE

Vaso-dilatateur et Eupnéique.

Acécoline (Chlorure d'Acétylcho-
line) 0 gr. 10
Camphre..... 0 gr. 20

*Dyspnée des hypertendus. Asthénie des hyperten-
dus.*

Posologie. — 1 ampoule matin et soir.

ACÉCOLINE-YOHIMBINE

Hypotenseur et Sympathicolytique.

Acécoline (Chlorure d'Acétylcholine). 0 gr. 10
Yohimbine..... 0 gr. 01

*Hémorragies cérébrales et méningées. Hypertensions
paroxystiques.*

Contre-indications. — Ramollissement cérébral
et spasmes des artères rétiniennes.

Posologie. — 1 ampoule matin et soir, 2 ampoules
dans les cas d'urgence.

ACÉCOLEX

Pâte trophique à l'Acécoline.

Traitement des Ulcères variqueux des Plaies atones
et des Dermatoses.

(Chlorure d'Acétylcholine ; fenchone ; oxydes de
zinc, de titane ; ichtyol, etc...)

Cicatrisation rapide et sédation des douleurs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère. — PARIS

Adresse télégraphique : Chevrematte 90-Paris.

ACEPILINE

Composition. — Acétone très pur, Alcool, Pilocarpine, Essences aromatiques stimulantes déterpénées.

Indications. — Alopécies post-fébriles, Alopécies séborrhéiques.

Posologie. — Chaque matin peigner au démêloir et à la brosse dure, puis friction à l'Acepiline avec une brosse à dents demi-dure, raie par raie pendant 10 minutes pour la femme, ou durant 5 minutes sur toute la tête pour l'homme. Quand les cheveux morts cesseront de tomber, continuer par périodes d'une semaine de temps en temps.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).

ACÉSINE GUILLAUMIN

Composition. — Pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétone et de stovaïne.

Propriétés. — Agent analgésique et vasoconstricteur de grande efficacité, dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

Indications. — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

Mode d'emploi. — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes ; quand les hémorroïdes sont internes, visser, sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications 3 ou 4 fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

ACÉTYLARSAN

4 - oxy - 3 - acétylamino - phényl - 1 - arsinat de diéthyl-amine.

Solution aqueuse neutre et stérile, non irritante, injectable dans le muscle ou le tissu cellulaire sous-cutané. Bien toléré. Toxicité réduite.

Indications. — Arsénothérapie de la Syphilis et de certaines protozooses par les voies sous-cutanée ou intramusculaire.

Présentation et posologie. — *Acétylarsan pour adultes* : solution à 23,6 p. 100, 1 cc. = 0 gr. 05 d'Arsenic. Ampoules de 3 cc. (Boîtes de 10).

Acétylarsan infantile : solution à 9,4 p. 100, 1 cc. = 0 gr. 02 d'Arsenic. Ampoules de 2 cc. (Boîtes de 10.)

Injectations hebdomadaires ou bi-hebdomadaires (consulter les Notices spéciales).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

ACOBELLA

Le médicament sédatif de la Toux.

Forme. — Comprimés très assimilables, très actifs et ne provoquant pas de dyspepsie. Présenté en boîte de 30 comprimés.

Formule. — Bromoforme, 0,02 ; Codéine, 0,01 ; extrait de racines d'Aconit, 0,0025 ; Extrait de Belladone, 0,0025 ; Extrait de Jusquiame, 0,0025 ; Extrait de Drosera 0,003 ; Extrait de Grindelia, 0,002 ; Extrait de lobelie, 0,01 ; Benzoate de soude, 0,10 ; Poudre de Dower, 0,06 pour 1 comprimé.

Posologie. — 2 à 8 comprimés par 24 heures à avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

Indications. — Traitement de toutes les toux rebelles et fréquentes, des laryngites, trachéites, trachéo-bronchites aiguës, de la coqueluche et de la bacillose pulmonaire.

Laboratoire HOCQUETTE

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

Téléphone : Diderot 04-71.

ACODROS

Composition. — Préparation à base d'aconitine stabilisée, XX gouttes contiennent 1/10^e de milligramme d'Alcaloïde.

Action thérapeutique. — Décongestif, sédatif, analgésique, diaphorétique.

Indications. — Grippe, coryza, inflammations et infections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — *Adultes* : XV à XX gouttes 2 à 3 fois par jour dans un liquide quelconque.

Enfants (au-dessous de 5 ans) ; 2 gouttes par année d'âge.

Prix : 10 francs.

Laboratoires BOUVELOT

62, rue d'Antibes — CANNES (A.-M.).

ACOEGENOL

Principes actifs. — Iodures de rubidium, de cæsium, de potassium, de sodium, iode, mimotannin (tannin extrait du mimosa) ; teintures d'aconit, de gelsemium, de cimicifuga et de ballote.

Action. — Action principale sur la nutrition, action secondaire sur la circulation et enfin action antispasmodique et sédative.

Indications. — Bourdonnements, vertiges, surdité.

Mode d'emploi. — Se prend avec de l'eau vineuse ou avec de la tisane.

Posologie. — *Dose moyenne* : 2 cuillerées à café par jour, 20 jours par mois (les 10 autres jours du mois, 2 mois sur 3, il est bon, surtout s'il y a de l'oto-sclérose, de prendre des gouttes Chauvin à l'Audisclérocitrine).

Prescription. — Il est bon de faire suivre le produit du nom patronymique et de prescrire ainsi : un Acoégénol Chauvin.

Établissements Alfred CHAUVIN
AUBENAS (Ardèche).

ACOLITOL

Topique intestinal.

Composition. — Charbon organique pur à pouvoir d'adsorption élevé. Carbonate de calcium pur amorphe, salicylate de Bismuth, Peroxyde de magnésium, Belladone pulvérisée titrée.

Présentation. — Poudre et granulé.

Propriétés. — Topique intestinal de choix, neutralisant et sédatif. Régularise les réactions chimiques du milieu intestinal, entrave les fermentations anormales et les putréfactions, modifie la flore microbienne, adsorbe les toxines.

Indications. — Colites, entérocolites, typhocolites, stases colitiques, fermentations acides, dysenteries, entérite des tuberculeux.

Doses. — 1 cuillerée à entremets délayée dans 1/2 verre d'eau le matin à jeun et une 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

LANCOOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

ADÉNOSEPTYL

Pour instillations et pulvérisations nasales.

Formule. — Collargol, argyrol, Protargol, adrénaline, goménol, eucalyptol.

Propriétés thérapeutiques. — Infections du nez et de la gorge.

Pharmacie **BLOUIN**

50, rue de Turenne — PARIS.

ADONAL VICARIO

Phényl-éthyl-malonyl-urée.

Comprimés à 10 centigrammes.

Sédatif énergique — hypnotique.

Anticonvulsivant, son emploi constitue le traitement de choix du mal comitial.

La forme spéciale des comprimés permet la division facile soit en quatre parties égales, soit en deux parties égales (2 centigrammes et demi ou 5 centigrammes).

Doses habituelles. — De 2 centigrammes et demi à 30 centigrammes par jour, à prendre loin des repas.

Le flacon de 15 comprimés : 8 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

ADOVERNE « ROCHE »

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Action thérapeutique. — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. Complète, remplace ou continue l'action de la digitale.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire, œdèmes périphériques, hydropisies, etc.

Avantages. — Étalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

Posologie. — XL gouttes ou 4 granules = 1 cc. d'une solution à 5 p. 1 000 des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Modes d'emploi. — Par voie buccale = XX à XL gouttes ou 2 à 4 granules, 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

Adoverne « Roche »

Gouttes (flacon de 15 cc.).

Granules (flacon de 60).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

ADRAL

Constitution. — Poudre d'Algues sélectionnées, stabilisées, et privées de leurs sels minéraux.

Principes actifs. — 1° *Iode combiné organique* : modificateur le plus puissant de l'assimilation générale ;

2° *Eléments organiques de choix* : Protéines, Graisses, Hydrates de Carbone.

Indications. — *Suraliment spécifique* pour bacillaires, convalescents et amaigris.

Avantages. — *Augmentation* rapide du poids des malades.

Formes. — *Cachets pour adultes* : 2 à 5 par jour.

Granulé pour enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

ADRÉNALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Vaso-constricteur, hémostatique, stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixateur du calcium.

Indications. — Rachitisme, coqueluche, tuberculose, dyspepsies atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

Formes. — Ampoules de 1 cc. boîtes de 6 ampoules au millig. Solution au millième, flacons de 5 et 10 grammes.

Le flacon de 10 grammes au Public : 9 fr.

Pharmacie Centrale de France
21, rue des Nonnains-d'Hyères
PARIS (IV^e).

ADRÉNARGOL

(Ampoule Nasale)

Adrénaline associée aux sels d'argent.

Avantages. — Bactéricide énergique. Ni irritant, ni toxique.

Indications. — Antisepsie préventive et curative du rhino-pharynx, Sinusites, Rhinites, Coryzas, Angine, Grippe, etc.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans chaque narine, matin, midi et soir.

E. MONGE, Pharmacien
OULLINS (Rhône).

ADRÉNINE

Solution d'Adrénaline au 1 ‰

Action. — L'**ADRÉNINE** possède une action :

- 1^o Sur la pression sanguine ;
- 2^o Sur le cœur ;
- 3^o Sur les fibres musculaires lisses et plus électivement sur celles des petits vaisseaux ;
- 4^o Sur la nutrition.

Posologie :

Per os, Cent gouttes à doses fractionnées (toutes les heures, par exemple).

Injectons sous-cutanées, 1 à 10 mmgr. par séries d'injections dans les 24 heures.

Laboratoire du D^r MIALHE
8, rue Favart — PARIS.

ADRÉNOCALCINE

Recalcifiant par excellence.

Formes :

Poudres. — Cachets. — Granulés.

Composition :

Association de glycérophosphates, hypophosphites, phosphates, fluorure de chaux et magnésie.

Posologie :

3 doses par jour.

Laboratoire ADAM

**Docteur en pharmacie,
GRANVILLE (Manche).**

ADRÉNOÏDES BÉRAL

Comprimés pour l'administration efficace de l'adrénaline par voie buccale.

Composition. — Chaque Adrénoïde contient 1/4 de milligramme d'adrénaline stabilisée, ce qui correspond à V gouttes de la solution d'adrénaline au millième.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline *per os*, avec cet avantage que l'absorption des Adrénoïdes par la muqueuse buccale met l'adrénaline à l'abri des altérations causées par le suc gastrique et évite sa destruction au niveau du foie.

* Depuis 1904, j'emploie systématiquement l'adrénaline et ai presque exclusivement recours à l'administration par voie buccale. Les résultats obtenus ne me permettent pas de douter de son efficacité. Netter, *Bulletin Société Biologie*, mai 1922.

Mode d'emploi. — Laisser fondre les *Adrénoïdes* dans la bouche. C'est perdre l'avantage de l'absorption par la muqueuse buccale que de les avaler.

Posologie. — Un *Adrénoïde* toutes les 2, 3 ou 4 heures, soit de 6 à 12 par jour.

Indications. — Toutes *Affections aiguës ou chroniques avec asthénie ou dépression circulatoire, Tuberculose, Etats hémogéniques, Purpuras, Vomissements incoercibles, etc.*

Formuler : Adrénoïdes Béral. Une boîte.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

ADRÉPATINE

POMMADE-SUPPOSITOIRES

Association pluriglandulaire.

Composition. — *Extraits d'Organes* : Foie, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse, Prostate.

Extraits Végétaux : Marron d'Inde frais stabilisé, Cupressus, Hamamelis.

Excipient antiseptique et Calmant.

Propriétés et Indications thérapeutiques. — *L'Adrépatine est une préparation pharmaceutique qui ;*

1° Par les extraits polyglandulaires englobés ;

2° Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;

3° Par son action vaso-constrictive locale ;

4° Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des *Hémorroïdes internes et externes, des Rectites et Prostatites, du Prurit anal, des Fistules.*

Mode d'emploi. — De 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de Pommade est muni d'une canule rectale.

Boîte de 15 suppositoires..... 12 fr. 50

Tube de pommade avec canule rectale..... 12 fr. 50

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).

ADRÉPHÉDRINE BÉRAL

Ampoules de 2 centicubes pour injections sous-cutanées.

Composition. — 1/4 milligramme d'Adrénaline et 2 centigrammes d'Éphedrine naturelle par centicube.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline sous-cutanée, mais avec cette différence avantageuse qu'à doses égales elle est moins toxique, plus maniable et surtout d'une durée d'action beaucoup plus prolongée. De plus, cette action n'est pas suivie de la réaction hypotensive adrénalinique. Elle présente donc tous les avantages de l'adrénaline sans ses inconvénients.

Indications. — Toutes celles de l'adrénaline sous-cutanée, notamment *Accès d'asthme déclenchés, Etats de choc avec défaillance circulatoire périphérique et collapsus* (chocs thérapeutiques, sériques, anaphylactiques, opératoires, etc.), *Etats hémogéniques, Purpuras, Anémies, Hémoptysies, etc.*

Posologie. — De 1 à 4 centicubes sous-cutanés. Chez sujet neuf débiter par 1 centicube. Comme pour l'adrénaline, éviter la voie musculaire qui pourrait exposer à injecter dans un petit vaisseau.

Formuler : Adréphédrine Béral. Une boîte.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

AÉROPHAGYL

Boîte de 45 comprimés : 14 fr.

Indications. — Spécifique de l'*Aérophagie* et de ses conséquences : insomnies, troubles cardiaques, nerveux et pulmonaires.

Dosologie. — 1 comprimé délayé dans un demi-verre d'eau, au milieu des repas. En cas de crise 2 comprimés à la fois.
Enfants, 1/2 doses.

Composition. — Combinaison complexe constituée par l'association, à une faible dose d'uroformine, du citrate de sodium et des ions Br. et Ca.

Echantillons gratuits :

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 76-85.

AESCULASE

Composition. — Alcoolature de marron d'Inde stabilisée.

Propriétés thérapeutiques. — Action vasoconstrictive, énergique et constante sur le système veineux périphérique, puissant analgésique.

Indications. — Hémorroïdes, aussi bien internes qu'externes.

Mode d'emploi. — Pour éviter les crises : VI à X gouttes dans une cuillerée à bouche d'eau, matin et soir.

Dans les crises aiguës, augmenter la dose ci-dessus jusqu'à XXX à XL gouttes 2 fois par jour.

Laboratoires E. MICHELON

20, boulevard Heurteloup — TOURS.

ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche
et de la Toux.*

Doses. — Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour	{	de 1 mois à 1 an : 1 goutte par mois d'âge.
		De 1 à 2 ans : XII à XX gouttes.
		De 2 à 5 ans : XX à XXV gouttes.
		De 5 à 10 ans : XXV à XXX gouttes.
		De 10 à 15 ans : XXX à XXXV gouttes et plus s'il est nécessaire.

2° Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : L à LX gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée ou de sirop de tolu additionné d'eau. La dose totale pour les adultes peut être portée à 400 gouttes par 24 heures, s'il est nécessaire. L'Æthone doit être administré 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

Prix : 10 fr. 80 le flacon.

Laboratoire de l'ÆTHONE

9, rue Boissonade — PARIS

AGAMÉTOL

Traitement rationnel du paludisme.

Solution aqueuse à base de formiate de quinine dont la teneur en quinine (87,56 p. 100) en fait le plus actif de tous les sels de cet alcaloïde.

L'Agamétol étant une solution rigoureusement neutre et stérile, *ne précipite pas* en présence du sérum sanguin. Il est totalement indolore et ne provoque jamais ni réactions inflammatoires ni abcès.

Deux modèles :

Boîte de 12 ampoules 0,25, 2 cc.

Boîte de 12 ampoules 0,50, 2 cc.

Echantillon gratuit et notice au Corps Médical sur demande.

Laboratoires des Établissements

H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

AGARASE

Composition :

Comprimés à base d'agar-agar, de ferments lactiques et d'extraits végétaux.

Action :

Réveille la tonicité de l'intestin, lubrifie la muqueuse, dissocie le bol fécal, supprime les fermentations.

Avantages :

Petits comprimés très faciles à avaler ; enrobage soluble dans l'intestin évitant les réactions gastriques ; répartition de la dose active en plusieurs comprimés, ce qui évite une action brutale sur un segment isolé du tube digestif.

Pas d'accoutumance, pas de coliques.

Indications :

La constipation sous toutes ses formes, colites, entérocolites, entérite muco-membraneuse, appendicite chronique.

Céphalées, obésité, artériosclérose, affections du foie.

Dermatoses.

Mode d'emploi :

Trois comprimés à chacun des principaux repas à prendre avec une gorgée d'eau sans croquer.

Pour les enfants, deux comprimés à chacun des repas.

Laboratoire G. REAUBOURG

2, rue Boucicaut — PARIS (XV^e)

Bureaux : 31, rue St-Georges — PARIS (IX^e)

AGOCHOLINE

Stimulant hépato-biliaire.

Forme.

Granulé soluble aromatisé à la menthe ou sans arôme.

Composition.

Sulfate de Magnésie desséché.
Peptone sèche purifiée.

Propriétés thérapeutiques.

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.
Réalise le drainage des voies biliaires *per os*, et le rend facile en clientèle.

Indications.

Congestion du foie et de la vésicule biliaire.
Lithiase biliaire.
Ictère et Cholémie.
Cholécystites chroniques.

Certains troubles digestifs	{	Gastropathies réflexes, Inappétence, Nausées, Constipation.	} d'origine hépato-biliaire
Certains troubles généraux	{	Céphalée, Migraines, Asthénie, Vertiges, Urticaire et Prurit, Certaines dermatoses.	

Contre-Indications. (Temporaires.)

Cholécystites aiguës.
Diarrhées aiguës.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau chaude.

Enfants : A partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café, suivant l'âge.

N. B. — Il est bon de commencer par les doses faibles et de les augmenter progressivement, suivant la tolérance du malade.

Prix : 17 fr. 50

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie,
Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux
Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, Rue de Fécamp — PARIS (XII^e)

Tél. : Diderot 28-96.

AGOMENSINE CIBA

Substance protéidique extraite de l'ovaire.

Action physiologique. — Favorise le flux menstruel, accélère le développement des organes et l'apparition des caractères sexuels secondaires.

Indications :

- I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées. Malaises qui précèdent ou qui accompagnent la menstruation.
- II. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale.
- III. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

Comprimés. — Ampoules.

Doses. — 3 à 9 comprimés par 24 heures, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 20 comprimés : 13 francs.

— de 40 — : 22 francs.

— de 100 — : 50 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

(Voir *Sistomensine*.)

Laboratoire CIBA, O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

AIGUE D'OR

Analga du D^r Redier.

Composition :

Diméthyle amido-antipyrine...	0,25	} pour un verre à liqueur.
Salicylate de pyramidon.....	0,25	
Héroïne	0,001	
Plantes sédatives.	Q. S.	

Propriétés. — Action thérapeutique du Diméthyle amido-antipyrine et du Salicylate de Pyramidon *considérablement renforcée* par la dose minime d'Héroïne. L'action tonique de l'alcool corrige l'action déprimante des calmants.

Indications. — Névralgies, Migraines, *Dysménorrhées*, *Tranchées utérines*, Douleurs dentaires, Coliques néphrétiques, Gripes.

Posologie. — 1 verre à liqueur renouvelé, si nécessaire, 1/2 heure après.

Efficacité plus grande dans une tasse d'infusion.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose, selon âge.

Sans contre-indication.

Présentation. — Liqueur agréable.

Le flacon : 13 fr. 50.

Laboratoire de L'AIGUE D'OR

53 bis, boulevard de la Liberté — LILLE (Nord).

AIROGLYCE

Composition. — Préparation bismuthée (oxyiodogallate de bismuth spécialement porphyrisée).

Mode d'action. — Réalise le pansement et l'antisepsie de la muqueuse urétrale.

Indications. — Blennorragie aiguë (période du déclin). Blennorragie chronique, en association avec dilatation, massages, etc.

Mode d'emploi. — Après avoir uriné, agiter le flacon et injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis progressivement jusqu'à 5 minutes. Eviter d'uriner autant que possible après l'injection.

Ovules: Agent thérapeutique de choix dans le traitement des métrites, vaginites, ulcérations du col, etc.

Suppositoires : Prostatites. Hémorroïdes.

Laboratoires PIALOUX

55, rue de Chabrol — PARIS (Xe).

AIROL « ROCHE »

Combinaison basique de bismuth oxyiodé donnant, au contact des plaies, de l'iode à l'état naissant.

AIROL « Roche », en poudre.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant, désinfectant, cicatrisant, kératoplastique, sans odeur, inaltérable à la lumière ; toxicité moindre que celle de l'iodoforme (dont l'*Airol « Roche »* est le seul succédané pratique).

Indications thérapeutiques. — Toutes celles de l'iodoforme. Bien spécifier la marque « Roche ».

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

ALBUPLAST VIGIER

Composition :

Sparadrap adhésif caoutchouté à l'oxyde de zinc.

Avantages :

Suppression des bandes de pansement. — Préparé avec des substances adhésives de première qualité. — Ne se décolle jamais. — Supporté par les épidermes les plus délicats. — Se conserve très longtemps.

Indications :

Contention des pansements. — Traitement des dermatoses (urticaire, érythème polymorphe, ichtyose, furonculose).

Laboratoires VIGIER et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET.

ALCACYL

Composition. — Acétylsalicylate de chaux 0,5, alcool 0,4 pour un comprimé.

Sans action sur l'estomac, le cœur et les reins.

Forme. — Comprimés.

Indications. — Analgésique, antithermique, anti-infectieux, sudorifique.

Est utilisé dans : rhumatismes, névralgies, migraines, sciaticques, lumbagos, courbatures, gripes, maux de tête, de gorge et de dents.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 comprimés désagregés dans un peu d'eau sucrée, avaler ensuite un demi-verre d'eau pour activer l'effet.

A répéter si nécessaire 3 à 4 fois dans les 24 heures.

Enfants : 1/4 ou 1/2 comprimé, suivant l'âge, 3 à 4 fois par jour.

Le tube : 7 fr. 50.

Laboratoires WANDER
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

ALCALINOSE

Deux présentations :

1° Alcalinose granulée. 2° Alcalinose en poudre.

Composition. — Citrate, Phosphate, Sulfate de sodium desséchés et chimiquement purs. — Bicarbonate de sodium saturé.

Action. — L'Alcalinose fait diminuer le taux de l'acidité gastrique sans le faire disparaître ; régularise les sécrétions digestives ; excite la motricité de l'estomac et diminue la durée du transit gastrique.

Mode d'emploi. — Alcalinose granulée : 1 à 3 cuillerées à café avant les repas dans un demi-verre d'eau.

Alcalinose en poudre : 1 à 3 cuillerées-mesure avant les repas.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques et maladies de Reichmann, Ulcères digestifs, Sténoses pyloriques, Suites de gastro-entérostomie et de pyloréctomie, Aérophagie et dilatation gastrique, Gastropathies nerveuses, Entérites et colites chroniques, Acidose.

Laboratoires CORBIERE
27, rue Desrenaudes — PARIS.

ALCAMFÉTOL

Composition :

Iodométhylate d'hexaméthylènetétramine (iode réel 45 %)	0 gr. 10
Camphosulfonate de sodium (camphre soluble)	0 gr. 20
Glycéryl Gaiacol	0 gr. 01
Eau bi-distillée q. s. pour	2 cc.

Avantages thérapeutiques. — 4 médications essentielles : de l'Iode, de l'Urotropine, du Camphre et du Gaiacol.

En une seule formule : *Solution aqueuse, stérilisée, à Ph constant.*

Indications. — Toutes infections chroniques ou aiguës (septicémies). Défaillance circulatoire. Troubles respiratoires. Maladies de la nutrition.

Forme. — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. 25 francs au public.

Posologie. — Injections hypodermiques ou intramusculaires indolores, La voie intraveineuse n'est indiquée que pour les cas urgents. Elle n'apparaît pas nécessaire pour les traitements courants.

Adultes : 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

Enfants : 1/2 à 1 ampoule de 2 cc. par jour.

L'Alcamfétol étant d'une innocuité absolue, ces doses peuvent être augmentées, dans les cas particulièrement graves, mais sous la surveillance du médecin.

Laboratoires DOR
DORANTOWICZ, Pharmacien.
17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

ALCASODINE

Composition. — Sulfate, phosphate, citrate de soude, benzoate de soude et sel de Vichy.

Formes. — Paquets, granulé.

Indications. — Toutes celles de la solution alcalino-sodique et « dite de Bourget », affections gastriques, douleurs, spasmes, hyperacidité, vomissements, dermatoses, affections du foie, entérites, intoxications alimentaires.

Posologie. — 1 paquet ou 1 cuillerée à café avant ou après les repas.

Laboratoire de l'ALCASODINE
MAURICE GLORY, pharmacien,
38 bis, boulevard Beaumarchais
PARIS (II^e).

ALEPSAL GENEVRIER

Calmant non déprimant.

Spécifique de l'Epilepsie, des Insomnies, des Convulsions. On l'emploie également avec succès comme Hypnotique et Antispasmodique dans : Angines de Poitrine, Asthme, Spasmes du Larynx, cardiaques, vasculaires, etc.

Chaque comprimé renferme 0,10 de Phényléthyl-malonylurée très pure associée à la Belladone stabilisée et à la Triméthylxanthine.

Posologie. — 2 comprimés par jour, matin et soir, absorbés purs ou dans une boisson chaude.
AUCUN REGIME SPECIAL.

« Avec l'ALEPSAL, les convulsions disparaissent sans observer de troubles psychiques ; l'intelligence de l'EPILEPTIQUE s'éveille et son activité s'accroît normalement. » (D^r Ducoste, médecin chef des Asiles de la Seine.)

Contre-indications. — Néant.

Prix : Le tube : 9 francs.

Laboratoire GENEVRIER
45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS.

ALEXIME

Anciennement « ALEXINE »

Composition. — Préparé par le procédé de Joulie, est de l'acide phosphorique solidifié, assimilable, hyperactif.

Les résultats de L'ALEXIME sont remarquables et constants dans tous les états de déchéance organique.

Indications. — Anémies, Phosphaturie, Démence, Rétardation, Prétuberculose, Neurasthénie, Fatigue, Faiblesse, Impuissance.

Posologie. — 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs.

Échantillons et littérature au

Laboratoire A. LEBLOND

Pharmacien de 1^{re} classe,

Ex-interne des hôpitaux de Paris,

51, rue Gay-Lussac — PARIS (V^e).

R. C. Seine 56 049.

ALGATAN

Composition. — Hyposulfi-iodotannate de soude en milieu sulfocalcique fluoré. (Iode entièrement assimilable sans iodisme.)

Formes. — Cachets dosés à 1 gramme.

Comprimés dosés à 0 gr. 50.

Indications thérapeutiques. — *Tuberculose pulmonaire, intestinale et osseuse, Artério-sclérose, Emphysème, Asthme, Catarrhe bronchique, Affections cardio-vasculaires, Rachitisme, Tertiarisme, Déchéance physique.*

Dose et mode d'emploi :

Enfants de 3 à 5 ans : 1/2 cachet ou 1 comprimé.

Enfants de 5 à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés.

Enfants de 10 à 15 ans : 2 cachets ou 4 comprimés.

Adultes : 2 à 6 cachets ou 4 à 12 comprimés.

Par jour au moment des principaux repas.

Laboratoires de L'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes — NANTERRE (SEINE).

ALGOCRATINE

(Phénylamidoxanthine.)

Présentation. — Cachets de 0 gr. 75 (assimilation plus rapide que la forme Comprimés).

Indications thérapeutiques. — Migraines, névralgies, sciatiques, grippe, algies cancéreuses. En général, toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les *règles douloureuses*.

Aucune action hypnotique. Pas d'accoutumance. Elimination extrêmement rapide sans fatigue des reins. Tolérée parfaitement par l'estomac.

Posologie. — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs, un second une heure après si nécessaire.

Trois cachets par 24 heures.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

ALGOPHAGINE

Capsules glutinisées contenant 1/10 de milligramme de colchicine dissous dans l'essence de Gaulthéria pure, iodure de lithium et formine.

Indications :

Médication intensive pour le traitement raisonné des Affections rhumatismales de toute nature. Névralgie faciale.

Posologie :

Trois capsules, le matin avant le premier déjeuner et deux le soir avant le dîner, accompagnées d'un verre d'eau bicarbonatée (Vals, Vichy) ou hypominéralisée (Vittel, Evian).

Laboratoires UNIS-SPEs

14, rue Demarquay — PARIS.

ALGOSTÉRINE OLIVIERO

Lyposuble d'algues marines pélagiques. **Stérol.**
Chlorophylle d'algues.

Pigments carotinoïdes et fucoxanthiques.

Le foie de Morue, intègre *l'algostérine* des algues, c'est à ce principe que l'huile de foie de Morue doit ses propriétés thérapeutiques.

Indications. — L'ALGOSTERINE OLIVIERO renferme tous les principes utiles à la *croissance* des jeunes enfants. Elle a une action marquée dans la *calcémie* et est indiquée dans toutes les *dystrophies musculaires et osseuses*, dans toutes les *carences par avitaminose*, dans les bronchites.

Doses. — II à XVI gouttes, et plus, 2 fois par jour. *Innocuité absolue. Pas d'hypervitaminose. Pas d'ossification trop rapide.*

Laboratoire de Biothérapie OLIVIERO

41, rue Denfert-Rochereau — PARIS (V°).

ALIBOURINE

Formes :

1° Pommade en tube de 50 grammes environ.

Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs, Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli, Extrait d'Hamamélis et de Millepertuis, Lanovaseline.

Indications :

Eczémas suintants, Impétigo, Teigne, Plaies, Ulcères variqueux, Erysipèle.

2° Solution concentrée : Flacon de 60 cc.

Composition :

A base de sulfates de cuivre et de zinc purs, donne, diluée dans un litre d'eau, une solution se rapprochant d'une Eau d'Alibour un tiers et chimiquement pure. Ces deux préparations n'irritent jamais.

Laboratoires B. E. A

Ch. BEHA, Pharmacien de 1^{re} classe. — Belfort.

ALIMENT TINARDON

Nutrition. — Recalcification. — Reminéralisation.

Forme. — Poudre dosée pour la préparation, soit au lait, soit à l'eau, d'un entremets agréable.

Composition :

Carbonate de chaux...	0,30	Lactose	2,50
Phosphate de chaux...	0,20	Caséine purifiée...	0,50
Glycéroph. de chaux ..	0,05	Arrow-Root.....	4 »
Magnésie calcinée	0,05	Sucre	12 »
Éléments céréalo-légumineux.....	5 »	Cacao vanillé	8,50

Pour 2 mesures.

Posologie. — *Enfants* : 1 à 2 mesures par jour.

Adultes : 2, 3 ou 4 mesures par jour.

Indications. — Dégénérescence infantile, Scrofule. Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Prix : 15 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} classe,
de l'École Faculté de Pharmacie de Paris.
17, rue Cadet — PARIS.

ALLISATINE « SANDOZ »

Composition. — Tous les principes actifs de l'*Allium Sativum* fixés sur du charbon activé et présentés en dragées, inodores, insipides.

Propriétés. — Stimulant des fonctions gastriques, puissant anti-diarrhéique. Hypotenseur. Tolérance parfaite.

Posologie. — 2 à 4 dragées d'Allisatine, trois fois par jour à la fin des repas.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e).

Dépôt général et vente :

Usine des Pharmaciens de France,
129, rue de Turenne — PARIS (III^e)

ALLOCAÏNE LUMIÈRE

Anesthésie locale, régionale et rachidienne.

Constitution. — (Chlorhydrate de paramino, benzoyl, diéthyl, amino, éthanol).

Les solutions allocaïne-adréaline sont d'une conservation parfaite et rigoureusement inaltérable. Elles présentent des garanties exceptionnelles d'efficacité et d'asepsie.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique équivalent à celui de la cocaïne. Toxicité 7 fois moindre. Durée de l'anesthésie nettement supérieure. Nullement irritante pour les tissus, son administration laisse intacts les centres bulbaires. Aucune modification de la nutrition générale et des tissus.

L'anesthésie rachidienne obtenue est caractérisée par l'intégrité qu'elle laisse aux centres nerveux supérieurs (excitabilité réflexe cérébrale, fonctions intellectuelles).

Indications. — Les mêmes que pour la cocaïne. L'Allocaïne Lumière est mise dans le commerce sous la forme d'ampoules prêtes à l'emploi, aux titrages suivants :

Solution A à 1/2 p. 100, pour anesthésie locale 1 a. 25 cc.

Solution AA à 1 p. 100, pour anesthésie locale 3 a. 10 cc.

Solution B à 2 p. 100, pour anesthésie régionale 6 a. 2 cc.

Solution BB ; 2 p. 100, pour art dentaire 100 a. à 1 cc.

Solution C. à 5 p. 100, pour rachianesthésie 6 a. à 3 cc.

Solution J. à 10 p. 100, pour badigeonnage usage externe et divers 5 a. à 2 cc.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté — LYON.

ALLOCHRYisine LUMIÈRE

Chrysothérapie par voie-intramusculaire.

Traitement de choix des Tuberculoses et des Rhumatismes chroniques infectieux.

Constitution. — Thiopropanol sulfonate double d'or et de sodium.

Propriétés. — Injectée sous la peau ou dans les muscles, s'absorbe facilement ; sa toxicité est très faible.

Cette préparation donne la possibilité d'appliquer la méthode chrysothérapique sans avoir recours à la voie intraveineuse, d'une utilisation toujours délicate et souvent dangereuse, ni sans avoir à redouter les graves accidents si fréquents avec les sels d'or même administrés à doses modérées.

Indications. — Sa parfaite innocuité facilite un emploi large de la chrysothérapie, et la facilité remarquable avec laquelle elle est absorbée permet d'étendre cette méthode, sans arrière-pensée, aux cas bénins où il est normal de ne vouloir faire courir aucun risque au malade. Une indication toute particulière : le rhumatisme chronique infectieux où les résultats dépassent toutes les espérances. Pas de contre-indications formelles, cependant agir avec prudence dans les insuffisances hépatiques profondes, les lésions rénales (albuminurie), les lésions intestinales.

Dans les cas très rares de troubles anaphylactoïdes, la substitution au solvant spécial d'une ampoule EMGE LUMIÈRE en é vite le retour.

Présentation. — Boîte contenant deux ampoules pour une préparation extemporanée de la solution : une de 2 cc. d'Allochryisine ; une de 8 cc. de sérum artificiel.

3 dosages : 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 20.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté — LYON.

ALLONAL « ROCHE »

ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

Action thérapeutique. — L'Allonal Roche est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine, il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamino-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnogènes de l'acide isopropylallylbarbiturique ($C^{10} H^{14} O^3 Az^2$).

Indications thérapeutiques. — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie; agitation, excitation, délires, etc.

Avantages. — L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0,16 isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 compr. par 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, av. un peu d'eau ou de tisane, 1/2 h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C¹⁰

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

ALLOPHAQUINA

(le cachet analgésique rationnel).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-3.

Allophanate de benzyle.....	10 cgr.
Pyramidon	30 —
Poudre de quinquina.....	10 —

Mécanisme d'action. — L'Allophanate de benzyle donne par hydrolyse, *in vivo*, de l'alcool benzylique antispasmodique agissant comme un véritable mordanceur du pyramidon, et de l'urée diurétique entretenant la perméabilité rénale.

Toutes les Algies. — Articulaires, musculaires, nerveuses : 1 à 3 cachets par jour.

Laboratoire du Jécol

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine).

ALOÏNE HOUDÉ

Granules titrés à 4 centigrammes.

Aloïne Houdé

Principe actif cristallisé de l'aloès des Barbades.

Doses et mode d'emploi :

Comme laxatif :

1 à 2 granules le soir en mangeant.

Comme purgatif :

3 à 4 granules le soir en se couchant.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

ALOPLASTINE

PÂTE À L'EAU ASEPTIQUE

Indications. — Toutes les dermatoses aiguës et subaiguës et toutes les maladies des peaux fragiles. **Ne présente pas les inconvénients des pommades à base de corps gras**, évite les méfaits de ceux-ci dans les eczémas aigus et les dermites artificielles. Spécialement indiquée dans les érythèmes des nouveau-nés et les eczémas des nourrissons.

Mode d'emploi. — S'applique avec le doigt ou une spatule. À recouvrir de gaze ou à saupoudrer de talc stérilisé ou mieux, de poudre d'Aloplastine. S'enlève avec de l'eau bouillie ou de l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

Présentation. — Tube de 100 grammes environ.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France
3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise).

ALOYSINE

Pilules à base de suc d'ail.

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliagée.

Indications. — Entérites, Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire, Urticaire.

Posologie. — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension interrompre 48 heures tous les 2 jours).

Pommade Aloysine. — Tuberculoses externes, Plaies suppurées, Dermatoses, etc.

Prix de vente { pilules : 10 fr. la boîte ;
pommade : 7 fr. le tube.

Laboratoire GOUZÈNE,
139, rue de Paris à PANTIN (Seine).

ALSODINE

Poudre composée de sels alcalins et de lactose.

En faisant dissoudre 1 cuillerée à café de cette poudre dans une tasse à thé d'infusion tiède non sucrée, ce qui représente 125 centimètres cubes de liquide, on obtient une solution de degré cryoscopique $\Delta = 0,38$.

Prescrire cette dose après le repas de midi et du soir, ou au moment des crises douloureuses, chaque fois que les troubles observés pourront être rapportés à une évacuation incomplète ou retardée de l'estomac.

Dyspepsie, hyperchlorhydrie, affections du pylore, atonie, aérophagie, vomissements de la grossesse.

Dépôt O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoire B. O. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal)

Réducteur d'HCl.

Nouvelle thérapeutique gastro-intestinale parce que : l'Alucol n'est pas une formule complexe mais un corps chimiquement défini obtenu selon un procédé spécial.

1° Protection de la muqueuse stomacale par le mucilage colloïdal que forme l'ALUCOL, au contact du suc gastrique hyperacide.

2° Fixation par cette masse mucilagineuse des principes fermentescibles et entéro-toxines.

Formes. — Cachets, comprimés et paquets.

Les paquets (dose spéciale 3 gr., pour pansement gastrique et traitement des états aigus).

Doses. — Un à deux cachets ou comprimés une heure avant et une ou deux heures après chacun des principaux repas. Le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau sucrée, le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner et environ deux heures après le repas, midi et soir.

Le traitement peut être renforcé sans inconvénient suivant l'avis du médecin.

La boîte cachets : 8 fr.

La boîte comprimés : 12 fr.

La boîte paquets : 12 fr.

Etablissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

ALUNOZAL

Salicylate aluminique basique.

Associe aux effets antiseptiques de l'acide salicylique l'action astringente et absorbante de l'alumine sous état gélatineux. Tolérance parfaite.

Indications :

Diarrhées aiguës et chroniques de toute nature, Diarrhée des nourrissons ;

Posologie :

Adultes : 2 à 10 comprimés ou 2 à 10 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

AMBORHINOL

Double ampoule (compte-gouttes) nasale à l'Ephédrine et à l'argent colloïdal chimique en solutions séparées.

Médication plus spécialement réservée aux enfants.

Décongestif et calmant, sans contre-coup dilatateur, par la sol. d'Ephédrine végétale à 1 p. 100.

Bactéricide puissant par la sol. d'argent colloïdal albuminée à 1 p. 100.

Les deux médicaments faciles à employer par instillations nasales successives.

Indications. — Inflammations et infections nasopharyngiennes, adénoïdites, otites, grippe, rhino-bronchites, asthme infantile et de l'adulte, coryza spasmodique.

Mode d'emploi. — Instiller 2 à 3 fois par jour dans chaque narine IV à V gouttes de la solution 1 (Ephédrine), et quelques minutes après IV à V gouttes de la solution 2 (ag. colloïdal).

Laboratoires A. REGAGNON et C^o

276, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

Tél. Vaugirard 26-30.

AMIBIASINE

Extrait de garcinia composé.) (Accepté par le Service de Santé.)
Fournisseur du Ministère des Colonies.

Non toxique — Sans contre-indications.

Solution brune stabilisée, de saveur amère.

Action. — Antiparasitaire et bactéricide puissant. Agit sur l'amibe et ses kystes. Calmant des douleurs abdominales, du ténésme. Antihémorragique et antidiarrhéique énergique sans action constipante.

Indications. — Diarrhées de toutes natures et origines. — Dysentérie amibienne, bacillaire. Cholagogue. Entérites chroniques, muco-membraneuse, tuberculeuse — Diarrhée infantile, cholériforme. (Voir Bioentérase). Pyélite. Colibacillurie.

Doses. — Formes aiguës : 6 à 12 cuillers à café par jour.

Formes chroniques : 3 à 6 cuillers à café par jour.

Administrar le médicament jusqu'à sédation des symptômes intestinaux.

Curé d'entretien : 2 cuillerées à café par jour, 8 jours par mois, pendant 1 à 3 mois.

Régime : Régime habituel des entéritiques en notant de s'abstenir totalement du lait, des œufs, du bouillon de légumes. Comme boisson : Thé léger sucré ou eau.

Diarrhée infantile. Formuler : Amibiasine B. B. 1 à 3 cuillers à café par jour. Remplacer le lait par l'eau bouillie ou eau de riz sucrée.

Prix : 16 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires AMIBIASINE — 58, rue de Miromesnil — PARIS.

AMIDAL

Amidon paraffiné. — Ferments lactiques.

Forme. — Poudre, comprimés, cachets, dragées.

Indications. — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, artériosclérose, appendicite chronique.

Mode d'emploi. — Deux à 3 cuillerées à café ou 6 à 8 comprimés, cachets ou dragées par jour.

Prix au public :

La boîte de Poudre, Comprimés, Cachets : 16 francs.

Le flacon de Dragées : 15 francs.

Le tube de Comprimés : 8 francs.

La boîte de Poudre P. M. : 12 francs. (Boîte aluminium).

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien,
4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

AMINO-SEL BYLA

(En flacons-salières.)

Composition. — Renferme des corps chimiquement définis, *extraits des féculents et des fruits* : glutamates et tartrates alcalins.

Propriétés. — *Condiment hautement sapide*, absolument inoffensif, de conservation indéfinie. Communique aux aliments *la véritable saveur* du SEL, en même temps que l'arome de la viande.

Indications. — Tous régimes achlorurés et déchlorurés, albuminurie, affections circulatoires, hépatiques, néphrites aiguës, scarlatine, etc.

Mode d'emploi. — Saupoudrer les aliments avant de les consommer, au goût de chaque malade (ne jamais faire cuire avec les aliments).

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire. PARIS.

AMIPHÈNE CARRON

Le plus puissant antiseptique intestinal.

Nouvel Antidiarrhéique iodé.

Présenté en cachets de 25 centigrammes de : Dioxyphène iodo-sulfonate de potasse C₆ H₄ O₅ SKI + 3 aq.

Création du Laboratoire Carron, l'*Amiphène* contient 31 p. 100 de son poids en iode dissimulé et possède les qualités suivantes :

- 1° *Ne fatigue pas l'estomac*, parce que inattaquable par le suc gastrique.
- 2° *Toxicité nulle. Pas d'iodisme.* Chez l'animal, le chat supporte par kilo et sans aucun trouble *per os* 5 grammes d'Amiphène ; en injection sous-cutanée: 2 gr. 50. Tolérance absolue chez l'homme avec de hautes doses et un traitement prolongé (observations multiples).
- 3° *Antisepsie intestinale parfaite.* Combat les fermentations et les putréfactions intestinales (nombreuses analyses coprologiques).
- 4° *Rapidité de l'action curative.* Remarquable.

Indications. — Toutes les diarrhées quelle qu'en soit l'étiologie, aiguës ou chroniques, Diarrhées banales, Fermentations ou putréfactions intestinales, Entérocolites muco-membraneuses, Diarrhées tuberculeuses, Diarrhées colibacillaires, Diarrhées des pays chauds, suites de Dysenterie.

Mode d'emploi et posologie. — 2 à 4 cachets par jour à prendre au début de chaque repas.

Boîte de 12 cachets : 20 francs.

(C. R. Académie de médecine, 19 novembre 1929 ;
Société de gastro-entérologie, décembre 1929 ;
Société de pathologie exotique, décembre 1929 ;
Société de pathologie exotique, janvier 1931.)

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires CARRON

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

AMPHOSTÈNE

Composition. — Tartrate d'Eséridine, Intrait de Valériane, Intrait de Ballote stab., Intrait de Gui.

Formes. — Ampoules et dragées.

Mode d'action. — Activant du vague et frénateur de l'hyperexcitabilité du Sympathique.

Indications. — Troubles nerveux vago-sympathiques, Etats psychonévrosiques, Eréthisme cardio-vasculaire, Syndrome solaire, Toux spasmodiques, Trachéites spasmodiques et saisonnières, Asthme, Rhume des foins.

Mode d'emploi. — Sympahticotonie pure : 1 à 2 ampoules par jour.

Dystonie associée et toux spasmodiques : 1 à 2 dragées avant chaque repas.

Laboratoires des Produits VELY
132, av. Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

AMPHO-TABLETTES RONCHÈSE

Comprimés à base d'Ampho-vaccin rhino-pharyngien.

Composition. — Chaque comprimé de 0 gr. 30 contient le résidu sec de son poids de bouillon-vaccin à base de : *pneumocoques*, *pneumobacilles de Friedlander*, *streplocoques*, *micrococcus catarrhalis*, *coccobacilles de Pfeiffer*, *entérocoques*, *staphylocoques* et 40 millions de chacun de ces germes stérilisés et stabilisés par le brome qui est ensuite neutralisé.

Indications. — Véritable gargarisme sec aux antiviruses, immunisant et curatif.

Traitement des angines, irritations de la gorge, toutes les infections buccales : *gingivo-stomatites*, *pyorrhée alvéolaire*, *accidents de dents de sagesse*, etc...

Leur rôle prophylactique en période de grippe est des plus importants.

Doses. Mode d'emploi. — La dose moyenne est de 10 à 15 comprimés par jour, à sucer lentement.

Pour les enfants en bas âge, broyer le comprimé dans une cuiller à café et faire sucer la poudre obtenue d'un goût agréable.

Le flacon de 70 comprimés : 14 francs.

Laboratoires des Ampho-Vaccins

A.-D. RONCHESE, Docteur en Pharmacie
6, rue Rothschild — NICE.

AMPHOTONYL

Sédatif spécifique du système vago-sympathique.

Composition :

Phényl-éthyl-malonyl-urée (<i>gardénal</i>)...	0,02
Extrait de belladone.....	0,002
Para-acetphénétidine (<i>phénacétine</i>).....	0,10
Extrait fluide d'aubépine.....	0,05

pour un comprimé.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Indications thérapeutiques. — Analgésique. Sédatif général. *S'emploie dans tous les états anxieux, névrosiques.* Spasmes douloureux. Palpitations, Insomnies, Dyspepsies nerveuses, Asthme, Troubles endocriniens, névralgies, etc.

Action très efficace. Aucune contre-indication.

Doses. — 2 à 6 comprimés ou plus par jour, entre les repas.

Prix : Le tube de 40 comprimés : 16 fr. (sans impôt).

Laboratoires de l'AMPHOTONYL

20, rue du Bourg — LAON (Aisne).

Dépôt général pour toute la France et Colonies :

Office Commercial Pharmaceutique

71, rue du Temple — PARIS.

AMPHO-VACCINS RONCHÈSE

Lysat bactérien, ou filtrat de cultures, et bactéries entières:

Vaccins injectables : anti-infectieux, anti-staphylococcique, intestinal, pulmonaire, urinaire.

Vaccins à ingérer : anti-infectieux, anti-staphylococcique, antityphoïdique T. A. B. (curatif), intestinal, pulmonaire, urinaire.

Vaccins pansements : antipyogène, rhino-pharyngien. *Pyo-amphogel* (gelée molle à base d'Ampho-Vaccin pansement antipyogène). *Ampho-Tablettes* (comprimés à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien).

Composition, avantages, indications, posologie :

Voir page 38, **Ampho-Tablettes.**

page 1145, **Vaccins Ronchèse.**

page 877, **Pyo-Amphogel.**

AMPOLASES

Composition. — Extraits totaux ovariens, orchitiques, rate et foie, préparés à froid et maintenus en suspension isotonique avec toutes leurs propriétés physiologiques. Ampolases O, Ampolases G, Ampolases R et Ampolases F.

Indications. — Troubles des fonctions génitales. Dépression.

Doses. — Absorption par voie buccale d'une ou deux ampoules par jour, contenant 0,20 de produit actif.

Durée du traitement : 12 jours au moins par mois.

La boîte de 6 ampoules : 18 francs.

OPOLASES

Composition. — Dragées contenant à l'abri de l'air les différents produits opothérapiques prélevés aseptiquement dès l'abat et desséchés par froid et l'air sec.

Avantages. — Ces produits sont dosés de telle sorte qu'ils permettent aisément les combinaisons individuelles les plus variées.

Principaux produits. — *Opolases* : Ovaires « O », Ovaires et Thyroïdine « O. T. », Thyroïde « T. », Surrénale totale « S. », Ovaires-Surrénales-Hypophyse-Thyroïdine « P. », Testicules Surrénales-Hypophyse-Cérébrine « P. M. », Mammaire « M. », Hypophyse « H. ».

La boîte : 18 et 16 francs.

Laboratoire E. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

AMPOULES BOISSY

pour inhalations.

Ampoules Boissy de nitrite d'amyle.

Indications. — *Angines de poitrine, Hémotysies, Syncopes, Crises gastriques du Tabès, Mal de mer, Migraines, etc.*

Ampoules Boissy d'iodure d'éthyle.

Indications. — *Asthme, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

Mode d'emploi. — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main.

Prix : 15 fr. la boîte de 12 ampoules.

AMPOULES BOISSY

d'iodure de potassium.

Pour injections hypodermiques.

Formule. — Ampoules de 2 cc. contenant :

KI pur stabilisé	0 gr. 10
Iodure de codéine	0 gr. 001

En solution aqueuse.

Indications. — Médication extrêmement active des *accidents rhumatismaux*, en particulier : *rhumatismes articulaires et déformants, névrites, sciaticques*. Amélioration très rapide dès la 3^e ou 4^e injection, suivie d'une guérison durable. Résultats remarquables contre les accidents de la *ménopause*, et toutes applications classiques des iodures.

Propriétés thérapeutiques. — Injections indolores (grâce à l'iodure de codéine) ou peu douloureuses, toujours bien supportées. Diffusion immédiate, sans aucune réaction et sans aucun accident d'iodisme.

Mode d'emploi. — 1 ampoule par jour, en injection sous-cutanée profonde (ou intramusculaire).

Prix : 18 fr. la boîte de 10 ampoules.

Laboratoires BOISSY

49, rue Hoche — COURBEVOIE, près Paris.

AMPOULES DE DIGALÈNE « ROCHE »

Digitale injectable
étalonnée physiologiquement.

Glucosides totaux de la feuille de Digitale
pourpre titrée d'après les prescriptions du
Comité d'Hygiène de la Société des Nations.

Dose moyenne. — 1 à 4 ampoules et plus par
24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Solubilité
parfaite, dosage rigoureux. — Action très
rapide, tolérance absolue, effets constants
aux mêmes doses, pas d'accumulation
(Voir *Digalène « Roche »*).

Injections. — Hypodermiques, *intravei-
neuses*, intra-musculaires (indolores).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

AMPOULES DE PANTOPON « ROCHE »

(Opium total injectable.)

1 amp. de 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche ».

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 3 amp.
par 24 heures et plus. *Enfants* : 1/4 à 1/2 amp. par
année d'âge et par 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Toutes celles de
l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON « ROCHE » représente tous les
alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates
solubles et injectables.

0,01 ctg. de Pantopon « Roche »

= 0,50 ctg. de teinture d'opium.

= 0,025 mgr. d'extrait d'opium.

= 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6 et 12 ampoules.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e)

AMPOULES DE SÉCACORNINE « ROCHE »

(Tous les principes actifs de l'ergot de seigle.)
(Voir page spéciale Sécacornine « Roche ».)

Indications thérapeutiques. — Hémorragies de toute nature, myocardites, congestion des poumons et de l'encéphale, atonie utérine avant, pendant et après les accouchements.

Doses et mode d'emploi. — 1 ampoule de 1 cc. de Sécacornine « Roche » agit comme 4 grammes de seigle ergoté.

Dose moyenne : 1/2 à 1 ampoule par jour.

Dose d'urgence : 2 ampoules et plus par 24 h.
(Voie hypodermique ou intramusculaire.)

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

AMPOULES DE SPASMALGINE « ROCHE »

(Antispasmodique vrai.)

Composition. — Chaque ampoule contient :

Un centigramme Pantopon « Roche ».

Deux centigrammes Papavérine « Roche ».

Un milligramme Atrinal « Roche ».

(Voir page spéciale Spasmalgine « Roche ».)

Indications thérapeutiques. — *Tous les états spasmodiques* et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voies hypodermique et intramusculaire).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

AMPOULES DE THÉOBRYL « ROCHE »

Indications. — Toutes les fois que la Théobromine n'a rien donné, qu'il y a intolérance gastrique ou susceptibilité des malades ou chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

Doses et mode d'emploi. — Chaque ampoule = 2 cc.
Dose moyenne utile : *Adultes* : 1/2 ampoule 2 à 3 fois par jour.

Enfants : 1/4 ou 1/2 dose.

Dose d'urgence : *Adultes* : 3 à 4 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

Enfants : 1 à 2 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

(*Par voie endoveineuse ou intramusculaire.*)

Nota. — Les injections intramusculaires sont *indolores* ; il faut les faire à la face externe de la partie fessière de la cuisse. — (Voir thèse du D^r Jouisse, Paris 1920, et les travaux des Prof. Pouchet, Rémond, Duhol, des D^{rs} Richard-St-Yves, Vigouroux, Ségard, Bénech, etc.)

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

AMPOULES NÉVROSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration indolore de la Strychnine par voie sous-cutanée, en association avec divers rectorporants et toninervins.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, adynamie.

I. — Névrosthéniques simples.

La dose de strychnine est constante : 1, 2, 3, ou 4 milligr. par ampoule selon la demande. Le type en est la série suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.
Strychnine (Sulfate) 1, 2, 3 ou 4 milligr.
suivant la demande.

II. — Névrosthéniques progressives.

Administration de la strychnine à doses progressivement croissantes. Chaque série comprend 24 ampoules et renferme 16 dosages de strychnine allant de 1 à 10 mill.

Le type en est la formule suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.
Sulfate de strychnine.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Abriot — PARIS (IV^e).

AMPOULES REIPAR

Composition. — Acide salicylique d'origine végétale et stabilisé par des procédés spéciaux.

Indications. — Tous les rhumatismes vrais, toutes les algies rhumatismales, Sciaticques.

Action. — Curative certaine, sédative très rapide.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, suivant les indications de la notice.

Prix : 15 fr. la boîte de 10 ampoules de 2 cc.

Echantillon gratuit à réception d'une simple carte de visite adressée au

Laboratoire du REIPAR

LUCQUY — (Ardennes).

AMUNINE

Vitamine A.

Composition. — Solution huileuse de Vitamine A de croissance et anti-infectieuse concentrée et physiologiquement titrée en unités (1 cc. = 1.500 unités Javillier).

Propriétés thérapeutiques. — L'Amunine a pour effet de compléter les rations alimentaires, toujours déficientes en Vitamine A.

Indications. — L'Amunine est indiquée : chez l'enfant, dans tous les cas où l'on constate une *insuffisance du développement*, un *arrêt de la croissance*, ou des *irrégularités dans la courbe du poids*. — Chez l'adulte, dans les *diarrhées*, la *fatigue générale*, l'*amaigrissement*, la *perte de l'appétit* et, en général, pour mettre un organisme affaibli à l'abri des infections. — Elle est également indiquée dans la *grossesse*.

Posologie. — En flacon de 24 cc., solution dans l'huile d'olives. — Jusqu'à un an : XX gouttes ; de 1 à 10 ans, XL gouttes. — *Adultes et adolescents* : LX gouttes par jour, à mélanger à l'alimentation ordinaire, et dans du lait tiède pour les tout petits.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et vitamines de croissance
des Céréales germées.

Formes. — Comprimés et Sirop.

Indications thérapeutiques. — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose, Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculents.

Mode d'emploi. — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop 3 fois par jour après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou deux comprimés écrasés d'amylodiastase ou une cuillerée à café de sirop dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Prix : le flacon sirop . 17 fr. 50 ;

la boîte de comprimés : 13 fr. 75.

**Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPÉNIER**

10 et 12, rue Clapeyron — PARIS.

R. C. 150.854

ANACAMPHRE

Camphre hydrosoluble indolore.

Constitution. — Solution à 22 p. 100 de camphocarbonate d'aminoéthanol. 1 cc. = 0 gr. 10 de camphre droit.

Avantages. — A. *Sur l'huile camphrée.*

Remplace l'huile camphrée dans toutes ses applications. Action plus rapide et plus régulière. Possibilité d'utiliser la voie intraveineuse dans les cas graves. Facilités d'emploi, en raison de l'absence de tout corps gras (Possibilité d'user d'aiguilles très fines).

B. *Sur les camphro-sulfonates.*

Jamais de douleur, meilleure tolérance.

Jamais d'abcès éloignés.

Action plus complète (le dégagement du camphre est plus facile avec la série carbonique qu'avec la série sulfonique).

C. *Sur les succédanés du camphre.*

Ceux-ci ne dégagent pas de camphre. Action moins sûre.

Indications. — Toutes celles de l'huile camphrée : Adynamie, collapsus, shock, défaillances cardiaques, grandes hémorragies, affections cardiaques dépressives, pneumonies, broncho-pneumonies, hémoptysies, etc...

Mode d'emploi. — *Adultes* : Jusqu'à 2 grammes de camphre par 24 heures. *Enfants* : 1 à 2 cgr. par année d'âge.

Injectons intraveineuses. — Fractionner et injecter lentement.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

ANACIDASE

Poudre absorbante, anti-acide, anti-fermentescible.

Facilite les digestions ;

Décongestionne le foie ;

Désinfecte l'intestin.

Prix au public : 10 francs.

Aux médecins pro-pharmaciens : 5 fr. (même par unité) chez les grossistes.

Par postaux franco gare 4 fr. 50, par minimum de 20 unités demandées au :

Laboratoire MEUNIER

11, boulevard Davout

AUXERRE (Yonne).

Tél. : 5-94.

ANACLASINE RANSON

Antianaphylaxie, Cytophylaxie, Prophylaxie anticancéreuse.

L'*Anaclasine Ranson* (ανά = contre, κλάσις = choc) est une préparation *anti-anaphylactique polyvalente et cytophylactique*.

Forme. — Comprimés et granulé.

Action. — Elle évite le choc anaphylactique, désensibilise l'organisme, stimule la fonction cellulaire, améliore l'état hépatobiliaire, rétablit l'équilibre sympathique, régularise la tension, entrave l'apparition et l'évolution du cancer.

Composition. — L'*Anaclasine* comprend, d'une part, de l'hyposulfite de magnésium et des composés halogénés du Magnésium associés à l'Hyposulfite de soude, et d'autre part, de multiples Polypeptides spécifiques de bœuf, de cheval, de mouton, de porc, de gibier, de cabillaud, de merlan, de rouget, de crustacés, d'œuf total, de lait, de pois, de haricots, de lentilles, de céréales, de gélatine animale (*vingt peptones différentes*).

Indications. — Anaphylaxie alimentaire, intolérance digestive, déficience hépatique, intoxication alimentaire, migraines, insomnies, vertiges, eczéma, urticaire, maladie de Quincke, asthme, dyspnée, rhume des foies, coryzas spasmodiques, tachycardies, arythmies, arthritisme, tumeurs bénignes, cancer.

Doses journalières. — *Adultes* : 3 à 5 comprimés par jour, 1/2 heure avant les repas, ou 4 à 6 cuillerées à café de granulé.

Enfants : de 1 à 3 comprimés par jour, ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie

121, avenue Gambetta — PARIS.

Tél. : Ménil. 62-80, 62-81, 62-82.

ANAPEPTONE VASSAL

Forme. — Comprimés de Peptone, remplaçant les cachets (conservation parfaite).

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticaires, troubles intestinaux.

La boîte : 18 francs (4 tubes).

Échantillon gratuit sur demande.

Établissements Léon DANJOU
LILLE

ANAQUINTINE LESCÈNE

Composition. — Aldéhydes benzylcinnamiques, Thymol, Eucalyptol.

Formes — 1^o *Solution aqueuse*. Liquide légèrement rosé, entièrement miscible à l'eau. — 2^o *Solution huileuse* avec éphédrine pour instillations nasales (flacons stilligouttes).

Propriétés. — Puissant antiseptique diffusible. En applications sur la gorge et la poitrine et en gouttes huileuses dans le nez ; elle calme la toux et réalise l'antisepsie des voies respiratoires.

Indications. — Toux, grippe, coqueluche, rhumes, sinusites, adénoïdites.

Associée au *Balsamol*, elle constitue le traitement conjugué des toux spasmodiques donnant des résultats remarquables particulièrement dans la *Coqueluche*.

Prophylaxie des maladies contagieuses en aspersion ou pulvérisation sur les vêtements, linge, draps, etc., en inhalations froides (Méthode de Milne), en gouttes dans les narines (solution huileuse).

Mode d'emploi. — 1^o *Solution*. La diluer de 4 à 5 parties d'eau chaude pour compresses sur la gorge et la poitrine, recouvrir de taffetas gommé et d'une bonne couche d'ouate, laisser en place toute la nuit. En inhalations froides et en aspersions, l'employer pure.

2^o *Gouttes nasales*, 3 à 8 gouttes dans chaque narine 3 à 8 fois par jour.

Prix : 12 fr. sans compresse. — 15 fr. avec compresse.

14 fr. gouttes nasales.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

ANASECTOL

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tique, calmant, propre, agréable ; ne tache pas.

Indications. — Toutes piqûres d'insectes.
(Voir également « *Baume Tanex* »)

Mode d'emploi. — Étaler avec l'extrémité du doigt une petite quantité d'*anasec-tol* en frottant quelques minutes sur l'endroit de la piqûre. Le soulagement est immédiat.

Laboratoire DEBRUÈRES

66, rue de Paris — POISSY (S.-et-O.).

ANAUURAL

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Gardénal, rutonal, bo-rotartrate de calcium.

Indications. — Épilepsie essentielle, épilepsie jacksonienne, Prurits.

Doses. — 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 20 francs (10 jours de traitement).

Laboratoires LAMAR

1, place Forbin

AIX-EN-PROVENCE

ANAXERYL

Forme. — Pommade (tube).

Composition. — Dioxyanthranolsulfonate de sodium, Thioélaïdinosulfonate de sodium, Huile de Bouleau, Résorcine, Baume du Pérou.

Propriétés pharmacodynamiques. — Réducteur, Antiparasitaire, Antiseptique.

Indications. — Toutes dermatoses sèches ou squameuses, Psoriasis, Parakératoses, Affections parasitaires.

Mode d'emploi. — Appliquer l'ANAXERYL en massant légèrement. Enlever l'excès de pommade avec un tampon d'ouate.

Le tube (grand modèle) : 11 francs (en France)

Le tube (petit modèle) : 6 francs (en France)

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e)

ANDROCALCION

Forme H

Composition. — Association de Calcium, de Magnésium, de Phosphore, combinée à la Théobromine, à l'Iodaseptine et à l'Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Ménopause masculine, *Préventif* des troubles de la Cinquantaine, *traitement* de ses accidents : adjuvant indispensable de toute intervention génitale ou paragénitale chez l'homme (Prostatectomie, Castration, etc.).

Propriétés. — Agit à la fois sur le système nerveux sympathique, sur l'état général, sur la tension artérielle, sur les fonctions cardiaques. Par son extrait orchitique, apporte à l'organisme le stimulant qui lui manque.

Préparation. Doses. — Se présente sous forme de dragées : Prendre trois fois par jour quatre dragées (soit 12 par 24 heures) douze jours par mois.

Forme E

Composition. — Lactate de Calcium, Glycérophosphate de Magnésium, Iodaseptine, Lobe antérieur d'hypophyse, Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Puberté masculine : troubles de croissance et de développement chez l'adolescent. S'adresse surtout aux enfants de petite taille, entre 14 et 18 ans, dont le développement général et le développement génital sont insuffisants.

Présentations et Doses. — Dragées à avaler sans croquer. Prendre 3 fois par jour 3 à 4 dragées par 24 heures, 12 jours par mois.

Laboratoires CORTIAL.

15, boulevard Pasteur — PARIS.

ANDROSTINE CIBA

Hormone issue de la lignée spermatogénétique de la glande génitale mâle.

Action physiologique. — *Chez la femme* : Equilibrante de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. Peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas. — *Chez l'homme* : Activa-trice de la spermatogénèse. — *Dans les deux sexes* : Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.

Indications. — *Chez la femme* : Ménopause chirurgi-cale. Hypersthénie génitale, érotomanie, onanisme. troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. *Chez l'homme* : Infantilisme, impuissance. *Dans les deux sexes* : Obésité, Engelures, acrocyanose, diabète. Comprimés, ampoules.

Doses. — 2 à 6 comprimés par jour, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

ANÉGRINE

Composition :

Acide quinoléique, carbonique, associé à l'Arbutine, à la phénolactine et au cascara.

Action :

Elimination rapide de l'acide urique. — Augmen-tation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein. — Excitation de la fonction cholagogue du foie.

Indications :

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chro-nique. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Mode d'emploi :

Cas aigus, 6 à 10 comprimés par jour, en deux ou trois fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés par jour. — Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre.

Laboratoires RIVIER

26 et 28. rue Saint-Claude — PARIS.

ANEXOL

Antiseptique chloré, parfumé, non irritant.

Formes. — Double boîte de 80 comprimés.

Boîte de 40 —

Principe actif. — Sel sod. acid. sulfam.

Toluène monoch. (chloramine T.)

Doses. — Pour 1 litre d'eau chaude :

Gargarismes 1 à 2 comprimés.

Urologie et gynécologie.. 2 à 4 —

Pansements des plaies... 4 à 6 —

La dissolution des comprimés d'Anexol se fait immédiatement, même à froid.

Prix : 14 fr. la double boîte. La boîte : 8 fr.

LABORATOIRES DROUET ET PLET

RUEIL-MALMAISON (S.-et-O.).

ANGIOLYMPHE DU D^r ROUS

Prétuberculose — Tuberculose.

Dans toutes ses manifestations : Pulmonaire, Ganglionnaire, Osseuse, Péritonéale, Rénale, Intestinale.

Indications :

Dans les formes pulmonaires.

DIMINUTION et DISPARITION de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs, de la Fièvre et de tous les Symptômes.

AUGMENTATION de l'appétit, du poids, des forces, du sommeil, amélioration rapide de l'état général.

DIMINUTION, DEGENERESCENCE et DISPARITION des BACILLES DE KOCH et autres micro-organismes pathogènes.

Dans les formes ganglionnaires, osseuses, rénales, etc.
Amélioration rapide de tous les symptômes. Une boîte suffit d'ordinaire pour donner un commencement d'amélioration sensible.

Posologie. — De 2 à 5 cc. en une injection dans la fesse, faite quotidiennement, par série de 8 à 12, et reprise après 10 à 12 jours d'interruption.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE.

MORO. ph. de 1^{re} cl., 15, av. de la Défense, Puteaux.

ANGIOSEDINE

Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Formule. — Ext. mou de passiflore, de cratoegus, de jusquiame, gardénal, nitrite de soude, extrait de muguet, de gui, d'hama-mélis, marron d'Inde, d'hydrastis, hypophyse et silicate de soude.

Forme. — Comprimés dragéifiés de 0,50.

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour.

Pharmacie BEAU

36, rue des Archives — PARIS (IV^e).

ANGIOXYL DU D^r ROUSSEL

Nature. — Extrait pancréatique hypotenseur à action trophique sur les vaisseaux, titré physiologiquement.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension artérielle, artériosclérose, artérites de toute nature. Ulcères gastriques, ulcères variqueux. Maladie de Basedow, Anxiétés. Troubles de la Ménopause.

Formes. — 1^o Angioxyl-Ampoules, en boîtes de 10 ampoules ; 2^o Angioxyl-Sirop, en flacons de 100 cc. environ.

Doses. — De 1 à 3 ampoules par jour en injection intramusculaire pendant 18 jours.

Ou 3 à 4 cuillerées à café de sirop par jour.

Aucune contre-indication.

Laboratoire des PROXYTASES

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

ANIODOL

Le plus puissant antiseptique interne et externe, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

ANIODOL INTERNE

Forme. — Gouttes.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, gripes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

Mode d'emploi et doses :

Nourrissons : III à V gouttes à chaque tétée.

Enfants : XX à L gouttes.

Adultes : XXX à CC gouttes.

Par jour dans une tasse de lait ou de tisane, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

ANIODOL EXTERNE

Formes. — Solution normale ; solution concentrée ; comprimés ; poudre ; savons, ovules ; vaseline.

Indications. — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

Mode d'emploi et doses. — Normale : 1 cuillerée à bouche pour 1 litre d'eau. Concentrée : XXX gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés (injections vaginales) 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre : (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon : asepsie et désinfection des mains et des plaies. Ovules (gynécologie) : un ovule le soir. Vaseline : plaies, accouchements, rhinologie.

Laboratoires de l'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes. — NANTERRE (Seine).

Envoi d'échantillons gratuits à MM. les Docteurs.

ANOÏDE

Traitement des hémorroïdes.

Suppositoires, Pommade.

Formule simple. — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive).

Formule composée. — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive), Adrénaline, Eucaïne, Menthol.

Administration. — *Crises aiguës* : Suppositoires Anoïde formule simple. *Cas habituels* : Suppositoires Anoïde, formule composée. Pommade Anoïde.

La caractéristique des suppositoires Anoïde est de réaliser un véritable pansement isolant qui entoure l'hémorroïde d'une enveloppe souple et adhésive dont la viscosité empêche tout frottement irritant contre les tissus voisins.

Mode d'emploi. — *Suppositoires* : Un le soir en se couchant. *Crises aiguës* : Un matin et soir.

Prix : 16 francs.

Pommade : Application locale, matin et soir.

Prix : 13 francs.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS.

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

ANOZYL

Liquide épais contenant Thymol arsénié.

Indications. — Rhinite atrophique, Ozène.

Mode d'emploi. — Badigeonnage de la muqueuse nasale avec un porte-coton et coton situés dans la boîte, matin et soir.

Avantages : expérimenté depuis vingt ans, donne 80 p. 100 de succès.

**Laboratoires des Produits Oto-Rhino-
Laryngologiques**

du Dr DEROZIER

24, rue Jardel — BORDEAUX (Gironde).

ANTALGOL DALLOZ

Composition. — Quino-Salicylate de pyramidon.

Forme. — Granulé.

Propriétés. — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

Indications. — Rhumatisme aigu ou chronique, Goutte, Lumbago, Sciatique, Migraines, Névralgies, Grippe, Contre l'élément Douleur en général.

Dose. — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.
Le flacon : 15 francs.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (Xe).

ANTASTHÈNE

Composition. — Reconstituant du système nerveux, à base de glycérophosphates associés à un extrait cérébral et spinal.

Forme. — Comprimés, Ampoules de 2 cc.

Indications. — Reconstituant du système nerveux ; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

MODE D'EMPLOI.

Enfants : 1 injection tous les 2 jours,
2 comprimés par jour aux repas.

Adultes : 1 injection par jour,
4 comprimés par jour aux repas.

Prix : 20 francs la boîte (12 amp. ou 50 compr.),

Laboratoire de Biologie Appliquée

H. GARRION et C^{ie}

54, faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

V. BORRIEN, Docteur en pharmacie.

ANTASTHME CIBRAND

Forme. — Pilules dragéifiées.

Composition. — Association adrénaline, Hypophysine, Iodure de Caféine, Grindélia, Lobélie, Quebraco, etc.

Indications. — Asthme, Emphyseme, Bronchites chroniques, Catarrhes bronchiques, Dyspnées.

Posologie. — 4 à 6 par 24 heures.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoire de l'Antasthme

199, av. Victor-Hugo

AUBERVILLIERS (Seine).

ANTÉLOBINE

(Lobe antérieur d'hypophyse.)

Composition. — Hormone sexuelle du lobe antérieur d'hypophyse, physiologiquement titrée.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant excitant de l'ovaire, l'Antélobine est la clef du fonctionnement ovarien. Elle agit, par l'intermédiaire de l'ovaire, sur l'ensemble du tractus génital.

Indications. — Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien, d'agénésie et d'hypogénésie sexuelle ; aménorrhée, hypoménorrhée, retards de la puberté, troubles de la ménopause naturelle. N'agissant que par l'intermédiaire de l'ovaire, l'Antélobine est sans action chez les ovariectomisées totales.

Posologie. — En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (solution aqueuse) titrées à 20 unités par ampoule. Une série de 6 injections sous-cutanées commençant vers le quinzième jour qui précède la date présumée de la prochaine menstruation.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique
des D^{rs} Dufour et Le Hello.

Médication fondée sur les propriétés coagulantes du sérum d'animaux en état d'anaphylaxie.

Indications. — Hémorragies et Etats hémorragipares. Hémoptysies. Hémostase pré-opératoire.

Posologie et mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule de 10 cc., à renouveler au besoin après quelques heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

ANTHRAXONE FORNET

Vaccin buccal contre la Furonculose

Principe actif. — Staphylocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Traitement spécifique de la Furonculose.

Posologie. — 1 à 3 pilules, 3 fois par jour, 1/2 heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Fait disparaître les Furoncles naissants, fait mûrir les autres.

Prix : 29 francs.

Vente et échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie
23, rue du Caire — PARIS (II^e).

SERVICE D'ETUDE ET DE FABRICATION :
Institut de Microbiologie
SARREBRUCK (Sarre).

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Spécifique de la Goutte et du Rhumatisme.

Solution diiodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique	3 gr. 50
Colchicine.....	0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner).....	1 gr. environ.
Excipient. Q. s. pour 100 cc.	

Dose et mode d'emploi. — *Accès* : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

Indications thérapeutiques. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.

Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, le rein, le foie et l'estomac. *Calme l'accès en 24 heures.*

**LABORATOIRES DE LA PHARMACIE
DE LA PLACE ROYALE**

2, rue du Champ-de-Mars — REIMS
Compte Postal Paris 234-33. R. C. Reims 4478.

ANTIASTHMATIQUE DOMERGUE

Principes actifs. — Valériاناتes de Diméthyl et Triéthylxanthine.

Indications. — Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques.

Présentation. — Capsules.

Doses médicamenteuses. — 2 à 6 par jour, par deux à la fois de préférence, matin ou soir ou matin et soir.

La boîte de 30 capsules : 18 francs.

Laboratoires DOMERGUE
AGEN (Lot-et-Garonne).

ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de
Solanées nitrées, digitale et menthol.

**Rétablit l'eupnée. Facilite l'expectoration.
Calme la toux.**

Mode d'emploi. — Faire brûler une pincée de
poudre sur une soucoupe et aspirer doucement
la fumée par les narines.

Indications. — Crises d'asthme, Emphysème,
Oppressions des bronchites chroniques, Catarrhes,
Coryza spasmodique, etc.

Cigarettes Schulzé-Bengalais
aux mêmes principes.

Laboratoires FAGARD

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.
Tél. : Molitor 07-05.

DERNEVILLE

7, rue de Joncker — BRUXELLES (Tél. 111-73).

ANTI-ASTHME DEHAUSSY

A tout asthme, quelle que soit sa forme, il faut une même médication de fond visant le déséquilibre vago-sympathique commun à tous ces malades.

Médication de fond.

Hypophyse, Surrénale, Euphorbe, Lobellie, Belladone, Arrhénal.

Médication complémentaire

particulière à chaque variété d'asthme.

Médication de la crise :

Antiasthmine E. : éphédrine naturelle (à donner par comprimé de demi-heure en demi-heure dès le début de la crise). Sédation en 20 à 30 minutes.

Médication d'entretien :

10 à 20 jours par mois pour éviter la réapparition des crises. Donner suivant les cas :

Antiasthmine A (iodure) : asthme sec.

Antiasthmine B (expectorants, balsamiques) : asthme vieilli avec bronchique chronique et emphysème.

Antiasthmine C (iodure-caféine) : Asthme vieilli avec retentissement cardiaque, dyspnées paroxystiques des vieux scléreux pulmonaires.

Posologie :

Comprimés : 2 à 3 par 24 heures.

Sirop : 2 à 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

Pilules : 4 à 6 par 24 heures.

Enfants, 10 ans : demi-dose.

Prix : 16 francs.

Laboratoire DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

ANTIDIABÉTIQUE MONAVON

A base de kola et sans sucre.

Indications thérapeutiques. — Dans le traitement du diabète, la Kola agit comme un adjuvant qui s'attache à certains symptômes et qui développe la résistance de l'organisme :

Elle diminue la glycosurie ;

Comme aliment d'épargne, elle agit sur les tissus musculaires en diminuant l'urée, elle agit sur les éléments nerveux en diminuant les phosphates ;

Elle est tonique, reconstituante, et lutte contre l'amalgrissement causé par l'excès de désassimilation.

Composition et Mode d'emploi :

Elixir contenant : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur.

— — — 0 gr. 021 saccharine par verre à liqueur.

Un à 2 verres à liqueur après chaque repas.

Prix : 18 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens.

14, rue Victor-Hugo — LYON.

ANTI-ÉPILEPTIQUE DE LIÈGE

Elixir bromuré d'une action puissante évitant les inconvénients du bromisme. En 4 numéros.

Épilepsie, crises nerveuses, neurasthénie, troubles nerveux.

EPILEPSIE. POSOLOGIE

1° *Enfants au-dessous de 7 ans.* — Seulement le n° 1 :

Moins de 5 mois : 1/4 mes. par j.

5 mois à 1 an : 1/2 —

1 à 4 ans : 1 à 2 mes. par j. } en augment.

4 à 7 ans : 2 à 3 — } graduellem.

2° *De 7 à 10 ans.* — Seulement le n° 1.

3° *De 10 à 14 ans.*

N° 1. 1^{re} bouteille 2 1/2 mesures par jour.

— 2^e — 3 — —

— 3^e — 3 1/2 — —

N° 2. 1^{re} bouteille 3 — —

— 2^e — 3 1/2 — —

— 3^e — 4 — —

4° *Adultes.* — Le choix du numéro de début dépend de l'intensité de la maladie et de la constitution du malade. Les personnes faibles et celles qui n'ont d'accès qu'à un mois d'intervalle commenceront par le n° 1. Les bonnes constitutions victimes d'accès fréquents commenceront par le n° 2.

N° 1. 1^{re} bouteille 3 mesures par jour.

— 2^e — 3 1/2 — —

N° 2. 1^{re} — 3 — —

— 2^e — 3 1/2 — —

N° 3. 1^{re} — 3 — —

— 2^e — 3 1/2 — —

N° 4. 1^{re} — 3 — —

— 2^e — 3 1/2 — —

La mesure dont nous nous servons jauge 15 cc. (soit une cuillère à soupe).

Les doses indiquées plus haut sont toujours prises en trois fois diluées dans une infusion de thé diurétique de Liège.

Le flacon : 25 francs, impôt compris.

Laboratoire **FANYAU**

48, rue Claude-Lorrain — LILLE.

ANTIFURONCULEUX DOMERGUE

Principes actifs. — Juglandine. Méthylpyrazolone. Alcalins.

Propriétés. — S'oppose au développement du Staphylocoque. (Réussit même alors que les autres moyens ont échoué.)

Présentation. — Cachets (boîtes de 24).

Durée du traitement. — Minimum 21 jours.

Emploi. — 2 cachets par jour, demi-heure avant chacun des 2 principaux repas.

La boîte : 16 francs.

Laboratoires DOMERGUE
AGEN (Lot-et-Garonne).

ANTIGÉNINES

Vaccins par voie buccale.

500 milliards de microbes par ampoule de 10 centimètres cubes.

Boîte de 6 ampoules de 10 centimètres cubes.

Prix : 25 francs.

Antigénine C. E.

Colibacilles-Entérocoques : Entérite, Appendicite, Syndrome entéro-rénal, Diarrhée infantile.

Antigénine C.

Colibacilles polyvalents : Colibacillose, Pyélonéphrites gravidiques.

Antigénine S.

Staphylocoques polyvalents : Anthrax, Furunculose, Staphylococcies.

Antigénine E. P. S.

Entéro-Pneumo-Streptocoques : Grippe et ses complications, Fièvres puerpérales, Angines.

Antigénine T. A. B.

Bacilles typhiques, Para A. et Para B. : Fièvres typhoïde et paratyphoïdes.

Posologie. — Donner le contenu d'un flacon-ampoule dans de l'eau sucrée ou dans une infusion aromatisée au gré du malade, matin et soir bien à jeun, une demi-heure au moins avant toute alimentation.

Aux nouveau-nés et enfants : Donner de un demi à un flacon-ampoule, suivant l'âge.

Vaccins par voie hypodermique.

Même série que les Antigénines, vaccins par voie buccale,

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

Faire une injection hypodermique, tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant le cas, en commençant par 1/2 centimètre cube, augmenter de 1/2 centimètre cube chaque jour, jusqu'à 2 centimètres cubes.

Bouillon-Antigénine pour pansements.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

Rhino-Antigénine pour instillation nasale ou otique.

Boîte de 4 ampoules. Prix : 15 francs.

Ovules-Antigénines : métrites et toutes leucorrhées.

Boîte de 6 ovules. Prix : 15 francs.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1 place Lucien-Herr — PARIS (V°).

(Anciennement 43, rue Tournefort.)

Gobelins 26-21.

ANTIGRIPPINE MIDY

Cachets dosés à 0 gr. 65.

Poudres d'Aconit, de Belladone, de Gelsemium et de Dover, Caféine, Phénacétine et Pyramidon, Codéine (1 cgr. par cachet).

Ni quinine ni antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — Pour les adultes, dès le début de la grippe, prescrire 1 cachet dans un grog chaud, de préférence à distance du repas et au moment de se coucher. Renouveler au besoin 2 heures après. Le lendemain et jusqu'à la fin de l'attaque, un cachet matin et soir.

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, Analgésique, Bactéricide.

Indications. — Grippe, Influenza, Rhume, Coryza, Maux de tête, Courbatures, Névralgies.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).

ANTINÉASE

Composition. — Gélose, kaolin, magnésium hydrocarbonaté. Forme granulée.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement gastrique, transforme l'excès nuisible d'H-Cl en chlorure de magnésium naissant.

Indications. — Aigreurs, hyperchlorhydrie, ulcère de l'estomac. Prévient le cancer.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin à jeun et 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

M. SALAVERT

Pharmacien de 1^{re} classe

SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde)

ANTIPHI

Le plus rapide reconstituant. Médication Arsénio-Phosphorée par sensibilisation.

Deux formes. — Elixir. Solution.

Indications. — Etats prétuberculeux. Tuberculoses apyrétiques. Surmenage. Toutes les anémies. Convalescences. Neurasthénies. Enfants chétifs.

Posologie. — *Elixir* : Un petit verre après les deux repas.

Solution : Une cuillerée au milieu des deux repas.

Laboratoires de l'ANTIPHI

JEAN CAPIN, Docteur en Pharmacie
ROQUEFORT (Landes).

ANTIPHMIQUE VADAM

Chimiothérapie anti-tuberculeuse et anti-infectieuse pulmonaire. Cinnamate de benzyle, cholestérine, Iode combiné, Gaïacol. Eucalyptol, Goménol, Huile d'arachide neutralisée, stérilisée, q. s. p. 1 cc. 1/2.

Résultats certains chez les malades curables (Antisepsie, Cicatrisation et Histogénèse, Reprise de poids), 1 ampoule tous les deux jours, ou chaque jour (réchauffer l'amp. au B-M avant l'emploi). Injection indolore, résorption aisée.

Prix au public, boîte de 12 ampoules :
22 francs.

Echantillons, littérature aux

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en pharmacie

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III^e).

ANTIPIOL

Vaccin filtrat antipyogène polyvalent.
Immunisation locale suivant la méthode de Besredka.

Trois formes :

- 1^o Pommade pour pansements non adhérents.
- 2^o Ampoules de 10 cc. pour compresses.
- 3^o Ampoules de 1 cc. pour oto-rhino.

Indications. — Furoncles, Phlegmons, Abcès, Plaies infectées, Plaies variqueuses, Ostéomyélites, Gercures des seins, Crevasses et toutes blessures ou maladies de la peau.

Prix : Les 3 formes : 12 fr.

Laboratoire de Biologie médicale
7, avenue des Sources — NICE.

ANTIRRHOÏDE

Huile indienne : Balaninum, Lentiscum, Myagrium, Laurium, Spirea, etc.

Indications. — Traitement des hémorroïdes.

Mode d'emploi. — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibelargement avec l'huile ANTIRRHOÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer des SUPPOSITO-CONES ANTIRRHOÏDES qui plongés dans l'huile antirrhoïde doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Le grand flacon : 26 fr. — Le demi-flacon : 14 fr. 85.

La boîte de supposi-cônes : 12 fr.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

ANTISCIATIQUE

P. Chambon.

Indications. — Traitement étiologique et rapide de la *Sciatique*, du *Lumbago* et des *douleurs rhumatoïdes*. Aucune contre-indication.

Composition. — Association de métaux ionisés catalyseurs d'oxydation (Mn, Mg, Ca, Ni, Fe et excipient lactosé). Forme : paquets.

Mode d'emploi très important. — 7 paquets par jour, d'heure en heure, sans discontinuer malgré les repas, chaque paquet dissous dans une cuillerée à soupe d'eau.

Boîte de 30 paquets : 12 fr. 50

Boîte grand modèle (90 paquets) : 33 fr. 50.

Laboratoire P. CHAMBON

Place Francheville — PÉRIGUEUX
(Dordogne).

ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements spécifiques microbiens.

Antivirus colibacillaire.

Antivirus staphylococcique.

Antivirus streptococcique.

Antivirus mixte (strepto-staphylococcique).

Antivirus polyvalent (pneumo-strepto-staphylo).

En boîtes de 3 ampoules 10 cc. Prix : 12 fr.

— de 12 — 4 cc. — : 20 fr.

— de 6 — 4 cc. — : 10 fr.

Antivirus puerpéral (streptococcique) en boîtes de 2 ampoules 50 cc. Prix : 20 fr.

Atoxicité absolue.

Conservation indéfinie en ampoules scellées.

Antivirus mixte en pommade (Arapal) :
10 fr. et 5 fr.

H. VILLETTE, Pharmacien

Produits de « La BIOTHÉRAPIE »,
131, rue Cambronne — PARIS (XV^e).
Téléphone : Vaugirard 11-23.

ANTONAL

Traitement rationnel et polyvalent de l'hypertension vasculaire. — Spécifique des scléroses artérielles et viscérales. A base de principes dynamogénétiques du gui. — Diméthylquinoxanthine. — Extrait total hépatique.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament d'une grande efficacité par son action à la fois diurétique, antitoxique et hypotensive, d'où son indication dans l'hypertension vasculaire et les maladies qu'elle accompagne : Artériosclérose, Cardiopathies artérielles, Angine de poitrine, Ménopause, Congestions hémorragiques, Néphrites, etc.

Deux formes :

Cachets : 1 à 3 par jour. — Comprimés : 2 à 6 par jour.

Prix : { 12 fr. la boîte de cachets
12 fr. la boîte de comprimés } sans impôt.

Littérature et échantillons :

Laboratoires CARESMEL

2, quai Paul-Bert — TOURS.

Téléphone : 19-42.

ANUSOL MIALHE

Iodo-résorcino-sulfite de bismuth.

Forme :

Suppositoires ; pommade.

Indications :

Hémorroïdes.

Agit également bien contre la constipation, prostatites, etc.

Dose :

Un suppositoire matin et soir.

Laboratoire du D^r MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

ANXIOSEDINE

Médication sédative et régulatrice du Système nerveux.

Forme. — Sirop.

Composition :

Codéine	0,005
Chlorhydrate de Morph.....	0,007
Extr. mou de Jusquiame	0,03
Extr. mou d'Aconit	0,0025
Extr. mou de Salix Alba.....	0,30
Extr. fluide de Passiflore	0,50
Teint. Cratoegus Oxyac.	XV gouttes.
Sirop d'Ecorces d'oranges amères glycér.....	Q. S.

Pour une cuillerée à café.

Indications thérapeutiques. — Anxiété, Dyspnée anxieuse, Oppression, Etats spasmodiques, Neurasthénie, Mélancolie, Hypochondrie nerveuse, Angoisse, Toux et insomnies nerveuses.

Dose. — Déséquilibre du système nerveux : 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Insomnies nerveuses : 1 à 3 cuillerées à café le soir en se couchant dans une tisane.

Prix : 16 fr.

Echantillons :

Laboratoire du PNEUMOGENOL

Place Saint-Goëry — EPINAL.

APHLOÏNE TROUETTE-PERRET

Elixir contenant en totalité les principes extractifs des plantes tropicales : Aphloïa, Piscidia, Hamamelis, Hydrastis et Viburnum.

Indications. — Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté et du Système veineux (varices et hémorroïdes).

Sédatif utéro-ovarien.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café par jour aux principaux repas.

Prix au public : 16 fr.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, rue des Immeubles-Industriels

PARIS (XI^e)

APHOSAL

Spécifique de l'insomnie,

Chez les cardiaques, les dyspeptiques, les surmenés.

Composition. — Chloralose chimiquement pur, préparé d'après les travaux des professeurs Ch.-Richet et Hanriot.

Présentation. — Tube de 12 cachets de 20 centigr.

Propriétés thérapeutiques. — Procure un sommeil réparateur, sans cauchemar, avec réveil agréable. Non toxique ; sans action sur le rein, ni l'estomac. Tonique du cœur.

Posologie. — Un cachet dans un verre d'eau ou d'infusion avant le coucher.

Prix : 9 fr. 75.

Laboratoire de l'APHOSAL

48 bis, avenue Mozart — PARIS (XVI^e).

APIOLINE CHAPOTEAUT

Composition. — Principes actifs de l'apium petroselinum.

Indications. — Troubles de la menstruation, Douleurs cataméniales, Ménorragies, Aménorrhée.

Action. — L'APIOLINE régularise les règles et calme les douleurs qu'elles provoquent. Son action est supérieure à celle des autres emménagogues. Complètement inoffensive, reste sans action sur la grossesse.

Mode d'emploi. — 4 à 5 jours avant l'apparition des règles et pendant toute leur durée, prendre 2 à 3 capsules par jour au moment des repas.

**LABORATOIRE
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
Dr PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne, PARIS.**

APPETYL

Gouttes apéritives à base d'extraits fluides stabilisés de : Gentiane, Simarouba, Condurango, Colombo et Camomille. Extrait délipodé de muqueuse gastrique.

Donne de l'appétit. — Aide la digestion. — Favorise l'assimilation des médicaments.

Ne contient ni AS ni P.

Posologie. — Aucune contre-indication, XV à XX gouttes un quart d'heure avant les repas dans un liquide sucré ou mieux encore sur un morceau de sucre. Enfants : 1/2 dose.

Prix : 15 francs pour 25 à 30 jours de traitement.

Laboratoires de l'APPETYL

3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise).

APSOPHOL

Composition. — Agents nervins, antispasmodiques et sédatifs, à l'exclusion des iodures et de tout alcaloïde stupéfiant.

Indications. — Spécifique contre les bourdonnements d'oreilles, sifflements, battements et tous bruits subjectifs d'oreilles, avec ou sans vertiges.

Mode d'emploi. — Uniquement chez l'adulte. XXX gouttes matin et soir dans un peu d'eau ou de tisane 1/4 d'heure avant les repas. Après 8 jours de traitement, prendre XL gouttes matin et soir. Cure de 15 jours environ.

Echantillon sur demande.

Prix : 16 francs (exempt d'impôt).

Laboratoire R. O. L.

(Spécialités Oto-Rhino-Laryngologiques)

H. DUFOUR, Pharmacien de 1^{re} classe

Ancien Interne des hôpitaux de Paris.

40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret).

AQUINTOL PETIT-MIALHE

COQUELUCHE

Chloro. — Bromo. — Fluor.

Modifie, dès les premiers jours, la toux. Le malade n'éprouve plus de suffocation ni de vomissements, il retrouve l'appétit et le sommeil.

Doses :

Au-dessous de 6 mois :	2 à 4 cuill. à café.
Moins de 5 ans :	3 à 8 — à café.
Moins 15 ans :	4 à 8 — à dessert.
Adultes :	5 à 8 — à soupe.

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

Laboratoire du Docteur MIALHE
8, rue Favart — PARIS.

ARAPAL

Bouillon-Vaccin en pâte molle, non grasse, contenant 75 p. 100 d'Antivirus Strepto-Staphylococcique Mixte de *La Biothérapie*.

Son excipient non gras évite toute macération et cloisonnement des exsudats.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Pyodermites, plaies infectées, Brûlures, etc...

Présentation. — En tubes.

Grand modèle : 10 francs.

Petit modèle : 5 francs.

H. VILLETTE, Pharmacien
131, rue Cambronne — PARIS (XV^e).

ARCANAN

Marque déposée.

Atophan quininique	0 gr. 141
Atophan.....	0 gr. 134
Urotropine.....	0 gr. 225

Forme :

Boîte de 10 cachets à 0 gr. 50.

Propriétés thérapeutiques :

Traitement et prophylaxie de la *grippe* et des affections des voies respiratoires supérieures.

Mode d'emploi :

3 à 4 fois par 24 heures : 1 cachet pendant le repas, accompagner l'emploi de l'Arcanan d'un verre de Vichy ou autre boisson alcaline.

Laboratoires CRUET

13, rue Miollis — PARIS (XV^e).

ARDOGÈNE

Elixir fortifiant, Reconstituant physiologique, Stimulant énergique Hyperleucocytaire, Antichlorotique.

Indications. — Convalescence, Faiblesse générale, Chlorose, sous toutes ses formes, Grippe, Neurasthénie.

Une cuillerée à soupe contient :

Arrhénal	15 milligr.
Phosphate de soude	15 centigr.
Quinium	45 milligr.
T ^{re} de Noix vomique :	III gouttes.
Extrait fluide de kola :	XX gouttes.

Doses :

Adultes : Une cuillerée à soupe ou un verre à liqueur midi et soir avant les repas.

Enfants : A partir de 10 ans, une cuillerée à café midi et soir avant les repas.

Flacon : 20 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoire LEPORCQ

9, rue du Temple, ENGHIEU-LES-BAINS (S.-et-O.).

ARGION

Désinfectant général dans toutes les affections internes et externes.

Infections intestinales, infections rénales, affections stomacales, fièvres infectieuses, affections rhino-pharyngiennes.

Forme. — Comprimés.

Mode d'emploi. — Affections internes. Adultes : 3 à 6 comprimés par jour, de préférence après les repas. Enfants : 1 à 3 comprimés. Croquer le comprimé ou l'écraser dans un peu d'eau.

Prix : 15 francs.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS.

ARGYBIL

Composition. — Complexe de Vitellinate d'argent (Argyrol de BARNES) et de bile.

Présentation. — Liquide.

Indications. — Traitement de l'ozène, infections aiguës ou chroniques des fosses nasales et du rhino-pharynx. Donne d'excellents résultats en association avec le vaccin local.

Mode d'emploi. — Par le médecin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulvérisations : 2 à 3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS.

ARGYCUPROL

Traitement intégral et polyvalent
de la BLENNORRAGIE.

**Injection urétrale non caustique, absolument indolore
et ne provoquant jamais de rétrécissement.**

Composition. — Argent colloïdal (10 p. 100), détruit
le gonocoque. Cuivre colloïdal (0,1 p. 100), attaque les
microbes associés.

Forme. — Boîte de 6 ampoules-injections.

Indications. — Activité remarquable et tolérance
parfaite aussi bien dans les urétrites les plus aiguës
que dans les urétrites chroniques.

S'emploie en injections urétrales dans les cas aigus,
en grands lavages dans les cas chroniques ; en com-
presses sur les bourses dans les orchites blennorra-
giques ; en instillations dans les conjonctivites blen-
norrhagiques.

Chez la femme, la blennorrhagie, les métrites, les vulvites
et vulvo-vaginites sont justiciables du traitement par
l'Argycuprol.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE (Seine).

MORO, ph. de 1^{re} cl., 15, av. de la Défense, Puteaux.

ARHÉMAPECTINE GALLIER

Antihémorragique

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Solution isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante de *Pectine*, associée à son coferment minéral (Calcium).

La **Pectine**, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, C. R. Ac. Médec., 4 nov. 1924).

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc. Prix : 20 fr.

Boîte de 2 ampoules de 20 cc. — 12 fr.

Indications et Posologie. — *A titre thérapeutique* : Toutes Hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Métrorragies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc.

Faire boire, dans un peu d'eau sucrée, 1 à 4 ampoules en 2 heures, selon la gravité de l'hémorragie.

A titre préventif : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie, obstétrique, etc.

Une à quatre ampoules durant les dix heures qui précèdent l'opération.

Dans les cas d'hémorragies massives ou persistantes on se trouvera très bien d'injecter (sous-cutanée) 20 cc. d'*Arhémapectine* une ou deux fois dans la journée.

Ne présente aucune contre-indication.

Laboratoire R. GALLIER

Pharm., Ex-interne des Hôpitaux de Paris
38, bd du Montparnasse — PARIS (XV^e).

Téléph. : Littré 98-89.

ARHÉOL

Formule. — $C^{15}H^{23}O$.

Composition. — Principe actif de l'essence de santal.

Forme. — Fl. de 40 capsules contenant chacune 0 gr. 20 environ de produit.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal, supérieure elle-même aux essences de Cèdre.

Indications. — Blennorragie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

Dose. — 10, 12 capsules par jour, en 3 fois : le matin, à midi et le soir avant les repas.

Prix : 20 francs.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e)

ARHINE

LAMBIOTTE FRÈRES

Composé formaldéhydo-gaïacolo-tannique chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

Indications. — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du *coryza*, des *rhinites* et *rhinopharyngites*.

Mode d'emploi. — On l'utilise soit en *insufflations*, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les *coryzas*, *rhinites*, *maux de gorge*.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

ARISTARGOL

Association 9 parties Ichtyol, 1 Argent colloïdal, Antiseptique, Décongest., cicatrisant, Résolutif. Non caustique.

Ovules à 1 % (Pansem. vag.).

Poudre à 1 % Alcaline (Inject. gynécologie, toilette muqueuse, yeux, O. R. L.).

Pommades :

Aristargol D à 1 % dermatologie.

Aristargol A (id. + stovaine 1 %) : Hémorroïdes.

Aristargol U à 10 % : pansement utérin (à appliquer par le médecin seulement).
Prix de vente au public : 14 francs.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e)

ARQUÉRITOL LESURE

Huile injectable d'amalgame d'argent
à 40 p. 100 de mercure.

Mode d'emploi. — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

Indications. — Toutes manifestations syphilitiques.

Avantages. — Injection non douloureuse, absence de nodosités, tolérance parfaite grâce à l'action propre de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'hygiène.

Flacon de 5 gr. : 22 fr.

Se fait aussi sous la forme suppositoires.

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, rue du Bac — PARIS.

ARRHENAL ADRIAN

Composition :

Méthylarsinate de soude chimiquement pur.

Action :

Réalise le traitement arsénical par voie buccale avec tolérance parfaite même chez les personnes les plus délicates. Remplace avantageusement le cacodylate de soude.

Indications :

Dermatoses, tuberculoses pulmonaire et viscérale, broncho-pneumonie, grippe, lymphatisme, scrofule, états de débilité, vomissements de la grossesse, arthritisme, asthme, intoxication palustre.

Formes et mode d'emploi :

Gouttes : 12 à 30 gouttes par jour, dosées à 2 milligr. en 2 fois. Ampoules : à 50 milligr. et à 100 milligr. 1 à 2 par jour. Granules à 1 et 2 cgr. : 2 à 6 par jour. Comprimés à 0,025 : 1 à 3 par jour.

ADRIAN et C^{ie}

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

Composition. — Complexe de Ferro-manganèse codiastasique, Arrhénal, Sulfate de Strychnine et Fluorure de Calcium.

Propriétés. — Hématopoïétique, phagocytogène et névrosthénique.

Indications. — Toutes les anémies et les asthénies, le surmenage des écoliers, et les convalescences.

Mode d'emploi. — De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin, midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine, pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

Prix : 15 francs la boîte de 60 pilules.

G. BERGEVIN

Docteur en pharmacie
CHATEAUDUN (Eure-et-Loir).

ARSÉCRINOL

Médication spécifique des asthénies.

Composition :

Eléments catalyseurs sous forme organique : arsenic, fer, phosphore, manganèse.

Eléments opothérapiques : extraits totaux de foie et capsules surrénales.

Forme pharmaceutique. — Granulé très agréable, fondant.

Indications thérapeutiques. — *Toutes les asthénies et déficiences organiques.* Gripes, états pré-tuberculeux, dépression générale, convalescence, surmenage intellectuel, retards de croissance, rachitisme, grossesse, anémies, etc.

Action très efficace. Aucune contre-indication.

Doses. — *Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Adultes : 4 —

Croquer au milieu ou avant les repas. Arrêter le traitement pendant quelques jours et reprendre.

Prix : Le grand tube : 20 fr. (sans impôt).

Laboratoires de l'AMPHOTONYL

20, rue du Bourg — LAON (Aisne).

Dépôt général pour toute la France et Colonies :

Office Commercial Pharmaceutique

71, rue du Temple — PARIS.

ARSÉNIODE BURIAT

Forme Gouttes. — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 p. 100.

Indications. — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatique-arthritique.

Mode d'emploi. — Doses moyennes.

Enfant : II gouttes par 24 heures et par année d'âge.

Adultes : XV à XXX gouttes, 2 fois par jour.

Prix : 14 fr.

Laboratoire BURIAT

25, rue Copernic — PARIS (XVI^e).

ARSÉNOS-SOLVANT

Adopté par les hôpitaux

Serum glucosé avec addition de Gaïacol
et de Chlorétone pour injections hypo-
dermiques d'arsénobenzènes

— Indolores —

Présentation. — Boîtes de 1, 6, 12 am-
poules.

Voir *Sulfarsénol*.

Laboratoires de Biochimie Médicale

Ch. Desgrez, Docteur en Pharmacie.

19-21, rue Van Loo — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 26-62, 04-30.

ARSI-STRYCHNAL LONGUET

Association. « Strychnal-Cacodylate de Na »
des dérivés non-toxiques de la strychnine
et de l'arsenic.

Strychnal 0 gr. 01

Cacodylate de Na..... 0 gr. 25

Sérum isotonique Q. S..... 3 cm³

par ampoule.

Injection rigoureusement indolore.

Doses. — 1 à 2 ampoules par jour.

Indications. — Anémie, Convalescence.

(Voir Strychnal Longuet).

La boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 18 fr.

Laboratoires LONGUET.

34, rue Sedaine — PARIS.

ARSYCODILE

Cacodylate de Soude pur.

Formes. — Ampoules dosées à 0,05, 0,10, 0,20 et 0,50 pour applications progressives (*bien spécifier*).

Indications thérapeutiques. — Accélérateur de la nutrition générale, ramenant l'appétit, etc.

Tout spécialement désigné pour l'usage sous-cutané.

Doses et mode d'emploi. — Une injection par jour pendant huit jours, repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

La première spécialité à base d'arsenic organique (1900).

Prix de vente au public : 12 fr. 50.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

ARSYLÈNE « ROCHE »

Acide allylarsinique.

L'Arsylène « Roche » est un arsenic organique nouveau qui, sur les préparations inorganiques, arsénates, arsénites, liqueur de Fowler, etc., etc., possède l'avantage d'une *toxicité pratiquement nulle*, laquelle permet son emploi à doses élevées, sans craindre la brusque apparition de phénomènes d'arsénicisme tels que sécheresse de la gorge et de la bouche, troubles digestifs et nerveux, symptômes cutanés, bouffées congestives, essoufflement, hyperthermie, etc. ; il est en outre *très bien toléré* par les voies digestives, ne provoque pas de dégagement d'oxyde de cacodyle (odeur alliagée de l'haleine) et il est *utilisé presque complètement* dans l'économie ; peut être substitué en toute sécurité, par le médecin traitant, aux cacodylates généralement employés, dans toutes leurs indications et à toutes doses.

Indications thérapeutiques.

Affections nerveuses et mentales, *sclérose en plaques, Parkinson, contractures, chorée, mélancolie, anxiété, maladies de la peau, psoriasis, affections parasitaires, tuberculose* au début, *anémie grave, période de dépression du traitement Bi ou Hg*, toutes les *Anémies* et toutes les *Asthénies*.

Posologie et modes d'emploi.

Thérapeutique intensive. — 1 à 4 ampoules de 5 cc. à 0,20 tous les 2 ou 3 jours en injections intramusculaires ou endoveineuses *absolument indolores*.

Thérapeutique toni-stimulante. — 1 ampoule de 2 cc. à 0,05 par jour et plus par voie hypodermique ou intramusculaire (injections *absolument indolores*). — *Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose.

Thérapeutique d'entretien. — *Granules* à 0,01 : 1 à 3 granules. — *Enfants* : 1/4 à 1/2 doses selon l'âge, avant chaque principal repas.

ARSYLÈNE « ROCHE »

Granules : Flacon de 60.

Ampoules de 2 cc. : Boîte de 12.

Ampoules de 5 cc. : Boîte de 12.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

ARTERASE

Composition. — Ail, gui, silice, citrate et formiate de soude, marron d'Inde, cupressus, prêle.

Propriétés. — Abaisse la tension artérielle. Diminue la viscosité sanguine. Active la circulation dans les capillaires et les veines. Arrête les hémorragies.

Indications. — Cœur, artères, veines. Présclérose, artériosclérose, hypertension, hémorragies (nasales, oculaires, cérébrales, etc.), hémiplegies, œdèmes. Etats congestifs, vertiges, bourdonnements, troubles visuels. Troubles de la ménopause.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 pilules le matin, à midi et le soir, soit 3 à 6 pilules par jour. Continuer 5 jours, cesser 2 jours et recommencer. Au début du traitement, la dose de 6 pilules par jour sera préférée pour être ramenée à 3 par la suite. Pas de contre-indications.

Laboratoires Biologiques

E. GILBERT, Docteur en Pharmacie

6, rue du Laos — PARIS (XV^e).

ARTÉRION VINCARDI

HYPOTENSEUR

Principes actifs. — Complexes stabilisés extraits du *Viscum album*, de l'*allium sativum*, du *fucus vesiculosus*, du *citrus limonum*. Nitrite sodium.

Forme. — Comprimés lenticulaires glutinisés. **Innocuité absolue**, tolérance parfaite. Pas de contre-indication.

Indications. — Hypotenseur, sclérolysant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires qu'il décrasse et assouplit. — Artériosclérose. — Hypertension, scléronéphroses, présclérose.

Doses. — 5 à 6 capsules par jour aux principaux repas.
Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire VINCARDI.

Ph. VIGUIER, pharmacien

42, avenue Borriglione — NICE (Alpes-Maritimes).

Chèques postaux : Marseille 105-38.

R. C. Nice 9046.

ARTÉRIO-VEININE

Composition. — Crataegus, passiflora, gui, marrons d'Inde, hamamélis (Extraits stabilisés), iode peptonisé.

Indications. — Troubles de la Ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

Forme. — Gouttes.

Doses. — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires J. KRIEGER

121, avenue de Saint-Ouen
PARIS (XVII^e)

ARTORADINE

Hypotenseur radioactif.

Composition. — Iodure de Potassium et Arséniate de soude associés au Bromure de Radium soluble.

Avantages. — Suppression par la radioactivité induite des doses massives et, partant, du iodisme. Vitalisation des cellules artérielles par l'action directe du Radium. Innocuité absolue. Conservation indéfinie.

Indications. — Artériosclérose, présclérose, aortite, asthme, angine de poitrine, œdème, arthritisme.

Posologie. — 4 à 6 pilules (kératinisées) par jour en deux fois au milieu des repas.

Laboratoire de Radiumthérapie

25, rue Vaneau — PARIS.

ASCÉINE

Acet-salicyl-para-acet-phénétidine-caféine.

Analgésique sédatif, antirhumatismal.

Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur.

Indications. — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc., Grippe, Arthrites aiguës et toutes manifestations rhumatismales.

Doses. — Adultes : 2 à 4 comprimés par jour ; enfants : 1/2 à 2 comprimés.

Le tube de 20 comprimés : 4 fr. 50.

La pochette de 4 comprimés : 1 franc.

LABORATOIRES O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

ASCIATINE

Diméthylamido-phényl-diméthyl-pyrazolone-butylchloral.

Analgésique et hypnotique.

Action élective dans le domaine du trijumeau.

Indications. — Douleurs dues aux diverses affections dentaires, douleurs consécutives aux interventions dentaires, névralgies à localisations diverses et particulièrement les névralgies faciales. Lumbago, dysménorrhée, insomnies.

Présentation et posologie. — Comprimés à 0 gr. 25 (boîtes de 3, 12, 24). 1 à 3 comprimés par dose, 4 à 5 comprimés par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

ASCOLÉINE RIVIER

L'ASCOLÉINE est à base de lipoïde phosphoré iodé de foie de morue. Elle renferme les vitamines A et C, la **vitamine D à l'état naturel**, toutes les vitastérines des cellules hépatiques.

Indications. — Inappétence, anémie, convalescences, bronchite, pré tuberculose.

Quatre formes. — *Solution huileuse* : Une cuillerée à café 1/4 d'heure avant chaque repas.

Comprimés (véritables bonbons) : 1 à 5 comprimés suivant l'âge avant chaque repas.

Granulés : De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an.

Ampoules : Une injection intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Toutes pharmacies ou à défaut chez :

Henri RIVIER, Pharmacien,

26-28, rue Saint-Claude — PARIS.

ASEPTONE

L'antiseptique idéal en gynécologie.

Formule. — Menthol, trioxyméthylène, essence thym, sulfate de cuivre, acide borique, alun (deux formes), poudre et comprimés.

Indications. — Antisepsie des organes génito-urinaires de la femme, métrites, vaginites, salpingites, fleurs blanches, ulcération du col de la matrice, toilette intime.

Avantages. — Odeur agréable, solubilité parfaite, ne tachant pas le linge, ni toxique, ni caustique, décongestive, microbicide, laissant après l'emploi une agréable sensation de fraîcheur et calmant immédiatement les démangeaisons.

Emploi. — *Poudre* : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie chaude en injections et lavages, matin et soir.
Comprimés : 1 comprimé pour 2 litres, même emploi.

Prescrire : Une aseptone, poudre ou comprimés,

Littérature et échantillons.

Prix au public : 10 francs.

Laboratoires MOULIN

50, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

ASEPTO-POUDRE

(Paquets)

Antiseptique désinfectant.

Composition :

Pour un paquet :

Trioxyméthylène	0,10
Borate de soude	6
Essence de thym.	IV gttes

Indications. — Hygiène intime des deux sexes, suites de couches, pertes fétides, pertes blanches, métrites.

Avantages. — Dissolution parfaite, odeur agréable.

Posologie. — 1 paquet par injection.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de Thérapeutique normale

Ch. LAVIRE, Pharmacien de 1^{re} Classe

46, rue de Rome — MARSEILLE (B.-du-R.).

ASEPTORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

Composition. — Hyposulfite de soude associé au **Bromure de Radium** en solution stable, rigoureusement dosée, d'absorption agréable.

Propriétés. — Action du Bromure de Radium sur les échanges biochimiques. Action réductrice et désensibilisatrice de l'hyposulfite de soude sensiblement accrue par radioactivité induite (Ravaut, *Presse médicale*, 1920, Missirliu, *Thèse* 1922).

Indications. — Tous les Eczémas, Psoriasis présentant des poussées aiguës, Dermatoses évoluant par poussées récidivantes, Urticaires, Prurits, Dermites artificielles, Furonculose (Werner, Action du Bromure de Radium sur le staphylocoque).

Posologie. — XX à XXX gouttes avant chaque repas dans un liquide très sucré.

Aucun des Inconvénients des doses massives d'hyposulfite de Na: ni diarrhée, ni éructations soufrées.

Établissements **LABORADIUM**

33, rue Saint-Jacques — PARIS.

ASEPTOVULES

Calmant cicatrisant aux essences antiseptiques.

Composition :

Essence de Géranium.	0,0125
Essence de Thym	0,0125
Essence de Verveine.	0,0125
Essence d'Origan..... ..	0,0125
Résorcine	0, 10
Chloral	0, 07
Menthol..... ..	0, 06
Glycérine solidifiée, Q. S. pour une ovule.	

Indications :

Métrites, Vaginites, Véritable pansement gynécologique.

Posologie :

Une ovule le soir en se couchant.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de Thérapeutique normale

Ch. LAVIRE, Pharmacien de 1^{re} Classe

46, rue de Rome — MARSEILLE (B.-du-R.).

ASTHMO-ACTINE

Eupnéique, Antispasmodique, Toni-Cardiaque.
Le plus fort Elixir antiasthmatique connu.

Composition. — Synergie totale : Respiratoire, circulatoire et sympathique.

Une cuillerée à soupe contient : iodure de caféine 0,50, teinture de lobélie 0,50 ; Ext. thébaïque 5 milligr. Ext. belladone 1 milligr. Ars. de soude 1 milligr. Ext. grindelia 0,10... et.

Nouveauté. — Ext. Actœa 0,05. Ext. nat. surrénale au 1/10 : 20 gr. 07 dans sirop antiasthmatique stimulant diffusible pour 15 cc.

Indications. — Asthmes divers. Emphysème. Dyspnée des gazés, Catarrheux, Intoxiqués, etc...

Action rapide curative et préventive.

Posologie. — Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour loin des repas dans un peu d'eau ou de lait. **Enfants :** par cuillerées à café.

Le flacon 210 cc. : 15 fr.

Laboratoires G. BERTHON Pharmacien.
DORNES (Nièvre).

ATHÉROLYSINE

Spécifique de l'Artériosclérose et de ses conséquences.
Silicate de Soude chimiquement pur et Extrait Aqueux de Viscum Album (extrait de Gui avec ses indosés organiques).

Propriétés thérapeutiques. — L'ATHEROLYSINE est le traitement *étiologique et symptomatique* de l'Athérome et des troubles concomitants propres à la cinquantaine (Silicate de Soude, antiscléreux, Viscum Album hypotenseur).

Indications. — Présclérose-Artériosclérose et Hypertension. Toutes Scléroses, Vertiges, Obnubilation intellectuelle, Céphalées, Bourdonnements d'oreilles, Troubles oculaires, Perte de la mémoire, etc.

Forme. — Granulés, comprimés-pastilles.

Posologie. — *Granulés* : 1 à 3 cuillerées à café.
Comprimés : 2 à 6 par jour.

(Conforme aux prescriptions légales, l'Athérolysine peut être prescrite aux Assurés sociaux.)

Le flacon : 14 fr.

Laboratoire JONIDS
DIJON.

ATOPHAN-CRUET

Marques déposées.

Acide phénylquinoléine 2 — carbonique 4.
Produit chimique pur. N'est pas un mélange de médicament.

Formes. — Boîtes de 20 cachets ou comprimés à 40 centigrammes.

Propriétés thérapeutiques. — Rhumatismes, goutte, névralgies.

Mode d'emploi. — Trois fois par jour un cachet ou comprimé pendant le repas. Accompagner l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines.

Prix : 16 francs net (exempt d'impôt).

Laboratoires CRUET

13, rue Miollis — PARIS (XV^e).

ATOPHANYL

Marque déposée.

Atophan sodique. — Salicylate de soude.
Eau stérilisée.

Forme. — Boîtes à 5 ampoules pour injections intraveineuses ou intramusculaires.

Indications. — Formes graves et rebelles du rhumatisme musculaire ou articulaire, goutte, névralgies.

Prix : 36 francs net (exempt d'impôt).

Laboratoires CRUET

13, rue Miollis — PARIS (XV^e)

ATOQUINOL CIBA

Phénylcinchoninate d'allyle.

Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

Indications. — Diathèse urique en général : goutte, rhumatisme, dermatoses d'origine arthritique et toutes manifestations uricémiques.

Doses. — Etats aigus : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

Etats chroniques : 1 cachet ou cuillerée à café de granulé, 8 ou 10 jours par mois.

La boîte de 20 cachets : 15 francs.

Le flacon de granulé : 18 francs.

(Voir Sanoquinol).

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON.

ATURAL

Composition

Poudre à base d'antilab-ferment et de citrate de soude.

Action :

Produit physiologique, absolument inoffensif, dépourvu de goût, extrait du sérum du jeune veau.

Empêche la coagulation du lait dans l'estomac et en assure la digestion intégrale.

Indications :

Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte.

Mauvaise digestion du lait et ses conséquences : vomissements, diarrhée verte des nourrissons, gastro-entérite, troubles digestifs divers.

Mode d'emploi :

Une mesure (environ 1 gr.) pour 100 gr. de lait.

(Ne jamais porter à haute température.)

Prix : 14 francs.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

AVANTOL

Reconstituant total.

Forme. — Granulé de saveur agréable.

Composition. — Ergostérine irradiée crist. ; Nucléinate de manganèse ; Méthylarsinate disodique ; Poudre de rate ; Oxalate de fer ; Hexa-inositol phosphate de chaux et magnésie ; Phosphate de manganèse ; Chlorure de magnésium ; Phosphate bicalcique et excipient.

Indications. — Type des reconstituants, reminéralisateur physiologique énergétique, stimulant et modificateur des échanges nutritifs.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, avant les repas.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS.

Tél. : Danton 81-53.

AVISTYL

Sérum normal d'oiseau.

Autorisé par le décret n° 66 du 22 janvier 1932. (Cette autorisation ne garantit pas l'efficacité du produit.)

Origine. — Ce sérum est extrait du sang de dindons parfaitement sains, ayant subi l'épreuve de l'intradermotuberculisation avec une tuberculine mixte, humaine, bovine et aviaire.

Action. — Ce sérum, qui est le résultat de plusieurs années de recherches et d'expériences, agit d'une façon élective sur le terrain pulmonaire. C'est une médication véritablement spécifique des maladies du poumon.

Indications. — Pneumonie, Bronchites aiguës et chroniques, Broncho-pneumonies, Congestions pulmonaires, Emphysème, Pleurésie, Grippe et catarrhes pulmonaires, Tuberculose au début, Toux rebelles d'origine pulmonaire.

Mode d'emploi. — Injections de préférence intra-musculaires (région scapulaire) de deux ampoules par jour dans les cas aigus et de deux ou trois ampoules par semaine dans les cas chroniques.

Littérature-échantillons sur demande adressée :

Dépôt général :

Laboratoire PERICHON
11, rue Lepic — PARIS (XVIII^e).

AZIGOL THEVENOT

Crises convulsives. États nerveux.

Composition. — Tartrate Borico-Calcique, Phényl-éthylmalonylurée. Extrait de Gelsémium et de Piscidia.

Forme. — Dragées.

Indications. — Toutes crises nerveuses, Epilepsie, Convulsions. Tous états nerveux : Asthme, Prurit, Eczémas, Urticaire, Hyperexcitabilité.

A l'action suspensive des crises par le Phényl-éthylmalonylurée s'ajoute l'action du borotartrate de chaux, modificateur du tissu nerveux et celle des extraits végétaux qui diminuent la sensibilité périphérique et de certains organes, origine des réflexes déclenchant les crises.

Dose. — 2 à 6 comprimés par jour. On peut continuer le traitement par le Borocalcyl.

Enfants : 1/2 à 1 comprimé par jour.

Prix du flacon de 40 dragées : 18 francs.

Laboratoires THEVENOT — DIJON.

AZOTYL

Composition. — Lipoïdes spléniques et biliaires, cholestérine, goménol, camphre, Irradiés aux rayons ultra-violets.

Forme. — Ampoules et pilules.

Propriétés thérapeutiques. — Médication antibacillaire (tuberculoses).

Doses et mode d'emploi.

A. (Ampoules) injections sous-cutanées ou intramusculaires (tous les jours ou tous les deux jours).

B. Pilules glutinisées, six par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

Prix de vente au public. Ampoules : 22 fr. ;
Pilules : 16 fr.

LABORATOIRES « LOBICA »
46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

AZUFROL

Soufre colloïdal. (Procédé A. Lancien.)

Description. — 1° Capsules kératinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° Pommade à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

Action thérapeutique. — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du soufre par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

Indications. — 1° Capsules : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif y adjoindre les injections de sulfuration (voir plus loin).

2° Pommade : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

AZYM

S'oppose à la lenteur des digestions.

Présentation. — Poudre.

Composition. — Bicarbonate, Phosphate, Sulfate de Soude, Hydrate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate de Bismuth.

Posologie. — 1 cuillerée à café après le repas : 1 nouvelle cuillerée à café au cours de la digestion si l'on se sent incommodé. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café.

Indications. — **Hyper et Hypochlorhydrie.** Affections gastro-intestinales de l'enfance. Intoxications alimentaires. Dermatoses d'origine gastrique. Vomissements.

Prix : 14 francs.

Laboratoire PARET

22, rue Guibal — MARSEILLE.

BABEURRE « LA FAYE »

Préparé avec du lait frais à la Ferme de « La Faye » à Marlihes (Loire).

Présentation :

- 1° Babeurre ordinaire (étiquette blanche) aux farines, aussi nourrissant que le lait, d'une digestion très facile. Pour les enfants et les adultes.
- 2° Babeurre léger (étiquette bleue) sans farine, alimentation transitoire, d'une digestion extrêmement facile, convient tout particulièrement aux enfants débiles, aux prématurés, aux vomisseurs. Est tout indiqué également pour les hépatiques.
- 3° Babeurre gras (étiquette rouge) suralimentation. Dans la convalescence, la croissance, peut remplacer le Yoghourt. Plus nourrissant et plus digestible que le lait.

Fournisseur des Hôpitaux, des municipalités de Lyon et de Saint-Etienne depuis 25 ans.

Echantillons et littérature sur simple demande :

JEAN COURBON LA FAYE

Ferme de « La Faye »
MARLHES (Loire).

BABEURRE NUTRICIA

Composition. — Lait écréméensemencé de ferments lactiques sucré au saccharose.

Présentation. — Variétés : babeurre au froment sucré et non sucré. Babeurre au riz sucré et non sucré, en boîtes hermétiquement fermées assurant une conservation du produit pratiquement indéfinie.

Indications thérapeutiques. — Aliment de remplacement dans toutes les gastro-entérites de l'enfance. Le Babeurre simple ne peut être utilisé qu'un jour ou deux. Le Babeurre Nutricia, par son froment ou son riz, est un aliment complet dont l'emploi peut être prolongé.


Gastro-entérites avec vomissements : Babeurre froment.

Gastro-entérites avec diarrhée : Babeurre au riz.

Mode d'emploi. — Se conformer exactement aux indications formulées sur les boîtes.

Léon CLAEYS

1, Boulevard St-Martin — PARIS (3°).



BACKERINE

ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie.
Modifiant l'organisme par développement des agents
de fermentation.

Forme. — Ampoules; cachets, dragées.

Indication. — Traitement de toutes les hyperplasies
(tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

Mode d'emploi. — Injecter une ampoule SOUS LA
PEAU, tous les quatre à six jours. On prescrira en
même temps l'usage des dragées ou des cachets de
ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'effi-
cacité des injections. Prendre avant les repas, quatre
cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans
les cas d'urgence.

La boîte de 8 ampoules : 25 francs.

La boîte de cachets ou de dragées : 16 francs.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

BACTÉ-PHAGES

du Professeur d'Hérelle.

Préparations de Bactériophages mono ou polymicrobiens.

Mode d'action. — Le Bactériophage de d'Hérelle est un principe :

- 1° Qui détruit et dissout les bactéries.
- 2° Qui se régénère au cours de la lyse.
- 3° Dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

Avantages :

- 1° Action puissante et rapide.
- 2° Innocuité absolue.
- 3° Pas de contre-indication.

I. — BACTÉ-INTESTI-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des voies intestinales (Entérocoques, Coli, Staphylocoques, Streptocoques, etc.).

Indications. — Entérites, Colites, Diarrhées infantiles.

Mode d'emploi — Ingestion buccale : Une ampoule matin et soir dans 20 cent. cubes d'eau alcaline.

II. — BACTÉ-COLI-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages adaptés à de nombreuses variétés de bacilles Coli ou paracoli.

Indications. — Colibacilluries, Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Métrites, Prostatites, etc.

Mode d'emploi. — Ingestion buccale : une ampoule matin et soir dans 20 cent. cubes d'eau alcaline. Instillation vésicale. (Voir notice explicative.)

Très important. — L'action du Bacté-Coli-Phage est nulle en milieu acide. Il est donc nécessaire d'obtenir l'alcalinisation des urines.

III. — BACTÉ-PYO-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des infections purulentes (Staphylocoques, Streptocoques, Coli, etc.).

Indications. — Furoncles, Anthrax, Panaris, Phlegmons, Ostéites, Plaies infectées.

Mode d'emploi. — Injection « in situ » (méthode RAIGA) dans le foyer même de l'infection ou dans la région enflammée pouvant passer rapidement à l'état aigu.

IV. — BACTÉ-STAPHY-PHAGE

Composition :

Mélange de bactériophages adaptés aux diverses variétés de Staphylocoques (Aureus-Citreus-Albus).

Indications :

Furunculoses aiguës et chroniques, Anthrax, Infections urinaires à staphylocoques.

Mode d'emploi :

Injections « in situ » (méthode RAIGA). Applications locales en cas d'ulcération.

V. — BACTÉ-RHINO-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes du rhino-pharynx (Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Entérocoques etc.).

Indications. — Grippe, Coryza, Rhinopharyngites, Otites, Sinusites.

Mode d'emploi. — Pulvériser suivant la gravité des cas la valeur d'une ou plusieurs ampoules au moyen du pulvérisateur spécial : Pulvolyseur Ercé.

VI. — BACTÉ-DYSENTÉRI-PHAGE

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes de la dysenterie bacillaire (Flexner, Shiga, Hiss).

Indication. — Dysenteries bacillaires sous toutes les formes.

Mode d'emploi. — Ingestion : Une ampoule dans un demi-verre d'eau ordinaire froide ; répéter la dose de quatre en quatre heures.

Agents Généraux :

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

BACTÉRIOPHAGES LECLERC

STAPHYLOPHAGE : Bactériophage anti-staphylococcique.

ENTEROPHAGE : Bactériophage anticoli.

Composition :

Tous deux sont des bactériophages préparés selon d'Hérelle. Ils sont polyvalents, c'est-à-dire lysent plusieurs types soit de Coli, soit de staphylocoques.

Présentation :

Ampoules de 2 cc. (boîtes de 10 ampoules).

Indications :

ENTEROPHAGE : Manifestations aiguës de l'infection intestinale.

STAPHYLOPHAGE : Toutes les staphylococcies localisées ou généralisées.

Mode d'emploi :

En ingestion : Sans aucun inconvénient, on peut à tout âge ingérer une ou plusieurs ampoules par jour, à distance des repas, dans un peu d'eau froide.

En injection : Dans les infections aiguës, à la dose de 1 cent. cube par piqûre, sans jamais dépasser 3 piqûres s'échelonnant sur une durée de 3 jours.

En pansement : Le Staphylophage peut, en outre, s'employer en pansement en appliquant sur la région infectée une compresse stérile imbibée du contenu d'une ampoule.
Littérature, Echantillon sur demande.

Prix : 25 fr. la boîte de 10 ampoules.

Etablissements T. LECLERC

Docteur P. Lemeland, pharmacien,
10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

BACTIOXYNE

Formes. — Gouttes.

Ampoules pour instillations rectales.

Ampoules pour injections intraveineuses.

Propriétés thérapeutiques. — Manganate calcico-sodico-potassique. Médication antibacillaire, hyperoxydante et recalcifiente.

Indications. — Prétuberculose ganglionnaire et osseuse.

Posologie. — LX à C gouttes 2 fois par jour, de X à XXX gouttes pour les enfants ; en augmentant progressivement de 1 à 2 par jour.

Prix de vente au public : 25 francs.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1^{er}).

BAIN CARBOGAZEUX WOLO

Forme :

Poudres qui, dissoutes, produisent assez d'acide carbonique pour saturer l'eau du bain, sans attaquer les baignoires.

Indications :

Maladies du cœur et de l'appareil circulatoire : hypertension, artériosclérose, etc.

Prix : 8 fr. 45 le bain.

Laboratoires FISCH et C^{le}

4, rue d'Ilzach — MULHOUSE.

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

BAIN CARRÉ

Bain marin complet.

Composition. — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels.

Indications. — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatisme, arthritisme.

Enfants : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.

Gynécologie : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 boîte par bain.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 34°, 15 minutes.

Bains sédatifs : 34° à 39°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII°).

BAIN SALVIA

(Un traitement « aux Eaux » chez soi.)

Composition. — Silicate de magnésie hydraté, perborate de sodium, nitrate d'uranium.

Présentation. — Poudre en étui, chaque étui pour un bain.

Indications. — Stases veineuses (Varices, phlébites), arthritisme, rhumatismes et dépression générale. Soins gynécologiques.

Posologie. — Un bain à la température d'environ 37°, pendant 20 minutes, traitement de 21 jours. En gynécologie : 1 cuill. à soupe par litre d'eau.

Prix de la cure de 21 bains Salvia au public : 136 fr. 50 ;
au corps Médical, 91 fr. 50.

Les personnes qui ne peuvent se rendre à une station thermale peuvent faire leur saison chez elles par une série de 21 « Bains Salvia » pendant 21 jours consécutifs.

Cette série peut être encore ordonnée de temps à autre, entre deux cures « aux eaux ».

Pilules Salvia : Traitement interne des stases veineuses, varices, hémorroïdes, ménopause, puberté, par l'extrait mou de Teskra.

Laboratoires VENOT

139, avenue Emile-Zola — PARIS (XV°).

BALDISEDAN

(BALsamique, DIurétique, SÉdatif, ANti-septique.)

Composition.

Salol	0.02
Benzo-Naphtol	0.02
Extrait mou d'uva ursi....	0.05
Hexaméthylénetétramine...	0.05
Térébenthine de Venise....	0.05
Acide camphorique.....	0.10
Excipient q. s. pour une pilule glutinisée.	

Indications.

Cystites.

Colibacilluries et toutes Pyuries.

Pyélo-néphrites. Cholécystites.

Gonorrhées et complications.

Propriétés thérapeutiques.

Antiseptique et Sédatif génito-urinaire.

Aseptise et clarifie les urines

dont il modifie le p. H.

Tolérance parfaite, sans aucune contre-indication.

Doses.

4 à 5 pilules avant chacun des deux principaux repas.

Littérature et échantillons :

Laboratoires du BALDISEDAN

133, rue Lecourbe — PARIS.

Téléphone : Vaugirard 48-10.

BALLOTYL

Agent le plus efficace
de la Phytothérapie Antispasmodique.
Sédatif du grand sympathique.

Composition :

Alcoolature stabilisée de Ballote aromatisée.

Posologie :

Irritabilité nerveuse. L à C gouttes au
coucher.

Etats sympathicotoniques ou vagotoniques.
5 prises de XXX gouttes par 24 heures.

Prix au public : 15 francs.

**Laboratoire de PHYTOTHÉRAPIE de
PARIS**

M. GUILLON, Pharmacien

113, boulevard Voltaire — PARIS (XI^e).

BALMIGA

Tablettes fumigatoires.

Forme pharmaceutique :

Tablettes comprimées effervescentes.

Composition :

Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence
d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de
menthe, Menthol.

Action :

Antisepsie des voies respiratoires par inhalation.

Indications :

Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza,
Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

Mode d'emploi :

Mettre successivement deux ou trois tablettes
Balmiga dans un verre d'eau bouillante et prendre
deux ou trois fumigations par jour.

Prix : 6 francs.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
Dépôt : 127, Bd St-Michel — PARIS (V^e).

BALSAMOL LESCÈNE

Composition. — Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoate de Benzyle.

Formes. — Sirop, Comprimés.

Caractéristiques. — Produit non toxique plus calmant que le bromoforme, les composés forméniques et les narcotiques. *Chez les enfants*, il peut être administré à partir de 5 à 6 mois.

Antiseptique des voies respiratoires.

Indications. — TOUX, COQUELUCHE, toux émétisante des tuberculeux, asthme, *toux des vieillards*, GRIPPE.

Doses. — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge, ou 3 à 10 comprimés.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour ou 6 à 15 comprimés par jour.

Prix : Sirop, 12 francs. Comprimés, 11 fr. 90.

Laboratoires L. LESCENE

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados)

Téléph. : Vaugirard 08-19.

BALSOFORME

Mélange de Schleich

additionné de Goménol Prevet

(formule du docteur Siauve-Evausy).

Le Balsoforme associe les propriétés du mélange de Schleich à l'action balsamique du Goménol.

Indications. — Anesthésie générale, exempte de complications pulmonaires post-anesthésiques.

Posologie et mode d'emploi. — Verser dans l'appareil d'Ombredanne le contenu d'une ampoule de 60 grammes.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

BAUME BENGUÉ

Analgésique.

Composition. — Menthol, salicylate de méthyle, lanoline.

Indications. — Rhumatisme, goutte, névralgies, points de côté, douleurs abdominales, douleurs de la gorge.

Mode d'emploi. — En onctions deux fois par jour en recouvrant d'une serviette ou flanelle.

Docteur BENGUÉ

Pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

BAUME DAYNOC

Le spécifique des brûlures.

Le BAUME DAYNOC offre la solution définitive et complète du traitement des brûlures de tous degrés, par son efficacité absolue et la simplicité de son emploi. En effet, une seule application *immédiate*, en couche épaisse, supprime instantanément la douleur et empêche les phlyctènes ; donc pas de plaie.

Aucune préparation préliminaire n'est nécessaire. On étend le BAUME sur toute la surface de la brûlure tel qu'il sort du tube. La peau n'est jamais tachée.

Indications. — Brûlures causées par flamme vive, graisse bouillante, courant électrique, sucre cuit, eau bouillante, vapeur, charbon rouge, métal chauffé à blanc, verre en fusion, etc., toutes sans exception, de la plus légère à la plus grave, relèvent du BAUME DAYNOC.

Prix du grand tube 15 fr. 95 (impôt compris).

Prix du petit tube 8 fr. 50 (impôt compris).

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

BAUME DELACOUR

Gerçures et Crevasses des Seins

Gerçures en général.

Baume benzo-tannique

Mode d'emploi. — Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec deux bouts de sein :
6 fr. 50.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie
56, boulevard Péreire — PARIS.

BAUME DE LA MATERNITÉ

Composition :

Chlorhydrate d'amyléine.....	0,10
Résorcine.....	0,20
Acide borique.....	2 gr.
Dermatol	0,50
Baume du Pérou	0,10
Lano-vaseline.....	Q. S.
pour un tube.	

Propriétés thérapeutiques. — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

Indications. — Erythème fessier, toutes gerçures en général.

Prix, le tube : 5 fr.

Dépôt : **Laboratoires NOGUES**

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS.

Anciennement : 11, rue Joseph-Bara — PARIS.

BAUME DU D^r BAISSADE

Composition. — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

Action. — Anti-prurigineux et analgésique, supprime immédiatement les Démangeaisons et la Douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Indications. — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furunculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En onction douce (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Prix au public : 9 fr. 50 et 13 fr. 50.

Laboratoire du Baume du D^r BAISSADE
Saint-Loup — MARSEILLE.

BAUME DURET

Créé et adopté à l'hôpital Saint-Louis
(Dermatothérapie).

Composition. — Combinaison de soufre, goudron de Norvège, camphre, huile de cade, résorcine, borate de soude, gaiacol, dans un mélange d'acétone, huile de ricin, lanoline.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, décongestif et cicatrisant. Ni toxique, ni irritant.

Indications. — Eczéma, Lichen, Psoriasis, Acné Prurigo, Dartres, Parakératoses, Prurit.

Mode d'emploi. — Onction deux fois par jour, recouvrir ensuite d'une compresse de gaze.

Prix : 15 francs.

Enregistré au Laboratoire National du Contrôle des
Médicaments sous le n° 306-3.

H. ROUTIER, Pharmacien de 1^{re} classe
20, rue Saint-Lazare — PARIS.

BAUME IKI

Pommade fondante à l'I et KI

Formule :

Iode bisublimé	1 gr.	} pour 100 grammes de pommade.
Chlorhydrate d'ammoniaque. 1 gr.		
Iodure de potassium	4 gr.	
Iodure de plomb	4 gr.	

Par un procédé spécial de fabrication tous les principes actifs se trouvent en dissolution absolue dans le véhicule gras de la pommade.
AUSSI PAS DE BRULURE A CRAINDRE.

Indications. — Traitement externe des ADENOPATHIES, OREIL-
LONS, Goîtres, Glandes, Kystes, Angines.

Mode d'emploi. — En application sur les parties malades. Recouvrir d'une compresse de gaze et d'un enveloppement ouaté. **NE PAS METTRE DE BAUME IKI SUR LES PLAIES, COUPURES OU ECORCHURES.**

Présentation. — En un original pommadier en verre de 30 gr. bouché au moyen d'une calotte en bois.

Prix : 8 francs.

Produit enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments

Préparé par Fernand MERCIER
Pharmacien, 54, rue d'Etretat.
FECAMP (Seine-Inférieure).

BAUME PY

Composition. — A base d'essences antiseptiques et cicatrisantes.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, antiprurigineux ; cicatrisant, décongestif, non caustique.

Le **BAUME PY** permet le renouvellement des pansements sans arrachement des tissus et sans hémorragies ; puissant régénérateur de la cellule, il comble progressivement les plaies en donnant une cicatrice souple et résistante.

RESULTATS REMARQUABLES pour le malade qui ne souffre plus dès les premiers jours, et pour le docteur qui a en mains un cicatrisant incomparable.

Indications. — **ULCERE VARIQUEUX**, Eczéma variqueux sec ou suintant, Plaies atones ; toutes plaies à Staphylocoques : furoncles, plaies infectées, phlegmons, abcès, etc...

Mode d'emploi. — Une ou deux applications locales par jour sur gaze hydrophile, après lavage préalable à l'éther.

Prescrire : **BAUME PY** : 1 tube.

Laboratoire PY

58, boulevard Richard Wallace — PUTEAUX (Seine).

BAUME RHODIA

à base de Rheumacylal
(Salicylate de Glycol)

Succédané inodore du salicylate de méthyle.

Ne tache pas le linge.

Indications :

**Traitement externe des douleurs
humatismales et des névralgies.**

Présentation et mode d'emploi :

Deux présentations : Forme liquide et forme crème.

Onctions légères suivies d'enveloppement ouaté.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

BAUME SÉLÉNIA

AU SÉLÉNIUM COLLOIDAL

Propriétés thérapeutiques. — Il en est quatre principales :

Le **Baume Sélénia** est *décongestif*, calme la *démangeaison*, le *prurit*, *décape* les *téguments*, est *cicatrisant*.

Indications. — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas*, *Pyodermites*, *Ulcérations de la peau*, *Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

Mode d'emploi. — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

Prix du pot : 13 francs.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par **C. DAVID et ses fils**

Pharmaciens, 49, rue de Bitché — COURBEVOIE
(Seine).

BAUME SUELTA

Pommade à l'Esculéol

Composition. — Extrait de Marrons d'Inde stabilisé. Di-Iodosulforésorcinate de Bismuth, Stovaine, Adrénaline, Baume du Pérou, Oxyde de zinc.

Indications et propriétés. — Traitement local des Hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal. **Sédation immédiate de la douleur, décongestion et vaso-constriction**, antiseptie, suppression des hémorragies.

Mode d'emploi. — Onction le matin et après chaque garde-robe. Pansement pour la nuit. Une canule s'adapte au tube pour permettre l'application de la Pommade sur les Hémorroïdes internes.

Prix : 13 francs.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

MICHEL DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

BAUME TANEX

Composition. — Sels d'hydrargyre porphyrisés et lavés ; excipient ; lanoline.

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tique, anesthésique, cicatrisant. Odeur agréable ; ne tache pas le linge.

Indications. — Eczémas, lichen, dartres, herpès, démangeaisons, crevasses, gale du ciment, prurit vulvaire, ulcères variqueux, croûtes et boutons dans le nez.
(Voir également *Anasectol*).

Mode d'emploi. — *Application*, après lavage.

Laboratoires DEBRUÈRES

Pharmacien de 1^{re} classe

66, rue de Paris — POISSY (Seine-et-Oise).

BAUMOLACPININE

pour bains à l'essence de pin.

Forme. — Liquide de fluorescence verte.

Composition. — Essence de pin soluble dans l'eau, ne salissant pas les baignoires.

Indications. — Convalescence, Faiblesse, Débilité, Anémie, Maladies nerveuses, Rhumatismes, Arthritisme.

Posologie. — Une à deux cuillerées à soupe par bain.

Prix :	{	Flacon de	30 gr ...	5 fr. 80
		— de	150 gr....	23 fr. 80
		— de	500 gr....	60 fr. »
		— de	1 000 gr....	110 fr. »

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

BÉATOL

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif nerveux, Hypnotique.

Indications. — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, Intoxications. Maladies nerveuses ou mentales.

1^o Forme : Ampoules.

Composition :

Diéthylmalonylurée	0 gr. 25
Bromhydate de scopolamine.	1/4 de mgr.
Soluté de valériane.....	2 cm ³

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

2^o Forme : Liquide.

Composition :

Diéthylmalonylurée	0 gr. 18
Valériane stabilisé Q. P.....	5 cm ³
Extrait de jusquiame	0 gr. 015

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuill. à café par jour, par doses progressives prises dans de l'eau sucrée, avant le repas du soir, ou au coucher.

3^o Forme : Comprimés.

Composition :

Diéthylmalonylurée	0 gr. 18
Intrait de valériane	0 gr. 10
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 02

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés pris avec de l'eau ou une infusion chaude une heure après le repas.

Prix de vente au public : Comprimés : 14 fr.
Liquide : 14 fr. ; Ampoules : 18 fr.

LABORATOIRES LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

BEEF LAVOIX

ou Vin de Lavoix.

Composition. — A base de vieux vin de Banyuls, le Beef Lavoix contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

Indications. — Convalescence.
Tuberculose.
Epuisement.
Inappétence.
Anémie.
Grossesse.
Allaitement.

Posologie. — Un verre à madère avant ou après chaque repas.

Prix : le flacon, 20 fr. 75 ; le 1/2 flacon, 12 fr. 50

Maison du Docteur PILLET

5, avenue Victoria — PARIS.

BELHÉMINE

Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval, Sérum hématopoiétique.

Indications. — Toutes les anémies, hémorragies, fausses-couches. En pansements locaux : plaies, ulcères variqueux, brûlures.

Mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix public : 18 francs la boîte de 6 ampoules.
Compléter le traitement par l'usage de la

SANGUIPLASMINE.

Granulé préparé avec le Caillot sanguin : 2 cuillérées à café par jour.

Prix au public : 12 fr. le flacon.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoire de Sérothérapie

H. AMMANN, Pharmacien, Licencié ès sciences.

Impasse Adam, 3. BOULOGNE-BILLANCOURT,

Tél. : Molitor 01-90.

BELLADENAL « SANDOZ »

Association de Phényl-éthyl-molonylurée et de Bellafoline.

Sédatif nervin général et des cas résistants.

Indications spéciales. — Epilepsie, angine de poitrine, tremblements, asthme, tous états de crise, anxiété, douleur morale, vomissements de la grossesse.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour.

Epilepsie : 3 à 5 comprimés.

Enfants. — 2 à 4 demi-comprimés.

Produits SANDOZ,

3 et 5, rue de Metz, Paris (X^e).

Dépôt général et vente :

Usine des Pharmaciens de France

129, rue de Turenne, Paris (III^e).

BELLAFOLINE « SANDOZ »

Alcaloïdes totaux de la belladone.

Antispasmodique à effets constants. Modérateur des sécrétions.

Posologie :

Comprimés : 1 à 2, trois fois par jour.

Gouttes : X à XX, trois fois par jour.

Ampoules : 1/2 à 2 par jour.

Sirop : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Naupathie :

Bellafoline : 4 comprimés par jour, un de 2 heures en 2 heures, et en plus :

Belladénal : 2 comprimés pris à la fois le soir au coucher.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e).

Dépôt général et Vente :

Usine des Pharmaciens de France

129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

BEMAX

Aliment vitaminé préparé avec les embryons détoxiqués des céréales (orge, froment, seigle). Une cuillère à soupe de Bemax est plus riche en vitamines que quatre livres de pain complet.

Préparation. — Est faite sous la surveillance constante d'un service médical. Par des procédés spéciaux on arrive à conserver et même à concentrer toutes les vitamines (A; B et E) des céréales, surtout les vitamines B.

Propriétés thérapeutiques. — Le plus précieux des compléments de notre alimentation actuelle.

Indications. — Tous les troubles, provenant d'une alimentation insuffisante en vitamines.

Doses. — Une cuillerée à soupe par jour pour les *adultes* ; pour les *enfants* : une cuillère à café. — D'un goût agréable se prend mélangé à n'importe quel aliment au repas du matin et du soir.

Prix : 22 fr. 50 (boîte pour un mois).

ROBERTS et C^{ie}, Pharmaciens

5, rue de la Paix — PARIS (II^e).

Tél. : Central 69-86.

BENSAMINE

Composition. — Combinaison boro-benzoïque d'Hexaméthylènetétramine. Antiseptique général interne et anti-infectieux puissant. Action combinée du benzoate et de l'urotropine créant dans son absorption humorale et dans son élimination urinaire le milieu acide favorable au dédoublement de l'urotropine en son composant actif, le méthanal (formol).

Indications. — Voies urinaires : urines troubles, alcalines, microbiennes, purulentes. Syndrome entéro-rénal. Pyérites gravidiques, colibacilluries, gravelles.

Etat général : Voies biliaires, coliques hépatiques, ictères, septicémies, rhumatismes, arthralgies.

Formes :

1^o Comprimés instantanément solubles à 0 gr. 50 de combinaison active. Dose moyenne : 3 à 6 par jour (avalés ou dissous).

2^o Bensamine liquide : Goût agréable, pure ou diluée, 1 cuillerée à café correspondant à 1 comprimé 3 à 6 fois par jour.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

74, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).

Tél. : Botzaris 38-78.

BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules, Antisymphilitique énergique.)

Adopté par le Ministère de la Santé et les Hôpitaux.

Indolores. — Ni abcès. — Ni enkystement.

Le **Benzo-Bismuth**, sel soluble, contient 4 centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de 4 centigrammes de métal intégralement actif puisque intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo-Bismuth**, présenté sous forme de poudre, extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de cacydylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15 ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à fait comparables à ceux qu'on est accoutumé d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzobismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant pour 5 injections. Prix médical : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 0-69.

BENZOBROMINE

Antiseptique Entéro-rénal.

Diurétique (Acide benzoïque et théobromine).

Antis ptique urinaire (Formine).

Tonique cardiaque (Théobromine).

Indications. — Grippe, Scarlatine, Rougeole, Pneumonie, *Pyélo-néphrite*, Fièvre typhoïde. Manifestations entéro-rénales, uricémiques et urémiques.

Prescrire : Benzobromine granulé, ou Comprimés, 1 flacon.

Adultes : 6 à 8 comprimés ou cuiller à café, par jour avec un peu d'eau.

Enfants : Réduire de moitié.

Laboratoire HERAULT
BEAUVAIS (Oise).

BENZOFLORINE JULIEN

Gouttes et Comprimés.

Composition :

Extr. fluide valériane fraîche stabil...	1000
Alcoolature de Passiflora Incarn.....	1000
Teinture de Cratægus oxyacantha...	1000
Benzoate de benzyle et dériv. benzylés.	10

Indications. — Tous les états spasmodiques, Insomnies, Angoisses, Vertiges, Eréthisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies, Palpitations.

Posologie. — Insomnies : L à LX gouttes le soir dans une infusion, ou 1 à 3 comprimés. Spasmes : XXV gouttes ou 1 comprimé 3 ou 4 fois par jour. Prix : Gouttes, 13 fr. Comprimés, 15 fr. — Flacon gratuit sur demande.

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie
105, rue de Rennes - PARIS.

BENZOPHOSPHINE CHRISTIAENS

(Antiseptique des Voies urinaires et de l'intestin.)

Seul solubilisant de l'Oxalate de Chaux.

Indications. — Coliques néphrétiques. Lithiase rénale. Diathèses urique et *Oxalurique*, Fermentations du tube digestif.

Composition. — Phosphines, benzoate, magnésie.

Doses. — Moyenne de 3 cuillerées à café par jour, empêche la précipitation de l'Oxalate de Chaux et par suite, la formation de calculs oxaluriques.

Dose de 6 cuillerées à café, comme dissolvant des Calculs.

N'irrite pas le rein comme le fait l'Urotropine et a au contraire une action nettement sédative.

2, rue du Champ-de-Mars — REIMS.

BENZOQUINOL

Composition. — Benzoate de quinoléine, pyridine, thymol, benjoin mentholé eucalyptolé, aconit, créosote iodée.

Propriétés. — Antiseptique et anesthésique des voies respiratoires. Sédatif et antispasmodique certain.

Indications. — *Coqueluche, asthme, emphysème, toux nerveuses, dyspnée, bronchites aiguës et chroniques.*

Caractéristiques. — Effet rapide et continu, pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — En inhalations, quinze gouttes dans un quart de litre d'eau bouillante, deux à trois inhalations par jour.

Pour les enfants en bas-âge, faire les inhalations au pied du lit dans une chambre bien fermée.

Remarque. — Que le médecin traite la coqueluche par des vaccins, des injections d'éther, de sérum, il est nécessaire de compléter le traitement par des inhalations au benzoquinol.

Prix : 12 francs,

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.

BENZYANYL

Valérianate de benzyle.

Forme. — Capsules glutinisées dosées à 0 gr. 10 de valérianate de benzyle.

Propriétés. — 1° Vasodilatateur et hypotenseur grâce au radical benzyle ;

2° Antispasmodique grâce à l'acide valérianique.

Indications. — Hypertension artérielle sous toutes ses formes, Angine de poitrine, Asthme, Coqueluche.

Avantages. — Abaissement simultané de Mx. et de Mn. Suppression rapide des troubles subjectifs. Toxicité nulle, action durable.

Mode d'emploi. — *Hypertension* : 6 capsules par 24 heures à distance des repas.

Autres indications. — *Adultes* : 2 à 6 capsules.

Enfants : 1 à 2 capsules.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

BENZYLOCALCIUM

Recalcification (Vitaminée Phosphorée) intensive.

Renforcée par le Fénugrec (parfaitement désodorisé)

Assimilation. — Assurée par les actions combinées :

- 1° Antispasmodique et hypnotique du *noyau Benzylique*.
- 2° Antitoxique de la substance *génératrice de Vitamine B*.

Formule :

Benzylolhypophosphite de calcium	7 gr. 50
Fénugrec désodorisé	4 gr.
Substance véhicule de Vitamine B (Extraite de Levures)	} 2 gr.
0 gr. 01 = $\left\{ \begin{array}{l} 100 \text{ Unités Physiologiques curatives. Unité Pigeon ou,} \\ 200 \text{ Unités Physiologiques préventives. Unité Pigeon.} \end{array} \right.$	

Benzylolhypophosphite de calcium : Nouveau composé introduit par nous dans la thérapeutique, obtenu en traitant des corps de la série benzoïque par l'acide hypophosphoreux. Donne un acide cristallisé en fines aiguilles fondant à 224° dont le sel de calcium contient 10,4 % de phosphore, 6,7 % de calcium, purs, et deux groupes benzyliques ($C^6H^5 - CHOH$), groupes

qui ont été employés en thérapeutique comme antispasmodiques et hypnotiques (*benzoate, succinate et cinnamate de benzyle*).

Ce composé a été choisi de préférence aux glycérophosphates qui ne contiennent pas de noyaux benzyliques et dont l'absorption calcique est très défectueuse.

Indications. — Tous les états de décalcification et de carence minérale ou organique.

Surmenage, convalescence, rachitisme, anémie. Toutes les affections du tissu osseux. Les troubles douloureux de la ménopause et enfin, tout spécialement, pendant les périodes de grossesse et d'allaitement.

Avantages thérapeutiques. — La plupart des insuccès dans les traitements à base d'excellentes médications phosphorées calciques, sont dus à une assimilation imparfaite ou nulle des éléments reconstituants d'apport.

En général, chez les sujets où cette médication est indiquée, l'organisme, déprimé par un mauvais état du système nerveux, appauvri et affaibli par une intoxication (localisée ou généralisée), se défend mal, réagit mollement et n'assimile que difficilement.

De par sa composition, le **Benzylocalcium** permet :

- 1° De rétablir l'équilibre du système nerveux. Rôle dévolu au noyau benzylique.
- 2° De désintoxiquer l'organisme. Action indiscutable de la substance génératrice de Vitamine B.

Fonctions en apparence secondaires, mais, en réalité, primordiales et qui, avec le **Benzylocalcium** s'opèrent sans réaction physique déprimante pour les malades ni modification chimique des principaux éléments constitutifs du produit. (Les essais physiologiques en font foi). En est-il toujours de même lorsque le médecin doit associer différentes médications ?

Une bonne assimilation des composants phosphorés calciques du **Benzylocalcium** est donc assurée.

Elle sera plus ou moins rapide et complète, suivant les sujets, mais, en définitive, toujours certaine. Ce ne sera plus qu'une question de durée du traitement.

Enfin le Fenugrec, incorporé à la formule du **Benzylocalcium** non seulement renforce un sel déjà suffisamment riche en Phosphore et Calcium, mais il agit indéniablement comme catalyseur. Cette action lui est reconnue par des éminents auteurs d'une bibliographie à laquelle le praticien pourra se reporter.

Formes. — Le **Benzylocalcium** se présente sous 2 formes :

Granulé, de goût agréable (90 grammes de produit par boîte). 18 francs au public.

Cachets (30 cachets par boîte). 20 francs au public.

Posologie. — Pour produire le maximum d'effets, le **Benzylocalcium** doit être pris un quart d'heure avant les repas.

Le granulé peut être croqué ou pris dans un peu d'eau. Dans ce dernier cas, avoir bien soin d'agiter le liquide avant l'absorption.

Chaque boîte contient une petite mesure qui correspond à la valeur d'une cuiller à café.

Cette mesure *bien pleine* représente 1 dose.

Adultes : 1 dose de granulé ou 1 cachet, 3 fois par jour avant chacun des repas.

Enfants de 10 ans et au dessus : 1/2 dose de granulé, 3 fois par jour avant chacun des 3 repas ou 1 cachet, 2 fois par jour avant chacun des 2 principaux repas.

Enfants de moins de 10 ans : 1/2 dose de granulé, 2 fois par jour avant chacun des 2 principaux repas.

Ces doses, généralement suffisantes, peuvent être largement dépassées, le **Benzylocalcium** étant absolument inoffensif.

Dans les traitements de longue durée, suspendre la médication une semaine par mois.

Laboratoires DOR.

DORANTOWICZ, Pharmacien

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

BENZYLOL

Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse, à base de Benzoate de Benzyle et de Benzaldéhyde.

Deux présentations : 1° Gouttes; 2° Perles.

GOUTTES. — Action antispasmodique sur tous les muscles lisses de l'organisme.

Spécifique de l'Hypertension. Asthme vrai. Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche. Mal de mer.

Posologie. — *Adultes* : XXX à XL gouttes toutes les 3 ou 4 heures.

Enfants : 2 à 4 gouttes par année, toutes les 3 ou 4 heures.

PERLES. — Spécifique de la Dysménorrhée (règles douloureuses).

Posologie. — Deux perles à un quart d'heure d'intervalle ; 6 à 12 par jour.

Prix : 10 francs.

Laboratoire E. HAUTDIDIER

37, rue Galilée — PARIS (XVI°).

BETUL-OL MIDY

(Méthyl oléo-salicylate comp.)

Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Composition. — Menthol et chloral en solution dans le salicylate de méthyle.

Mode d'emploi. — Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé, puis de coton. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du *Betul-Ol* se fait si rapidement par la peau, que dix minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Propriétés thérapeutiques. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications. — Lumbago, sciaticques, douleurs des articulations, névralgies.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII°).

BEXININE

Spécifique idéal de la Coqueluche, des gripes, toux convulsives, catarrhe bronchique.

Propriétés thérapeutiques. — Seul médicament inaltérable et non toxique. Jugule la Coqueluche en moins de huit jours.

Doses et mode d'emploi. — Toujours à jeun dans du lait bouilli et très chaud ou, à défaut, dans infusion de tilleul ou feuilles d'oranger.

Doses pour 24 heures :

Enfants de 2 mois : X à XXX gouttes en trois fois. (Augmenter de X gouttes par mois.)

1 an : 2 cuill. à café ; 2 ans : 2 à 4 cuill. à café ; 3 ans : 3 à 6 cuill. à café ; 4 et 5 ans : 2 à 3 cuill. à soupe ; 6 et 7 ans : 3 à 4 cuill. à soupe ; 8 à 10 ans : 3 à 6 cuill. à soupe. **Adultes** : 6 à 10 cuill. à soupe.

Observations et attestations médicales à l'appui. En 1925, les épidémies de Vichy et de Nancy ont été jugulées par la Bexinine, ainsi que celle de Pau en 1927.

Prix au public : 15 fr. 95. Impôt compris.

Laboratoire de la BEXININE

6, rue Ballainvilliers. — CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).

BIAZAN

Solution huileuse parfaitement limpide et incolore permettant de faire proprement une injection intramusculaire non douloureuse d'une quantité de bismuth bien déterminée.

Présentation. — Boîtes de 12 ampoules de 2 cent cubes rigoureusement titrées à 0 gr. 04 de bismuth métal par cent cubes.

Propriétés thérapeutiques. — Le Biazan a été étudié et mis au point dans le service de M. le Dr L. Fournier à l'hôpital Cochin. Réunissant les effets rapides des composés hydro-solubles à l'action profonde et prolongée des bismuths insolubles, le Biazan est actuellement la meilleure préparation pour le traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

Posologie. — Faire deux fois par semaine une injection intramusculaire de 2 cc. de Biazan. Continuer la série jusqu'à 12 injections. Les 4 à 6 dernières piqûres pourront être faites à 5 et 6 jours d'intervalle. Les doses et le rythme des injections, donnés à titre d'indications générales, sont susceptibles d'être modifiés par le médecin traitant, en particulier chez les vieillards, les débilités et les sujets dont l'état général est mauvais.

Prix : 32 francs.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1, place Lucien-Herr — PARIS (V°).
(anciennement, 43, rue Tournefort.) — Gobelins 26-21.

BI-CITROL MARINIER

Citrates monosodique et trisodique en granulé soluble de goût agréable.

Eupeptique, Cholagogue, Antivisqueux, Décongestif.

Doses : 2 à 4 cuill. à café par jour.

Prix du flacon : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 48-I, le « BI-CITROL » peut être légalement prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires MARINIER

52, rue de Flandre — PARIS.

BI-IODURAL NOVAT

Formule. — Comprimés contenant chacun 25 centigr. d'iodure de potassium et 5 milligrammes de bi-iodure de mercure.

Remarque. — Les comprimés (comme ceux d'iodural) renferment un alcalin chargé de neutraliser, au moment où ceux-ci se forment dans l'estomac, les acides iodique et iodhydrique. Le Bi-iodural est de cette façon parfaitement toléré.

Ces comprimés doivent être absorbés avec un liquide sans y être dissous.

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

BILEYL FOURNIER

Sels biliaires

(Extraits de la bile de bœuf.)

Forme. — Globules glutinisés (digestion intestinale).

Dose. — 4 à 8 globules par jour, à prendre vers la fin du repas, par 2 ou 3.

Indications. — 1^o Les causes d'arrêt d'excrétion : lithiase, compressions, ictères subaigus et chroniques par rétention ;

2^o Les cas d'insuffisance biliaire : cholémie familiale, entérocolite muco-membraneuse.

L'étui de 60 globules : 14 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

BILIASE RABY

Globules d'extrait de fiel de bœuf renfermant tous les principes actifs de la bile.

Mode d'action. — Cholagogue énergique. Le plus constant de tous les agents opothérapiques biliaires.

Indications. — Coliques hépatiques. Ictère. Lithiase biliaire. Entérocolite et constipation par **insuffisance biliaire**.

Doses. — 4 à 12 globules par jour (aux repas).

R. RABY, pharmacien
ASNIÈRES (Seine).

(Échantillons sur demande.)

BILIBOLDO

Forme. — Pilules glutinisées.

Composition. — Ext. de bile dépigmentée, ext. total de feuilles de Boldo, podophyllin, ext. de belladone.

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire, Lithiase biliaire, Ictères, Constipation.

Doses. — 4 à 6 pilules par jour pour les hépatiques ; 1 à 2 pilules pour les constipés.

Prix : 12 francs les 60 pilules.

(15 jours de traitement.)

Laboratoires LAMAR

1, place Forbin — AIX-EN-PROVENCE.

BILIFLUINE

du Dr L. BIGNON, de Vichy.
Traitement de la Lithiase Biliaire
et des Ictères.

Composition. — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications. — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal, Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhoses sous toutes leurs formes.

Posologie. — 4 pilules ou dragées par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

La boîte de 45 pilules ou dragées. Le flacon de sirop. Prix au public : 16 fr.

Laboratoires « STÉNÉ »

2, Place des Vosges — PARIS.

BILIOGASTRINE CHEVILLON

Composition. — Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate de Soude, Pipérazine, Helmitol.

Indications. — Draine les Voies biliaires, augmente la Diurèse, nettoie le Rein et l'Intestin.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées par jour dans un peu d'eau tiède.

Prix : 16 francs.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

BILIVACCIN

1° Antityphique.

2° Antidysentérique.

3° Anticholérique.

Prix : dose pour adultes : 10 fr. ;

dose pour enfants (moins de 7 ans) : 8 fr.

Vaccination préventive, par VOIE BUC-
CALE, contre la Typhoïde, les Para A et
B, la Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication.

Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun, trois matins de suite.

H. VILLETTE, Pharmacien

Produits de « La Biothérapie »

131, rue Cambronne — PARIS (XV^e).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

BILIVACCIN ANTICOLIBACILLAIRE

Vaccination par voie buccale contre toutes affections colibacillaires du tractus intestinal, constipation, colites, appendicites et annexes. Cholécystites, voies urinaires.

N° 1 Bilivaccin coli pur.

N° 2 — coli-entérocoque.

N° 3 — polyvalent (coli-entérocoque-perfringens-proteus).

À prendre le matin à jeun, pendant 18 jours consécutifs. Renouveler après repos de 6 jours.

Prix : 20 francs la dose.

H. VILLETTE, Pharmacien

Produits de « La Biothérapie »

131, rue Cambronne — PARIS (XV^e).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

BIOCALCOSE

Tonique, Stimulant, Reminéralisant intégral. Granulé soluble, de saveur très agréable.

Hypophosphites ; Manganèse, Fer, Magnésie et Chaux en combinaison organique avec le glucose ; Fluor ; Silice, etc., dans les proportions où ces corps se trouvent dans l'organisme.

Constitue une véritable synthèse minérale de la matière vivante.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reminéralisant.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 8 ans ; 3 à 4 au-dessus de cet âge, à croquer, ou dissoutes dans un peu d'eau, aux repas.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégrammes : Chevrematte-90-Paris.

BIOCÉANE

Eau de mer ionisée, pure.

Véritable **Lymphé marine. Sérum marin.**

Ampoules buvables de 10 cc.

Par boîte de 16 ampoules.

Action thérapeutique. — *Athrepsies, Diarrhées des nourrissons. Colibacillurie. Toutes Phosphaturies*, le PH urinaire est abaissé à 6-51/2.

*Toutes déchéances, Fatigues, Surmenages, S ni-
lité précoce, Précancer.*

Doses :

Enfants : 1 à 2 ampoules par jour.

Adultes : 2 à 4 — — —

Laboratoires de Biothérapie OLIVIERO

41, rue Denfert-Rochereau — PARIS (V^e).

BIOCHOLINE

d'après les travaux du Prof. J. CARLES et du
D^r F. LEURET.

Constitution. — Chlorhydrate de Choline R. et C. chimiquement pur. Seule préparation contrôlée aux points de vue physiologique et clinique par les auteurs.

Mode d'action. — 1^o Amélioration du terrain par l'augmentation régulière et durable du taux de *cholestérol* sanguin, principale condition de la résistance aux infections. Régularisation de la Glycémie.

2^o Action génératrice sur les *globules sanguins* et la moelle osseuse. Cette réaction de défense se traduit par la disparition des gros polynucléaires, et l'apparition des mononucléaires de défense.

3^o Excitation des fonctions d'élimination et du péristaltisme intestinal.

Indications. — 1^o *Toutes les formes de Tuberculoses*: externes ou viscérales, même évolutives, à tous les degrés et à tous les âges.

2^o *Tous les cas d'Anémies*: Maigreur, anorexie, hypertrophies ganglionnaires infantiles.

3^o Tous les cas d'insuffisances pancréatiques.

Avantages. — Innocuité complète, tolérance parfaite, aucune contre-indication.

Présentations. — *Ampoules* (1 cc. = 0,02). Boîtes de 10 ampoules (type normal); boîtes de 25-50 et 100 ampoules (cures prolongées).

Suppositoires 1 suppo = 0,02). Boîte de 10 suppositoires.

Mode d'emploi. — *Ampoules*: 1 injection sous-cutanée, tous les 2 jours, d'une façon continue et sans interruption.

Suppositoires: 1 suppositoire tous les 2 jours par séries de 20 jours.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE
37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

BIODYNAMINE

Indications générales. — Débilité, Neurasthénie
Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intel-
lectuel et tous états asthéniques et atoniques.

1° Ampoules :

Sulfate de strychnine.....	1 milligr.
Cacodylate de soude.....	0 gr. 05
Nucléinate de soude.....	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude.....	0 gr. 05
Sérum isotonique camphré.....	1 cc. 3
par ampoule.	

(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

Prix : 13 fr. 75.

2° Gouttes concentrées (facilitant l'administra-
tion progressive) : de X à XL gouttes, bien diluées.
avant chaque repas, suivant le cas et d'après le
tableau :

	20 Gouttes cont.	40 Gouttes cont.	60 Gouttes cont.	80 Gouttes cont.	100 Gouttes cont.
Sulfate de Strychnine.....	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de soude...	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Acide phosphorique.....	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

Prix : 11 fr. 75.

3° Elixir : Préparation d'un goût très agréable et
contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Phosphate de soude.....	0 gr. 060
Acide phosphorique officinal	0 gr. 053
Méthylarsinate disodique	0 gr. 012
Sulfate de strychnine.....	0 gr. 0006

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

BIOENTÉRASE

Ampoules buvables.

Non Toxique. Sans contre-indications.

Extrait de *Phyllanthus Casticum*, *Scutia Commersoni*, *Psidium Pommerum*, *Garcinia Mangoustana*, *Fraxinus Ornus* en solution stabilisée.

Indications. — Diarrhée verte, gastro-entérite des nourrissons. Choléra infantile, Entérites aiguës, entérocolite dysentérique.

Action. — Antidiarrhéique et antihémorragique énergique, sans action constipante. Cholagogue. Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales et du ténesme, sans opiacés.

Doses. — Faire prendre le médicament dans de l'eau fortement sucrée.

Enfant au-dessous de 3 mois : 1 à 2 ampoules dans la journée.

Enfant de 2 à 6 mois : 2 à 3 ampoules dans la journée.

Enfant de 6 mois à 2 ans : 3 à 4 ampoules dans la journée.

Proportionner les doses à l'âge et à l'intensité des symptômes et continuer le médicament jusqu'à disparition du syndrome intestinal, ce qui survient rapidement.

Remplacer le lait par de l'eau bouillie ou eau de riz sucrée.

Prix de la boîte de 6 ampoules buvables : 18 francs.

Littérature et Echantillons :

58, rue Miromesnil — PARIS.

BIOGÉNOL DEMASLES

Puissant accélérateur de la nutrition.

Granulé. — Contenant, par cuillerée à café :

1 centigr. de glycéro-arséniate.

0,50 centigr. de phosphates organiques.

0 gr. 50 chlorure de magnésium.

1 cuillerée à café avant les deux repas.

Prix : 14 francs.

Elixir. — Même composition que le granulé, mais contient de la cola en plus. 1 verre à liqueur avant les repas.

Prix : 14 francs.

Gouttes Arséno Biogénol. — Strychnine, glycéro-arséniate, extraits de quina, cola, coca.

Gouttes Phospho Biogénol. — Strychnine, acide phosphorique, extraits de quina, cola, coca.

Pour XX gouttes, 1 milligr. de strychnine, 5 milligr. de glycéro-arséniate ou 25 cgr. d'acide phosphorique.

Doses moyennes : X à XX gouttes aux 2 repas. Doses progressivement croissantes : jusqu'à CXX gouttes.

Prix : 12 francs.

Ampoules. — De 1 cc. Une ampoule contient :

Glycéro-arséniate..... 0,01 centigr.

Sulfate de strychnine..... 0,001 milligr.

Prix : 10 francs.

LABORATOIRES DEMASLES. — VIENNE (Isère).

BIOLACTYL FOURNIER

Symbiose de deux ferments lactiques
orientaux sélectionnés.

Usage médical :

1^o Culture en bouillon :

En boîtes de 10 fl., pour adultes.

La boîte : 24 fr.

En boîte de 2 fl., pour nourrissons.

La boîte : 8 fr.

En boîte de 6 tubes (pour le caillage du
lait).

La boîte : 7 fr.

2^o Culture sèche ; boîte de 60 comprimés
(4 à 6 par jour).

L'étui : 14 fr.

Indications. — Traitement des putréfac-
tions intestinales et de l'auto-intoxication
digestive.

Usage chirurgical :

1^o Culture liquide, en boîtes de 6 tubes.

La boîte : 7 fr.

2^o Culture sèche en poudre.

La boîte : 7 fr.

Indications. — Pansement des plaies in-
fectées, escarres, vaginites, cystite tuber-
culeuse, affections nasales et laryngées,
pyorrhée alvéolo-dentaire.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

BIONÉOL

Formes : 1^o Elixir.

	Par cuillerée à café.	Par cuillerée à soupe.
Méthylarsinate de soude	1 cgr.	3 cgr.
Acide nucléinique	2 cgr.	6 cgr.
Glycérophosphates	5 cgr.	15 cgr.
Strychnine (noix vomique)	0,1 de mmgr.	0,3 de mmgr.

2^o Cachets.

Méthylarsinate de soude	3 cgr.	par cachet.
Acide nucléinique	6 cgr.	—
Glycérophosphates	15 cgr.	—
Strychnine (noix vomique)	0,3 de mmgr.	—

Indications. — Anémies, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Neurasthénie, Paludisme, Débilité générale, Troubles de la croissance et de la puberté, Excitant de l'Appareil digestif.

Posologie :

De 3 à 6 ans, 2 cuillerées à café par jour.

De 6 à 10 ans, 3 — —

De 10 à 15 ans, 2 cuillerées à dessert par jour.

A partir de 15 ans, 2 cuillerées à soupe ou 2 cachets par jour.

A prendre après les repas.

Prix : Elixir : 14 fr., 10 jours de traitement.

Cachets : 14 fr., 15 — —

Laboratoire du BIONÉOL

14, rue de Périgueux — ANGOULÊME.

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycéro-Phosphatée.

Granulé à base de Kola, Glycérophosphate de chaux, Quinquina et Cacao vanillé.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Prop. thér. — *Tonique du système nerveux, facilite l'effort musculaire.*

Indications. — Surmenage, Vertiges, Anémie cérébrale, Névralgies rebelles, Névroses.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

BIOPHYLACTINE M. G.

Médication polypeptique, hyposulfitique et magnésienne.

Forme. — Dragées.

Indications. — Asthme (digestif), coryzas spasmodiques périodiques (rhume des foins), urticaire, eczéma, prurits, maladie de Quincke, migraines, somnolences, rougeurs ou pesanteurs après les repas, vomissements, inappétence, intolérance digestive.

Doses. — Adultes : 2 dragées 1/2 heure avant les 3 repas. — Enfants : une dragée.

Prix du flacon : 15 fr.

Echantillon sur demande.

Préparé par le laboratoire F. VELLAY
Pharmacien de 1^{re} classe.

116, avenue Berthelot — VIENNE (Isère).

BIOSINE LE PERDRIEL

**Glycérophosphate double de chaux
et de fer.**

Ni intolérance, ni constipation, ni coloration des dents. Reconstituant énergétique.

Indications. — Anémie, Chlorose, Rachitisme, Croissance, Convalescence, Surmenage, Neurasthénie, Suite de fractures, Hémorragies.

Doses. — 1 mesure (0,30 de glycérophosphate) à 4 mesures par jour au repas dans eau pure ou sucrée.

Laboratoires LE PERDRIEL
11, rue Milton — PARIS (IX^e).

BIOTRIGON

Composition :

Elixir. — Extrait fluide de fénu-grec désodorisé, Arrhé-nal, Manganèse.

Dragées. — Extrait sec de fénu-grec. Phosphate de chaux. Extraits opothérapiques fixateurs.

Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit. Amélioration de l'état général.

Indications :

Elixir. — Insuffisance organique, Asthénie, Prétuberculose, Adénopathie, Débilité.

Dragées. — Mêmes indications, mais plus spécialement pour malades en déplacement ou gastro-entéritiques.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 cuillerée à bouche au moment des repas.

Enfants : 1 cuillerée à café au moment des repas.

Prix du flacon de 1/4 de litre : 20 francs.

Laboratoires du BIOTRIGON

8, rue Pierre-Girard — PARIS.

BIS-KA-MA

Formes pharmaceutiques. — Poudre à l'état de division micellaire.

Composition. — Bismuth (carbonate), Kaolin colloïdal, Magnésie, Mucilages végétaux, Sucre vanillé.

Action. — Réalise le « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, modificateur de la flore intestinale, absorbant des gaz.

Indications. — Acidité pré- ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux 3 repas.

Constipation chez les hyperchlorhydriques et les entérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun.

Prix : 20 francs.

**Laboratoires DURET et RÉMY
et du Docteur Pierre ROLLAND
ASNIERES (Seine).**

BISMHYDRAL

Composition. — Définie et stable de chlorure mercurieux léger pur, et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

Propriétés thérapeutiques. — Réalise l'association et la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (Docteur Milian).

Indications. — Syphilis à toutes les périodes et sous toutes ses formes. Cure d'entretien discrète par voie buccale. (La boîte-vente ne renferme aucun prospectus et ne porte pas d'indication de maladies.)

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

Doses. — Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

LANCOSME

Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

BISMUSODINE

(Granulée.)

Composition. — Une cuillerée à café contient :

0 gr. 50 carbonate de bismuth.

0 gr. 50 citrate de soude état naissant.

1 gr. 50 carbonates de chaux et magnésie.

Indications. — Gastropathies. — Hyperacidité. — Sténoses pyloriques. — Colites. — Ulcus. — Antisepsie intestinale.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour délayées dans un demi-verre d'eau ou même croquées telles, suivant indications du médecin.

Laboratoires R. NIEL

60, rue Auguste-Comte — LYON (Rhône).

BISMUTARTROL**Bismuth soluble.**

Syphilis à tous les degrés.

Traitements de consolidation.

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth. *Injections absolument indolores.*
— 0 gr. 08 de Bismuth Métal par Ampoule de 2 cc. 1/2.

Posologie moyenne. — Séries de 10 injections à raison d'une tous les 3 ou 4 jours. Laisser un intervalle de 20 à 30 jours entre deux séries consécutives.

La boîte de 10 ampoules : 30 fr.

Laboratoires RAVAUD6, place de Breteuil — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 14-85. R. C. Seine 269.121.

Crème de BISMUTH

du D^r Quesneville.

Composition. — Suspension dans l'eau de l'hydrate de Bismuth pur obtenu à l'état de précipité gélatineux par le procédé du D^r Quesneville (25 gr. d'hydrate de Bismuth par flacon de 100 cc.).

Sans addition d'aucune matière étrangère.

Propriétés. — Forme réalisant l'extrême division des grains de Bismuth et portant au maximum l'action médicamenteuse utile (Pouvoir couvrant et protecteur. Propriétés cicatrisantes et anti-infectieuses. Effets sédatifs sur l'élément douleur.)

Indications. — Préparation créée en 1856 et restée en faveur depuis plus de 70 ans dans toutes les indications du Bismuth en thérapeutique gastro-intestinale.

Innocuité confirmée par une longue expérimentation.

Mode d'emploi. — Par cuiller-mesure, correspondant à 0 gr. 25 Bi.

Etats aigus : 10 à 20 cuillerées-mesure en 3 ou 4 fois, terminer le traitement par doses décroissantes.

Etats chroniques : 5 à 10 cuillerées-mesures en 2 ou 3 fois, traitement de 3 à 4 jours, alterné avec période égale de repos.

Prix : 19 fr. le flacon (100 cuillerées-mesure).

Laboratoire QUESNEVILLE

12, rue de Buci — PARIS.

Dépôt : Pharmacie COLLESSON

5, rue d'Angoulême — PARIS (XI^e).

Crème de BISMUTH

Chl. Magnésienne

du D^r Quesneville.

Composition. — La cuillerée à café correspond à l'association de 0 gr. 50 d'hydrate de Bismuth gélatineux du D^r Quesneville en suspension et de 0 gr. 60 de chlorure de Magnésium en solution avec addition de 0 gr. 20 de Phosphate Bicalcique comme fixateur magnésien.

Posologie. — 2 cuillerées à café par jour en 1 ou 2 fois, avant les repas.

Indications. — Médication complémentaire de la méthode cytophylactique dans les affections des muqueuses gastriques et intestinales. Traitement des lésions ulcératives, des névroses digestives, des gastrites et entérites chroniques.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoire QUESNEVILLE

12, rue de Buci — PARIS

Dépôt : Pharmacie COLLESSON

5, rue d'Angoulême — PARIS (XI^e).

BISMUTH DESLEAUX

Pansement gastro-intestinal idéal

au Carbonate de Bismuth pur, amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement gastro-intestinal de choix, à teneur en bismuth élevée, assurant un tapissage intégral, homogène, uniforme de la muqueuse, joint à une action sédative, protectrice, cicatrisante et anti-infectieuse. Modifie la flore microbienne, met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate, supérieur aux produits de substitution (Charbon, kaolin, magnésie, talc).

Indications. — Ulcères et ulcerations gastriques ou duodénales, gastropathies, hyperchlorhydrie, entéropathies, colites, spasmes, oxyurase.

Présentation. — Poudre impalpable, de goût agréable.

Posologie. — Chaque flacon porte une mesure dont le contenu correspond environ à 6 gr. de produit.

Pansement gastro-intestinal : 12 à 50 gr. par jour, suivant les cas, soit 1 à 3 mesures prises à jeun, matin, midi et soir 1/2 heure avant les repas, dans 1/2 verre d'eau ou de tisane.

Oxyures. — *Adultes :* 30 à 40 gr. (5 à 7 mesures), *enfants :* 15 à 25 gr. (3 à 4 mesures) par jour, en 2 fois, le matin à jeun, 2 à 3 cures de 7 jours (voir brochure).

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

BISMUTHION COUTURIEUX

(Procédé A. Lancien.)

Description. — Le Bismuthion est une suspension colloïdale isotonique de Bismuth pur dans l'eau distillée, obtenue par procédé électrique et destinée au traitement de la syphilis. En boîtes de 6 ampoules de 3 cc.

Action thérapeutique. — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

Indications. — Le Bismuthion, grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement : syphilis nerveuses, tabes, hérédosyphilis.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

BISMUTHOÏDOL

Bismuth colloïdal, à grains fins.

Ampoules.

Titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Stériles.

Solution aqueuse.

Indications.

Spirillicide.

Syphilis.

Toutes maladies à protozoaires.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS.

BISMUTH TULASNE

Sous-nitrate de bismuth kaoliné spécialement préparé pour l'emploi à doses élevées.

Indications. — Réalise le véritable pansement gastro-intestinal au sous-nitrate de bismuth (méthode du Prof. Hayem) avec la garantie d'une innocuité absolue.

Estomac : Ulcères - Ulcérations - Gastrites - Hyperchlorhydrie - Spasmes - Aérophagie - Vomissements.

Intestin : Colites - Diarrhées - Météorisme - Troubles fonctionnels - Troubles nerveux et circulatoires paradigestifs : extrasystoles, douleurs précordiales, migraines.

Oxyurose.

Présentation. — Boîtes : 10 paquets de 10 gr. : 20 fr.

Demi-boîtes : 10 paquets de 5 gr. : 12 fr.

Posologie. — En général doses massives (10 à 20 gr., 1 à 2 paquets) à prendre en une seule fois le matin, à jeun, dans un verre d'eau pour réaliser le pansement bismuthé de la muqueuse digestive. Les mêmes doses, fractionnées en deux ou trois prises dans la journée, sont indiquées dans certains cas.

Oxyurose : Un paquet de 10 gr. tous les matins à jeun pendant 5 jours. Pour les enfants au-dessous de 7 ans : un paquet de 5 gr. le matin à jeun et un même paquet une heure avant le repas du soir. Deux à trois cures séparées chacune par 6 jours de repos. Pas de régime spécial. Innocuité absolue.

Laboratoires BOUILLET
50, boulevard des Batignolles — PARIS.

BIVATOL

Formule. — α . Carboxéthyl ; β . Méthyl nonoate basique de bismuth.

Produit absolument nouveau, le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

Présentation. — Ampoules huileuses fluides de 2 cc. contenant 4 centigrammes de bismuth métal par cc. soit 8 centigrammes au total.

Boîtes de 12 ampoules constituant une cure.

Indications thérapeutiques. — Action spirillicide intense. Le plus rapide, le mieux toléré des sels de bismuth. Incolore et rigoureusement *indolore*, produit des effets au moins comparables à ceux obtenus par l'emploi des doses massives d'arsénobenzol.

Posologie. — *Adultes* : 12 injections de 2 cc. faites intramusculaires à raison d'une tous les deux jours pendant la première semaine, puis de deux par semaine ensuite.

Enfants : 0 cc. 1 par semaine jusqu'à 3 ans.

0 cc. 5 de 3 à 5 ans.

1 cc. à 10 ans.

Prix au public :

La boîte de 12 ampoules 2 cc. (adultes) : 25 fr.

— de 10 — 1 cc. (enfants) : 20 fr.

Laboratoire Français de Chimiothérapie.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS.

BLÉDINE JACQUEMAIRE

Composition. — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

Propriétés. — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

Indications. — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition. Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (Aliment de régime dans les cas suivants : Diarrhée, Constipation, Gastro-entérites); désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

Particularités. — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

Doses. — Du 1^{er} au 4^e mois : 1 gramme par biberon et par mois d'âge. Du 5^e au 6^e mois : 1 1/2 à 2 cuillères par biberon. A partir du 7^e mois : 1 cuillerée à soupe par repas ; 1 1/2 à 2 pour les adultes.

Nota. — La Blédine peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

Blécao. — Toutes les qualités de la Blédine se retrouvent dans le Blécao, déjeuner reconstituant, aliment de régime d'une digestibilité exceptionnelle.

Établissements JACQUEMAIRE

M. MIGUET, *, Docteur en Pharmacie,
VILLEFRANCHE (Rhône).

BLENNOPIAT

Composition. — Association de : Copahu, Cubèbe, Santal, Sassafras, Térébenthine. Ancien opiat complet du Codex sous forme pilulaire, *glutinisée*.

Action thérapeutique. — Synergie balsamique efficace, absorption facile, pas de troubles gastriques ni de réaction rénale.

Indications. — Blennorragie à toutes ses périodes et toutes complications dues au gonocoque. Cystites. Uretrites.

Mode d'emploi. — 6 à 12 pilules par jour, au moment des repas.

Prix : 15 francs la boîte.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe.
78, Cours de la Liberté — LYON.

BLENNOSINE - FORNET

Vaccin buccal contre la Blennorragie.

Principe actif. — Gonocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Blennorragie aiguë ou chronique, ainsi que leurs complications.

Posologie. — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une 1/2 heure avant les repas jusqu'à réaction locale et générale. Cette réaction, d'ailleurs légère, prouve l'activité spécifique de ce vaccin buccal anti-blennorragique.

Propriétés thérapeutiques. — Préventif et Curatif. Supprimer rapidement l'écoulement. Jugule les douleurs. Evite ou guérit toutes complications.

Prix : 45 francs.

Vente et échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie.

23, rue du Caire — PARIS (II^e).

Service d'Etude et de Fabrication :

Institut de Microbiologie.

SARREBRUCK (Sarre).

BLOCS « VECOR »

Complexe phytothérapique.

Forme. — Blocs de sucre soluble. Dissoudre un bloc dans une tasse d'eau très chaude.

Composition. — Gui, prêle, aubépine, oranger, cassis, anis.

Indications. — Hypertension, palpitations, azotémie, sclérose, aérophagie.


Mode d'emploi. — Solution chaude après les repas, chaude ou froide le matin à jeun.

H. AMMANN, Pharmacien.

Licencié ès Sciences

21, Rond-Point de la Reine,
BOULOGNE-BILLANCOURT

Dépôt Général pour la vente :
Rue de la Folie-Méricourt, 64, PARIS (XI^e)
Tél. Roquette 93-66



BOLCITOL

Composition. — Principes extractifs de basilic, menthe, corydalis, bugrane, *boldo*, sauge, noyer, piscidia, anis vert, fenouil, hexaméthylène-tétramine (0,42 p. 100), *citrate de soude*, papaine liq., eau chloroformée et liqueur spéciale.

Indications. — Mauvais fonctionnement des organes (*foie*, estomac, intestin, reins), et leurs suites : sclérose, épaissement du sang, épuisement nerveux, constipation, toutes manifestations arthritiques.

BOLCITOL réalise à merveille les principes de la Phytothérapie ; c'est le régénérateur du protoplasme cellulaire.

Dépuratif médical par excellence.

Doses. — 2 verres à liqueur par jour pour les adultes.

Le grand flacon : 20 fr.

Laboratoire G. LESOURD

18, rue Ferdinand-Flocon — PARIS (XVIII^e).

BOLDINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Boldine Houdé

Principes actifs des feuilles de boldo.

Emplois thérapeutiques :

Maladies du foie, lithiase biliaire, ictère, hépatites, insuffisance hépatique, etc.

Mode d'emploi :

De 3 à 6 par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

BOLDO GMET

Composition. — Extrait total, liquide, sans alcool ni sucre, renferme *tous* les principes actifs de la feuille de Boldo fragrans : boldine huiles essentielles, matières aromatiques. Correspond à 2 gr. de feuilles fraîches par cuillerée à café.

Propriétés. — Diurétique, cholagogue, stimulant et antiseptique du foie et des voies biliaires.

Indications. — Tous les troubles fonctionnels du foie. Insuffisance. Congestion. Lithiase biliaire. Cholécystite. Anorexie. Constipation. A donner au cours d'un traitement opothérapique ou spécifique pour maintenir l'intégrité du foie.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans une tasse d'eau chaude le matin à jeun ou aux repas de midi ou du soir.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX°).

BOLDOINE ÉPARVIER

Forme. — Granulé fin sucré.

Composition. — 1 cuillerée à café équivalent à 4 gr. de Boldo frais, parties active et aromatique comprises.

Action. — Stimulant général. Cholagogue. Antisep-tique intestinal favorisant l'oxydation et l'éli-mination des déchets (urée).

Indications. — Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Lithiase rénale. Ictères. Dyspepsies d'origine hépatique. Anorexie. Atonie des voies digestives. Cachexies.

Posologie. — Après chaque repas, 1 ou 2 cuillerées à café, prises en nature ou dans un peu d'eau chaude.

Echantillons et littérature :

Laboratoires ÉPARVIER

26, grande rue Saint-Clair. — LYON.

BOLDORHÉINE

Composition. — Capsules glutinisées à base d'extract de boldo, d'extract biliaire, de podophyl-lin et de ferment lactique (conservé à l'état sec, mais vivant, dans un milieu approprié).

Action thérapeutique. — Combat l'insuffisance biliaire, stimule l'activité de la cellule hépatique, active la sécrétion et l'excrétion biliaires, régula-rise les fonctions intestinales et aseptise le tube digestif.

Indications. — Insuffisances hépatiques et biliaires, ictère, lithiase, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 4 capsules, au moment des repas, avec une gorgée d'eau.

**LABORATOIRE
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
D^r PH. CHAPELLE**

8, rue Vivienne — PARIS.

BOLDO VERNE

Le cholagogue sûr et régulier.

Composition. — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

Indications. — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires. Anorexie, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

Posologie. — L à C gouttes par jour.

Laboratoire VERNE

13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE

BOLÉASE MONAL

Forme. — Globules glutinisés.

Composition. — Bile et boldo, extraits complets et inaltérables.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Action. — Cholagogue, décongestif et antitoxique.

Indications. — Troubles biliaires et hépatiques. Affections hépatiques : lithiase, ictères, congestions, cholémie, cirrhose. Affections intestinales : entérites muco-membraneuses, constipation, auto-intoxications.

Le flacon de 50 globules : 12 francs.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

6, rue Bridaine — PARIS

BOLÈNE

Traitement de la Constipation

Composition. — Héxaméthylènetétramine, Sels biliaires, Pancréatine, Erepsine, Entérokinase, Agar-agar.

Mode d'action. — Désinfection et rééducation del'intestin par l'association d'acides biliaires à l'héxaméthylènetétramine, le meilleur et le plus actif des antiseptiques biliaires.

Présentation. — Comprimés dragéifiés de 0.50.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés et plus par jour.

10 francs la boîte de 60 comprimés.

LABORATOIRES J. M. RICARDOU

Docteur en pharmacie
46, rue Pierre-Charron — PARIS

BORÉOL

Comprimés pour gargarismes et inhalations.

Composition. — Perborate de soude, bicarbonate de soude. Essence de Wintergreen. Essences de cannelle, badiane, menthe, saccharine, gomme arabique, amidon.

Propriétés. — Antiseptique, sédatif et analgésique, déterge et décongestionne les muqueuses.

Indications. — Coryzas, sinusites, angines, pharyngites, laryngites, trachéites et trachéo-bronchites.

Mode d'emploi. — 1° En gargarismes : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau bouillie, assez chaude.

2° En inhalations : 1 à 2 comprimés dans 1/2 litre d'eau bouillante, et l'on peut se gargariser ensuite avec la même solution.

Prix du tube de 20 comprimés : 12 francs.

Dépôt général pour la France :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue Feydeau — PARIS (II°).

Téléph. : Central 83-15.

BORICINE MEISSONNIER

Tetraborate de Sodium chimiquement pur en poudre fine. Sel défini, cristallisé en rosettes résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du biborate de sodium.

Infiniment supérieur à ses composants par :

1° *Sa pureté.* — Sel cristallisé neutre, non caustique.

2° *Sa solubilité.* — 16 p. 100 à froid } dans
75 p. 100 à l'ébullition } l'eau
parties égales dans la glycérine.

3° *Son pouvoir bactéricide.* — Stérilisante à 6 p. 100.

4° *Sa non-précipitation des alcaloïdes et son inaction sur les métaux.*

Indications. — Succédané des borax impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémostatique puissant.

Hygiène et antiseptie générale de la peau et des muqueuses, conjonctivites, otites, ozène, stomatites, dermatoses, voies urinaires, gynécologie, plaies, brûlures. Bains.

Mode d'emploi :

En poudre : Insufflation en gynécologie, ophtalmologie, oto-rhinolaryngologie.

En solution : De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

1 cuillerée = 8 gr. Boricine.

Prix : 7 fr. 50 net.

Laboratoires J. LOGEAIS

22 bis, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE, près PARIS.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

BOROCALCYL THEVENOT

Dragées de Borotartrate de Chaux.

Indications. — Hyperexcitabilité, Spasmes, Prurits nerveux, États convulsifs dans l'Enfance, l'Adolescence et chez la Femme.

Remplace avantageusement les bromures et ne présente pas leurs inconvénients. Sédatif puissant.

Doses. — 2 à 4 comprimés par jour
3/4 d'heure avant les repas.

Enfants : 1/2 dose.

Prix du flacon de 40 dragées : 13 francs.

Laboratoires THEVENOT

DIJON

BOROSODINE LUMIÈRE

Médication calmante et antispasmodique
des Affections nerveuses de toute nature.

Constitution. — Solution aqueuse de Tartrate borleosodique chimiquement pur dosée à 1 gr. par cc.

Propriétés. — Renferme, à poids égal, une plus forte proportion de bore actif que le Tartrate borleo-potassique, beaucoup moins toxique et plus efficace.

Indications. — Agitation, insomnies, délires, hystéries, névroses, chorée et incontinence nocturne d'urine des anormaux instables ou agités. Les améliorations ne sont jamais obtenues aux prix de dépressions nerveuses profondes, elles s'accompagnent, au contraire, d'une amélioration très nette de l'état général, de l'état intellectuel et même du faciès du malade.

Mode d'emploi. — Doses progressives qui varient de 2 à 3 gr. par jour chez l'adulte pouvant être notablement dépassées, sans inconvénient.

La BOROSODINE LUMIÈRE peut, sans inconvénient, être administrée dès le plus bas âge sous forme de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE exactement dosé à 1 gr. de BOROSODINE LUMIÈRE par cuillerée à café.

Doses. — 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau sucrée.

Formuler. — *Adultes* : Flacon de Solution BOROSODINE.

Enfants : Flacon de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté — LYON.

BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de substances
cutanées ou muqueuses.

Composition et présentation. — 1° Soluté alcoolique ; 2° Pommade ; les deux à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

Propriétés thérapeutiques. — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

Indications. — Plaies, Brûlures, Contusions, Boutons, Aphtes, Piqures, Crevasses du sein, Rougeurs des nourrissons, Ulcères variqueux, Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

Mode d'emploi. — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix : Flacon, 9 fr. 50 ; tube, 8 fr. 75.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e)

A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien,
273, rue Victor-Rauter.

BOUGIES FRANKLIN

Chloro-iodo-tanniques résorcinées.

Admis dans les Hôpitaux de Paris et de Province.

Spécialement indiquées dans la Blennorragie rebelle, urétrites chroniques et autres affections microbiennes de l'urèthre.

Posologie. — 2 bougies par jour suivant l'avis du médecin traitant.

Laboratoires Polytechniques

W.-J. NETTER

100, boulevard Sébastopol — PARIS

BOULES QUIES

Boules plastiques adoptant exactement la forme de l'orifice auditif.

Point de fusion plus élevé que la température maximum du corps = 45°.

Anti-vibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent.

Constituent le seul procédé pratique et sans danger d'isolement des bruits.

Indications. — Accessoire précieux de la Thérapeutique, permettant d'assurer le repos de tous les malades sans avoir recours aux hypnotiques et aux soporifiques toujours dangereux.

Contre le mal de mer, les bruits de l'usine et de la rue, du voyage, de l'hôtel, etc.

Indispensable aux nageurs pour éviter les otites dues à l'introduction de l'eau dans l'oreille.

**DORMIR ET TRAVAILLER
AU MILIEU DES BRUITS**

(Grand Prix Marseille 1922).

Echantillons sur demande.

Boules QUIES

47, boulevard Victor — PARIS (XV°)

BRADYGASTRINE DUCLOY

Modérateur de la Sécrétion gastrique.

Formes. — Granulé. — Comprimés.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-citrate trisodique-phosphate tricalcique-carbonate et bromure de calcium-magnésie calcinée-terre sigillée.

Propriétés thérapeutiques. — *Antinauséuses* par l'acide fumaro-protocétrarique et le citrate trisodique. *Neutralisantes* par la terre sigillée et la MgO. *Modératrice de la sécrétion* par le phosphate et le bromure de calcium. *Dépourvues d'action excitante secondaire* grâce à la faible proportion de citrate trisodique : 50/o.

Indications. — Toutes hyperchlorhydries et hypersécrétions.

Contre-Indications. — Aucune. Même l'hyperchlorhydrie des cardia-rénaux.

Posologie. — Une dose : 1 cuillerée à café = 3 comprimés.

3 à 6 cuillerées à café de granulé à avaler à sec ou mieux avec une gorgée de liquide ou 9 à 18 petits comprimés à sucer lentement.

Prendre une nouvelle dose : au bout d'un quart d'heure si l'action sédative *n'est pas immédiate* ; au moment de la réapparition des douleurs si la sédation est *passagère*.

Ces doses moyennes peuvent être augmentées sans inconvénients et *très rapidement* si le soulagement se fait attendre. Une fois le soulagement obtenu, diminuer progressivement les doses, mais ne pas cesser brusquement.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée en cas de besoin.

Prix : 20 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).

Sel naturel de BRIDES

Extrait des Eaux de la Source Hybord
12 fr. 50 la boîte.

Foie. Intestin. Obésité.

Dose. — 1 à 2 paquets le matin, à jeun, dans un grand verre d'eau.

FRUCTIA

Le Sel de Brides effervescent.

Mêmes indications.

Dose. — Une ou deux mesures le matin, à jeun, dans un grand verre d'eau.

25 francs le flacon.

**Dépôt de la Compagnie
des Sous-Produits de Brides**

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

Tél. : Elysées 76-48.

Tablettes-Pilules de BRIDES

Composition. — Taurocholate de soude,
Sels deshydratés des Eaux de Brides,
Extraits végétaux.

Indications thérapeutiques. — Obésité et
en général toute la gamme des affections
arthritiques et hépatiques.

Dose et mode d'emploi. — De 2 à 4 ta-
blettes par jour, soit en deux fois matin
et soir, soit en une seule fois au coucher.
12 fr. 50 la boîte.

**Dépôt de la Compagnie
des Sous-Produits de Brides**
46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).
Tél. : Elysées 76-48.

Thé de BRIDES

A base de plantes à actions réductives et
toni-laxatives.

En infusion, une cuillerée à soupe par tasse
à prendre, soit le matin comme petit
déjeuner, soit après les repas, soit le soir
en se couchant.

7 fr. 50 la boîte.

Bain de BRIDES

Réductifs et amaigrissants.

Un paquet pour un grand bain à 38°-39°.
Un bain tous les jours ou tous les deux jours.
45 francs le Coffret de 12 bains.

**Dépôt de la Compagnie
des Sous-Produits de Brides**
46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).
Tél. : Elysées 76-48.

BROMADYL VICARIO

Brom-diéthyl-acétyl-carbamide.

Comprimés à 50 centigrammes.

Sédatif léger

Particulièrement indiqué dans les troubles neurasthéniques, phobies, etc.

Provoque rapidement le sommeil et, au réveil, ne laisse pas au malade l'impression pénible de dépression nerveuse.

Posologie. — *Comme hypnotique*, 1 ou 2 comprimés dans une infusion chaude, le soir.

Comme sédatif, 1/2 ou 1 comprimé, 3 ou 4 fois par jour, dans l'eau froide.

Le tube de 10 comprimés : 8 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e)

BROMÉINE MONTAGU

(Bromhydrate de Codéine.)

Propriétés. — Action sédatrice et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

Indications. — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

Formes pharmaceutiques. — *Ampoules dosées* 0,02 cgr, 15 fr. — *Pilules* : 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour, 12 fr. 50. *Sirop* : 0,03 par cuillerée à soupe, Dose : 1 à 3 cuill. par jour, 15 fr. — *Gouttes* : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée, 15 fr.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS

BROMIASE

Description. — Capsules kératinisées contenant :

Bromure de potassium..... 0 gr. 30

Bromure d'ammonium..... 0 gr. 20

Levurine extractive..... 0 gr. 10

En flacons de 50 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle des bromures, mais sans bromisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage de kératine qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie, et ne répugnant pas au malade.

Indications. — 2 à 12 capsules par jour, dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale
(Voir l'étude sur l'Iodogénol).

Forme. — Gouttes.

Doses et mode d'emploi. — XX gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : affections du système nerveux, insomnie, hystérie, convulsions, épilepsie, névralgies, etc.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUcq
COURBEVOIE (Seine). Tél. : Défense 09-71.

BROMO-MAISINE

Globules.

Combinaison directe du *Brome* et d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*, sans aucune autre association médicamenteuse.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsies, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

Posologie. — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

Laboratoire R.-J. SOUDAN

Pharmacien de 1^{re} classe — Ex-interne des Hôpitaux de Paris
48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de
Peptone de viande de bœuf.

Gouttes : 40 gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. de bromure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : XX à L gouttes. *Enfants* : X à XX gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

Propriétés thérapeutiques. — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

Indications. — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

Propriétés thérapeutiques. — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.

Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.

Indications thérapeutiques. — Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Épilepsie, etc.

Posologie. — XL gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS

Téléphone : Anjou 16-55.

BROMURES SOUFFRON

Bromure de Potassium (KBr)

Bromure de Sodium (NaBr).

Chimiquement purs - Titrés et inaltérables.

Pas de bromisme.

Solution à 2/15. Une cuill. à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.

Sirop à 2/20. Une cuill. à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.

Dose et mode d'emploi. — De 0 gr. 25 cgr. à 4 gr. par jour et plus.

Propriétés thérapeutiques. — Antinervin.

Indications. — Affections nerveuses, insomnie, chorée, épilepsie, hystérie, névroses.

Société Générale

d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

BRONCHITOL

Sirop de Thiocol pur, procédé français (Thiocol Elzévir).

Modifie et tarit les sécrétions bronchiques. Aseptise la flore microbienne pulmonaire.

Spécifique de la tuberculose et de la bronchite à leurs diverses phases.

Agréable au goût.

Ne donne pas de troubles gastriques.

Augmente même l'appétit des tuberculeux.

Le Thiocol Elzévir est *absolument alcalin* (point capital).

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : dose moitié. Ces doses peuvent être augmentées après avis du médecin.

Echantillon et littérature au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

BRONCHODERMINE

Laboratoires du Docteur TISSOT.

Sous ce nom (déposé) est présenté un nouveau produit à base de *corps gras, spécial, adhérent à la peau*, pour obtenir l'absorption simple et rapide des éléments les plus connus dans le traitement des voies respiratoires : Gaïacol, Sève de Pin, Terpinol, Eucalyptol et Helenine.

La peau est l'agent *dyaliseur, absorbant à grande surface*, le plus actif.

En respectant les *voies stomacales, intestinales et rénales* (ce qui a son prix) on peut traiter par simple application tous les *rhumes, bronchites, pneumonies, gripes, pleurites, danger de bacillose, coqueluches, etc., etc...*

Mode d'emploi. — A tous les âges, étendre une bonne couche de Bronchodermine sur le dos, et au besoin la poitrine, recouvrir d'ouate ou de flanelle toujours la même.

Laboratoires du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS.

BRONCHOFORME

Composition. — Teintures racine d'aconit, belladone drosera, eau de laurier-cerise, benzoate de soude, sirop de bourgeons de sapin, de bromoforme composé et de cerises.

Indications. — Bronchites aiguës ou chroniques, suites de grippe, rhumes négligés, catarrhes, influenza, asthme, coqueluche, laryngites, trachéites, etc.

Doses. — 4 cuillerées à soupe par 24 heures ; enfants, de 3 à 5 cuillerées à café par 24 heures.

M. DECHATRE, pharmacien,
20 bis, rue du Sergent-Godefroy
MONTREUIL-SOUS-BOIS.

BRONCHOSEPTOL LAURIAT

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptise les bronches et les voies respiratoires. Calme la toux, facilite l'expectoration : fluidifie les sécrétions et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques.

Indications cliniques. — Toutes affections broncho-pulmonaires, rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, trachéites, broncho-pneumonie, tuberculose pulmonaire.

Composition. — Chaque comprimé renferme :

Poudre de Dover codinée (opium 0,01 remplacé par codéine 0,01)	0,10
Bromol (Tribromophénol)	0,02
Extrait d'aconit titré (Codex)	0,0025
Extrait de belladone (titré Codex)	0,0005
Terpine	0,05
Benzoate de soude	0,10

Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin et évitant ainsi l'action émétisante de l'ipéca à doses répétées.

Mode d'emploi. — *Adultes.* 4 comprimés par jour et 2 dans la nuit, s'il y a lieu.

Enfants au-dessus de 8 ans. Demi-dose. Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 11 fr. 90.

Laboratoires E. LAURIAT

Docteur en pharmacie, La Garenne-Colombes (Seine).

BRONCHO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Lysat polyvalent (B. diphtériques, Streptocoques, Pneumocoques, Staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. Catarrhalis, Colibacilles).

Indications. — *Enfants, adultes, vieillards* : Grippe, Bronchites profondes, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonies (Rougeole, Coqueluche, Diphtérie), Vaccination pré-opératoire et Accidents pulmonaires post-opératoires, Suppurations pleuro-pulmonaires non fétides.

Posologie. — Première injection de 1/2 cc., les suivantes : 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Nourrissons, enfants, adultes, mêmes doses. (Voir VACLYDUN, page 1150.)

Présentation, en boîtes de 8 ampoules de 1 cc.

Prix : 40 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

BRONCOSOL

Spécifique des affections broncho-pulmonaires.

Composition. — Le Broncosol ne se présente que sous la forme de comprimés, chaque comprimé renferme : Codéine, 0 gr. 015 ; Extrait d'aconit, 0 gr. 01 ; Extrait de belladone, 0 gr. 01 ; Terpène, 0 gr. 10 ; Thiocol, 0 gr. 05 ; Ipéca pulvérisé, 0 gr. 02.

Action thérapeutique. — Hypnotique puissant, calmant nerveux, modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant parfait, régulateur des actes respiratoires.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 5 ou 6 comprimés par 24 heures.

Enfants de plus de 10 ans : 2 ou 3 comprimés par 24 heures.

Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer, de préférence dans l'intervalle des repas et au moment des crises.

Prix : 11 francs la boîte de 20 comprimés.

Laboratoires CH. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — Paris (III^e).

Téléphone : Archives 67-05.

BRUMARSYL

Composition. — Iodo-Arsénite d'hydrargyre chimiquement pur.

Indications. — Psoriasis, Impétigo, Eczémas, Dermites irritantes, Adénites cervicales, Ophthalmies intermittentes avec Kératite, Bronchites à répétitions, Toux rebelles, Catarrhes naso-pharyngiens, Maladies spécifiques.

Mode d'emploi. — *Adultes*: Débuter par V gouttes matin et soir, augmenter d'une goutte matin et soir, pour arriver à XX gouttes 2 fois par jour. Continuer cette dose 8 jours et redescendre progressivement à V gouttes matin et soir. Cesser 8 jours et recommencer.

Enfants: De 6 mois à 2 ans, de I goutte matin et soir, à V gouttes matin et soir.

2 à 8 ans: de II gouttes matin et soir, à X gouttes matin et soir.

8 à 15 ans: aller jusqu'à XV gouttes matin et soir.

Prix: 12 fr.

Laboratoire du BRUMARSYL

C. BRUMAULD, pharmacien 1^{re} classe.

65, Cours National, SAINTES (Charente-Inférieure)

BUCCUROL

Forme. — Granulé soluble, de goût agréable.

Composition. — Formine, benzoate de soude et de lithine, extraits de buchu, maïs, pichi, uva-ursi, térébenthine (extr. fluide).

Indications. — 1^o Diathèse urique: coliques hépatiques et néphrétiques, calculs uratiques et phosphatiques, goutte, gravelle, uricémie.

2^o Antiseptique urinaire: cystites, pyélites, pyélonéphrites, blennorrhagie, urétrites, prostatites, bactériuries, rétentions d'urine, infections entéro-rénales.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour, 20 minutes avant les prises d'aliments.

Laboratoires du Docteur E. GAUCHON

Pharmacien de 1^{re} classe.

83, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

BUCMINE

Buchu-formine.

Composition. — Formine de pureté absolue, complètement indolore, buchu stabilisé. Benzoate de lithine.

Formes et doses. — Granulés de saveur agréable, 2 à 4 cuillerées à café. Comprimés à 0,50, 2 à 4 par jour.

Indications. — Affections des voies biliaires et urinaires. Uricémie infantile. Irritation de l'épithélium urinaire. Maladies infectieuses. Infections entéro-rénales post-grippales.

Prix : 15 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS.

BULGARINE THÉPENIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal.

Forme. — Bouillon, comprimés et poudre.

Indications thérapeutiques. — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte). Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale), Dysenterie, Dermatose, Furunculoses, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du Choléra. Poudre : Rhinites, Ozènes, Stomatites, pansement des Plaies.

Modes d'emploi. — Adultes : Sucrer 2 comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon 4 fois par jour 1/2 heure avant le repas.

Enfants : Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Prix : La boîte ou flacon : 12 fr. 50.

Le 1/2 flacon de bouillon : 8 fr. 75.

Laboratoire des Ferments

du Docteur A. THÉPENIER

10 et 12, rue Clapeyron — PARIS.

R. C. Seine 150.854.

C 40

Indications thérapeutiques. — Traitement des cancers, fibromes et de toutes tumeurs malignes.

Principe actif. — Savons doubles de Cu et Mg.

Formes :

C 40 Injectable, en boîtes de 10 ampoules de 5 cc. et de 2 ampoules de 2 cc. 5.

C 40 Comprimés. — En flacons de 120.

Doses :

Ampoules. — Faire 3 séries de 12 à raison d'une ampoule par jour.

Comprimés. — Deux comprimés le midi et deux comprimés le soir, pris en mangeant. Faire suivre le traitement pendant un an.

Prix : 60 fr. la boîte d'ampoules.

22 fr. le flacon de comprimés.

Durée : 20 jours.

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

CACHETS DU Dr BOVEIL

à l'Amino-Phéno-Théine.

Calmant infailible de l'élément douleur, quelle qu'en soit l'origine. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Indications. — Névralgies, Migraines, Crises de Rhumatisme ou de Goutte, Insomnies, Fièvre, Grippe, Influenza, Courbature, Paludisme, Douleurs menstruelles, Maux de dents, Otite, Mastoïdites et toutes douleurs.

Doses et Mode d'emploi. — Un cachet au moment où l'on souffre, avec un liquide chaud de préférence.

Dose moyenne : 2 à 3 cachets par jour.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 8 fr. l'étui de 12 cachets.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le n° 346-1.

Maro PARIS, pharmacien de 1^{re} classe.

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle).

CACHETS KAPYTAN

contre la Grippe.

Composition. — Codéine (1 cent. par cachet), Teinture d'aconit (III gouttes par cachet), Benzoate de soude, terpine, benzonaphtol.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif de la toux, fluidifiant les sécrétions bronchiques. Antisepsie du tube digestif (Grippe, Influenza).

Indications. — Grippe, Bronchites, Asthme pulmonaire, Rhumes et toutes Affections broncho-pulmonaires.

Posologie. — 4 cachets dans les 24 heures, pris entre les repas, dans un grog fortement alcoolisé.

L'étui de 12 cachets : 12 francs.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

Fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CACHETS PACHAUT

(Cachets de santé).

Propriétés thérapeutiques. — Laxatifs, cholagogues, ne provoquant ni coliques ni selles diarrhéiques.

Composition :

Alpha :

Extrait de cascara.....	0.25
Agar-agar.....	0.20
Bicarbonate de soude.....	0.15

Gamma :

Extrait de cascara.....	0.25
Agar-Agar.....	0.20
Bicarbonate de soude.....	0.15
Belladone	un centigramme.

Mode d'emploi. — De 1 à 4 cachets par jour à prendre de préférence au début du repas du soir

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS

Téléph. : Lab. 16-72.

CACHETS RÉPARATEURS

Composition A avec ovaire, oxalate de fer, bioxyde de manganèse, arrhénal, belladone.

Indications. — Chlorose, dysménorrhée naturelle ou chirurgicale, ménopause.

Composition B, même composition *sans ovaire*.

Indications. — Anémie, chlorose, pauvreté du sang, faiblesse générale.

Mode d'emploi. — 2 cachets par jour aux repas principaux.

Laboratoire des Produits Français
L. HERIN, Ex-Interne des Hôpitaux
 98, rue Jeanne-Maillotte
 LA MADELEINE (Nord).

CACHETS « ROCHE » DE THIOL

1 cachet « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. gâicol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 4 par jour et plus.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS « ROCHE » de Thiocol.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
 21, place des Vosges — PARIS (V^{ie}).

CACODYLE GONNON

Au Cacodylate de soude pur corrigé par le
procédé Hélier.

Présentation et composition :

Sirop : Cacodylate de soude (2 cgr. par cuill.
à soupe) associé à un sirop iodophosphaté
tannique spécial (Sirop de Lovel).

Vin : 2 cgr. de Cacodylate de soude et 20 cgr.
de phosphoglycérate de chaux, soude et
potasse.

Granules : 2 cgr. de cacodylate de soude.

Ampoules : 5 et 10 cgr. par cc.

Gouttes : 1 cgr. par V gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Toujours
bien toléré, permet d'administrer l'arsenic
à haute dose et pendant longtemps, sans
craindre les inconvénients des composés
minéraux de l'arsenic. Excitant de la
nutrition et modérateur nervin.

Indications. — Affections pulmonaires, ané-
mie profonde, chlorose, scrofule, impalu-
disme, psoriasis, et tout état cachectique.

Posologie :

Sirop : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Vin : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Granules : 3 à 6 par jour.

Gouttes : V à XV gouttes par jour.

Ampoules : 1 par jour.

Sirop et vin : 12 francs.

Granules, Gouttes et ampoules : 7 fr. 50.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

CACODYLINE JAMMES

Médication cacodylique intensive indolore

Enfants : Cacodyline A. 10 cgr. Cacodylate de soude (1 cc.). Cacodyline B : 20 cgr. Cacodylate de soude (2 cc.).

Adultes : Cacodyline C, 30 cgr. (3 cc.). Cacodyline D : 50 cgr. (3 cc.). Cacodyline E : 1 gr. (3 cc.). Magnésio-Cacodyline. Cacodylate de soude : 30 cgr. Chlorure de magnésium : 20 cgr. (3 cc.).

Une injection intramusculaire par jour.

Indications. — Anémies, Asthénie, Tuberculose, Prétuberculose, Syphilis.

Prix public : 18 francs.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

CALCIONAL

Ion Calcium Stabilisé.

Deux formes :

Comprimés sans goût. — Ampoules indolores.

1 comprimé = 25 centigr. de CaCl_2 naissant libéré au contact de l'eau et des sécrétions digestives.

1 ampoule = 1 milligramme de calcium ionisé, injectable par la voie sous-cutanée.

Propriétés thérapeutiques. — Celles du chlorure de calcium sans aucun de ses inconvénients.

Indications. — A titre préventif et curatif (hémorragies et états hémorragipares, albuminuries, réactions sériques tardives, spasmophilies, tétanies, décalcifications, asthénies).

Doses :

Comprimés : Nourrissons : 1 à 2 par jour. — Enfants : 2 à 4 par jour. — Adultes : 5 à 8 par jour.

A faire dissoudre dans l'eau sucrée.

Ampoules : Enfants (2 à 10 ans), 1 tous les 2 jours. — Adultes, 1 tous les jours.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Adresse télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

CALCI-STÉNINE

Solution titrée de Chlorure de Calcium.

LXXX gouttes = 1 gramme des sels suivants :

Chlorure de Calcium.	0,94
Chlorure de Sodium.	0,03
Chlorure de Magnésium . . .	0,03

Indications. — *Reconstituant* : Croissance, Convalescence, Prétuberculose, Grossesse, Allaitement.

Hémostatique : Curatif de toutes les hémorragies et préventif des hémorragies post-opératoires.

Diurétique : Néphrites, Albuminuries.

Antianaphylactique : Accidents sériques, Urticaire.

(La CALCI-STENINE, étant à la fois reconstituante et antianaphylactique, est indiquée dans la convalescence de la diphtérie).

Posologie :

Enfants : Reconstituant : V gouttes par année ; Hémostatique : XV gouttes par année ; Antianaphylactique : IV gouttes par année.

Adultes : Reconstituant : XL gouttes 2 fois par jour ; Hémostatique : LXXX gouttes 3 à 4 fois par jour ; Diurétique : LXXX gouttes 5 à 10 fois par jour ; Antianaphylactique : XXX gouttes 3 fois par jour.

Laboratoire MAIRE, pharmacien

171, rue de Belleville — PARIS

« CALCIUM-SANDOZ »

Composition et propriétés. — Gluconate de chaux pur, sel soluble, assimilable. Teneur en chaux (CaO) 13 p. 100, soit 9,3 p. 100 de Ca élément. Assure toutes les propriétés physiologiques de l'ion calcium. Le seul injectable par la voie intramusculaire et la voie endoveineuse à doses efficaces et sans inconvénients.

Forme. — Ampoules à 10 cc., à 5 cc. et à 2 cc. ; poudre granulée (sans sucre) ; comprimés effervescents et tablettes chocolatées.

Posologie : Ampoules :

Adultes : 1 ampoule de 5 ou 10 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

Enfants : 1 ampoule de 2 ou 5 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

Granulé sans sucre :

Adultes : 3 cuillerées à café bien pleines par jour.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café plus ou moins pleines selon l'âge.

Tablettes chocolatées :

Adultes : 2 tablettes 3 fois par jour.

Enfants : 1/2 à 1 tablette 3 fois par jour.

Comprimés effervescents :

Adultes : 1 comprimé 2 fois par jour.

Enfants : 1/3 à 1 comprimé 2 fois par jour.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e).

Dépôt général et Vente :

Usine des Pharmaciens de France

129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue *concentrée et solidifiée*, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Avitaminose, assimilation défectueuse du calcium.

Indications. — Rachitisme, Troubles de croissance. Spasmophilie, Maladies infectieuses et contagieuses, Gastro-entérites, Déminéralisation (tuberculose, grossesse, allaitement).

Forme. — En dragées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés. (Dragées et granulés glutinisés ne se dissolvant que dans l'intestin.)

Dose et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 dragées ou 2 cuillères à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas, à avaler.

Enfants : Moitié de ces doses.

Prix au public : *Dragées et Granulés* : 15 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits **SCIENTIA**

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1^{re} classe
21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

CALCOMAGNÉSIE

Comprimés à croquer sans addition de liquide. Médication antidyspeptique, neutralisant stomacal.

Indications. — Gastralgie avec douleurs et brûlures. Spasmes douloureux de la région stomacale. Fermentations et acidités gastriques. Aérophagie et dilatations gazeuses. Troubles digestifs d'origine nerveuse ou émotive.

Emploi et doses. — Croquer 3 ou 4 comprimés au moment des crises douloureuses, sans addition d'aucun liquide.

La **Calcomagnésie** ne renferme aucun produit toxique et peut être ordonnée aux enfants.

Prix : 14 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique
appliquées

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

CALCOZYMASE

Cure de désensibilisation

Composition. — Association de ferments digestifs : pancréatine, maltine, lab-ferment, avec un sel de calcium.

Mode d'action. — Chez les insuffisants digestifs et hépatiques, la Calcozymase réalise dans l'estomac une digestion artificielle et complète l'action de la Prézymase (Voir Prézymase).

Indications. — Tous les accidents dus à une sensibilisation quelconque : urticaire, asthme, arthropathies d'origine anaphylactique, accidents de la goutte, du rhumastisme, etc...

Mode d'emploi. — Deux à trois dragées au milieu de chaque repas.

Laboratoires **LEBOIME**

3, rue Fernand-Widal — PARIS (XIII^e).

CALMAG-NA

Forme. — Poudre impalpable, légèrement aromatisée.

Composition. — Sous-gallate et sous-carbonate de Bismuth, carbonate de Magnésium, bicarbonate de Soude, carbonate de Calcium, Kaolin colloïdal.

Action thérapeutique. — Neutralisation de l'hyperacidité et sédation des troubles gastriques. Action prompte et prolongée, sans formation d'acidité secondaire. Ne constipe pas. Aucune toxicité.

Indications. — Hyperchlorhydrie, dyspepsies, gastralgies, pyrosis, flatulence, etc...

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café délayée dans un verre d'eau. Si nécessaire, renouveler la dose toutes les 2 ou 4 heures.

La boîte : 17 fr. 50.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

Laboratoires **SUBSTANTIA S. A.**

F. Guillemoteau, pharmacien

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

CAMPHODAUSSÉ

(Camphre soluble dans l'eau.)

(Camphosulfonate de soude.)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection bien tolérée et ne provoquant les réactions locales dues au véhicule huileux.

Indications. — Stimulant cardiaque dans l'*adynamie* et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

Mode d'emploi. — 1 à 5 cc. une ou plusieurs fois par jour par voie *hypodermique, intramusculaire, ou intraveineuse*.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV°).

CAMPHO-SPARTÉINE DUBOIS

Solution d'acide campho-sulfonique et de Spartéine

Deux Formes : — Ampoules de 2 cc. et gouttes :

Trois formules :

1° **Simple.** — Chaque ampoule et 20 gouttes de solution correspondent à 4 centigr. de spartéine, et à 6 centigr. de camphre.

2° **Caféinée.** — Composition simple additionnée de 5 centigr. de caféine par ampoule et par 20 gouttes de solution.

Cette formule est spécialement indiquée contre les dyspnées et à titre préventif ou curatif, dans les accidents opératoires.

3° — **Strychnée.** — Composition simple additionnée de 1/2 milligr. de sulfate de strychnine par ampoule et 20 gouttes de solution.

Cette formule convient aux malades nerveux déprimés

Indications. — Toutes les indications du camphre, de la spartéine, de la caféine et de la strychnine comme traitement d'urgence des *défaillances et collapsus cardiaques*, des *palpitations*, des *insuffisances cardiaques*, des *asthénies cardio-vasculaires*, des états infectieux, des *dyspnées* d'origine cardiaque et respiratoire, comme diurétique dans tous les cas de *déséquilibre du système nerveux vago-sympathique* et enfin comme préventif des *accidents cardio-vasculaires*, des *malaises lypothymiques* et des anesthésies opératoires.

Mode d'emploi et Posologie :

Ampoules. — Voie cutanée ou intramusculaire en injection indolore : une à 4 ampoules par 24 heures.

Gouttes. — 20 à 60 gouttes par 24 heures en deux ou trois fois au début des repas ou au moment des malaises lypothymiques ou syncopaux.

LABORATOIRES DUBOIS

16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII°)

CAMPHOSTYL LACROIX

Composition. — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

Avantages. — 1° Absorption immédiate. 2° Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3° Injection parfaitement indolore grâce à son pH = 7.

Indications. — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

Formes pharmaceutiques. — 1° *Camphostyl simple*.

A. *Ampoules.* — 1° Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 10 ; 2° boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 20 ; 3° boîtes de 6 ampoules à 0 gr. 50.

Pour le corps médical, en boîtes de 25, 50 et 100 ampoules.

B. *Gouttes.* — XX à CXXX gouttes par jour.

2° *Camphostyl spartéiné.* — Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 camphostyl et 0,05 de spartéine.

Echantillon sur demande.

Laboratoires LACROIX

(V. MEROBIAN et fils, Successeurs).

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

CAMPYRO-SALYL FRAISSE

Composition :

Salicylate de Benzyle.....	0 gr. 50
Camphre	0 gr. 10
Huile d'olive pure.....	5 cc.

Indications :

Sciatique. — Névrites aiguës ou chroniques.

Forme :

En ampoules de 5 cent. cubes.

5 à 6 ampoules suffisent pour guérir une sciatique rebelle.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin — PARIS.

CAMPHYDRYL ROBIN

Dérivé camphré en solution aqueuse, solution à 5 p. 100.

Ampoules de 1, 2, 5 cc. — Tubes de 50 comprimés.

Dose et mode d'emploi. — Injections sous toutes formes : 1 cc. pour les enfants ; 2 cc. dans les cas ordinaires des adultes ; 5 cc. dans les cas importants et même 10 cc. dans les shocks traumatiques ou opératoires.

Propriétés thérapeutiques. — Les mêmes que celles des huiles camphrées et de l'alcool camphré, excitant énergique du cœur et des centres nerveux et respiratoires, analgésique et antiseptique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les démangeaisons, prurits, brûlures, angines, etc.

Indications. — Troubles cardio-vasculaires, états de shock, crises respiratoires, maladies infectieuses, antiseptie des plaies, antiseptie et analgésie des prurits, acnés, démangeaisons.

L'action est plus rapide et plus intense que celle du camphre. L'injection est indolore et n'amène pas de réaction locale.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

CANOL

Composition. — Poudres végétales, sans aucune addition de corps d'origine chimique.

Albumine végétale.....	4.9
Sucre réducteur.....	1.4
Aphloïa	0.05
Chimaphila	2.85
Pectases	0.797
Lawsotanine.....	0.003

Absolument inoffensif, aucune contre-indication.

La Lawsotanine noircit les urines au début du traitement — ne s'accumule pas — peut être employée indéfiniment sans danger.

Indications. — Médication rationnelle des Infections des Voies urinaires, de l'Albuminurie et du Diabète, Néphrites, Pyélo-néphrites, Lithiase rénale, Cystites, Hématuries.

Forme pharmaceutique. — Boîte de 50 cachets de 0 cgr. 50.

Posologie. — *Dans les néphrites aiguës* : 4 cachets par jour, augmenter jusqu'à 10, suivant indication fournie par l'analyse des urines.

Dans les néphrites interstitielles. — En cas de pollakiurie, débiter par 10 cachets par jour, diminuer progressivement jusqu'à 4 par jour.

En cas d'oligurie, commencer par 4 cachets par jour et augmenter jusqu'à 10.

Pyélo-néphrites et Lithiase rénale. — D'emblée 12 à 14 cachets par jour, suivant la diminution du pus, du mucus ou du sable, diminuer progressivement jusqu'à 6 cachets.

Diabète. — 4 à 6 cachets par jour.

Prix de la boîte de 50 cachets : 25 francs.

Echantillon et littérature sur demande :

Laboratoire du CANOL

5, rue des Lyonnais — PARIS (V^e).

A. CŒURET, Pharmacien.

CANTÉÏNE BOUTEILLE

Forme. — Elixir.

Composition :

Cratœgus.....	XXV gouttes.
Passiflore	0 gr. 50
Hamamélis.....	XXX gouttes.
Salix Alba	0 gr. 025
Excipient. Q. s. par cuillerée à café.	

Indications. — Eréthisme cardiaque. Troubles circulatoires et troubles nerveux consécutifs. Ménopause. Neurasthénie. Mélancolie. Déprimés. Varices. Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

Tél. : Marcadet 04-02.

CAPARLEM

Capsules gélatinisées d'huile de Haarlem d'origine, pure et vraie, dosée à 0 gr. 15 de produit actif.

Foie. — Cholagogue, Antiseptique biliaire, Lithiase biliaire simple ou infectée, Cholécytites chroniques, lithiasiques ou non, Angiocholites et Angiocholécystites.

Rein. — Antiseptique rénal complet. Toutes variétés de Pyélonéphrites, Lithiase rénale, Uricémie et Colibacilluries.

Posologie :

Une à deux capsules au milieu des deux principaux repas, 10 à 15 jours par mois. Doubler la dose dans les cas aigus.

Laboratoire Lorrain

de Produits Synthétiques Purs

ETAIN (Meuse).

CAPSELLASE

Médicament anti-hémorragique.

Composition. — Extrait stabilisé de CAPSELLA.

Indications. — Métrorragies, hémoptysies, hémorragies de toute nature.

Forme. — Pilules dosées à 125 milligrammes

Propriétés. — Modère et régularise les périodes menstruelles.

Posologie :

Dose moyenne : 6 à 8 par 24 heures, par prises de 2.

Hémorragies graves : jusqu'à 12 à 14 pilules par 24 heures.

Prix de vente : 12 fr.

Laboratoire GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

CAPSULES BARDET

à l'Huile de Haarlem vraie.

Composition. — Chaque capsule contient 10 gouttes d'Huile de Haarlem vraie, garantie importée de la *seule* maison fabriquant la véritable Huile.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Calculs biliaires, Coliques hépatiques, Ictère, Coliques néphrétiques, Pyélo-Néphrite, Cystites, Arthritisme, Asthme, etc.

Posologie. — Affections aiguës : 2 à 4 capsules par 24 heures.

Affections chroniques et cures d'entretien : 1 à 2 capsules par 24 heures.

A avaler avec une gorgée de liquide froid.

Formuler :

CAPSULES BARDET

Échantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Gaïacol, à la dose de 0,05 cgr. dissoute dans 0,20 cgr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

Dose. — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas, ou matin et soir avec une tasse de lait ou de tisane.

Propriétés. — Elles se dissolvent lentement dans l'intestin, répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

Indications. — Toux, Catarrhes, Bronchites chroniques, Tuberculose, etc.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

CAPSULES ET SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

1° Calme l'irritation et tarit le **catarrhe des muqueuses bronchiques**, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude).

2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir : le **spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique**, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyl-lique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la **papavérine**, sans en avoir la toxicité.

Posologie :

Sirop : 3 à 4 cuill. à soupe par jour ; 10 ans, 5 à 6 cuill. à café ; 5 ans, 2 à 3 cuill. à café.

Capsules : 3 à 4 par jour ; 10 ans : 1 à 2.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

CAPSULES FRANKLIN

Admis dans les Hôpitaux de Paris
et de province.

Association nouvelle de Kava-Kava avec
essence de Santal, Salol, Bleu de
Méthylène et Camphre, ayant une
réelle efficacité dans les affections
vésico-rénales.

Posologie: 6 à 8 capsules par 24 heures.

Echantillons à la disposition de
MM. les docteurs.

Laboratoires Polytechniques
W.-J. NETTER

100, boulevard Sébastopol — PARIS

CAPSULES JORET ET HOMOLLE

Emménagogue.

Forme. — Capsules de gélatine de 0 gr. 20, spécialement étudiées pour être rapidement absorbées par l'organisme.

Composition. — Apiol pur et bien défini, préparé et purifié par le procédé des docteurs Joret et Homolle qui découvrirent et isolèrent ce corps.

Indications. — Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorrhagie. Innocuité absolue en cas de grossesse.

Posologie. — Une capsule matin et soir pendant toute la durée de la menstruation.

Prix : 13 fr. 50

Pharmacie SEGUIN
165, rue St-Honoré — PARIS.

CAPSULES KUCHNER AU MÉCAPTOL

Affections bronchiques et pulmonales.

Composition. — Héléline suractivée par association avec Gaïacol crist., Eucalyptol crist., Codéine et Chl. Thébaïque.

Action thérapeutique. — S'opposent au développement du Bacille de Koch, calment la toux, modifient et tarissent l'expectoration, préviennent les hémoptysies, propriétés fébrifuges et antidyspnéiques très prononcées.

Indications. — Bronchites simples et chroniques, Tuberculose, Emphysème, Angine, Laryngite. Toutes affections des voies respiratoires.

Posologie. — 6 capsules par jour en trois fois.

Prix de vente : 12 francs.

Laboratoire HINGLAIS
EPERNAY (Marne).

CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit (ext.) ,001, Belladone(extr.) 0,003, Lobélie (ext.) 0,002, Grindelia (ext.) 0,005, Terpene 0,012, Eucalyptol 0,02, Thiocol (Sulfogaïacolate de potasse) 0,04, par capsule.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

Indications. — Toux opiniâtres, bronchites chroniques, laryngites, asthme, catarrhe, etc.

Prix, le flacon : 11 fr.

Laboratoires H. NOGUÈS

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS.

Anciennement : 11, rue Joseph-Bara, Paris.

CARBALCALOÏDES

Alcaloïdes (ou principes actifs) adsorbés par un charbon polyvalent (Carbosanis) qui leur sert de véhicule et ne les relâche que dans l'intestin. Les principaux sont :

La Carbatropine. — Carbosanis atropiné (*Constipation spasmodique*). 15 francs.

Le Carbarsèno. — C. + ac. oxyaminophénylarsénique (*Contre parasites intestinaux*). 18 francs.

La Carbémétine. — C. + chlorhydrate d'émétine (*Dysenterie amibienne*). 40 francs.

Le Carbalga. — C. + iode (*Antiseptique intestinal*).

La Carbésérine. — C. + sulfate d'ésérine (*Atonie colique*). 18 francs.

La Carbocarpine. — C. + chlorhydrate de pilocarpine (*Constipation atonique*). 18 francs.

Laboratoires MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

CARBATROPINE

Charbon organique (Carbosanis) atropiné.

Composition. — 1/2 milligr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/4 de milligr. d'atropine par cuillerée à café.

Indications. — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

Formes. — Granulé dosé à 5 milligr. par 100 gr., soit 1/4 de milligr. par 5 gr. (cuillerée à café).
Poudre et cachets.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dosage spécial pour enfants :

1/10 de milligr. par cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

CARBOCITROL

Composition. — A base de citrate trisodique chimiquement pur.

Indications. — Gastrite aiguë et chronique. Dilatation de l'estomac. Dyspepsie flatulente. Congestion du foie. Paresse gastrique de toute origine.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — 2 à 4 paquets ou comprimés par jour.

Laboratoires O. VISCONTI

64, boul. Barbès — PARIS (XVIII^e).

Téléphone : Nord 30-21

CARBOIODINE

Formes. — Tablettes, Comprimés.

Composition. — Iodothérapie colloïdale, complexe colloïdal, iode métalloïde et charbon d'algues marines.

Indications. — Maladies infectieuses des voies respiratoires, grippe, pneumonie, asthme, emphysème, affections du cœur et des vaisseaux, etc.. Toutes indications de l'iode.

Mode d'emploi. — 1 à 5 tablettes ou comprimés par jour.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne — PARIS

CARBOÏODURE FRAUDIN

Composition. — Iodure de potassium chimiquement pur, fixé sur du charbon activé, utilisé comme véhicule.

Granulé friable, d'un goût agréable, contenant 0 gr. 25 d'iodure de potassium, par cuiller à café.

Propriétés. — L'iodure de potassium fixé sur le charbon est seulement libéré en milieu alcalin (intestin). *La libération est intégrale.* Ni intolérance stomacale, ni iodisme.

Indications. — Toutes celles de l'iodure de potassium : artériosclérose, arthritisme, affections cardio-vasculaires, asthme, etc.

Prix : 17 fr.

Laboratoire des CHARBONS FRAUDIN
4, avenue Desfeux — BILLANCOURT (Seine).

CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale
hépatique et rénale.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, adsorbés par du charbon végétal pulvérisé, extrait pancréatique, algues à mucilage.

Indications. — Auto-intoxications gastro-intestinales. Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatoses.

Formes. — 1° Boîte de 30 cachets ;
2° Poudre avec cuiller-mesure.
(N'existe pas sous forme de comprimés.)

Doses. — Adultes : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — Enfants : 2 à 6 mesures *pro die*.

CARBOLACTYL BILIÉ

Composition. — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

Indications. — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystite, Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabètes par Dyshépatie, Artériosclérose par intoxication.

Forme. — Boîte de 30 cachets.
(Ni comprimés, ni poudre biliée.)

Doses. — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Echantillons et littérature sur demande :
19, rue de Fleurus — PARIS (VI^e).

CARBOLIN MIDY

Graines de lin (sélectionnées et triées) enrobées d'un mucilage gommeux et d'un charbon végétal activé dit « Acti-Carbone » (maximum de pureté et d'activité).

Mode d'emploi. — 4 cuillerées à café par jour, aux repas ou à distance des repas suivant les cas.

Propriétés thérapeutiques :

- 1° Action mécanique de massage de la graine de lin.
- 2° Action émolliente du mucilage gommeux.
- 3° Action anti-toxique et désinfectante du charbon.

Indications. — Toutes les affections gastro-intestinales depuis la constipation chronique jusqu'aux colites aiguës. Aucune contre-indication.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS.

CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersecretion* : dans les fermentations intestinales, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON

(anciennement, 7, rue des Archers)

CARBONÉSIE

Boîte de 30 cachets : 15 francs.

Composition. — Charbon activé, charbon animal, charbon végétal, peroxyde de magnésium, carbonate de chaux, magnésie calcinée légère.

Indications. — Gastro-entérites, entérocolites, intoxications et auto-intoxications, fermentations gastro-intestinales, etc...

Posologie. — Un ou deux cachets après chaque repas. Cure de 15 jours.

Echantillons gratuits :

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 76-85.

CARBOPHOS

Médication carbo-calcique.

Aucun toxique : ni belladone, ni opium.

Neutralisation des toxines intestinales et des acides de fermentation.

Recalcification du terrain tuberculeux.

Forme. — Cachets.

Composition. — Charbon végétal, charbon animal purifié, chlorure de calcium stabilisé, bromure de calcium, phosphate de chaux, carbonate de chaux.

Indications. — Colites chroniques avec fermentations acides et selles molles, diarrhée des tuberculeux, aérophagie, hyperchlorhydrie.

Doses. — 3 cachets par jour au début des repas.

La boîte (30 cachets) : 15 francs.

Laboratoires H. NOE

SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord).

CARBOS

Composition. — Le premier charbon animal obtenu chimiquement pur sans *Sulfures ni Cyanures*.

Forme. — *Comprimés* de 1 gramme. *Granulé* à 60 p. 100, soit 3 grammes de charbon par cuillerée à café.

Indications. — Dyspepsies gastro-intestinales avec flatulences, Fermentations, Putréfactions, Infections intestinales aiguës et chroniques, Empoisonnements, Gastro-entérites des enfants, Diarrhées infantiles, etc.

Posologie. — *Comprimés*, 3 à 5 avant ou après les repas. *Granulé*, 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires E. MILLET

RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

CARBOSANIS

CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR D'ADSORPTION CONSTANT

Propriétés. — Pouvoir adsorbant considérable, puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

Indications. — Empoisonnements, Fermentations gastro-intestinales, Hyperchlorhydrie, Ulcus, Entérocolites, Diarrhées intenses.

Formes. — Granulé, poudre et cachets.

Prix : 15 francs.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

CARDIALGINE DUBOIS

Composition. — Une dragée contient :

Bromure de Spartéine	3 centigrammes.
Extrait de Strophantus gr.....	1 milligramme.
— d'Aubépine.....	10 centigrammes.
— de Belladone titré.....	5 milligrammes.
Chlorhydrate de Papavérine	1 centigramme.

Action. — Cardiotonique, régulateur des rythmes du cœur, antispasmodique et sédatif, continue et remplace l'action de la digitale sans crainte d'effets accumulatifs.

Indication. — Troubles fonctionnels du cœur et des vaisseaux, insuffisance cardiaque, spasmes vasculaires de l'hypertension, arythmies, tachycardies, éréthisme neuro-cardiaque, atonies graves des infections, etc.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 dragées par 24 heures.

Enfants : 3 à 6 ans : 1 dragée par jour ; 6 à 12 ans : 2 dragées par jour ; 12 à 16 ans : 3 dragées par jour.

LABORATOIRES DUBOIS

16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure.

Principe actif du *Strophantus gratus*.

Présentation et posologie. — 1^o *Voie buccale*.

Solution glycéro-alcoolique à 2 p. 1000 (25 gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).

Petites doses : 25 gouttes par jour en une fois.

Doses moyennes : 50 à 75 gouttes par jour en 2 ou 3 fois. *Doses fortes* : 100 gouttes par jour en 4 fois.

2^o *Voie intraveineuse.* — Ampoules titrées telles que 1 cc. — 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/4 mgr. p. injec.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiaques avec hypotonicité marquée ; en un mot, tous les cas où il y a dilatation cardiaque. Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaïne**.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

6, rue d'Assas — PARIS (VI^e). Tél. : Littré 31-85

Belgique : *Agent général* : **L. Prunières**

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

CARDION VINCARDI

Toni-cardiaque d'entretien.

Principes actifs. — Complexes stabilisés, extraits du crataegus, du convallaria, du passiflora, de l'adonis vernalis, du cimicifuga racemosa.

Forme. — Comprimés lenticulaires glutinés.

Indications. — Tonicardiaque d'entretien associé à des antispasmodiques, Insuffisance cardiaque des hypertendus.

Doses. — 3 à 5 comprimés par 24 heures, de préférence entre les repas.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire VINCARDI

Ph. VIGUIER, pharmacien.

42, avenue Borriglione — NICE (A.-M.)
R. C. Nice 9046.

CARDIOSTHÉNINE

Médicament du Cœur et des Vaisseaux.

Définition :

La Cardiosthénine, à base d'extrait de strophantus, de sulfate de spartéine, d'extrait de crataegus oxyacantha et d'extrait de valériane, constitue un toni-cardiaque antispasmodique par action vasculaire dilatatrice qui soutient le cœur et diminue les résistances.

Indications thérapeutiques :

Douleurs précordiales, Dyspnée d'effort, Palpitations, Tachycardie, Angine de poitrine, Goitre exophtalmique, Arythmie, Myocardites, Endocardites, Hypertrophie du cœur, Dilatation des cavités du cœur, Hypertension artérielle, Cardio-arthérosclérose, Urémie.

Posologie :

De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

Laboratoire de Pharmacologie Générale

Dr Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS.

CARNINE LEFRANÇO

Suc de viande de bœuf crue, concentré à froid, dans le vide, en solution sucro-glycérinée.

Indications. — Reconstituant énergétique, prescrit dans : *Anémie, Anorexie, Convalescences, Tuberculose, Affaiblissements, etc.*

Dose et mode d'emploi. — Une à quatre cuillerées à soupe par jour, pure ou additionnée d'une boisson froide.

Établissements FUMOUZE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

CAROTTASE

Composition. — Poudre de carottes fraîches stabilisées à froid. 1 gr. de carottase = 4 gr. de carotte fraîche. Aliment végétal renfermant des sels minéraux naturels complètement assimilables, des substances albuminoïdes, des hydrates de carbone, de la cellulose à l'état de poudre très ténue et des vitamines A B C.

Forme. — Poudre.

Indications. — Favorise le développement des enfants et des nourrissons, excite l'appétit, active la croissance, stimule les fonctions de la nutrition, et régularise les fonctions intestinales.

Doses

Après 2 mois, 1 pincée dans chaque biberon (0 gr. 50).

Après 3 mois, 1/2 cuillerée à café.

Après 6 mois, 1 cuillerée à café.

Après 8 mois, de 2 à 4 cuillerées à café.

Pour conserver à la Carottase toute son efficacité ne jamais faire cuire, la délayer avec du lait bouilli et refroidi, puis l'ajouter au biberon, bouillies ou panades déjà préparés.

Pour la poudre de légumes frais (Carottes, tomates, épinards), voir également VEGUVA.

Société anonyme des Établissements WANDER
151 bis, route de Joinville. CHAMPIGNY-SUR-MARNE

CARYPAÏNE

Thérapeutique infantile.

SIROP

Papaïne — Extrait de malt — Citro-phosphate de soude.

Indications. — Vomissements. Indigestions. Gastrites. Gastro-entérites. Diarrhées. Diététique mal dirigée. Maltage des bouillies.

Propriétés. — La Carypaïne :

Augmente la digestibilité de la caséine, de la viande, des œufs.

Permet la digestion facile des hydrocarbonés.

Prévient et fait cesser les vomissements.

Tonifie le système nerveux et augmente le pouvoir excito-moteur des organes digestifs.

Supprime l'intoxication intestinale.

Se prend dans de l'eau, du lait, ou dans une infusion.

Pour les bouillies, ajouter la Carypaïne après ébullition au moment où l'on retire la bouillie du feu. Remuer pour bien mélanger.

Goût agréable. Tolérance parfaite. Doses largement maniables.

Posologie :

Jusqu'à 1 an : Avant les tétées, 2 à 4 cuillerées à café par jour.

De 1 à 3 ans : Après les repas, 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

Au-dessus de 3 ans : Après les repas, 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

L. CROC, pharmacien de 1^{re} classe
SAINT-FONS (Rhône).

CASCARA MIDY

A base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

Pilules dosées à :

1^o 0,12 cgr. d'extrait hydro-alcoolique de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

2^o 0,10 cgr. de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

Doses et mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux et à effet constant, ni irritant, ni drastique.

Indications. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).

CASCARINE LEPRINCE



Indications thérapeutiques. — Constipation habituelle, Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc. Cholagogue puis Copragogue de tout premier ordre. (Spécifique des *causes* et des conséquences de la *constipation*.)

Véritable traitement et non pas purgatif banal, employé couramment depuis 50 ans.

Doses et mode d'emploi. — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 pilules le soir au début du repas.

Prix de vente au public : 8 fr. 75.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

CATALYL Mg.

Soluté de Chlorure de Magnésium cristallisé pur.
Exempt d'Oxychlorure.

Activité intense — Toxicité nulle — Stabilité.
Seule préparation magnésienne au goût vraiment agréable.

Suppression sur nos conditionnements de toute allusion au cancer.

Indications. — Cholagogue puissant, Asthénies, Surmenage, Hépatisme, Paludisme, Constipation, Senilité prématurée, Dermatoses, Prostatites, Dysfonctionnement des glandes à sécrétion interne, Diabète, *adjuvant puissant des traitements opothérapiques.*

Mode d'emploi. — De une à deux cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucrés ou non. Dose variable.

Une cuillerée à café correspond à 0 gr. 50 de Mg Cl², anhydre. 0 gr. 02 de chlorure calcium.

Laboratoire DELISS

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

CATAPLASME DU D^r LELIÈVRE

Antiseptique instantané, émollient, résolutif.
Approuvé par l'Académie de Médecine de Paris.

Avantages et indications. — Il est *instantané et économique*, Plus de manipulations compliquées, plus de linges.

Il est *antiseptique et résolutif*. — Abscess, furoncles, anthrax, panaris.

Il est *anesthésiant*. — Contusions, entorses, brûlures, engelures, eczéma, zona.

Il est *antiphlogistique et émollient*. — Ecchymoses, épanchements, hydarthrose.

Il est *décongestif*. — Laryngites aiguës, faux croup et toutes inflammations.

Il est *inaltérable*, et remplace tous les pansements humides.

Mode d'emploi. — Soumettre le cataplasme ou un morceau de cataplasme à une faible quantité d'eau tiède ou chaude jusqu'à parfait gonflement, l'appliquer sur la partie malade et recouvrir d'imperméable.

Comme *véhicule*, ce Cataplasme accepte et retient facilement les substances médicamenteuses les plus variées: laudanum, arnica, etc.

On obtient un *Cataplasme sinapisé* en le saupoudrant de farine de mouarde au moment de l'application.

E. BOULLE, pharmacien de 1^{re} classe

Ex-Interne des hôpitaux,

Lauréat de la Faculté de Paris

12, avenue de la Grande-Armée — PARIS (XVII^e).

CATEMÉNYL

Composition. — Le *Cateményl* est à base : d'*Hamamélis virginica*, vaso-constricteur veineux, hémostatique, sédatif ; de marron d'Inde, qui fluidifie le sang et calme spécialement la douleur hémorroïdale ; de *Piscidia erythrina*, sédatif utérin ; de *Viburnum prunifolium*, tonique nerveux, astringent, antiabortif ; d'*Hydrastis canadensis*, vaso-constricteur abdominal, par action élective sur les splanchniques.

Propriétés et indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Hémorroïdes, États variqueux, Eczéma variqueux, Phlébites infectieuses et variqueuses, Hyposphixie des extrémités.

Mode d'emploi. — XV à XX gouttes avant chacun des deux principaux repas dans un peu d'eau. Cesser pendant les règles.

Littérature et échantillon sur demande.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle sous le numéro 489-I.

Prix : 15 francs.

Laboratoire du docteur LALAURIE

CUXAC-D'AUDE (Aude).

Dépôt général ; Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple — PARIS (III^e), et ses succursales.

C. B. K.

Médicament empêchant le développement du bacille tuberculeux et modifiant favorablement le terrain.

Composition. — Le C. B. K. (Contre Bacille de Koch) est une association injectable de cholestérols de cuivre, d'or, de cérium et de molybdène, physiquement activés.

Action. — Le C. B. K. agit sur :

Le développement des corps microbiens (le cuivre rend en effet stériles les cultures de B. K.).

Le bacille lui-même (le molybdène et le cérium le détruisant par oxydation).

Le terrain (en favorisant l'afflux leucocytaire par l'or et le chlore).

Présentation. — Ampoules pour injections intramusculaires de 5 cc.

Les injections sont faciles et indolores, ne créant aucun accident d'intolérance locale ou générale.

Il n'existe pratiquement aucune contre-indication.

Posologie. — Une injection par jour pendant 24 jours, un mois de repos et au besoin une autre série dans les mêmes conditions.

Indications. — Tous les états pré-tuberculeux et tuberculeux quelle qu'en soit la nature.

Résultats. — Reprise du poids, diminution de la fièvre et de l'asthénie ; reprise de l'appétit à la première série.

Atténuation très importante des signes fonctionnels à la deuxième.

Modification favorable et parfois même guérison des phénomènes anatomiques à la troisième et à la quatrième série.

Prix :

La boîte de 8 ampoules : 28 fr. La triple boîte : 78 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoires S. F. E. A. T.

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

CELLU-SON

Biscottes de Son et de blé dur PUR, sans aucune substance médicamenteuse, laxative ou irritante. D'après la méthode de M. le professeur Fiessinger.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les constipations, mais plus spécialement celles provoquées par : Insuffisance hépatique, Dystonie gastrique et Ptose intestinale, Colites muco-membraneuses, Grossesse, Suites opératoires, Colibacillose.

Dermatoses à origine intestinale.

Posologie. — 2 à 3 biscottes par jour au début du traitement, puis réduire progressivement pour cesser au bout de 3 à 4 mois.

Enfants : 1/2 dose.

Prix au public : 13 fr. la boîte de 24 biscottes.

Laboratoire P. AUBRY

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII^e).

Laborde 15-26.

Belgique et Congo :

Agence Pharmaceutique Française.

51, rue Jean-Robie — BRUXELLES

CÉRÉALES BÉBÉ FAVRICHON

Farine de croissance des enfants constipés.

Composition. — Froment, 55 ; Seigle, 35 ; Sucre, 15.

Nous garantissons qu'il n'y entre pas trace de drogue.

Indications. — Tous les cas de constipation infantile à partir de 6 mois. Les donner en remplacement de toute autre bouillie, car les Céréales-Bébé sont une farine de croissance de premier ordre, riche en éléments nutritifs, en sels minéraux et vitamines.

Emploi. — 1, 2 ou 3 bouillies par jour. Les doses suivant l'âge et mode de préparations sont portées sur une notice incluse dans chaque boîte.

Littérature et échantillon sur demande.

Produits Diététiques FAVRICHON

Pharmacien-chimiste

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

CÉRÉALES GRANULÉES FAVRICHON

Aliment des constipés.

Composition. — Froment et Seigle 100 p. 100. Pas de trace de drogues.

Forme. — Granulé à saveur de grillé.

Indications. — Tous cas d'atonie intestinale (sauf cas d'obstruction : tumeur, corps étranger).

Emploi. — 2 ou 3 cuillerées à soupe dans un déjeuner, potage, ou plat quelconque, très chaud.

Produits diététiques FAVRICHON

Pharmacien-Chimiste

SAINT-SYMPHORIEN-de-LAY (Loire).

CÉRÉALINE TULIVET

Composition. — Farine de Céréales complète (Sels minéraux), tyndallisée à basse température et conservant toutes ses vitamines.

Forme :

I. Simple sans cacao ni sucre.

II. Légèrement cacaotée et sucrée.

III. Légèrement cacaotée, sucrée et maltée.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment de choix pour les enfants et les vieillards.

Mode d'emploi. — N° 1. Se prépare au bouillon de légumes ou lait sucré.

Nos 2 et 3. Se préparent à l'eau ou au lait sucré (jauné d'œuf à volonté).

Une cuillerée à bouche pour bouillie claire, 2 cuillerées pour bouillie épaisse.

Laboratoires TULIVET

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

CÉRÉBRINE FOURNIER

Liqueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

Cérébrino simple. — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

Cérébrine bromée. — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles.

Cérébrine bromo-iodée. — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciatiques.

Cérébrine iodée. — Névralgies rhumatismales.

Cérébrine quiniée. — Courbature, grippe infectieuse.

Dosé. — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

Prix : 12 fr., toutes variétés.

A. FOURNIER et C^{ie}, Pharmaciens

147, boulevard Montparnasse — PARIS (VI^e).

CÉRÉBRO-LIPASE

Comprimés.

Médication reconstituante opthérapique.

Composition. — Cerveau total de taureau fraîchement abattu, substances blanche et grise. Jusquiame. Méthylarsinate disodique.

En comprimés kératinisés et glutinisés solubles au contact de la sécrétion pancréatique et duodénale.

Indications. — États pré-tuberculeux, Anémies, Asthénies, Grossesse, Dépression cérébrale, Surmenage, Convalescence.

Action. — Stimulant général de l'organisme et de ses fonctions : circulation, nutrition, respiration. Excitant de l'assimilation et de l'hématopoïèse. Accroissement de résistance et d'euphorie.

Posologie. — *Adultes* : 2 comprimés par jour, 10 jours par mois ; durée moyenne du traitement : 3 mois.

Enfants : (à partir de 10 ans seulement), 1 comprimé tous les deux jours.

Echantillons et littérature :

Laboratoires H. YVRARD

17, rue Soufflot — PARIS.

Tél. : Odéon 56-67.

CÉRÉBROSTHÉNINE DALIN

Eléments actifs. — Vanadium, Phosphore, Strychnine, Nucléines, Manganèse en combinaison stable et définie.

Indications. — Toutes les maladies déficitaires ou par carence organique, les Asthénies, Anémie, Lymphatisme, Neurasthénie, Maladies consomptives et anergissantes, Grippe, Convalescence, Tuberculose.

Posologie. — 1^o *Cachets* : 1 cachet de Cérébrosthénine avant chacun des 2 principaux repas.

2^o *Dragées* : 2 dragées le matin, à midi et le soir, avant les repas. De 12 à 18 ans : 1 dragée seulement avant les trois repas.

3^o *Gouttes* : XX gouttes avant les deux principaux repas. De 12 à 18 ans : 1 goutte par année d'âge avant les 2 principaux repas.

Echantillons (modèles de vente).

C. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe
49, quai Saint-Vincent. — LYON.

CERÉOSSINE DEHAUSSY

(Simple).

Reconstituant physiologique.

Minéralisateur complet.

Os frais : Os longs de l'animal en période de croissance, traités avec leur moelle rouge (facteur antirachitique et de croissance, contrôlé biologiquement sur le rat blanc carencé. *Vitamines D naturelles*).

Phytosphosphine : Élément phospho-organique extrait des graines de céréales.

Sels minéraux : Silice, Manganèse, Fer (hémoglobine).

Extrait parathyroïdien : Fixateur des sels minéraux.

Aucune contre-indication : Ni Adrénaline, ni Surrénale.

Indications :

Etats pré tuberculeux et tuberculose, Affections osseuses, Troubles de croissance, Grossesse, Lactation, Convalescence, Surmenage.

Posologie :

Cachets : Adultes, 2 cachets. Enfants, 1 cachet.

Granulé fondant : Nourrissons : 1 cuillerée à café. Enfants : 2 cuillerées à café. Adultes : 4 cuillerées à café.

Poudre : Nourrissons : 1/2 cuill. à café. Enfants : 1 cuill. à café. Adultes : 2 cuill. à café.

Prix : 15 francs la boîte de 40 cachets.

Granulé et Poudre : 15 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66. rue Nationale — LILLE.

CÉRÉOSSINE IRRADIÉE

Ergostérine activée aux ultra-violets.

(Triple contrôle: chimique, spectrophotométrique, biologique.)

Associée au complexe organo-minéral
« Céréossine ».

Indications.

Rachitisme, Pré-Rachitisme, Croissance, Déminéralisation accentuée chez la femme enceinte et la nourrice.

Posologie.

La même que celle de la Céréossine simple.

Cachets. — *Adultes*: 2 cachets.

Enfants: 1 cachet.

Prix : 22 francs.

Granulé fondant :

Nourrissons: 1 cuillerée à café.

Enfants: 2 —

Adultes: 4 —

Prix : 20 francs.

CÉRÉOSSINE MÉTHYLARSINÉE

par cachet : 0,020 de méthylarsinate de soude.

Posologie. — *Adultes*: 2 cachets.

Enfants: 1 cachet.

Prix : 15 francs.

CÉRÉOSSINE GAÏACOLÉE

Posologie. — *Adultes*: 2 cachets.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

CÉTHOCAL

DU DOCTEUR P. LEMAY

GÉRIUM — THORIUM — CALCIUM

Toutes les applications des terres rares.

Indications. — Traitement externe des Dermatoses, Eczéma, Lupus, etc., Ulcères variqueux, Hygiène des Bébés :

Poudre et Pâte CÉTHOCAL

Traitement interne des Dermatoses :

Gouttes et Ampoules CÉTHOCAL

Dépression physique et nerveuse, Convalescence, Arthritisme, Infections intestinales :

Gouttes CÉTHOCAL

Désensibilisation, traitement de l'asthme, des bronchites chroniques, de l'emphysème, de la coqueluche. Intra-dermo-réaction et Protéinothérapie de la Syphilis :

Ampoules CÉTHOCAL

Gynécologie : Traitement des métrites :

Poudre et Ovules CÉTHOCAL

Mode d'emploi. — *Poudre* : Employer la poudre telle quelle ou, mieux, délayée dans un peu d'eau bouillie, à consistance de crème ; l'appliquer sur la lésion et laisser sécher, faire tomber l'excès avec un coton ou un linge sec. Une application matin et soir.

Pâte. — Une application matin et soir.

Gouttes. — *Adultes* : XX gouttes, 2 fois par jour, au début des repas de midi et du soir.

Enfants : A partir de 6 ans, V à X gouttes.

Ampoules. — Voir instructions spéciales dans la notice intérieure des boîtes.

Ovules. — Un tous les soirs.

Forme et prix :

Poudre : 10 fr. *Pâte* : 10 fr. *Gouttes* : 15 fr.
Ampoules : 25 fr. *Ovules* : 18 fr.

Laboratoire du CÉTHOCAL

8 bis, rue J.-J.-Rousseau,
FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

CÉTRAROSE GIGON

Composition. — Solution d'acide protocétrarique $C^{30}H^{22}O^{14}$ à 0,016 milligr. par cm. c.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques. — Médicament à électivité musculaire, Analgésique gastrique, Spécifique contre les vomissements, Vomissements de la grossesse. Etats nauséux, Douleurs gastriques, Troubles digestifs, Indigestions.

Mode d'emploi et doses. — XV à XX gouttes en une fois dans un peu d'eau sucrée. Jusqu'à CC gouttes par 24 heures.

Laboratoires des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

CHARBON FRAUDIN

Composition. — Association de charbons de peuplier et de saule sélectionnés, doués d'une grande porosité.

Forme pharmaceutique :

1^o Granulés sphériques aromatisés à la menthe. Avec naphtol B : Charbon naphtolé.

Sans naphtol B : Charbon simple.

2^o Comprimés sans sucre à 0 gr. 75.

Propriétés. — Pouvoir absorbant et adsorbant très grand, grâce à la texture particulière des bois légers employés.

Indications thérapeutiques. — Gastro-entérites, Dyspepsies flatulentes, Fermentations intestinales, Intoxications de toute nature.

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour, à la fin des repas.

Prix : Charbon Fraudin naphtolé, . . . 10 fr.

Laboratoires des CHARBONS FRAUDIN

4, av. Desfeux — BILLANCOURT (Seine).

Téléph. : Molitor 02-62.

CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

3 formes :

Anisés simples. — Anisés naphtolés. — Anisés magnésiens.

Forme. — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol, simple ou magnésien.

Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable. *Divisent et expulsent mieux que les laxatifs.*

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvois, Embarras et Fermentations intestinales. *Pour l'Estomac net et l'Intestin net.*

Dose. — 1 cuillerée à café, soit après chaque repas, ou le soir en se couchant, ce qui suffit habituellement.

Nota. — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau si possible.

La forme des grains supprime le spasme intestinal. Ne contient ni atropine, ni belladone. Peut être donné à tous les âges et dans tous les états.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS.

CHELOÏDINE

Pommade résolutive et calmante
à base de Thiosinamine, salicylate de soude
et stovaïne.

Dépourvue de toute toxicité.

Indications thérapeutiques. — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

Mode d'emploi. — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 14-12.

CHENANTHOL

(Vers intestinaux.)

Ascaris, Ankylostome, Anguillule, Oxyures, Trichocéphale, etc.

Seule présentation officinale, définitive et parfaite, inoffensive et sûre, de l'essence pure américaine de Chenopode, suivant les prescriptions de la *Fondation Rockefeller*.

Posologie et mode d'emploi. — Capsules dosées en volume et non en gouttes (1/4 de cent. cube par capsule). On donne une capsule par 3 années d'âge : maximum : 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purge saline : 1 heure 1/2 après la dernière.

Régime. — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Renouveler le traitement au bout de 10 jours si on juge à propos, comme cure radicale.

Prix de vente : 15 francs.

Laboratoire L. HINGLAIS

EPERNAY (Marne).

CHÉRALYS (Comprimés)

Composition. — Nickel catalytique Dufayard. Peroxyde de manganèse colloïdal. Cobalt catalytique.

Carbonate de calcium léger. Silicate d'alumine et de magnésie. (En comprimés agréables à croquer).

Propriétés. — Basées sur les principes scientifiques les plus modernes. Activateurs des ferments digestifs normaux. Neutralisants. Antifermentescibles.

Indications. — Maladies de l'estomac, du foie, des intestins, Diabète.

2 comprimés après les repas et 2 autres ou plus 3 à 4 heures après.

Prix : 10 francs.

Laboratoires DUFAYARD

12, rue des Saints-Pères — PARIS (VII^e).

CHLOCCI

(Le chlore occit les cocci.)

Antiseptique, non toxique, à base de chlore naissant.

Composition. — Poudre ou comprimés de paratoluène sulfochloramine sodique (0,25).

Indications. — Petite et grande chirurgie, Pansements humides, lavages. Gynécologie, Urologie.

Doses. — 5 comprimés par litre d'eau pour lavages, injections. 10 comprimés par litre d'eau pour lavage de plaies, pansements humides, goutte à goutte.

Aucune toxicité. — Aucune causticité.

Laboratoire ADAM

Docteur en pharmacie

GRANVILLE (Manche).

CHLORAL BROMURÉ du D^r DUBOIS

Sédatif nerveux, de tous points préférable aux barbituriques et aux opiacés, dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas l'estomac.

Liquide sucré représentant 40 cgr. chloral et 60 cgr. bromure par cuillerée à soupe. 1 à 6 cuillerées à soupe ou à café, selon l'âge, dans les 24 heures.

Flacons et demi-flacons.

Insomnies, dysménorrhée, névralgies, névroses, psychoses, coqueluche, épilepsie, malaises des hypertendus.

DURIEZ

20. place des Vosges. — PARIS.

CHLORALOSANE

Hypnotique non toxique, « l'hypnotique de choix des cardiaques et des dyspeptiques ».

Composition. — Chloralose pur et complètement exempt de parachloralose.

Propriétés. — Non toxique, sans intolérance, ni accoutumance.

Indications. — Insomnies des cardiaques, des dyspeptiques et des neurasthéniques, des fatigués et surmenés. Agitation nocturne. Psychonévroses et anxiété.

Doses et mode d'emploi. — A prendre une demi-heure avant le coucher dans une tasse de tisane ou dans un peu d'eau.

Dose moyenne usuelle : 2 à 4 comprimés de 0 gr. 10.
1 à 3 comprimés de 0 gr. 15.

Prix : le tube de 10 comprimés de 0 gr. 10 : 5 fr. ; le flacon de 20 comprimés de 0 gr. 10 : 9 fr. ; le tube de 20 comprimés de 0 gr. 15 : 12 fr.

Littérature et Echantillons médicaux :

Établissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII°).

CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

Forme. — Pilules à enrobage de gluten recouvert d'un enduit inattaquable par le suc gastrique.

Composition. — Chloramine T 0 gr. 05.
Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

Indications thérapeutiques. — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, Colibacillose, Dermatoses, etc. D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection intestinale (Fétidité des selles, etc.).

Posologie. — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

CHLORASEPTINE OPTIMA

Sodium paratoluène sulfochloramine (0,25 pa comprimé.)

Agit à l'instar de la solution de Carrel-Dakin.

Forme. — Comprimés dosés à 25 cgr.

Indications. — Antisepsie générale. Affections buccale, urétrale vésicale. Antisepsie hygiénique. Traitement d'affections septiques.

Mode d'emploi. — *Chirurgie générale* : 2 à 4 comprimés dans 100 cc. d'eau.

Oculistique : 1 à 2 comprimés pour 100 cc.

Urologie et gynécologie : 2 à 8 comprimés par litre.

Stomatologie : 1 comprimé par verre d'eau.

A dissoudre dans l'eau froide ou légèrement tiède.

Laboratoires « OPTIMA » S. A.

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

CHLORÉTHYLE BENGUÉ

Chloréthyle Bengué. — Anesthésie locale, névralgies.

Flacons en métal et en verre. Fermeture à clapet très pratique.

Anestile Bengué. — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°.

Anesthésie locale, névralgies.

Narcotile Bengué. — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale.

Flacon de 50 gr. gradué à gros jet, fermeture à clapet. — Tubes scellés 3, 5, 10 cc. pour anesthésie générale.

Chlorure de méthyle pur. — Bidons de 250, 500 grammes et 1 kilo.

Docteur BENGUÉ

Pharmacien,

16, rue Ballu — PARIS (IX°).

CHLORIDIA

Pepsine. — Chlorhydro — Cocaïnée — Chloroformique.

Indications. — Dyspepsie, gastralgie, crampes, renvois, vertige stomacal, dilatation de l'estomac et, en général, toutes les maladies de l'estomac se reliant à une insuffisance de sécrétion du suc gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Le Chloridia restitue au suc gastrique tout son pouvoir digestif par l'effet de la pepsine et de l'acide chlorhydrique, oppose aux fermentations putrides l'action antiseptique de son eau chloroformée, et fait disparaître les sensations douloureuses grâce à la présence d'une légère quantité de chlorhydrate de cocaïne.

Forme et dose. — Le Chloridia est un liquide limpide de saveur sucrée et agréable, que l'on prend à la dose d'une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau au commencement de chaque repas.

Les personnes qui n'obtiennent pas un soulagement rapide peuvent doubler la dose ou diminuer la quantité d'eau.

Laboratoires des PRODUITS DANNEC'H

BRUN ET MARTINEAU

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e).

R. du C. Seine 218-670.

CHLORMAGNÉSIUM FISCH

Composition. — Comprimés Chlorure de Magnésium à 0 gr. 20, assez petits pour être avalés comme pilules ou dissous.

Indications. — *Cytophylactique, neurotonique, cholagogue*, préventif du cancer etc., Dermatoses, verrues.

Mode d'emploi. — 3 fois par jour 2 comprimés à chaque repas. On peut encore réduire à 3 comprimés par jour, selon indication du médecin.

Prix : 9 fr.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

CHLOROBACILLINE

Composition. — Chloramine T, Charbon de peuplier pulvérisé, Agar Agar pulvérisé.

Forme. — Comprimés glutinisés solubles dans l'intestin.

Propriétés thérapeutiques. — Bactéricide, Désodorisation complète des selles, Désinfection de l'intestin sans irritation ni toxicité.

Résultats cliniques concluants dans les divers états intestinaux toxi-infectieux : entérites, dysenteries, paratyphoïdes, affections grippales.

Mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés au début de chaque repas (2 à 6 par jour).

Laboratoires **TULIVET**

G. de Saint-Stéban, Docteur en pharmacie.
52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

CHLOROBYL

Composition :

Tochlorine	0 gr. 05
Bile purifiée	0 gr. 10
Charbon	0 gr. 10

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Propriétés thérapeutiques. — Désinfection intestinale.

Indications. — Entérite, Dysenterie, Affections cutanées

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Prix de vente au public : 14 francs.

Laboratoires « **LOBICA** »

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

CHLORO-CALCION

Forme : Solution.

Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* cristallisé, chimiquement pur, stabilisé.

LXXX gouttes (ou 1/2 cuiller à café) = 1 gr.
Ca Cl².

Indications :

Recalcifiant : Croissance, Tuberculose, Entérites, Carie dentaire, Spasmophilie, Accidents sériques, Grossesse, Allaitement.

Hémostatique : Toutes hémorragies ; et comme préventif des hémorragies post-opératoires.

Diurétique déchlorurant : Albuminuries, Néphrites, Pleurésies, Ascite.

Mode d'emploi et Doses :

Dans de l'eau sucrée, avant les repas.

Chez les enfants au-dessous de 10 ans :

IV gouttes par année comme *recalcifiant* ;
XX gouttes par année comme *hémostatique* ;
X à C gouttes comme *anti-albuminurique* ;
L à CC gouttes dans les *accidents sériques* ;
3 à 6 fois LXXX gouttes dans la *spasmophilie*.

Chez les adultes :

XL gouttes 2 fois par jour comme *recalcifiant* ;
LXXX gouttes 4 fois par jour comme *hémostatique* ;
L à CL gouttes par jour comme *anti-albuminurique* ;
3 à 10 cuillers à café comme *diurétique* ;
LXXX gouttes 4 fois par jour comme *anti-sérique*.

Laboratoires MICHELS

9, rue Castex — PARIS.

Tél. Archives 45-12.

CHLORO-MAGNESION

Composition. — Solution titrée et stabilisée de Chlorure de magnésium pur sec, et de Chlorure de calcium pur cristallisé.

XXX gouttes = 1 gr. 20 $MgCl^2$ + 0 gr. 50 $CaCl^2$.

Indications. — Médication anticancéreuse, Dermatologie, Verrues, Papillômes, Régulation de la Sécrétion biliaire, Asthénie nerveuse, Tremblements séniles ou pathologiques.

Emploi. — XV gouttes avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours, suivis d'un repos d'une semaine, le traitement étant continué pendant 2 ou 3 mois, et repris au besoin après une période égale.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 27-1.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS.

Descouraux et Fils, Pharmaciens.

Docteur en Pharmacie.

CHLORUMAGÈNE

Formule du Dr Martin du Thell.

Forme. — Poudre.

Composition. — Hydroxyde de magnésium pur
Codex de densité constante sans odeur ni saveur.

Propriétés. — Au contact du suc gastrique formation de chlorure de magnésium pur à l'état naissant à l'exclusion de tout autre sel halogène (fluorure bromure, iodure ; de ce fait aucune contre-indication).

Régulateur de l'intestin convenant à tous les âges.

Indications. — Toutes les indications du chlorure de magnésium. Déficience de la cellule nerveuse. Troubles du sympathique. Hypertension artérielle. Constipation habituelle, entérites, etc.

Doses habituelles. — Une cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou de lait.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e)

CHOCOLATE MILK C. G.

La boisson tonique naturelle.

Analyse :

Graisse.....	18	p. 100
Protéine.....	17,4	—
Lactose.....	20	—
Sucre.....	32	—
Hydrates de carbone divers.....	6	—
Matières minérales.....	4,2	—
Eau.....	2,4	—

« CHOCOLATE MILK C. G. » est à basé du lait renommé des pâturages du « West Country » de l'Angleterre. Le lait est mélangé au chocolat fin et aux autres ingrédients et séché par le procédé spécial à rouleaux « Cow et Gate ». Cet aliment n'est pas simplement une saveur qui doit se joindre à du lait pour devenir d'une valeur nutritive. C'est un produit complet qui déjà contient du lait.

Société de Spécialités diététiques et pharmaceutiques.

22, rue des Belles-Feuilles — PARIS (XVI*).

W. P. WRATHALL

204, rue Royale — BRUXELLES

CHOLÉCYSTINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.

*Réalisation en thérapeutique journalière
de l'épreuve de Meltzer-Lyon.*

Forme. — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

Indications. — Cholécystites aiguës et chroniques, ictères, migraines, entéro-colites muco-membraneuses.

Doses. — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

VINCENT, pharmacien,

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

CHOLÉINE CAMUS

Extrait inaltérable de fiel de bœuf,
capsules dosées à 0 gr. 20.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, 2 ou 3 à la fin de chaque repas.

Propriétés thér. — Opothérapie biliaire.

Indications. — Lithiase Biliaire, Coliques Hépatiques, Ictère, Cholémie, Constipation, Entéro-Colites, Dyspepsie, Auto-Intoxication.

Laboratoires DARRASSE

7 à 13, rue Saint-Maurice
NANTERRE (Seine).

CHOLÉINE LACTIQUE

Opothérapie biliaire et ferments lactiques

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, dosées à 0 gr. 20, à la fin des repas.

Indications. — Congestion du foie, lithiase, cholécystite, acholie, ictères, hépatites, cirrhoses, cholémie, phénomènes gastro-intestinaux, constipation, colite muco-membraneuse, arthritisme.

Laboratoires DARRASSE

7 à 13, rue Saint-Maurice
NANTERRE (Seine).

CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

Composition. — Extrait de Combretum. Extraits biliaires boldine et boldo.

Propriétés. — Opothérapie et Phytothérapie associées : Cholagogue, Diurétique Eupeptique, Antitoxique, Laxatif.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholestémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse. Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

Dose. — Prescrire 1 à 2 pilules après chacun des deux grands repas ou 3 à 4 pilules au repas du soir.

Prix : le flacon, 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-3.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

Téléphone : Invalides 12-63.

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase.

Dragées ovoïdes kératinisées dosées

à : Bile en pâte : 0,20 ; Secrétine : 0,003.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 6 ovoïdes par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

Propriétés thérapeutiques. — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

Indications. — Entérocolite muco-membraneuse, angiocholite, cholestémie familiale.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DURET et REMY
et du Dr Pierre ROLLAND
ASNIÈRES (Seine).

CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Formule du D^r L.-G. MARY

Forme. — Comprimés à enrobage de Kératine soluble dans l'intestin seulement.

Composition. — Boldine 1/2 milligr. incorporée avec :

Extraits biliaires dépigmentés.....	} aa 0,10
Pancréatine extractive.....	
Ferments lactiques purs.....	

par comprimé.

Dose. — Adultes : 4 à 6 par jour, aux repas.
Enfants : 1/2 dose. Avaler sans croquer.

Indications. — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques, Diarrhées estivales, Troubles de la peau.

Echantillons sur demande aux

Etablissements DAGUIN

à SAINT-MAUR (Seine).

CHOLERGINE

Médication Antitoxique, Colloïdes et Lipoides
Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous dans l'huile végétale.

Société de Thérapeutique (janvier 1911)

Académie de Médecine (avril 1911)

Académie des Sciences (juin 1911)

Forme. — Ampoules injectables de 2 cc.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection tous les 2 jours, chaque série comprenant 20 à 30 injections avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine. Injection intramusculaire profonde, aux points d'élection. Injecter lentement.

Propriétés. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique, Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires employée journellement dans les hôpitaux.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
PARIS-OUEST.

Précédemment : 8, rue de la Source, PARIS (XVI^e).
Tél. : Auteuil 11-86.

CHOLINE « ROCHE »

Chlorhydrate de Choline

(en ampoules de 1 cc. à 2 p. 100).

Le Chlorhydrate de Choline est un médicament *simple, inoffensif*, qui modifie chimiquement le milieu sanguin (augmentation constante et régulière de la Cholestérolémie sans action sur la Glycémie), cette modification s'accompagne de *résultats cliniques particulièrement impressionnants dans toutes les formes de la Tuberculose* (régularisation de la température, diminution de la toux, de l'expectoration, amélioration de l'appétit, de l'état général, du poids, etc...) et *sans aucun inconvénient* (1 ampoule tous les deux jours par voie sous-cutanée).

Choline ROCHE

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et **C^{ie}**
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

CHOPHYTOL-ROSA

Tonique du Foie et Puissant Diurétique

à base d'extrait de feuilles d'artichaut (*Cynara Scolymus*)

Communication à la Société de Thérapeutique de Paris
par le D^r J. Brel.

Forme. — Dragées inaltérables et très assimilables.

Composition. — Extrait de feuilles d'artichaut, extrait hépatique, extrait biliaire, Boldo.

Indications. — Toutes insuffisances hépatiques et biliaires et leurs nombreuses conséquences :

- a) *Troubles de l'excrétion biliaire* : Ictère, cholécystite, lithiase, cholémie, etc.
- b) *Troubles d'origine hépatique* : Cirrhose, Diabète gras, Urticairé, Maladies de la peau, etc.
- c) *Troubles lésant toujours le Foie* : Grippe, Fièvres infectieuses, maladies des pays chauds, etc.

Posologie. — De 4 à 12 dragées par jour.

Laboratoires du CHOPHYTOL-ROSA

1, place Champerret — PARIS (XVII^e).

CHRYSEMINE

(Pyréthrines Carteret),

Propriétés thérapeutiques. — Vermicide et anthelminthique, sans aucune toxicité ou contre-indication.

Indications. — Employée dans tous les cas de parasites bien définis (oxyures, ascaris, ténias, trichocéphales, lamblias, amibes, etc.), elle est également indiquée dans le traitement d'affections qu'on soupçonne être d'origine parasitaire : diarrhée à cause ignorée, entérites et colites à oxyures, colibacillose et colibacillurie, occlusions intestinales à lombrics, troubles et accidents nerveux dus aux toxines vermineuses.

Formes. — Gouttes (*enfants*), Perles glutinisées (*adultes*).

Administration. — Les perles s'absorbent les unes après les autres dans une gorgée de liquide. Les gouttes se prennent dans de l'eau sucrée ou édulcorée par du sirop de fruits, des confitures, etc.

Posologie. — *Ascaris, tous Helminthes, Amibes, tous Protozoaires.* — *Adultes* : 3 à 4 perles. *Enfants* : L à C gouttes suivant l'âge. Ces doses sont à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. La même cure est à renouveler après un repos de 2 semaines.

Trichocéphales. — Même traitement que pour les *Ascaris* en prenant comme dose quotidienne : *Adultes* : 5 perles. *Enfants* : C à CC gouttes.

Oxyures. — *Adultes* : 3 à 4 perles. *Enfants* : L à CL gouttes, à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. Le soir, au moment des démangeaisons anales, administrer un petit lavement (200 cc.) d'eau bouillie presque froide dans laquelle seront comptées C gouttes de Chrysémine. Le traitement est à renouveler plusieurs fois à 8 jours d'intervalle.

Ténias. — *Adultes* : 12 perles. *Enfants* : CC à CCC gouttes, à prendre le matin à jeun pendant 2 jours consécutifs. Supprimer le repas du soir le jour qui précède la cure et réduire le régime alimentaire les 2 jours suivants. Administrer une purgation légère (huileuse ou saline) le dernier jour, 1 heure après la dernière dose.

Remarque importante. — Les doses mentionnées peuvent être largement dépassées sans inconvénient, si le résultat de la première cure n'a pas été suffisant.

Prix de vente au public : *Perles* : 20 fr. *Gouttes* : 12 fr.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1^{er}).

CIBALGINE

Analgésique — sédatif

(Aucune substance du tableau B).

Diallylmalonylurée-diméthylaminophényl-
diméthylpyrazolone.

Indications. — Les algies d'une façon générale : migraine, névralgies, courbature, torticolis, sciatiques, douleurs dentaires, angines, otites, mastoïdites, sinusites, etc.

Comprimés. — Gouttes. — Ampoules.

Doses. — 1 à 4 comprimés par 24 heures.

20 à 60 gouttes — —

1 à 2 ampoules — —

Le flacon de 15 comprimés : 9 francs.

Le flacon de 15 cmc (gouttes) : 13 francs.

La boîte de 5 ampoules : 13 francs.

La boîte de 20 ampoules : 40 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109-113, Boul. de la Part-Dieu. — LYON.

Grand CIDRE « BOL » RÉGIME

Composition. — Cidre de qualité supérieure obtenu par un procédé spécial stabilisant les qualités du produit et assurant sa conservation sous tous les climats.

Propriétés thérapeutiques. — Nutritif, diurétique, antitoxique.

Indications. — Auto-intoxications, Arthritisme, Insuffisance hépatique, Dyspepsies, Entérites, Insuffisance rénale, Néphrites, Rhumatismes chroniques, Gouttes, Diabète.

Mode d'emploi. — En dehors des cas de grossesse et de diabète, mélanger un quart Grand Cidre « BOL » avec trois quarts d'eau de Vittel ou de Contrexéville ou eau pure.

Prix imposé : 12 fr. la bouteille.

Consignation de la bouteille 2 fr. en plus, reprise pour le même prix.

LANGLOIS Marc

Domaine de la Cressonnière,
PONT-L'ÉVEQUE (Calvado).

CIMATRYL

Composition. — Saccharose, Jaborandi, Prêle, Acide borique, Borate de soude.

Propriétés. — Action remarquable sur les plaies atones, grâce au pouvoir osmotique considérable du saccharose qui provoque une diapédèse favorable à la réparation des tissus ; celle-ci est aidée par la silice, le Jaborandi favorisant lui-même leur action grâce à son pouvoir vaso-dilatateur périphérique.

Indications. — Affections aiguës et chroniques des fosses nasales, polypes récidivants, rhinites atrophiques, etc.

Formes. — Poudre impalpable en prises, 5 à 6 fois par jour.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire du **CIMATRYL**

M. LE BONZEC

4, place Royale — NANTES.

CINALOSE

Présentation. — Boîte de 10 ampoules injectables de 3 cc

Composition. — Chaque ampoule contient :

Cinnamate de Benzyle.....	0 gr. 03
Lécithine.....	0 gr. 10
Cholestérine	0 gr. 04
Lipoides spléniques.....	0 gr. 007
Lipoides hépatiques.....	0 gr. 007
Camphre.	0 gr. 09
Huile d'olive stérilisé cuvée à l'alcool...	3 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Modificateur du terrain, augmentation du processus de défense antibacillaire de l'organisme. Immunisation et vaccination artificielles para-spécifiques vis-à-vis du bacille de Koch.

Indications. — Tuberculose pulmonaire et osseuse, Adénopathies, Convalescences des Affections anergisantes, Lupus. Affections pulmonaires : Broncho-pneumonies, Bronchite chronique, Asthme, Emphyseme, Pleurésies, Péritonites bacillaires.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 ampoules par jour en injections intramusculaires indolores. — *Enfants* : 1 par jour.

Laboratoires du Docteur **TAVERNIER**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

Tél. : Ségur 08-13.

CIPROMAROL

Composition. — Cupressus semperv. Equisetum Arvense. Capsella Bursæ Pastoris. Æsculus Hippocastanum.

Indications. — Toutes affections caractérisées par une dilatation temporaire ou permanente des veines.

Mode d'emploi. — L à LXXV gouttes et plus par jour, ou 2 à 3 mesures. La mesure en aluminium jointe au flacon contient XXV gouttes.

LANDRIN et C^{ie}

12, rue de la République
PUTEAUX (Seine).

CITROCARBINE

Antisepsie digestive.

Composition. — Granulé fondant de goût agréable, répondant à la formule :

Citrate acide de soude.. 10 Charbon animal.. 90

Action. — Eupeptique, cholagogue par le citrate de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

Avantages. — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal. Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

Indications. — Dyspepsies, Aérophagie, Insuffisance et infections biliaires, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées, Fermentations intestinales, Auto-intoxication, Artério-sclérose.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.
Se fait aussi en comprimés.

Prix : 15 francs.

Laboratoires WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

CITROFLUYL

Citrate monosodique pur.

Forme. — Granulés à saveur agréable.
Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de citrate monosodique-comprimés pour diabétiques à 0 gr. 50 de citrate monosodique pur.

Dose. — Par jour, 2 à 6 cuillerées ou comprimés dissous, avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

Indications. — Hypertension artérielle, Insuffisance hépatique, Rhumatismes, Goutte, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements, Congestions pulmonaires.

Prix : 15 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

CITROLARGOL

Argent sol et Citrate de Soude.

Action. — L'argent stérilise la muqueuse détergée par le Citrate de soude

Indications. — Toutes les affections du Rhino-pharynx, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Grippe, Coryza.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans chaque narine matin et soir. Badigeonnage. Pulvérisation.

Laboratoires LEBEAULT

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

CITROPAÏNE DU Dr FONTAL

Composition :

Phosphocitrate mangano-sodique associé à un ferment végétal.

Propriétés :

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

Indications :

Dyspepsies, hyperchlorhydrie, gastro-entérites, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

Forme et Posologie :

Granulé : de 3 à 6 cuillerées à café par jour,

Comprimés : de 6 à 9 par jour,

Cachets : de 2 à 3 par jour,

Laboratoires JIGEM

304, rue Saint-Jacques — PARIS (Ve).

CITROPEPTOL

Forme. — Paquets.

Composition :

Citrade de soude.....	0,25
Phosphate de soude.....	0,15
Sulfate de soude.....	0,10
Sacchar. lact.....	4,40

Propriétés thérapeutiques. — Poudre isotonisante du contenu stomacal, dont elle modifie la densité et facilite le passage dans l'intestin.

Indications. — Digestions pénibles, pesanteur, ballonnement, somnolence après les repas, fermentations, aérophagies, constipation.

Mode d'emploi. — 2 paquets par jour, aux repas.

Laboratoires R. FAURE

80, rue du Rocher — PARIS (VIII^e).

CITROPHOS

Granulé. — 2 formes : simple et belladonné. Une cuillerée à café contient 1 gramme de Citrate trisodique pur associé aux : Phosphate disodique, Sel de Seignette et Lactose.

Le CITROPHOS belladonné contient en plus V gouttes de teinture de belladone titrée.

Indications. — *Simple* : Hypertension, Viscosité sanguine, Insuffisance hépatique, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements.

Belladonné : Hyperchlorhydrie, Constipation spasmodique.

Doses. — 1 à 4 cuillerées à café par jour dans une tasse à thé d'eau tiède.

Le flacon (simple ou belladonné) : 15 fr.

Laboratoires H. NOE

SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord).

CITROSODINE LONGUET

Hyperacidité (douleurs gastriques).

Antémétique (vomissements des nourrissons).

Eupeptique (dyspepsies, gastro-entérites).

Action lithotriptique et diurétique.

Action sur la viscosité du sang.

(*Pneumonies — Broncho-pneumonies*
Phlébites — Artérites.)

Comprimés de 0 gr. 25 citrate trisodique.

Granulé à 1 gr. de citrate par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi :

Nourrissons : 1 comprimé à chaque tétée.

Enfants : 2 à 4 comprimés par jour.

Adultes : 3 à 4 comprimés (2 ou 3 fois par jour).

Pneumonies : 4 comprimés toutes les 2 heures, dans un demi-verre d'eau ; la médication étant continuée jour et nuit, jusqu'au 2^e ou 3^e jour qui suit la crise.

Le flacon de comprimés : 13 francs.

Le flacon de granulé : 14 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

CLEAROL

Lotions pour baïns d'œil.
Formuler : Clearol. Un flacon.

Composition. — Hydrolat d'Hatnaméïls boré-salicylé adréphédriné.
(sans caustique).

Propriétés. — Antiseptique, Calmant, Décongestionnant et tonique.
des conjonctives et des paupières.

Indications. — 1° *Toutes inflammations et infections oculaires externes.*
Conjonctivites, Blépharites, Dacryocystites, Orgelets, etc.

2° *Tous états inflammatoires professionnels* (cinéastes et personnes exposées à des radiations lumineuses intenses ou prolongées).

3° *Hygiène oculaire, Prophylaxie des poches palpébrales, Conservation de la blancheur de la sclérotique, de l'éclat et de la pureté du regard.*

Mode d'emploi. — Couper le Clearol d'un ou deux volumes d'eau chaude. En remplir l'œillère qui accompagne chaque flacon et y baigner l'œil pendant quelques minutes.

Les baïns d'œil au Clearol calment, décongestionnent et soulagent toujours.

ROGER, pharmacien
94, rue de Rivoli — PARIS

CLISEMINE LONGUET

Médication citratée injectable.

Indications. — **HÉMORRAGIES.**

Cancers (M. Renaud).

Tuberculose, Hémoptysies.

Gynécologie.

Interventions chirurgicales (Neuhof et Hirschfeld).

Ampoules de 20 cc. de solution stabilisée renfermant 30 p. 100 de citrate de soude et 10 p. 100 de chlorure de magnésium.

Dose et mode d'emploi. — Injection intraveineuse de 15 à 30 cc. (20 cc. en moyenne), selon le poids du sujet.

Enfants : Injection intraveineuse de 10 cc.

La boîte de 2 ampoules de 20 cc. : 20 fr.

Laboratoires LONGUET
34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré
non toxique.

(Méthode de Carrel.)

Composition. — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

Indications. — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines petite et grande chirurgie.

Posologie. — *Usages médicaux* : 1 à 5 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

Usages chirurgicaux : 5 à 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

La solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Sterilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

Avantages. — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

Comprimés : tubes de 20 à 60 comprimés à 0 gr. 25.

Poudre : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Prix : 3 fr. 80 et 10 fr.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

Echantillons médicaux sur demande.

**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES
CHLORÉS**

40, rue Thiers — LE HAVRE.

CLUPEYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire.

Forme. — Comprimés dragéifiés faciles à avaler.

Composition. — Poudre intégrale de laitances de harengs, fraîches, desséchées dans le vide et à froid.

Propriétés thérapeutiques. — Par sa richesse en phosphore organique (acide nucléinique, lécithine, cérébrine), le Clupeyl est un reconstituant général de tout premier ordre et un excellent stimulant du système nerveux, sur lequel il agit sans le surexciter. C'est l'aliment phosphoré par excellence.

Indications. — Anorexie, Amaigrissement, Surmenage physique et intellectuel, Neurasthénie, Asthénie post-grippale, Tuberculose, Rachitisme et toutes adynamies et débilites.

Posologie. — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour.

Enfants : à partir de 7 ans, 3 à 4. A prendre aux repas. Avaler sans croquer ni sucer.

Prix : 16 francs.

Lab^{re} du CLUPEYL — Pharmacie PANIER
MALO-LES-BAINS (Nord).

COAGULÈNE CIBA

Extrait de plaquettes sanguines.

Hémostatique physiologique.

Le Coagulène contient les substances coagulantes du sang et des organes hématopoïétiques. Il permet de juguler les hémorragies, même inaccessibles, en provoquant une accélération de la coagulation du sang total. Chez les hémophiles et dans les diathèses hémorragipares, il corrige la crase sanguine et permet à ces sujets de récupérer leur faculté de coagulation en cas de traumatisme ou d'intervention chirurgicale.

Indications. — Hémophilie, diathèses hémorragipares, Métrorragies. Hémoptysies, Purpura, etc..., et toutes interventions sanglantes, en particulier amygdalectomie.

Voie buccale et hypodermique.

Les flacons de 2 et 5 gr. : 10 et 25 francs.

La boîte de 6 ampoules : 30 francs.

Laboratoires CIBA. — O. ROLLAND.

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

Forme. — Emulsion de Coaltar.

Propriétés. — Antiseptique, Cicatrisant, Désinfectant.

Indications. — Hygiène de la bouche, pansement des brûlures, furoncles, anthrax, plaies, traitement de la leucorrhée.

Dose. — *Leucorrhée*: 1 cuillère à soupe par litre d'eau.

Pansement: Parties égales eau et Coaltar Saponiné.

Laboratoires LE PERDRIEL
11, rue Milton — PARIS (IX^e).

COCAÏNE MIDY

(Chloroborates).

Chaque pastille contient :

0,002 mgr. de Chlorhydrate de Cocaïne.

0,075 mgr. de Chlorate de Potasse.

0,025 mgr. de Biborate de Soude.

Doses et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx: Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge (avocats, chanteurs, orateurs, prédicateurs).

Laboratoires MIDY
4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).

CODÉRIX

Composition. — Chaque comprimé renferme : Codéine, 2 centigr. Terpène et Sucrs résineux pulvérisés de *Styrax Benzoin*, à 0,10.

Forme. — Comprimés pouvant être absorbés par les diabétiques; conservation indéfinie.

Indications. — Sédatif des toux les plus rebelles : toux d'irritation, spasmodiques, quinteuses, nerveuses, toux des fumeurs, laryngites, trachéites, bronchites.

Insomnies : 2 comprimés au coucher.

Maladies d'estomac : 1 comprimé après le repas contre la gastralgie.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer ni croquer.

Dose. — 6 comprimés par 24 heures au maximum.

Prix : 11 francs.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).

CODOCOL

Calmant de la Toux

Composition. — Association de Thiophenolate de Codéine, Cinnamate de soude, Soufre assimilable, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique. — Antiseptise l'appareil pulmonaire. Fluidifie la sécrétion bronchique. Facilite l'expectoration. Diminue l'excitabilité du centre tussigène. Active la défense de l'organisme.

Avantages. — Médication à la fois causale et symptomatique, forme comprimés pratique, suppression du goût désagréable du Gaïacol.

Indications. — Trachéites, Bronchites aiguës et chroniques, grippe, pré-tuberculose et tuberculose, et toutes les affections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — 4 à 8 comprimés par jour.

Laboratoires COUSSINET

20, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

CODOFORME

Composition. — Comprimés enrobés constitués par une nouvelle combinaison bromoformique solide associée à la codéine ; se dissolvent dans l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur.

Chaque comprimé représente : Codéine, 1 cgr. ; bromoforme, IV gouttes ; teinture d'aconit et belladone, àà V gouttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

Indications. — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropathes). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos sans irritation gastrique ou inappétence.

Posologie. — 5 comprimés p. j. ; 6 à 8 d. toux rebelles. Grands enf. (à partir de 5 ans) 2 à 3 compr. par 24 heures. Avaler sans sucer ni croquer.

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e).

COLARSENOL

Collutoire inaltérable au Novarsénobenzol.

Indications :

Angines de Vincent, rouges, pultacées, lacunaires, à streptocoques, herpétiques, pseudo-membraneuses.

Diphtéries ; adjuvant du traitement par le sérum, désinfection du rhino-pharynx chez les porteurs de germes.

Pyorrhée alvéolo-dentaire, stomatites et gingivites.

Mode d'emploi. — En applications sur les amygdales ou les gencives. En instillations nasales.

Echantillons et littérature :

Laboratoires René CARLIER
SAINT-FLORENTIN (Yonne).

COLCHI-SAL MIDY

(Colchicine — Ess. de Wintergreen.)

Chaque capsule contient :

1/4 de mgr. colchicine pure dissoute dans 0,20 cgr. salicylate de Méthyle naturel (Ess. de Wintergreen) obtenu par fermentation et distillation et équivalent à 0,25 cgr. salicylate de Soude.

Dose. — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

Propriétés therap. de l'Ess. de Wintergreen.

1° Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine. — 2° Calme la douleur. — 3° Liquefie et augmente la sécrétion biliaire. — 4° Légèrement diurétique. — 5° Diaphorétique. — 6° Diminue la fièvre. — 7° Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Sée). — 8° Action antiseptique sur le sang.

Propriétés therap. de la Colchicine.

1° Diminue la production d'acide urique. — 2° Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation. — 3° Soulage la douleur. — 4° Augmente la sécrétion biliaire. — 5° Légèrement diurétique. — 6° Diaphorétique. — 7° Purgatif.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).

COLHÉPATYL

(Produit Foulon.)

Anciennement désigné : Anticholestérine Foulon.

Un remède et un préventif. Seule médication qui non seulement juggle immédiatement les crises hépatiques dues aux dépôts de cholestérine dans les conduits biliaires, mais qui, encore, prévient le retour de ces crises.

Formule. — Capsules glutinisées dosées à 0 gr. 20 d'Ether amyli-vérianique pur et lavé, de préparation spéciale.

Indications. — *Toutes cholestérinémies, Boue biliaire, Lithiase, Boue vésiculaire et principalement : Coliques hépatiques.*

Mode d'action. — Désagrégation et fluidification des cristaux ou calculs de cholestérine, accumulés dans les conduits biliaires. Le calcul se ramollit instantanément, se fluidifie et s'élimine dès lors sans douleur en même temps que diminue, puis disparaît, l'empâtement douloureux caractéristique de l'hypochondre droit.

Nous sommes en mesure d'affirmer l'exactitude de ces faits.

Doses et mode d'administration. — *Crise aiguë* : 2 capsules toutes les heures jusqu'à concurrence de 12 à 16 capsules.

Le lendemain et le surlendemain : 6 capsules par jour, espacées.

Cure préventive : 4 à 6 capsules au moment des repas pendant 10 jours, tous les 2 ou 3 mois.

Prix : 45 fr. le flacon de 40 capsules glutinisées.

Produits FOULON

Laboratoire du Lutéovar

14 bis, rue de la République — ERMONT (Seine-et-Oise).

COLITIQUE

Vaccin curatif anti-colibacillaire

(D'après la technique du D^r Fisch.)

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Indications. — Toutes les manifestations du syndrome provoqué **uniquement** par le colibacille.

Double supériorité : Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

Formes :

Buccale, *la plus active* (10 ampoules de 3 cc.). Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré. — Injectable (10 ampoules de 1 cc.). — Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 25 fr.

Boîte de 50 ampoules pour cliniques et hôpitaux.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS

COLI-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

2 formes : Injectable, buvable.

Composition. — Lysat de Colibacilles (souches variées).

Indications. — Pyélonéphrites, Colibacilloses.

Posologie. — *Coli injectable* (ampoules de 1 cc.)

1^{re} injection : 3/4 de cc. Les suivantes : 1 cc. tous les jours, puis tous les deux jours. *Coli voie buccale* (non injectable) ampoules de 3 cc. 1^{er} jour : 1/2 ampoule dans un demi-verre d'eau sucrée; 2^e jour : 3/4 d'ampoules; ensuite une ampoule par jour pendant huit à dix jours.

Présentation. — 1^o Coli-Vaclydun injectable en boîtes de 6 ampoules de un centicube. 2^o Coli-Vaclydun buvable. — En boîtes de 10 ampoules de 3 centicubes.

Prix : 25 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

COLLOÏDINE LALEUF

Dragées.

Composition :

Extrait total pluriglandulaire associé à l'*Iodalbumine*.

Propriétés et Indications thérapeutiques :

Remédie à la viciation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de l'*Iodalbumine*, favorise la combustion intra-organique.

Toutes les affections dûes à une carence endocrinienne, et principalement l'obésité, sont justiciables du traitement à la *Colloïdine*.

Doses et Mode d'emploi :

De 2 à 4 dragées par jour suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

Etui de 100 dragées : 24 francs.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).

COLLOÏDOGÉNINE

du Docteur BAYLE

Opothérapie splénique intégrale.

Nature. — Extrait total de rate de porc.

Formes. — 1° Colloïdogénine injectable (ampoules de 5 cc.). La boîte de 6 : 20 francs.

2° Colloïdogénine sirop. Le flacon : 20 francs.

3° Colloïdogénine (flacons-ampoules pour voie buccale). La boîte de 6 : 20 francs.

Indications. — *Tuberculose* (toutes localisations et formes), où elle a fait ses preuves.

Anémies, où elle est supérieure à la méthode de Whipple.

Dermatoses, où elle est active.

Action. — *Augmentation rapide des hématies* (50 p. 100) et des leucocytes.

Relèvement du taux de l'hémoglobine (25 à 115 p. 100).

Progression rapide des forces et du poids.

Cicatrisation des lésions (visible à la radio) disparition des bacilles de Koch.

Emploi et doses. — Série de 12 injections (intramusculaires dans la fesse ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Après chaque série 8 jours de repos. Pendant les 22 jours de chaque série le sirop de colloïdogénine est donné en même temps (4 cuillerées à soupe par jour aux repas). Dans les anémies et les convalescences le sirop suffit.

Doses chez l'enfant. — Au-dessus de 5 ans injecter 5 cc. Au-dessous de 5 ans injecter 1 cc. par année d'âge.

Colloïdogénine sirop : 1 cuillerée à café par jour jusqu'à 3 ans, 2 jusqu'à 5 ans, 1 à 2 cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 à 3 jusqu'à 10 ans, ensuite 3 à 4.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue de l'Orne — PARIS (XV°).

COLLO-IODE DUBOIS

GOUTTES

Composition. — Solution titrée d'*Iodhydrates d'acides aminés* à 5% d'iode pur.

Action. — Suractive le tissu lymphoïde (*Lortat*), stimule les glandes endocrines (*Henno*) et exalte les moyens de défense de l'organisme. La présence d'*amines* lui confère une *activité spéciale* dans certaines diathèses.

Indications. — Toutes les indications de l'iode, des iodures et leurs diverses préparations. Son champ d'activité est très étendu et s'exerce tout particulièrement dans la carence de la nutrition et des fonctions glandulaires, l'artério-sclérose et les affections du cœur, l'obésité, l'asthme, la goutte et les rhumatismes, la syphilis, l'hyperthyroïdie, la tuberculose pulmonaire à évolution lente et les bacillooses diverses (osseuses, ganglionnaires, etc.), les mycoses, les états infectieux, etc.

Mode d'emploi. — *Adultes* : de XX à C gouttes par jour suivant les cas. Il peut se prendre avant, pendant ou après les repas, mélangé à un liquide quelconque.

Enfants : de V à L gouttes par jour.

Il n'est pas désagréable à prendre et sa tolérance est parfaite même à hautes doses prolongées. Sa dissociation se fait dans l'intestin et il ne donne pas d'*iodisme*.

DRAGÉES

Composition. — Chaque dragée représente 2 centigr. d'*Iode* combinés à 2 centigr. de *Caféine* et à 8 centigr. de *Théobromine* pure. Dragées à noyaux facilement dissociables et assimilables.

Indications. — Asthme, emphysème, artério-sclérose, affections du cœur et des vaisseaux, troubles de l'hypertension, troubles vasculaires, de la ménopause, maladies infectieuses et intoxications, hydropysies, etc.

Action. — Cardio-tonique et vaso-dilatateur efficaces. Diurétique puissant et fidèle.

Mode d'emploi. — Sauf avis du médecin, la dose est de 1 à 5 dragées par jour chez les adultes, mais il reste seul juge de la médication chez les enfants et les hypertendus artériels.

Ces dragées peuvent être à volonté avalées entières, divisées en plusieurs morceaux ou même dissoutes dans un peu d'eau ou de vin, après les avoir écrasées grossièrement pour en faciliter la désagrégation.

Leur conservation est assurée par un enrobage spécial, mais nous recommandons néanmoins de tenir le flacon à l'abri de l'humidité.

LABORATOIRES DUBOIS

16, Boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

COLLOÏXOLS

(Complexes colloïdaux du D^r Riquoir.)

Principe. — Leur action est basée sur la *propriété précipitante des colloïdes vis-à-vis des toxines*; l'expérience semble bien confirmer le fait que la localisation de l'action des médicaments se trouve considérablement renforcée.

Avantages. — On porte *directement et plus vite* les médicaments sur la localisation; la préparation, injectée à petite dose, est cependant *plus active* parce que *plus entièrement et plus longuement fixée*.

Indications. — Colloïxol: Antiarthritique: rhumatisme, goutte, sciatique. — Antipyosique: sinusites, salpingites, furonculose. — Anti-entéritique: infections diarrhéiques graves.

Autres colloïxols: antibacillaire, antipaludique, anti-spécifique, etc.

Prix: 30 fr. les 12 ampoules ou 18 cachets.

Désensibilisantes: 12 fr. la boîte de 12 ampoules.

(A utiliser simultanément avec le Colloïxol.)

Laboratoires MERMINOD

49, rue de Paradis — PARIS (X^e).

Tél.: Provence 30-32.

COLLUBLEU

Collutoire concentré au bleu de méthylène.

Deux sortes: Collubleu et Collubleu sans menthol.

Composition. — Bleu de méthylène de SANDOZ garanti pur, métaoxyphénol, et menthol pour le premier, bleu de méthylène seulement pour le second dissous dans un excipient épais et glyciné.

Action. — Antiseptique par le bleu (formes spirillaires) et par le métaoxyphénol (dépourvu de causticité), analgésique (par le menthol) et cicatrisant.

Indications. — Collubleu: Angines aiguës, Angines de Vincent, Pharyngites, Rhino-pharyngites, Végétations adénoïdes, Amygdalites.

Collubleu sans menthol: Stomatites, Gingivites, Muguet, Ulcérations de la bouche, Stomatites médicamenteuses, Hydrargyrisme, Saturnisme.

Mode d'emploi. — Attouchements tri-quotidiens des parties à traiter.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS:

Laboratoire PERICHON

11, rue Lepic — PARIS (XVIII^e).

COLLUTOIRE V. E. DOUMER

Formule :

Bleu de méthylène V. E.	
Doumer	1 gr.
Résorcine	0 gr. 20
Glycérine.....	30 gr.
Eau distillée	70 gr.

Indications. — Angines diverses, ulcérations bucco-pharyngées des angines, stomatites, abcès des amygdales, etc...

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

COLLYRES CHIBRET

“ Optima ”

En ampoules compte-gouttes (supprimant le compte-gouttes et donnant ainsi toute sécurité comme aseptie) au Bleu de Méthylène, Argyrol, Atropine, Atropine et Cocaïne, Pilocarpine, Pilocarpine et Adrénaline, Borate de Soude et Adrénaline, Esérine,-Adrénaline, Fluorescine, Iodure de Potassium et Chlorure de Calcium, Sulfate de zinc, Sulfate de zinc et novocaïne, etc.

Renseignements thérapeutiques sur tous nos produits et échantillons, sur demande, à MM. les docteurs à Laboratoires Chibret, 5, rue St-Herem, Clermont-Ferrand (P.-de-D.), France.

(Voir à *Pommades* la liste des Produits Chibret.)

Laboratoires CHIBRET

5, rue St-Herem, CLERMONT-FERRAND
(Puy-de-Dôme) (France).

Marque déposée “ OPTIMA ”

COMITIOL

Formules. — Faible. Normale. Forte.

Chaque comprimé contient : Tartrate-borico-potassique, 0 gr. 50 + Phényl-éthyl-Malonylurée (Synonyme : Gardénal Luminal).

0 gr. 01 par comprimé, formule faible.

0 gr. 02 par comprimé, formule normale.

0 gr. 03 par comprimé, formule forte.

Indications. — EPILEPSIE, Convulsions, Parkinson, Chorée, Angor Pectoris, Angoisses.

Avantages. — Activité aussi grande que celle des hautes doses de Phényl-Éthyl-Malonylurée, sans leurs inconvénients.

Doses. — *Adultes* : 6 comprimés par jour, quelle que soit la formule employée.

Enfants : 1/3 de comprimé par année d'âge et par jour. Sous peine d'accident, ne jamais interrompre brusquement le traitement par le COMITIOL.

Prix.	Formule faible.	Formule normale.	Formule forte.
Boîte de 10 jours.	12 fr.	16 fr.	18 fr.
— 30 —	30 —	40 —	50 —

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
sous les n^{os} 309-1, 309-2, 309-3, 309-4.

Pharmacie GRORICHARD

12, place de la Révolution — BESANÇON.

COMPLEXTRAITS

Phytothérapie intégrale.

Condurango. — Toutes les gastralgies,
XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

Kola fraîche. — Toutes les asthénies,
XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

G. P. V. — Toutes les affections utérines,
XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

Marron. — Toutes les affections veineuses,
XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

Valériane. — Toutes les excitations, 1 à
3 cuillerées à café par jour.

Littérature et échantillons :

Laboratoire des COMPLEXTRAITS

HÉRICOURT (Haute-Saône).

COMPOSÉ GMET

Tonique aux effets précoces et durables.

Composition. — Kola - coca - quinquina, sans addition d'alcool ni de caféine, ni de strychnine.

Propriétés. — Tonique général et nerveux. Effets *immédiats* mais *durables*.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, convalescences, suites de couches, d'opérations, fatigue, surmenage, prétuberculose.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant les repas, une ou deux fois par jour. (En cas de tachycardie, ajouter une cuillerée à café de Crataegus Gmet (régulateur cardiaque).

Laboratoire GMET

27. faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

COMPRESSIF BESLIER

Appareil perfectionné pour le maintien et la guérison de la **Hernie ombilicale** chez les enfants.

Le **Compressif Beslier** est un appareil sans caoutchouc confectionné en sparadrap Beslier très adhésif et non irritant pour l'épiderme délicat des enfants.

Le **Compressif Beslier**, très pratique parce que très simple, est d'une application très facile. Il ne se déplace pas sous l'influence des mouvements du corps et maintient continuellement la hernie refoulée.

Le **Compressif Beslier** supprime tous les inconvénients des bandages en caoutchouc.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN.

COMPRIMÉS ADRIAN

à l'hydrate de magnésie ou au carbonate de chaux.

Action. — Médicament saturant de l'hyperacidité gastrique.

Avantages. — *Ne neutralise que l'excès d'acide*, comprimés très friables, se délitant facilement, grâce à leur constitution presque spongieuse.

Indications. — Hyperchlorhydrie, pyrosis, fermentations acides, gastralgies, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés une heure avant les repas, et au moment des douleurs.

ADRIAN et C^{ie}

9 et 11, rue de la Perle — PARIS.

COMPRIMÉS D'ALIBOUR

Composition. — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre.

Indications. — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des flueurs blanches, impétigo, ecthyma.

Action. — Antiseptique d'usage courant prophylactique, hygiénique, anti-catarrhal.

Dose. — Deux comprimés dans 2 litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, lotion pour les yeux et les muqueuses. Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyma.

Prix : 10 francs la boîte de 36 comprimés.

Laboratoires DURET et RÉMY
et du Docteur Pierre ROLLAND
ASNIERES (Seine)

COMPRIMÉS DE PANTOLAXINE

du Docteur BOVEIL.

Traitement de la Constipation.

Ainsi que leur nom l'indique, ces comprimés renferment tous les principes actifs de tous les laxatifs reconnus les plus efficaces et doivent, par conséquent, agir dans tous les cas de constipation.

Composition. — Bourdaine, Cuscute, Chardon-Marie, Cascara, Rhubarbe, Aloïne, Evonymine, Belladone, Extraits biliaires, Extraits de glandes intestinales.

Indications. — Constipation et ses conséquences (vertige, tension artérielle, éruptions, démangeaisons, haleine fétide, etc.).

Doses et mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés pris au repas du soir, tous les jours, ou deux à trois fois par semaine suivant les besoins. Demi-dose pour les enfants.

Echantillon et Littérature sur demande.

Prix : 6 francs la boîte de 40 comprimés.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 346-4.

Marc PARIS, Pharmacien de 1^{re} classe
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e).

COMPRIMÉS « GALAC »

Ferment lactique titrant 50 % de culture pure de Bacille bulgare.

Antiseptique gastro-intestinal.

Traitement spécifique et inoffensif des Gastro-Entérites infantiles, Infections Gastro-intestinales, Dermatoses.

Chaque flacon de 60 comprimés porte UNE ÉTIQUETTE PRÉCISANT LA DATE DE FABRICATION, GARANTISSANT AINSI LA DURÉE D'ACTIVITÉ RÉELLE ET INCONTESTABLE DU MÉDICAMENT.

Adultes : 2 à 3 comprimés; Enfants : 1 à 2 comprimés.
Trois fois par jour, délayés dans un peu d'eau bouillie, avant les repas.

Prix du flacon de 60 comprimés : 10 fr.

Laboratoires LAMBERT

Place du Châtelet — ORLÉANS

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre.

Composition. — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25.

Propriétés. — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

Indications. — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, fleurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

Prix : 9 francs.

Laboratoires **ANDRÉ GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

COMPRIMÉS GYNÉCOLOGIQUES MERMINOD

Formule :

Dichlorylsulfamide Benzoate de soude...	0 gr. 012
Acide dioxysuccinique	0 gr. 125
Acide tartrique.....	0 gr. 126
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 144
Amidon et lactose.....	0 gr. 918

Propriétés et avantages. — Réalisation absolument nouvelle, inoffensive et la mieux adaptée aux besoins de la lutte spécifique contre la flore microbienne des organes génitaux.

Indications. — Comme prophylactique de toutes les infections vénériennes (gonocoques, staphylocoques, etc...) comme remède préventif et curatif de la leucorrhée, vaginite, métrite, endométrite, salpingite, etc... et comme préventif de la blennorrhée.

Prix : Tube de 6 comprimés : 10 fr. — 12 comprimés : 18 fr.

Emploi. — Introduire 1 compr. dans le vagin (avant l'acte) et attendre une demi-heure à 1 heure pour procéder à un lavage ordinaire.

Littérature et échantillons

Laboratoires **MERMINOD**

49, rue de Paradis — PARIS (X°).

Tél. : Provence 30-32.

COMPRIMÉS KLÉOS

Indications. — Maladies nerveuses infantiles (épilepsie, convulsions, douleurs de dentition, terreurs nocturnes).

Forme. — Comprimés solubles.

Comprimés Kléos aux polybromures n° 1.

Comprimés Kléos à la Phényléthylmalonylurée, n° 2.

Comprimés Kléos aux tartrates borico-potassiques et sodiques n° 3.

Posologie. — 1 comprimé par jour et par année d'âge.

Avantages. — Dosage rigoureux, produits purs et stables.

Prix : 12 fr. 50.

Littérature et échantillons :

Laboratoires GUÉRET

2, rue des Cordeliers

MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret).

COMPRIMÉS LEVURE MYCETA

Composition. — Levure de bière active, sélectionnée stabilisée selon le procédé RAPP.

Propriétés. — Par ses enzymes entravent le développement des putréfactions intestinales.

Par ses vitamines exercent une influence heureuse sur toutes les fonctions de la nutrition.

Indications. — Affections de la peau (furoncle, anthrax, acné, eczéma, dermatose).

Troubles du métabolisme et de l'utilisation nutritive (avitaminose, carences, anémies).

Mode d'emploi :

Adultes : 3 comprimés, 3 fois par jour ;

Enfants : 1 à 2 comprimés, 3 fois par jour délayés dans un peu d'eau qu'on peut ensuite ajouter à un peu de lait ou potage, soit une 1/2 heure avant les repas, soit immédiatement au début.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV°).

COMPRIMÉS « ROCHE » DE THIOCOL

1 comprimé « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 4 par jour et plus.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsie, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

Comprimés « Roche » de Thiocol.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

COMPRIMÉS URBÉ

Formule. — Urométine Lambiotte, 0 gr. 25 ; Bleu de méthylène, 0 gr. 05, pour 1 comprimé dragéifié.

Mode d'action. — Puissant dissolvant de l'acide urique ; analgésique, diurétique, antiseptique urinaire, biliaire et intestinal ; stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale.

Indications. — Néphrites, cystites, prostatites, urétrites, sciatique, rhumatismes, maux de reins, cholécystites, phosphaturie, bactériurie, pyélites.

Mode d'emploi. — 2 comprimés par jour (1 le matin, 1 le soir).

Pour les enfants : 1 comprimé.

Prix imposé : 12 francs.

Laboratoire URBÉ

R. LAFFARQUE, Pharmacien de 1^{re} classe.
BARSAC (Gironde).

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Effervescents

Aux sels naturels de Vichy-État.

Médication Alcaline pratique et économique.

Mode de présentation. — Les « Comprimés Vichy-État » présentés sous forme de pastilles effervescentes permettent de préparer, par simple dissolution, au moment du besoin, de l'eau alcaline gazeuse artificielle.

Indications. — L'usage des « Comprimés Vichy-État » est indiqué dans les affections de l'estomac, du foie, des reins, etc.

Posologie. — 3 à 4 Comprimés Vichy-État pour un verre d'eau, 12 à 15 pour un litre.

Georges PRUNIER et C^{ie}
4, rue de la Coutellerie — PARIS
et Pharmacies.

CONDURANGO GMET

Composition. — Extrait total, liquide, sans alcool ni sucre, du Condurango blanco, correspond à 2 grammes d'écorce fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Amer, apéritif, *sédatif*, de la muqueuse gastrique.

Indications. — Toutes les algies gastriques. Principalement : Ulcères, Cancer, Gastralgies réflexes consécutives aux troubles utéro-annexiels.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas ou au moment des crises douloureuses.

Laboratoire GMET

27, rue du Faubourg-Montmartre
PARIS (IX^e).

CONJONCTOL

Collyre nouveau à base de :

- 1° *Borosalicyl* (acide salicylique dissimulé et naissant). Antiseptique puissant ;
- 2° *Hamamélis virginica* (200 gr. pour 1 000). A haute dose est un vaso-constricteur qui (différence avec l'adrénaline) ne donne pas de vaso-dilatation réactionnelle. De plus, l'hamamélis virginica est un topique de tout premier ordre et sans danger (différence avec cocaïne).

Indications. — *Toutes les conjonctivites* (aiguës ou chroniques). *Adulte ou nourrisson.* Se prescrit également dans le cas de : surmenage des yeux.

Présentation. — 1° Ampoule-collyre de 5 centimètres cubes. En lavage de l'œil (coillère ou coton imbibé du contenu). Une ou deux fois par jour ;

2° Flacon compte-gouttes, soit en lavage (comme avec ampoule), soit en collyre (II à III gouttes dans l'œil matin et soir).

Littérature et échantillons au Corps médical.

Laboratoires H. SALLÉ

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

COPREX

Laxatif, efficacité inépuisable, garanti sans phénolphthaléine.

Composition :

- 1° Son de grains d'orge.
- 2° Sulfate de magnésie (à cette dose, il agit en provoquant un léger flux de bile).
- 3° Chlorure de magnésium (principe laxatif et rééducateur des eaux de Châtel-Guyon).
- 4° Extrait spécial de Cascara.

Avantage complémentaire appréciable : pris comme laxatif habituel, réalise automatiquement la « cure magnésienne ».

Dose. — 1 ou 2 dragées, 1/2 heure de préférence avant l'un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit.

Prix de la boîte : 10 fr. 60.

Laboratoire du COPREX

39, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

CORAMINE CIBA

Toni-cardiaque — eupnéique.

Stimulant du système nerveux, de la respiration et de la circulation. Produit synthétique (diéthylamide de l'acide pyridine-B-carbonique) soluble dans l'eau et pouvant être administré par voie buccale, sous-cutanée ou intraveineuse. Se substitue toujours à l'huile camphrée et parfois aux autres toniques du cœur avec de grands avantages. Pas de contre-indications. Aucune toxicité.

Indications. — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période post-opératoire. Hyposystolie des vieillards, etc.

Gouttes. — Ampoules.

Doses. — 25 à 100 gouttes par 24 heures.

1 à 12 cc. par 24 heures.

Le flacon de 15 cc : 12 francs.

La boîte de 5 ampoules de 1 cc. : 12 francs.

La boîte de 20 ampoules de 1 cc. : 36 francs.

La boîte de 5 ampoules de 3 cc. : 20 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109 à 113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

CORÉINE

Mucilage rigoureusement pur, sans l'adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal.

(Procédé Taillandier.)

La Coréine n'est pas de l'agar-agar.

La Coréine n'est pas extraite de l'agar-agar.

C'est du mucilage pur, indigestible.

Propriété unique. — Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

Indications. — Constipation simple, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.

La Coréine constitue un traitement remarquable, souvent le seul, de la constipation et de certaines formes diarrhéiques.

Formes. — Granulé et paillettes.

« La Coréine est admise par l'Assistance publique. »

Pour absorber la Coréine :

Mettre la Coréine en paillettes à sec dans la bouche ou la mélanger avec de l'eau, constituent des moyens sans inconvénient thérapeutique, mais peu agréables.

La Coréine en paillettes est très facile à absorber, à la condition de tenir compte des indications suivantes :

Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréine en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber tout de suite comme un potage.

Aux repas de midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréine à la dose de 1 à 2 cuillerées à café au petit déjeuner du matin.

Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréine, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

Quant aux nourrissons et aux bébés, une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

Le **Granulé de Coréine** se prend comme tous les granulés ; mettre directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avaler un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Bibliographie. — Pathologie gastro-intestinale, A. Mathieu et J.-C. Roux, etc.

L'ouvrage du Dr O. Taillandier, *Le Mucilage pur en Thérapeutique*, — publié en avril 1930, — est en vente au prix de 12 fr. à la librairie Maloine, 27, rue de l'Ecole-de-Médecine, et à la librairie Le François, 91, boulevard Saint-Germain.

Il est adressé gracieusement aux médecins, sur simple demande aux :

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
PARIS-OUEST

Précédemment : 8, rue de la Source — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 11-86.

La Coréine est remboursée par les Assurances Sociales.

CORTIODE

Régulateur des fonctions cardio-vasculaires.

Composition. — Union de l'iodaseptine (43 p. 100 d'iode) et d'iodure de sodium (84, 6 p. 100 d'iode) réalisant une dose d'iode élevée sans risques d'intolérance.

Propriétés thérapeutiques. — Fait baisser la tension artérielle, tonifie le cœur dont elle régularise et intensifie les contractions. Modifie rapidement le pouls bref et tardif.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension, Cardiosclérose, Ozène, Emphysème, Micose. Toutes les indications de la thérapeutique iodée intensive.

Préparation. — Posologie :

Ampoules de 5 cc (0 gr. 250 d'Iodaseptine, 0 gr. 221 d'Iodure de sodium). 1 à 2 ampoules par 24 heures, en injection intraveineuse ; exceptionnellement intramusculaire. Jamais d'intolérance.

Solution. — XX gouttes = 0,050 d'Iodaseptine et 0,0443 d'Iodure de Sodium.

Dose. — XXX à L gouttes 2 fois par jour au début du repas. Série de 12 jours par mois.

Laboratoires CORTIAL

15, boulevard Pasteur — PARIS.

CORYPHÉDRINE

Association d'acide acétylsalicylique et de Sanédrine (Voir p. 931).

Indications :

Coryza aigu. Rhume des foins. Trachéo-bronchite grippale ou non.

Posologie et mode d'emploi :

1 à 4 comprimés par jour par doses régulièrement espacées ; faire déliter les comprimés dans 1/2 verre d'eau.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

CRATÆGINE

A base de fleurs fraîches d'aubépine stabilisées (non toxique).

Propriétés thérapeutiques. — **Tonique et régulateur cardio-vasculaire.** — Si elle ne peut être considérée comme un succédané de la digitale, elle maintient utilement l'action obtenue avec ce médicament cardiaque comme elle doit maintenir celle que l'on obtient avec l'ouabaïne. — **Vasodilatateur, Hypotenseur** par action vasculaire périphérique.

Indications thérapeutiques. — Eréthisme cardiaque. Palpitations des nerveux et des neurasthéniques. Troubles congestifs de la ménopause. Tachycardie paroxystique essentielle. Goître exophtalmique.

Doses et mode d'emploi. — XV à XX gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée; — Dose maxima : XXX gouttes 3 fois par jour.

Prix : 12 francs.

P. BOUSQUET et E. LEROUX

Anciens internes des Hôpitaux

46, rue de la Barrière — ELBEUF.

CRATÆGUS GMET

Très agréable au goût.

Composition. — Extrait *total* de la fleur du *crataegus oxyacantha*; sans alcool ni sucre. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Régulateur du sympathique. Cardio-tonique.

Indications. — Tachycardie, Arythmie, Eréthisme cardiaque, Plexalgies, Cardialgies, Prurit, Insomnie, Gastralgie et tous les troubles nerveux d'origine réflexe.

Posologie. — Une cuillerée à dessert un peu avant l'heure du coucher, dans un peu d'eau ou de lait. (La dose peut être doublée.)

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

CRAYONS ANTIFISSURE DOMERGUE

Principes actifs. — Sulfolarsan. Masse spéciale.

Propriétés. — Antiseptique. Cicatrisant.

Indications. — Fissures anales : « pas d'insuccès ». Hémorroïdes ulcérées. Hémorroïdes.

Emploi. — Un crayon à demeure jusqu'à guérison.

Nota. — L'application du premier et quelquefois du deuxième est un peu douloureuse.

La boîte de 12 crayons : 20 francs.

Laboratoires DOMERGUE
AGEN (Lot-et-Garonne).

CREAGENOL

Médication reconstituante et tonique.

Composition. — Inositophosphate de chaux et de magnésie. Acétylamino-oxyphénylarsinate de chaux et hypophosphite de manganèse, en granulé sucré.

Indications. — Convalescences et états anémiques. Troubles de croissance. Rachitisme. Asthénie. Dépression nerveuse et surmenage. Tuberculose.

Mode d'emploi :

Adultes : une à deux mesures, 2 fois par jour au repas, pur ou délayé dans 1/2 verre d'eau.

Enfants : 1/2 mesure, 2 fois par jour.

Granulé très actif et d'un goût très agréable.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes -- PARIS (XVII^e).

CRÈME GRAZIANA

Érythèmes des nouveau-nés.

Composition. — Excipient spécial : liniment oléocalcaire associé à la lano-vaseline purifiée. Sous-nitrate de bismuth, hydrocarbonate de magnésie, oxyde de zinc.

Indications. — Erythème fessier. Dermites érythémateuses. Eczéma des nourrissons. Gerçures des seins. Et toutes irritations cutanées.

Le tube : 4 fr. 25. Le double tube : 6 fr. 40.

POUDRE CYTISIA

Toilette des bébés.

Infermentescible, entièrement minérale, antiseptique.

En boîte poudreuse à double couvercle.

La boîte : 6 fr.

Les spécialités de l'enfance.

Laboratoires AXAREL

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

CRÈME RÉSOLUTIVE du Dr RAP

Composition. — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à action fortement vasoconstrictive et analgésique :

(Hamamelis, Noix vomique, Arnica, etc.)

Propriétés. — Calme la Phlébalgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

Indications. — Varices, phlébites, hémorroïdes, insuffisances veineuses. Stase post-traumatique, entorses, fractures.

Mode d'emploi. — En massages matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer « l'Extrait Rap » en lotion ou en pulvérisation.

Prix : 11 fr. et 15 fr.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS
29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

CRÉOFORMINE

Spécifique de la toux et de l'expectoration.

Composition. — Tannocréosoforme, 0,20.
Phosphate de gaïacol, 0,05. Bromoforme,
III gouttes. Codéine, 0,01.

Forme. — Comprimés glutinisés, digérés
seulement dans l'intestin.

Indications. — Grippe, Toux catarrhales,
nerveuses et spasmodiques, Coqueluche,
Tuberculose, Bronchites aiguës et chro-
niques, Rhumes, Ectasie bronchique, Enté-
rite tuberculeuse.

Mode d'emploi. — De 4 à 8 comprimés par
jour.

Enfants : Demi-doses.

Avaler sans croquer.

Laboratoire de la CRÉOFORMINE

18, rue de Jouvence

DIJON (Côte-d'Or).

CRÉOSAL DUBOIS

Sirop, Comprimés, Solution.

Composition :

Le CRÉOSAL réunit dans sa composition le
Gaïacol, l'*Acide Phosphorique* et le *Calcium*
que la Thérapeutique a toujours associés.

Propriétés et indications thérapeutiques:

Recalcifiant puissant, antibacillaire, accéléra-
teur de la nutrition. Employé avec succès
dans : la Tuberculose pulmonaire, osseuse
ou cutanée, les Bronchites aiguës ou chro-
niques, les Toux rebelles, le Lymphatisme,
la Scrofule, le Rachitisme, etc., etc.

Sirop : 12 fr. le flacon.

Comprimés : 10 fr. l'étui de 50.

Solution : 12 fr. 50 le flacon.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e)

CRÉOSITOIRES

Pour l'imprégnation créosotée.

Actifs. — Indolores. — Non caustiques.

Composition :

<i>Pour Adultes :</i>	Créosote.	0 gr. 75
	Extrait thébaïque. .	0 gr. 02
<i>Infantiles :</i>	Créosote.	0 gr. 125

Indications. — Tuberculoses pulmonaires, Carminatif chez les opérés, Prophylaxie des accidents pulmonaires anesthésiques et des complications pulmonaires grippales ou rubéoliques, Curatif des affections pulmonaires aiguës.

Dosologie. — 1 à 2 par jour.

Prix : *Pour Adultes :* 15 fr. — *Infantiles :* 12 fr.

Echantillon et littérature :

Laboratoire JOLLY

1, rue Christine — PARIS (VI^e).

Tél. Danton 49-39.

CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Combinaison d'aldéhyde formique (4 p. 100) et de créosote (95 p. 100). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieur à l'iodoforme dans tous ses emplois.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

Indications. — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, Hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

Mode d'emploi. — Existe sous quatre formes :

- 1^o *Créosoforme-Poudre*, présenté en flacons poudreux, pour saupoudrage des plaies.
- 2^o *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.
- 3^o *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.
- 4^o *Créosoforme-Suppositoires*, 1 ou 2 par jour.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

CRÉOSOTE SOLUBLE VACHERON

Contient : 0 gr. 15 par cuillerée à soupe ; 0 gr. 05 par cuillerée à café de créosote de hêtre chimiquement pure, riche en gaïacol, et complètement absorbable. Une partie est en solution, le reste est émulsionné à l'aide d'un mucilage qui permet de passer de l'état émulsif à celui de solution (en ajoutant un liquide aqueux quelconque) sans que la créosote se sépare.

Indications. — Bronchites chroniques et spécifiques, catarrhe pulmonaire, pneumonie, laryngites chroniques et tuberculose.

Modes d'emploi :

Par voie stomacale : 1 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée, de tisane, de lait ou de vin.

En lavements : 1 ou 2 cuillerées à soupe dans un grand verre d'eau.

En pulvérisations et inhalations : 1 cuillerée à soupe dans un bol d'eau.

Prix : 14 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens
14, rue Victor-Hugo — LYON.

CRESCOGÉNOL

Composition. — Liqueur de Boudin, liqueur de Van Swieten, Sirop de lactophosphate de chaux, Sirop de coings.

Indications. — Rachitisme, troubles de la croissance, états pré-tuberculeux, enfants Hérédos, traitement d'épreuve, syphilis larvée, eczémas, dermatoses, etc...

Mode d'emploi. — De 1 à 5 cuillerées à café par jour suivant l'âge de l'enfant.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoires LESOURD
18, rue Ferdinand-Flocon
PARIS (XVIII^e)

CRESCOL BUISSON

(Produit non irradié)

Contient :

- 1° Tous les éléments minéraux qui existent dans l'organisme et dans les mêmes proportions que chez l'individu normal.
- 2° Les traces de minéraux catalyseurs nécessaires à la fixation des sels (manganèse, zinc, etc.).
- 3° L'insaponifiable de l'huile de foie de morue, avec la vitamine de croissance A et la vitamine antirachitique D.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anticarencielle.

Indications. — Rachitisme. Ostéomalacie. Déminéralisation de la grossesse, de l'allaitement, États tuberculeux et pré-tuberculeux, Avitaminoses.

Forme. — Granulé.

Posologie. — *Nourrissons et enfants* : 2 à 4 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau.

Adultes : 4 à 8 cuillerées à café par jour.

Prix de vente au public : 16 francs.

Prix médical : 10 fr. 80.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

ETHERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès-sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CRESENTYL

Le CRESENTYL est un benzo-méta-Crésol chimiquement pur, présenté en comprimés titrés à 0 gr. 50 de produit actif.

Ce produit a été étudié et mis au point dans le laboratoire et le service du Dr. Louis Fournier à l'hôpital Cochin. *Puissant anthelminthique, il a le grand avantage d'être dépourvu de toute toxicité.*

Spécifique des némathelminthes, ascaris, trichocéphales oxyures, etc., le CRESENTYL a aussi une action remarquablement rapide dans les amibiases et autres protozooses intestinales (*Lambli*a, *Balan*tidium, etc.) Excellent antiseptique intestinal, empêchant le développement des microbes de putréfaction (anaérobies), le CRESENTYL sera employé avec succès dans tous les cas nécessitant une désinfection de l'intestin.

MODE D'EMPLOI. — Désinfection intestinale :

4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas, pendant 10 jours.

Vermifuge : *Adultes* 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

Enfants, 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2-3 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours.

Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

Le tube de 20 comprimés. Prix au public : 12 francs.

Laboratoire des ANTIGENINES

Dépôt et Bureaux : 1, place Lucien-Herr
PARIS (V^e).

(Anciennement, 43, rue Tournefort.)


Tél. : Gobelins 26-21.

Laboratoire : 11, rue Michelet — PARIS (VI^e).

CRÉSOPIRINE

des Professeurs G. CARRIÈRE & E. GÉRARD

Acide Acétyl Crésotinique Ortho



Produit synthétique défini et pur.

Indications. — Traitement du rhumatisme aigu et chronique et de la douleur sous toutes ses formes.

Posologie. — *Douleurs rhumatismales, névralgies* : Prendre de 1 à 4 comprimés ou cachets dans la journée.

Insomnie : Le soir en se couchant, prendre 1 ou 2 comprimés ou cachets dans une tasse d'infusion de tilleul.

Rhumatisme articulaire aigu, fébrile : Se conformer à l'avis du médecin, qui, selon les cas, peut prescrire d'emblée 4 à 8 grammes par jour.

Grippe : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

La boîte de 30 cachets ou comprimés à 0 gr. 50 : 14 francs. Prix public.

La boîte de 30 cachets à 1 gramme : 18 fr. Prix public.

Flacon vrac de 50 grammes de poudre de Crésopirine : 17 fr. net le flacon à MM. les Pharmaciens.

Laboratoires " STÉNÉ "

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

CRINO-STHÉNYL

Complexe endocrinien des glandes dites « de l'énergie »

(Surrénale; hypophyse; orchitine; foie; parathyroïde; thyroïde).

Comprimés : étuis de 45.

Posologie : 2 à 4 comprimés par jour.

Ampoules pour injections hypodermiques.

Boîtes de 6 ampoules.

Posologie : 1 injection par jour.

Pour les enfants :

Sirop : 1 cuillerée à café (correspondant à un comprimé). Dose suivant âge.

Indications : chez les enfants retardataires, inattentifs, etc...; chez les adultes: asthénies diverses, surmenage.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS

CRISALBINE

(Thiosulfate double d'or et de sodium.)

Complexe chimique défini ; teneur en or :
37 p. 100.

Indications :

Tuberculose pulmonaire.

Posologie et mode d'emploi. — Injections intraveineuses, en débutant par 0 gr. 05 ou 0 gr. 10. Augmenter progressivement, selon la tolérance du malade.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

CRISTOLAX WANDER

Nouvelle formule.

Huile de paraffine	50 p. 100
Extrait de malt	40 p. 100
Agar-Agar	10 p. 100
Le plus efficace parmi les laxatifs doux, sans action drastique.	

Forme. — Paillettes.

Indications. — Tous les cas de constipation : nourrissons, femmes en couches, vieillards, opérés, grabataires et personnes délicates en général.

Doses. — *Nourrissons* : 1 cuillerée à café 3-4 fois par jour dans le lait ou la bouillie. *Enfants* : 2 cuillerées à café 3-4 fois par jour. *Adultes* : 1 cuillerée à soupe 3-4 fois par jour aux repas, tel quel ou dissous dans un liquide.

Le résultat atteint, continuer un traitement à faible dose : 1 cuillerée à café ou à soupe aux repas principaux.

Le flacon : 12 fr. Le grand flacon : 18 fr.

Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique, Analgésique.

Produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.

L'usage de la Cryogénine peut être prolongé sans danger.

Constitution. — Semi-carbazide de formule : $C^7H^8Az^3O$, en comprimés et cachets de 0 gr. 25 et 0 gr. 50. Toxicité très faible. Les animaux en expérience supportent impunément des doses considérables : plus de 2 gr. par kilog. d'animal.

Propriétés. — La CRYOGÉNINE LUMIÈRE ne ferme pas le rein, ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus. Elle ne provoque pas de vertiges, ni de troubles nerveux ou digestifs. La CRYOGÉNINE LUMIÈRE représente le médicament antipyrétique et analgésique type.

Aucune contre-indication. Aucune action nocive, son usage peut être prolongé sans danger.

Indications. — Grippe, fièvre au cours des maladies graves (fièvre des tuberculeux), fièvre typhoïde (permet d'éviter les bains froids), maux de tête, douleurs rhumatismales des membres, goutte, courbature, douleurs erratiques chez les tuberculeux, migraines, etc.

Chez les enfants, la CRYOGÉNINE LUMIÈRE est employée de préférence, dans toutes les pyrexies, du fait de son absolue innocuité.

Doses. — Chez l'enfant : de 0 gr. 25 à 1 gr. 50 par jour. Chez l'adulte : de 0 gr. 50 à 3 gr. par jour et davantage au cas de besoin.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté — LYON.

CRYPTARGOL LUMIÈRE

Antiseptique argentique, stable, atoxique.

Constitution. — (Argentothio-glycérine, sulfonate de sodium) 35 p. 100 d'argent métallique.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique égal à celui du nitrate d'argent sans toxicité, ni causticité. Ne tache pas, ne précipite pas les albuminoïdes. Jamais d'argyrisme. Aucune réaction ni sensation douloureuse.

Indications. — Usage interne : embarras gastrique fébrile, états infectieux du tube digestif, diarrhées, typhoïde, para-typhoïde, diarrhées imputables aux bacilles de Shiga ou au colibacille, dysenterie amibienne, entérite, entéro-colite, dyspepsies gastro-intestinales avec coprostase, fermentations intestinales, etc.

Chez l'adulte, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré par la bouche, en pilules dosées à 10 centigr. (4 à 6 pilules par jour au repas).

Chez l'enfant, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré sous forme de granulé à la dose d'une ou quatre cuillerées à café, selon l'âge de l'enfant sans aucun danger.

Usage externe — Antisepsie générale.

DERMATOLOGIE, UROLOGIE, GYNECOLOGIE, OPHTALMOLOGIE.

Formuler.

Usage interne : Etuis de pilules de CRYPTARGOL LUMIÈRE. — Flacon granulé de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Usage externe : Flacon de solution-mère de CRYPTARGOL LUMIÈRE, titré à 1 gr. pour 10 cc. en flacon de 30 cc. et de 120 cc.

Gynécologie : Boîte d'ovules de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Ophthalmologie : Ampoules collyre dosées à 1 p. 100 ou à 5 p. 100 de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté — LYON.

CRYPTHIOL

Composition. — Nouveau composé organique soufré, dérivé de la série aromatique, ni toxique, ni irritant.

Forme. — Capsulines glutinisées.

Action. — *a.* Par le pouvoir catalytique du soufre non oxydé, le CRYPTHIOL active la désintégration des albuminoïdes jusqu'à leur terme final: l'urée, et accélère l'oxydation des déchets nuisibles de l'organisme.

b. Par son action élective sur la cellule hépatique, le CRYPTHIOL constitue un puissant cholagogue et stimule les fonctions uropoïétique et glycémique du foie.

Indications. — Insuffisance hépatique, États congestifs du foie, Lithiases biliaire et rénale, Goutte, Obésité, Rhumatisme chronique, et en général toutes les affections provenant d'une carence soufrée de l'organisme ou d'un métabolisme défectueux.

Posologie. — 2 à 4 capsulines par jour, un peu avant les repas.

Prix : l'étui de 30 capsulines, 15 francs.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

CRYSIODAL

du Docteur Et. MAIGRE.

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode, associé au cadmium.

Indications. — Pré-tuberculose et tuberculose.

Présentation. — Deux sortes de solutions réparties en ampoules de 5 cc. :

1° Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.);

2° Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 027 d'or pour 100 cc.).

Doses et mode d'emploi. — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de deux injections par semaine, avec repos de 1 ou 2 mois entre les séries.

Prix : intraveineux, 30 fr. la boîte de 6 amp. ; intramusculaire, 25 fr. la boîte de 6 amp.

H. VILLETTE, Pharmacien

131, rue Cambronne, PARIS. — Tél. : Vaug. 11-23.

CURATINE BRUNET

Analgésique.

Spécifique de l'élément douleur.

Composition. — Association rationnelle de : Phénacétine, Théine, Analgésine bi carbonatée.

Indications. — Grippe, Migraines, Névralgies diverses, Rhumatismes, Règles douloureuses, Algies dentaires, etc.

Posologie. — 1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Prix réglementé de la boîte :

1 cachet : 1 franc. — 6 cachets : 5 fr. 50.

Laboratoire

de la CURATINE BRUNET

23, rue des Ecouffles — PARIS (IV^e).

CURIODE

Composition. — Combinaison organique d'iode et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Avantages. — Entièrement assimilable, plus efficace que les iodures alcalins et jamais aucun phénomène d'intolérance ou d'iodisme. — Elimination régulière.

Propriétés. — Le *Curiode* est :

- a) *Vaso-Dilatateur* (Artériosclérose, Hypertension, etc.).
- b) *Stimulateur des organes lymphoïdes et des Séreuses* (Adénopathies, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathie).
- c) *Donne de la fluidité au sang et aux sécrétions* (Asthme, Emphysème, Toux spasmodique, Coqueluche).
- d) *Indispensable au traitement de la Syphilis.*

Indications :

- 1° *Affections cardio-vasculaires* : Artériosclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Péricardite.
- 2° *Affections respiratoires* : Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques, Coqueluche, Laryngite chronique, Bronchites anciennes.
- 3° *Affections des organes lymphoïdes* : Adénopathies de la scrofule et de la Tuberculose. Gourme. Végétations adénoïdes. Goitre, Arthropathies, Hydarthroses.
- 4° *Syphilis et toutes ses complications.*

Posologie. — XX gouttes correspondent à : 1 gramme de KI ou à 4 centigr. d'iode métalloïdique. Doses moyennes : XX à XL gouttes par jour, à prendre en deux fois (aux repas).

Remarque. — Quand les doses atteignent LX gouttes, il est préférable de commencer par X gouttes à chaque repas (XX gouttes par jour) et d'augmenter d'une goutte par repas tous les jours jusqu'à XXX gouttes par repas. Repos une semaine par mois.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

CURIODE ARSÉNIÉ

Composition. — Combinaison organique d'iode, d'arsenic et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Indications. — Les mêmes que celles du *Curiode* et de l'arsenic, Recommandé chez les enfants et les adultes atteints d'*affections pré-tuberculeuses* et d'adénopathies simples ou trachéo-bronchiques.

Posologie. — XX gouttes correspondant à : 1 gramme d'iodure de potassium : 5 milligr. d'acide arsénieux ; 5 centigr. de méthylarsinate de soude (arrhéнал), 2 cuill. à soupe de sirop iodotannique.

Doses moyennes. — *Adultes*, XX à L gouttes par jour. *Enfants* : II à III gouttes par année d'âge.

Mode d'emploi. — A prendre en 2 fois pendant les repas. Commencer par des doses faibles et augmenter tous les jours d'une goutte par repas. Repos une semaine par mois.

TOLERANCE ET INNOCUITÉ ABSOLUES

Prix : 12 francs.

Echantillon gratuit à MM. les Docteurs.
Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires DORANTOWICZ
17 bis, avenue Parmentier — PARIS.

CUROGÈNE

Elixir antidouleur (forme liquide, seule rationnelle), à base de camphorate de pyramidon et de pyramidon.

Indications. — Sédation de la douleur : Migraines, névralgies, rages de dents, rhumatismes, sciaticques, dysménorrhée, grippe, etc.

Doses et modes d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillerées à café ; par jour : 2 à 8 cuillerées à café.

Enfants au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café.

Prix au public : 14 fr. ;

Le flacon d'essai : 3 francs.

Laboratoire du Curogène

Docteur J. GALIMARD, *, †, O.
145, rue Yves-le-Coz — VERSAILLES.

CURORAISIN

Extrait concentré de raisin frais stabilisé par électroionisation (Brevet N° 319.427).

Énergétique, Alcalinisant, Diurétique, Laxatif, Cardio-tonique, Croissance des enfants.

Posologie. — *Adultes* : Une cuillerée à soupe dans 1/2 verre d'eau, le matin à jeun.

Enfants : Une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau ou pur, ou selon l'indication du médecin.

R. COLAS, pharmacien

133, rue Lecourbe — PARIS

Tél. : Vaugirard 48-10.

Dépositaire Général : O. C. P. Paris.

CUROXYURE

Traitement efficace des oxyures.

Forme. — Pommade en tube muni d'une canule en os.

Composition. — Acide thymique, naphthaline; savon médicinal; extraits d'absinthe et de tanaïsie.

S'applique aussi bien aux enfants qu'aux grandes personnes, *sans aucun danger.*

Laboratoires B. E. A.

Ch. BEHA, Pharmacien de 1^{re} classe
BELFORT.

CUSCUTINE FOULON

Indications. — Laxatif doux, très actif. Stimule les sécrétions intestinales et décongestionne le foie.

La Cuscutine peut être prise pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes menstruelles, etc...

Composition. — La CUSCUTINE est composée d'extraits végétaux : Cuscute, Séné, Aloïne, etc.

Posologie. — Une à 2 pilules au repas du soir.

Echantillons gratuits.

L'étui de 50 pilules : 5 fr.

Pharmacie Rationnelle

20, faubourg Poissonnière. — PARIS (X^e).

CYANHERMINE

pour traitements antisyphilitiques
à base de Cyanure de mercure.
Ampoules pour injections intraveineuses.

Composition :

Cyanure de mercure (chimiquement pur)	0 gr. 01 cgr.
Arséniate de sodium	0 gr. 005 mill.
Sérum isotonique	2 cc.

Propriétés :

La Cyanhermine étant une solution à 1/200 en sérum isotonique réalise le maximum de tolérance. L'Arséniate de soude associé au mercure lutte contre l'anémie ou l'asthénie syphilitique.

Mode d'emploi :

Voie intraveineuse et posologie habituelle du Cyanure de mercure.

La boîte de 12 ampoules : 10 francs.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).
Tél. : Invalides 12-63.

CYNUROL-ROSA

Antilurique, antiseptique et diurétique.

« Drague la boue urique. »
« Sauvegarde l'appareil urinaire. »

Forme. — Dragées inaltérables et très assimilables.

Composition. — Extrait de feuilles d'artichaut, Uva-Ursi, Urotropine et Salicylate double de Phenyle-Pipérazine.

Indications :

- a. *Diathèse urique* : rhumatisme, arthritisme, maladies de la nutrition, lithiase biliaire et urinaire, etc.
- b. *Affections vésico-rénales* : cystite, blennorragie, uréthrite, pyurie, etc...
- c. *Maladies infectieuses* (parallèlement au traitement spécifique) : grippe, angine, fièvres diverses.

Posologie. — De 4 à 12 dragées par jour.

Laboratoires du CYNUROL-ROSA

1, place Champerret — PARIS (XVII^e).

CYTOBIASE

Extrait opothérapique de foies frais de Morue.

(Vitamines A et D.)

Formes :

- 1^o Gouttes : Cytobiase simple. Cytobiase composé (addition de 5/1 000 d'arrhénal.)
- 2^o Granulé : association à l'extrait de foies de morue, de poudre d'os, glycérophosphates de Ca et Mg.

Action :

Fixe la chaux par son cholestérol. Stimule les défenses organiques.

Indications :

Anémies, avitaminoses, adénopathies, croissances, rachitisme, inappétence.

Posologie :

Gouttes. Enfants :

Jusqu'à 5 ans : II gouttes par année d'âge.

De 5 à 15 ans : XV à XXV gouttes.

Gouttes. Adultes :

XXX à XL gouttes.

A prendre respectivement 2 fois par jour avant les repas dans un peu de vin, bière, eau, bouillon.

Granulé. Enfants :

Jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 5 à 15 ans : 4 cuillerées à café par jour.

Granulé. Adultes :

2 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires MARTIN

24, rue de Charenton — PARIS.

CYTO-CHOLINE

Composition :

Chlorhydrate de Choline pur.....	2 centigr.
Sérum chloruré isotonisant.....	2 centicub.

Indications. — L'injection de **Cyto-Choline** peut être associée aux divers traitements chimiothérapiques et collapsothérapiques de la tuberculose.

Elle est indiquée chaque fois qu'une lésion tuberculeuse est en cause, que la localisation soit pulmonaire ou extra-pulmonaire, que l'évolution soit aiguë ou chronique.

Mode d'emploi. — La **Cyto-Choline** s'emploie en injections sous-cutanées, pratiquées avec les précautions aseptiques habituelles, au niveau de la cuisse, tous les deux jours.

Comme il s'agit d'une médication ayant pour but de modifier le terrain, elle doit être poursuivie pendant plusieurs mois, sans interruption.

Résultats. — Associée à la cure hygiéno-diététique, la **Cyto-Choline** favorise le développement du processus de sclérose cicatricielle chez les tuberculeux pulmonaires, et détermine chez ces malades une amélioration des symptômes fonctionnels.

Dans les tuberculoses extra-pulmonaires, les résultats de ce traitement ne sont pas moins remarquables.

Boîte de 12 ampoules : 20 francs.

Laboratoires pharmaceutiques **CORBIÈRE**
fournisseurs des hôpitaux civils et militaires
27, rue Desrenaudes, 27 — PARIS (XVII^e).

CYTOMAGNÉSIUM LINDEUX

Halogènes du Magnésium à prendre par gouttes.

Posologie. — XX gouttes contiennent 0 gr. 62 de *Sels de Magnésium* actifs.

Indications. — *Dépression nerveuse, Anémie cérébrale, Affection des Voies biliaires, Prostatites (Mictions difficiles), Entérites, Action sur les épithéliums*, d'où ses indications dans la prophylaxie du *Cancer, Prurits, Dermatoses*.

Particularité. — Médication facile à prendre ; amertume masquée. De toutes les préparations magnésiennes, c'est la mieux indiquée étant donnée sa tolérance parfaite.

Doses. — XX gouttes le matin ; XX gouttes le soir, à prendre dans un peu d'eau, *avant* les repas.

Laboratoire de Biothérapie **OLIVIERO**
41, rue Denfert-Rochereau — PARIS (V^e).

CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique arseniée.

Le CYTO-MANGANOL constitue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

Indications. — Déminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement ; adénopathies ; lymphatisme, tuberculose.

Mode d'emploi. — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

Dose. — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les deux jours pour les adultes ; une ampoule de 2 centicubes pour les enfants.

Présentation :

Cyto-manganol pour adultes

Boîte de 12 ampoules de 5 cc.

Prix : 22 fr.

Cyto-manganol infantile.

Boîte de 12 ampoules de 2 cc

Prix : 16 fr.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes. — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Carnot 78-11

CYTOPAN

Forme. — Vin composé de goût agréable.

Composition. — Acide phosphorique, teinture de noix vomique.

Cytopan F : Même composition que le Cytopan avec extrait fluide de fénugrec désodorisé.

Indications. — Toute décalcification, pré-tuberculose, faiblesse générale, asthénie de toute nature, surmenage physique et intellectuel.

Cytopan F : Amaigrissement.

Doses. — 1 cuillère à soupe avant les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoire LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

CYTOPHÉDRINE

Médication préventive et curative de l'asthme.

Composition :

Ephédrine naturelle	0,02
Iodhydrate de codéine	0,01
Belladone	0,03

En comprimés enrobés.

Indications. — Asthme bronchique, emphyseme pulmonaire, dyspnée.

Mode d'emploi. — 2 à 5 comprimés par 24 heures en prises espacées, suivant la tolérance du malade.

Présentation. — En boîte métallique.

Prix : 16 francs.

(Voir Sérum antiasthmaticque de Heckel, page 967).

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS

Tél. : Carnot 78-11.

CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition :

<i>Cacodylate de soude chimiquement pur.</i>	<i>Trente centigr.</i>
<i>Sulfate de strychnine</i>	<i>Un milligramme.</i>
<i>Sérum isotonisant chloruré</i>	<i>Cinq centicubes.</i>

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée ou intra musculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

Indications. — Lymphatisme, Anémies, Tuberculose. Neurasthénie. Asthénie post-grippale, Convalescences.

Présentation. — Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 20 francs.

Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 14 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

DECORPA

Mucilage spécial contre la faim.

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, infermentescible ; « faux repas », remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire ; ne nourrissant pas.

Action. — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypoalimentés. — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

Indications. — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : *Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques, Uricémiques, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.*

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). Tél. : Lab. 08-00.

DELBIASE

Comprimés de sels halogénés de magnésium

Stimulant biologique général

par hyperminéralisation magnésienne.

Méthode cytophylactique du professeur Pierre Delbet.

Indications thérapeutiques particulières. — Asthénie et fatigue générale. Surmenage, Convalescence des maladies infectieuses. Dépression de certains malades devant être opérés.

Entérite chronique (désodorisation des selles), Constipation habituelle, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires. Tremblements séniles ou autres : Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques, Contractures et Crampes.

Troubles cardiaques par hypervagotonie.

Affections de la peau, Prurits, Eczéma chronique, Psoriasis, Acné chronique, Verrues.

Adénome prostatique.

Lésions de type précancéreux et prophylaxie du cancer.

Mode d'emploi et doses. — De 2 à 4 comprimés par jour, selon qu'il s'agit d'obtenir une simple action stimulante, ou que l'on désire, au contraire, lutter énergiquement contre un état pathologique déjà institué, surtout s'il revêt un caractère un peu menaçant. Faire dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau, à prendre immédiatement avant le petit déjeuner.

Laboratoire de PHARMACOLOGIE GENERALE

8, rue Vivienne — PARIS.

DELCAÏNE ROQUES

Chlorhydrate de pseudococaïne droite

-Cocaïne aneuphorique par double isomérisation stéréo-chimique.

Trois fois plus active, trois fois moins toxique que la cocaïne officinale. N'est pas un stupéfiant, ne figure pas au tableau « B ».

Emploi. — Anesthésie locale, régionale, rachidienne. Anesthésie par instillations, badigeonnages.

Forme. — Solutions à 0,5 %, 1 %, 2 % en ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. pour anesthésie locale, régionale. Dispositif pour préparation extemporanée pour injection rachidienne.

Solution à 2 % caféinée pour rachidelcaïnisation. Flacons de 15 cc. et 50 cc. à 5 % et 10 % pour anesthésie par contact.

Delcaïne en poudre, flacon de 2 gr.

Etablissements ROQUES

36, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie —
PARIS (IV^e).

DEMALGON

Un comprimé équivalent à 0 gr. 18 de Somben et 0 gr. 27 de diméthylaminophényldiméthylpsyrarobon.

Indications. — Tous les maux de tête, douleurs névralgiques, règles douloureuses, maux de dents, la fatigue, la neurasthénie.

Forme. — Comprimés à 0 gr. 45.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés pour les adultes ; 1,4-1 comprimé pour les enfants.

Echantillons et littérature :

31, avenue de St-Mandé — PARIS (XII^e).

P. BASUYAUX, pharmacien

94, rue Pasteur — FONTENAY-SOUS-BOIS
(Seine).

DENTOLINE

Dentifrice antiseptique.

Désodorisant le plus actif.

Marque déposée Cannes 127.

Composition. — Thymol, 5 ; Menthol, 5 ; Formol, 50 ; Excipient q. s. p. 1 000.

Propriétés thérapeutiques et indications.

— Solution antiseptique des plus puissantes employée dans le traitement des affections de la cavité buccale et de la gorge : stomatite, gingivite, pyorrhée, fluxion dentaire, angine, pharyngite, etc.

Mode d'emploi. — XXX à C gouttes par verre d'eau chaude en gargarismes, bains de bouche ou comme dentifrice.

35 francs le flacon.

« EVANS DRUG STORE »

J. M. RICARDOU, Docteur en pharmacie
46, rue Pierre-Charron — PARIS.

DENTORYL

(Antiseptique bucco-dentaire)

Formule du D^r M. ROCHETTE

Composition. — A base d'aldéhyde formique purifié et d'essences aromatiques.

Forme. — Flacons stables de 115 cc. et de 217 cc.

Indications. — *Son emploi journalier prévient et guérit* : Gingivite, Pyorrhée, Carie, Amygdalites, Angines.

Après extractions et interventions stomatologiques : Assure l'antisepsie ; favorise la cicatrisation ; calme les douleurs.

Posologie. — *Hygiène buccale journalière et bains de bouche après extractions* : V à X gouttes par verre d'eau.

Grands lavages post-opératoires : une cuillerée à café par litre d'eau bouillie tiède.

P. DAUMAS, Pharmacien chimiste,

3, rue Charles-Gounod, St-RAPHAEL (Var).

Dépôt O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e)

DÉPURATIF-ROB LECHAUX

Aux sucres végétaux concentrés et KI.
Publicité uniquement médicale. Le Rob
Lechaux est prescrit par le médecin.

Indications. — *Cure de désintoxication générale.* Printemps et automne.

Action. — Immédiate. Augmentation de toutes les sécrétions des glandes externes et internes. Abaissement de la tension sanguine. Désintoxication.

Dose. — Une cuillerée à soupe le matin à jeun pendant 2 mois. Une autre cuillerée à soupe le soir si nécessaire.

Le flacon : 14 fr.

Dépôt général :

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).
Echantillons sur demande.

DÉPURIODE

du D^r Roger Weber.

Dépuratif diurétique, ioduré, sans sucre ni alcool.
Une cuillerée à soupe contient
0 gr. 25 d'iodure de potassium.

Formule. — Extraits de bardane stabilisée, de fumeterre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de guaco, de stigmates de maïs, de noyer stabilisé : à à 2 gr. Réglisse : 5 gr. Iodure de potassium 16 gr. 70. Benzoate de soude : 10 gr. Glycérine : 50 gr. Eau. q. s. pour 1 000 cmc.

Indications. — Furonculose, clous, anthrax, orgelets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, dermatoses.

Goutte, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciatique, obésité.

Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardite chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème, asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstielle, albuminurie spécifique, oligurie, myélites, tabès, névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofule, adénites, mycoses, actinomycose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.

Mode d'emploi et posologie. — 20 jours par mois, au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

Adultes (dose moyenne) : 1 cuillerée à soupe, Contre artériosclérose et hypertension : 1 cuillerée à dessert.

Enfants : au-dessus de 5 ans (dose moyenne) : 1 cuillerée à café.

Prix du flacon : 18 francs.

Laboratoire du DÉPURIODE

61, rue de Seine — PARIS (VI^e).

Téléphone : Danton 92-73.

Angelini, Pharmacien.

DERMOFAGINE

Crème pommade, légèrement parfumée, en tube.
(Extr. de hêtre.)

Propriétés. — Antiparasitaire, Antiseptique, Antiprurigineuse cicatrisante.

Indications. — Toutes les Dermatoses, principalement les Dermatoses sèches, Pityriasis du visage (dartres); du cuir chevelu (pellicules).

Eczémas secs, chroniques, hyperkératosiques.

Eczémas séborrhéiques (séborrhée concrète des vieillards (verruques plates séniles).

Impétigo, Herpès : Tricophyties (herpès circinné).

Toutes affections croûteuses et pelliculaires du cuir chevelu.

Erythèmes, crevasses, Hémorroïdes.

Irritations de la peau, rougeurs, engelures, par rasoir, fards, intempéries.

La *Dermofagine* est une excellente crème de toilette.

Prix au public : 12 francs.

Donner en même temps à l'intérieur un dépuratif (cholagogue et diurétique), le **Raitoryl** (granulé) à la dose de 4 ou 5 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 francs.

Laboratoires de la DERMOFAGINE

15, pl. Godefroy-de-Bouillon — BOULOGNE-SUR-MER
(Pas-de-Calais).

DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil.)

Forme avec le *Zébo-Plastol* et le *Crémo-Plastol* le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très homogènes et destinées à être appliquées sur la peau, à la manière des pommades, dans toutes les dermatoses dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

Propriétés. — Le Dermo-Plastol est la préparation qui convient au plus grand nombre de cas; il calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

Indications. — Les *Plastols* peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres; eczémas de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichénification et eczématisation, pityriasis, impétigo, prurigo, etc.

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS.

DERMORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

Composition. — Pommade à base de **Bromure de Radium** associé aux meilleurs topiques usuels (soufre, camphre, Pix betulina, oxyde de Zn).

Propriétés. — Action particulière du Radium sur les réactions inflammatoires locales.

Accentuation des propriétés de chacun des topiques, par radioactivité induite.

Le **DERMORADOL** calme l'irritation et la douleur dès la première application. Cicatrise rapidement toutes les dermatoses.

Indications. — Acné, brûlures, eczémas, érythèmes, furoncles, herpès, impétigo, prurits, plaies atones, psoriasis, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer 2 ou 3 fois par jour la quantité de pommade nécessaire pour recouvrir complètement la partie malade.

Établissements LABORADIUM

33, rue Saint-Jacques — PARIS.

DERMOSPLÉNINE

Extrait désalbuminé aqueux de rate.

Communication à la Société Médicale des Hôpitaux (Paris, 5 décembre 1930).

Eczémas secs et suintants, aigus et chroniques
Prurits — Urticaires — Œdème de Quincke.

Ampoules de 2 centicubes correspondant à 50 gr. de rate fraîche de veau.

Mode d'emploi. — *Injection intramusculaire.* — Commencer le traitement par l'injection de 2 ou 3 ampoules à la fois ; une injection tous les 2 jours ; dès que le prurit est nettement atténué et que les lésions cutanées commencent à s'effacer, l'on peut réduire la dose à une ampoule, également tous les 2 jours.

Références cliniques : *Lipospléninine* du Dr Groc, 40 R. d'Enghein, Paris (X^o).

Vente :

J. OLIVE, pharmacien
14, rue des Minimes — PARIS (III^o).

DERMO-STALYS

du Docteur Wagon

(Pommade renfermant du Bactériophage).

But et principe :

Application pratique aux affections cutanées des propriétés d'un Bactériophage antistaphylococcique multivalent.

Composition :

Filtrat bactériophage antistaphylococcique	100 cc.
Orthoquinoléine sulfonate de potasse.....	0 gr. 25
Excipient. Q. S. pour.....	1 kg.

Indications :

Toutes *Staphylococcies cutanées*. Furoncles, Anthrax, Acné, Sycosis, Impétigo, et affections ou lésions aggravées par le *Staphylocoque* : Eczémas suintants, Intertrigo, Pyodermites, Ulcères, Plaies suppurées atones. Otites externes, Crevasses, Fissures anales.

Emploi sans danger.

Contre-indications. — Néant.

Mode d'emploi :

Pour Furoncles, Anthrax, Pyodermites, Plaies, étaler une bonne couche sur la zone malade, enflammée, suintante ou purulente ; compresse stérile, bande ou bandelettes agglutinatives.

Sur la face (Acné, Sycosis), appliquer une mince couche matin et soir avec léger massage, sans pansement.

Eviter l'emploi concomitant de tout antiseptique.

Résultats :

Disparition des phénomènes inflammatoires en 2-4 jours

Remarques :

- Pour l'acné et le sycosis, faire suivre les premières applications d'un traitement d'entretien durant plusieurs jours en utilisant la pommade à la manière d'une crème de beauté.
- Pour les vastes placards eczémateux, tâter la susceptibilité des malades en n'appliquant au début le produit que sur une surface de la dimension d'une pièce de 2 francs et augmenter ensuite progressivement.

Prix : Tube de 25 grammes : 18 francs.

Echantillons et littérature sur demande :

SOCIÉTÉ DES PRODUITS STALYS

Laboratoire SIDEPAI

64, rue La Boétie — PARIS.

Téléph. : Elysées 98-82.

DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphysème (méthode du Dr Paul Cantonnet).

Traitement principal d'attaque :

1^o Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium jaborandique injectable.

La boîte d'ampoules : 40 francs.

Traitements adjuvants et de maintien :

Pulvérisations huileuses (aérol, trachéol).

Aérol : Le flacon avec pulvérisateur : 60 francs.

Le flacon de rechange : 25 francs.

Trachéol : Le flacon : 20 francs.

2^o Pilules de Pilo-chlorine.

Pilo-chlorine : Le flacon : 25 francs.

Traitement forme bronchitique :

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

La boîte : 40 francs.

Laboratoires BÉLIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

DESITIN

Préparation à l'huile de foie de morue chlorée, en composition avec les dermatiques connus.

Indications. — En premier lieu traitement des plaies, bénignes ou suppurées. Traitement local de toutes dermatoses ; GYNECOLOGIE : comme sédatif antiseptique, les plus larges applications. Assèchement des plaies et prurits ; pédiatrie.

Principalement : en pommade et en poudre. Il existe également : suppositoires et ovules.

Avantages. — Les éléments vitaminés de l'huile de foie de morue favorisent la reformation des tissus et accroissent la leucocytose au niveau de l'inflammation. L'adjonction de chlore excite ces phénomènes, tout en faisant du *Desitin* un antiseptique externe très puissant.

Prix : 10 fr. le tube et 16 fr. le double tube.

Laboratoires MERMINOD

49, rue du Paradis — PARIS (X^e).

Tél. : Provence 30-32.

DÉTENSYL

Hypotenseur végétopolyhormonique.

Composition. — Gui, Hépatine, Pancréine, Pulmine.

Dose. — 3 ou 4 dragées par jour (de préférence avant les repas) amènent un abaissement rapide et durable de la tension artérielle.

Indications. — Hypertension artérielle, troubles de la ménopause, menaces d'hémorragie cérébrale chez les pléthoriques, troubles oculaires et auditifs provoqués par l'hypertension.

Prix : Le tube de 36 dragées, 16 fr.

Laboratoire du DÉTENSYL
8, avenue Walkanaer — NICE

DÉTERGINE

du Docteur BOURDEAU

(pommade aux peroxydes, persulfate desoude, gaïacol, terpinol).

TRAITEMENT des PLAIES

Plaies en général.

Plaies post-opératoires : appendicite à chaud, cystostomie, ostéomyélite, fistule, mastoïdectomie.

Déterge rapidement les plaies les plus infectées, c'est là son originalité.

Convient également dans l'eczéma consécutif aux plaies post-opératoires.

Nombreuses références médicales et chirurgicales.

Laboratoire du Docteur BOURDEAU
PARTHENAY (Deux-Sèvres).

DIABÉTALIM

~~DIASANA~~

Sucre pour diabétiques.

Ne contient ni saccharine, ni autre produit de synthèse.

Ses dérivés : CHOCOLAT et CONFITURE.

Mode d'action. — Très nutritif (92 p. 100 d'hydrocarbures). Goût délicieux, bien toléré.

Mode d'emploi. — Doses variables selon les cas, en moyenne de 20 à 60 grammes par jour.

Formes. — *Sucre* : Boîtes de 500 gr. (22 fr.) ; 250 gr. (12 fr. 50) ; 50 gr. (5 fr.).

Chocolat : Ordinaire à la noisette, la tablette (8 fr.) ; Napolitaine (8 fr. 75).

Confitures : Oranges, Prunes, Abricots. Le pot de 450 gr. : 18 fr.

Laboratoire DIABÉTALIM

61, rue Vandamme — PARIS (XIV^e).

Tél. : Ségur 64-24.

DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'antipyrine, de nitrate d'urane et de santonine.

Médication complémentaire de l'Insuline.

Doses. — Un cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours : diminuer, s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Prix au public : 25 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

DIABÉTULINE

Traitement du diabète par l'Huile de Gabian. (Pétrole chimiquement pur).

(Aucune contre-indication formelle.)

Forme. — Cachets.

Formule. — Huile de Gabian, 0 gr. 32 ; Levurine, 0 gr. 50 ; Eucalyptus pulvérisé, 0 gr. 93 ; Poudre inerte, 0 gr. 25. Pour un cachet.

Indications. — Diabète sous toutes ses formes.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets par jour, pris au milieu des repas.

Prix. — La boîte de 30 cachets : 18 francs (exempt d'impôt).

Vente autorisée aux Assurés Sociaux.

Echantillons et littérature :

Laboratoires V. CHARRET-TOMASI
SAINT-JUST-SUR-LOIRE (Loire).

DIADERMINE

Excipient pour pommade.

Définition. — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau et les sérums et pénétrant très rapidement l'épiderme.

Indications. — Remplace la vaseline, l'axonge et la lanoline dans la préparation des pommades médicamenteuses, *éteint le mercure*. *Touchers*, ne graisse pas et n'abîme pas les gants.

Massages, Soins de la peau, Brûlures, Engelures, Gerçures du sein. Prévient et guérit l'érythème fessier du nouveau-né.

Prix de vente au public : Pot : 6 fr. 50 ; Tube : 4 fr. 75.

Conditions spéciales au Corps Médical.

BONETTI Frères

12, rue Vavin — PARIS (VI^e).

DIAGNOTHORINE

Suspension aqueuse à 25 p. 100 d'Oxyde de Thorium pour l'Exploration radiologique du tube digestif.

Indications. — L'étude des contours des segments du tube digestif est obtenu par l'emploi de la GELOBARINE (voir p. 429). La DIAGNOTHORINE révèle les *plis de la muqueuse* dans tous leurs détails.

Posologie et mode d'emploi. — Pour un examen : en général 2 cuillerées à soupe, à faire ingérer par petites gorgées au moment de l'examen, le malade n'ayant rien absorbé dans les 8 heures précédentes.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

DIAL CIBA

Hypnotique antinerveux.

Diallylmalonylurée. Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétude. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, son usage étant même prolongé.

Indications. — Insomnie nerveuse en général et chez les agités, les émotifs, les surmenés. Etats démentiels.

Trois formes : Comprimés, Gouttes et Ampoules (Dial soluble).

Doses. — 1 ou 2 comprimés au coucher pour les insomnies du soir, au réveil pour celles du cours de la nuit. *Adultes* : 1 à 2 comprimés, XXX à LX gouttes, 1 ou 2 ampoules.

Prix : le tube de 12 comprimés, 8 fr. — Le flacon Dial Soluble, 11 francs. — La boîte de 5 ampoules, 10 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

DIALACETINE CIBA

Sédatif — Antipyrétique — Analgésique.

Diallylmalonylurée, plus éther allylique du paracétaminophénol. Action sédatrice, analgésique et antipyrétique permettant d'instituer une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

Indications. — Agitation et délire au cours des maladies aiguës. Epilepsie, Hystérie, Névroses diverses, Angine de poitrine, Névralgies, Lumbago. Insomnie des tuberculeux.

Doses. — Dose sédatrice : 1 à 3 comprimés par 24 heures, par 1/2 ou 1 comprimé, avec intervalle de 2 à 5 heures. Dose hypnotique et analgésique : 1/2 à 2 comprimés au maximum.

Le tube de 15 comprimés : 13 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

DIALINE

Définition :

Dialine = Cire + Huile + Eau.

La Dialine est un cerat fluide, inaltérable, neutre et non parfumé, présenté en un tube.

Indications :

Fluide, grâce à la forte proportion d'huile, la Dialine remplace l'eau et le savon irritants dans la toilette quotidienne des peaux délicates.

Protective, grâce à la cire.

Décongestive, grâce à l'eau, la Dialine est particulièrement indiquée pour la nuit, le massage, les soins de la peau et, en général, pour l'hygiène cutanée des peaux délicates.

Le tube de 100 gr. environ : 18 francs.

Etablissements C. I. P.

128, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e).

DIALYL

Dissolvant urique.

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

Forme. — Granulé effervescent.

Dosologie. — Deux cuillerées à café par jour chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 fr. le flacon.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

Téléphone : Auteuil 20-21.

DIASCLÉROL

du Docteur GUERSANT

Composition. — Association Sédobenzyl ($C^2 H^3$) $CH^3 SO^2 K$) (antispasmodique, hypotenseur), hydrate de pipérazine, salicylate de lithine et hexaméthylènetétramine en milieu citraté.

Indications. — Diathèse urique Hypertension, Artério-sclérose, Arthritisme, Goutte, Gravelle. Rhumatismes, Coliques hépatiques et néphrétiques, Obésité.

Dose et mode d'emploi. — Granulé effervescent, 2 à 6 cuil. à café par jour, dans un peu d'eau, vingt minutes avant les repas.

Le **DIASCLÉROL** n'étant pas toxique, son emploi peut être prolongé.

LABORATOIRE du DIASCLÉROL

D. DONNAT, pharmacien

26, rue Norvins — PARIS (XVIII^e).

Téléph : Marcadet 15-66.

DIASES

Composition. — Farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses renfermant toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber. Grâce à une prédigestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité.

Sans aucun surmenage des organes digestifs, elles assurent une suralimentation rationnelle.

Indications. — Nourrissons (particulièrement au moment difficile du sevrage), Enfants, Malades, Convalescents, Vieillards. Tous les malades à régime : Cardiaques brightiques, Rhumatisants, Dyspeptiques, Tuberculeux, Cachectiques.

Mode d'emploi. — Délayer parfaitement et à froid 3 cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diase dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de lait, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à *jeu très doux*, en remuant; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit. Elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter.

Nomenclature.

DIASE CACAO : Déjeuners et goûters pour adultes et enfants. La boîte de 1/3 de kilo : 8 fr. ; de 1 kilo : 22 fr.

DIASE CÉRÉALE sans sucre : Bouillies très fluides pour bébés au biberon, enfants et adultes délicats. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

DIASE CÉRÉALE sucrée : Diase complète aromatisée, recommandée pour les enfants en bas âge. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

DIASE LÉGUMINEUSE : Potages excellents instantanés. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

DIASTÉNINE GRÉMY

Principe actif de la glande interstitielle du testicule.

- 1° *Pendant l'établissement de la puberté*, permet de lutter contre les troubles de cette période : croissance trop rapide, douleurs articulaires dues au travail ostéogénique trop intense des cartilages de conjugaison, anémie, faiblesse musculaire.
- 2° *Chez l'adulte*, permet de lutter contre tous les signes d'insuffisance testiculaire, ralentissement général de la nutrition, obésité, faiblesse musculaire, neurasthénie.
- 3° *Chez le vieillard*, invigoration générale de l'organisme.

En pilules, gouttes et ampoules.

Laboratoires G. GRÉMY
14, rue de Clichy — PARIS

DIASTOGÈNE DEHAUSSY

Reconstituant intensif.

Composition.

Arsines, stimulant de la nutrition.

Nucléine manganésifère, catalyseur nutritif, excitant des centres hématopoïétiques.

Kola fraîche stabilisée, toni-cardiaque, éliminateur des toxines et des déchets de la nutrition.

Indications.

Chaque fois qu'il faut stimuler un organisme affaibli, une nutrition ralentie.

Formes.

Diastogène Elixir (légèrement alcoolisé).

Adultes : 2 verres à liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

Diastogène granulé. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à café, 10 ans, 2 ; 5 ans, 1.

Diastogène comprimés. — Le Reconstituant des Diabétiques : 6 par jour.

DIASTOGÈNE F

Poudre de **Fenugrec**, associée au complexe Diastogène. Le **Fenugrec**, en un comprimé glutinisé (tolérance parfaite), est incorporé au milieu du cachet.

Indications.

Amaigrissement, asthénies, convalescences.

2 à 3 cachets par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

DIASTO-PEPSINE RICHEPIN

Pilules et Élixir (très agréable).

Contiennent toutes les vitamines
et hormone des glandes fraîches.

L'activité des éléments digestifs : *Pepsine*, *Pancréatine* et *Diastase* dépend de la façon dont ils ont été recueillis et préparés. Aussitôt isolés par les procédés décrits ailleurs à basse température, ils sont incorporés aux excipients spéciaux, pilule ou élixir (très agréable). Leur puissance active est ainsi bien supérieure aux agents habituels du commerce.

La digestion stomacale et intestinale est donc complète : viandes, graisses, légumes, féculents, etc. L'assimilation est totale : c'est le repos du foie, du pancréas et de tous les organes digestifs souvent déficients, surtout avec l'âge et la fatigue.

Doses. — 2 ou 3 pilules après les repas ou 1 verre à liqueur d'élixir. Pour les enfants, faire fondre 1 pilule dans du lait ou 1 cuillerée à café d'élixir dans de l'eau sucrée.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS.

DIATHERMIE

A. — Diathermie médicale.

- 1° *Troubles de la circulation artérielle et veineuse :*
- 2° *Douleurs thoraciques* d'origine pleurale, et *Douleurs abdominales* : gastralgies, entéro-colite, épiploïtes et périviscérités, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux :
- 3° *Rhumatismes chroniques*, arthralgies et myalgies :
- 4° *Névralgies et névrites* :
- 5° *Trophicité des tissus* : paralysies, poliomyélite.

B. — Diathermie chirurgicale. Diathermo-coagulation.

Utilisée pour la destruction de nombreuses lésions, en dermatologie, en gynécologie, en oto-rhino-laryngologie, en ophtalmie ainsi qu'en chirurgie générale.

Vente et location de tous appareils et accessoires à :

La Verrerie Scientifique,

12, avenue du Maine — PARIS (XV°).

Tél. : Littré 94-62 et Littré 01-63.

DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode.

Médicament de choix pour l'administration de doses massives d'*iode libre*.

Composition et forme. — Suspension aqueuse titrant 4 p. 100 d'iode total dont 3 p. 100 d'*iode libre, métallique*, en petits grains.

Avantages. — Beaucoup plus rapidement qu'avec la teinture d'iode, on peut arriver à des doses importantes d'*iode libre* (0,50 à 1 gr. par j. ur). On institue pour cela une posologie par progression arithmétique.

Mode d'emploi. — Prescrire toujours le dicaliode en cc. (une mesure graduée accompagne chaque flacon) et *dans du lait froid* (de préférence avant les repas).

Indications. — *Dicaliode à petites doses* : 1 à 2 cc. par jour. Goitre. *Enfants* : perte d'appétit, ganglions, grosses amygdales, rachitisme.

Dicaliode à doses moyennes : 2 à 5 cc. par jour. Affections du cœur et des vaisseaux : **Hypertension** ; de l'appareil respiratoire (bronchite chronique, asthme, emphyseme, coqueluche, tuberculose). *Affections de la peau* : eczéma, psoriasis.

Dicaliode hautes doses : 10 à 30 cc. par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A Bruxelles : **LE MARINEL**, pharmacien

273, rue Victor-Rauter.

DIDIAL CIBA

Hypnotique — analgésique.

Diallylmalonylurée et diallylmalonylurate d'éthylmorphine, chaque comprimé étant formé de 0 gr. 075 de Dial pur, plus 0 gr. 025 de diallylmalonylurate. Pouvoir narcotique plus prononcé que le Dial, et action nettement analgésique, d'où indication toutes les fois que l'insomnie est sous la dépendance de la douleur.

Indications. — Toutes les insomnies relevant de la douleur : névralgies, traumatismes, tabes, cancers, etc. Agitation maniaque, excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

Doses. — 1 à 3 comprimés à 0 gr. 10 par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur ; par doses réfractées, aux repas dans les autres cas

Le tube de 12 comprimés : 14 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109 à 113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

DIEMENAL

Indications. — Paludisme chronique, Paludisme, Fièvre bilieuse hémoglobinurique.

Composition. — Fer, Manganèse colloïdaux, obtenus par électrolyse.

Forme. — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules.

Mode d'emploi. — Dans le Paludisme et la fièvre bilieuse hémoglobinurique :

Injection hypodermique ou intraveineuse d'une ampoule de 10 cc. toutes les 12 heures environ.

Dans le Paludisme chronique : Commencer le traitement par : 12 injections à raison de une par jour ;

Le continuer par : 6 injections à raison de une tous les 2 jours ;

Le terminer par : 6 injections à raison de une tous les 4 jours.

En se conformant à la posologie ci-dessus, on peut être assuré de voir les accès disparaître complètement chez le paludéen chronique, devenu le plus souvent insensible à l'action de la quinine.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 16 fr. 50 (en France).

Laboratoire J. DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

DIENOL

Indications. — Broncho-pneumonie, Infections septicémiques. Toutes septicémies (grippe, pneumonie, broncho-pneumonie) et tous états toxi-infectieux médicaux et chirurgicaux.

Composition. — Métaux colloïdaux, FeMn, obtenus par électrolyse.

Forme. — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules, et tubes-doses de 40 cc. pour l'emploi par voie rectale.

Mode d'emploi. — Une ampoule toutes les 12 heures, en injection hypodermique (indolente) ou intraveineuse. Pour la voie rectale : 2 tubes-doses par jour.

Quand on ne veut pas employer le DIENOL en injection hypodermique, surtout chez les enfants, on peut opérer par voie rectale.

Dans ce cas, on se servira des tubes-doses spéciaux à grande capacité, qui donneront des effets encore plus rapides et aussi puissants.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 14 francs.

Prix de la boîte de 3 tubes-doses : 15 francs.

J. DEPRUNEAUX

Pharmacien de 1^{re} classe
18, rue de Beaune, PARIS (VII^e).

DIGALÈNE " ROCHE "

**Digitale injectable
étalonnée physiologiquement.**

Glucosides totaux de la feuille de Digitale pourpre
titrée d'après les prescriptions du Comité d'Hy-
giène de la Société des Nations.

Posologie et modes d'emploi :

Ampoules, Solution, Comprimés.

1 ampoule de 1 cc. = 75 unités-grenouille =
0 gr. 05 de feuille de Digitale titrée (standard de
la S. D. N.).

1 cc. de Solution = 150 unités-grenouille = 0 gr. 10
de feuille de Digitale titrée.

1 Comprimé = 75 unités-grenouille = 0 gr. 05 de
feuille de Digitale titrée.

Doses faibles ou d'entretien cardiotonique :

Adultes : XX gouttes. *Enfants* : I à V gouttes.

Doses moyennes ou sédatives :

Adultes : XX ou LX gouttes ; 1 à 2 comprimés ou
1 à 2 ampoules (voie intramusculaire). *Enfants* :
V à X ou XV gouttes.

Doses fortes ou antiasystoliques :

Adultes : LX et CLXXX gouttes ; 3 à 6 ampoules
(Voie intramusculaire ou endoveineuse). *Enfants* :
V à XX gouttes et même 1 à 2 ampoules (cas déses-
pérés).

Propriétés thérapeutiques. — Action très rapide,
tolérance parfaite, pas d'accumulation.

Indications thérapeutiques. — Chaque fois que
le cœur faiblit.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}.

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

DIGASTRINE

(Cachets)

Composition. — Benzoate de naphtol, Charbon spécial, Pepsine, Poudre de belladone stabilisée.

Mode d'action. — Sédatif, absorbant, antiseptique intestinal; stimulant de la sécrétion gastrique, antispasmodique.

Indications. — Aérophagie, dyspepsies, embarras gastrique, fermentations intestinales, entérocolite, crampes de l'estomac, spasmes du cardia, de l'estomac, du pylore. Entérospasmes, constipation spasmodique.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cachets à la fin de chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoire de la **DIGASTRINE**

M. DELORME, pharmacien,

11, rue Saint-Agricol — AVIGNON (Vaucluse).

DIGESTIF HARVEY

Composition :

Benzonaphtol	50 centigr.
Carbonate de chaux.....	25 —
Salicylate de bismuth	25 —
Hydrate de magnésie.....	50 —
Pepsine extractive	10 —
Maltine.....	05 —
Sucre anisé	6 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de l'acidité gastrique et des fonctions digestives.

Formes. — Granulé d'un goût agréable, pouvant être croqué.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Gastrites, hyperchlorhydrie, fermentations acides, Entérites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau, après chaque repas. Avant d'absorber le granulé, le laisser pendant vingt minutes en contact avec l'eau.

Prix au public : 10 francs la boîte.

Laboratoire **MALMANCHE**

Pharmacien. Docteur ès sciences,
101, avenue de Paris.

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

DIGESTONIC

Composition. Citrate de soude, Phosphate de Bismuth, Fluorure d'Ammonium, Macération hydro-glycérique de sedum telephum et de gonolobus condurango.

Forme. — Elixir.

Propriétés thérapeutiques. — Action sédative s'exerçant sur les terminaisons nerveuses de la muqueuse gastrique. Calme le spasme, Action anti-émétique. Pouvoir antiseptique s'opposant aux fermentations. Supprime la constipation.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques, hyperchlorhydrie, spasme du pylore, irritations gastriques douloureuses, motrices et sécrétoires, vomissements du début de l'ulcus, fermentations gastriques par stase, constipation.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à soupe dans un peu d'eau ou de tisane. Répéter la dose jusqu'à cessation de la douleur. Adjonction d'un régime le cas échéant.

Prix : 17 fr. le flacon de 250 cc. environ.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits Scientia

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque.
Association digitaline-ouabaïne.

Présentation et posologie. — 1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. : Digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien) : X à XV gouttes par jour.

Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL à L gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2° *Voie intraveineuse* (méthode exceptionnelle). Ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. (1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours.)

Indications. — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonocardiaques ont échoué.

Remarques importantes. — La Digibaïne est la première association digitaline-ouabaïne préconisée en thérapeutique cardiaque (MM. Ch. Laubry, D. Routier et R. Giroux, C. R. Soc. méd. hôpitaux de Paris ; 26 janvier 1923).

La Digibaïne est préparée *uniquement* par les Laboratoires Deglaude.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

(Cardibaïne,

Spasmosédine, Théoxanthine, etc.

6, rue d'Assas — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 31-85.

Belgique : *Agent général* : L. Prunières.
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant, sous une forme optima, l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale. *Stable, d'action constante, toujours bien tolérée, rigoureusement dosée.*

Indications. — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules) et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

Posologie. — Celle de la poudre de feuille de digitale, à laquelle elle correspond poids pour poids.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles. — Ampoules de 1 cm³. = 10 cgr. poudre de feuille.

Le tube de 25 comprimés : 14 francs.

La boîte de 5 ampoules : 15 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109 à 113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

DIGIMIALBAÏNE

Composition :

Cent gouttes contiennent :

1/3 de mmgr. de digitaline Mialhe;

2/3 de mmgr. d'ouabaïne Mialhe.

Posologie :

Cardiotonique. — X à XV gouttes par 24 heures.

Sédatif. — XXX gouttes, 2 fois par 24 heures pendant 7 jours.

Antisystolique. — XL à L gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 5 jours.

Laboratoire du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

DIGITALINE CRISTALLISÉE MIALHE-PETIT

La plus fidèle
de toutes les préparations de digitale.

Titrag chimique rigoureux.

1 cc. = 50 gouttes = 0,001 digitaline cristallisée.

Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes.

Effets physiologiques constants et contrôlés.
(Employée dans les hôpitaux depuis 1889).

Dose. — Cardiotonique : III à IV gouttes par jour. — Sédatif : V à X gouttes. — Anti-
asystolique jusqu'à L gouttes dans les
24 heures.

Laboratoire du Docteur MIALHE
8, rue Favart — PARIS.

DIGITALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Toni-cardiaque, régularise et stimule les contractions cardiaques, diurétique cardio-vasculaire.

Indications. — Insuffisance aortique, rétrécissement mitral, affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

Formes. — Ampoules de 1 cc. au 1/10^e de milligr., boîtes de 6. Granules roses au 1/10^e de milligr. flacons de 50. Solution au 1/1000^e, flacons de 10 et 5 cc.

Le demi-flacon	au public.....	11 fr.
L'étui de 50 granules..	—	11 fr.
La boîte de 6 ampoules	—	10 fr.

Pharmacie Centrale de France
21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e).

DIGITALINE NATIVELLE

Prix Orfila (1872). Prix Desportes (1904).
Décernés par l'Académie de Médecine de
Paris.

La DIGITALINE NATIVELLE agit plus
sûrement que toutes les autres prépara-
tions de Digitale.

Employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Formes :

Granules au 1/10 de mgr. — Solution au
1/1000. — Ampoules au 1/4 de mgr.
pour injections intramusculaires. — Am-
poules au 1/5 de mgr. pour injections
intraveineuses.

Indications :

Insuffisances cardiaques, Cardiopathies val-
vulaires, Arythmies, Tachycardies, Myo-
cardites, Myocardie.

Doses :

1^o *Dose d'entretien* : 1/2 mgr. en 5 jours,
c'est-à-dire : 1 granule à 1/10 mgr. ou V
gouttes de solution au 1/1000 par jour les
5 premiers jours de chaque dizaine.

2^o *Dose de soutien* : 1 mgr. en 5 jours, c'est-
à-dire : 2 granules au 1/10 mgr. ou X gouttes
de solution au 1/1000 par jour les 5 pre-
miers jours de chaque dizaine.

3^o *Dose d'attaque* : Dépend de la gravité de
l'affection et de la susceptibilité du ma-
lade qui sera surveillé chaque jour.

Dose normale : 1 mgr. 5 en 10 jours.

Dose forte : 2 mgr. en 8 jours.

Dose de saturation : 3 mgr. en 10 jours.

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (15^e).

DIORADIN

Combinaison radio-active. — Médication antibacillaire.

Composition. — Sels d'iode, camphre mentholé, terpènes et Bromure de Radium.

Présentation. — Ampoules de 1 cc., 12 ampoules.

Propriétés. — Bactéricide, exaltant la phagocytose.

Indications. — Tuberculose. Tous états infectieux.

Mode d'emploi et doses. — En injections intramusculaires ou sous-cutanées, région supérieure du bras et de préférence dans la région musculaire des fesses. — On injectera aux adultes une ampoule de 1 cc. et aux enfants au-dessous de 10 ans 1/2 ampoule de 1/2 cc. 30 injections quotidiennes consécutives ; continuer jusqu'à la 40^e, avec une injection tous les deux jours. On peut recommencer une seconde série après un intervalle de 15 jours à 3 semaines.

La boîte de 12 ampoules : 22 francs.

Laboratoires GAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

Téléphone : Invalides 12-63.

DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine.

Mode de présentation. — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0 gr. 25.

Mode d'action. — La « Dioséine Prunier » diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

Indications. — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1.. quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

DISMINE FAVROT

Capsules glutinisées

Composition. — Capsules renfermant la totalité des principes actifs, glucosides et alcaloïdes retirés par un procédé spécial du BUCHU (*Barosma betulina*) et 0,05 de Salicylate de Phényle.

Propriétés et indications thérapeutiques. — *Antiseptique, décongestif, sédatif, diurétique.*

Indiquée dans toutes les affections pyogènes et douloureuses de l'appareil urinaire : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyélites, Pyélo-néphrites, Coliques néphrétiques.

La Dismine Favrot n'irrite ni l'intestin, ni les reins et ne cause pas d'éruption.

Mode d'emploi. — Prendre dans un peu d'eau, sauf indication du médecin, 3 capsules le matin, 3 au déjeuner, 3 au coucher.

La Dismine Favrot a été expérimentée avec succès dans les hôpitaux.

Littérature et échantillons

Laboratoires Docteur H. FERRÉ

Docteur en médecine

Pharmacien de 1^{re} classe

Membre de la Société de Médecine de Paris

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

DISOLURANE " VELY "

Composition. — Granulé à base de :
Pipérazine, Hétraline (Dioxybenzohexaméthylentétramine), Benz. de soude, Benz. de lithine, Citrate de lithine.

Indications. — Antiseptique urinaire, uricémie, urisolvant énergique, antisepsie hépato-rénale, diurétique doux, arthritisme, acidification de l'urine.

Posologie. — 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures une demi-heure avant les repas, dans un demi-verre d'eau.

Laboratoires des Produits Vely.
132, avenue Victor-Hugo — PARIS.
Tél. : Passy 87-85.

DITHIOLÉINE

Crème de Lanoline dithiosalicylée

Propriétés thérapeutiques. — La *Dithioléine* est une crème de lanoline purifiée et désodorisée, dont le principe actif est le dithiosalicylate de zinc. Ce corps possède les qualités thérapeutiques afférentes à ces trois corps qui sont à la base des traitements non spécifiques des affections cutanées.

Indications. — Inflammations et infections cutanées, Erythèmes, Intertrigos, Eczémas, Brûlures, Ulcérations.

Mode d'emploi. — Étendre la *Dithioléine* en couche assez épaisse sur toute l'étendue de la lésion. Protéger cette application par un léger pansement.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie Pharmaciens
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

DIURÉGINE

Action. — Diurétique puissant et anti-albuminurique. Désinfectant urinaire.

Forme. — Cachets.

Formule. — Théobromine, 3 gr. 50 ; phosphate de soude, 0 gr. 25 ; acide gallique, 0 gr. 15 ; bleu de méthylène, 0 gr. 03. pour un cachet.

Indications. — Toutes les albuminuries et affections rénales. Rétention d'urine et urémie.

Mode d'emploi. — 2 ou 3 cachets par jour.

Prix. — La boîte de 30 cachets : 18 francs (exempt d'impôt).

Vente autorisée aux Assurés Sociaux.

Echantillons et littérature :

Laboratoires V. CHARRET-TOMASI
SAINT-JUST-SUR-LOIRE (Loire).

DIURÈNE

(Extrait total d'Adonis Vernalis.)

Formes. — Liquide. Pilules.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique cardiaque et diurétique. Adjuvant inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Contient tous les principes actifs de l'Adonis.

Indications. — Indiqué dans tous les cas d'Arythmie, d'Asystolie, d'Œdème, dans toutes les Affections du foie, Néphrites, Artério-Sclérose.

Posologie. — 2 à 6 cuill. à café ou 4 à 12 pilules par 24 heures

Prix de vente au public :

Liquide : 15 francs ; pilules : 12 francs.

Laboratoires CARTERET
15, rue d'Argenteuil — PARIS.

DIURÉTIQUE GMET

Composition. — Extrait *total*, liquide et sans alcool de la pulpe d'oignon cru.

Propriétés. — Diurétique puissant et jamais contre-indiqué.

Indications. — Oliguries diverses : Pneumoniques, cardio-rénaux, brightiques, grippés, etc.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu de liquide. Ces doses en général suffisantes peuvent être augmentées.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

DIUROCALCINE GROS

Association Calcium-Théobromine.

Indications. — Diurétique cardio-rénal.

Propriétés. — Pouvoir diurétique exalté. Tonique et régulateur cardiaque. Innocuité et tolérance parfaites.

Posologie. — 3 à 5 comprimés par jour.

Prix : 10 fr. les 24 comprimés à 0 gr. 50.

DIUROCALCINE IODURÉE

Indications. — Sclérose rénale et tous troubles physiologiques survenant après la quarantaine.

Dose. — 3 à 5 comprimés par 24 heures.

Par comprimé : Iodure de Potassium, 0 gr. 10 associé à 0 gr. 50 de DIUROCALCINE.

Laboratoire GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

DMELCOS

Stock-vaccin anti-chancrelleux.

Emulsion de cultures de bacille de Ducrey, injectable exclusivement par la voie veineuse.

Indications. — **Chancre mou et ses complications : Bubon, Phagédénisme, Diagnostic de l'affection par cuti-réaction, Paralyse générale (pyréthérapie).**

Présentation et mode d'emploi. — Série de 6 ampoules à doses croissantes.

Une injection intraveineuse tous les trois ou quatre jours.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

DOHYFRAL

Vitamine D. cristallisée.

Composition. — Vitamine D. pure, cristallisée, incorporée au beurre de cacao dans des pastilles de chocolat. Chaque pastille renferme 0 mmgr. 04 (4 centièmes de milligramme) de Vitamine D. cristallisée.

Propriétés thérapeutiques. — Action catalytique puissante du calcium et du phosphore. Médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme calcique.

Indications. — Prévient et guérit les différentes formes du rachitisme. Troubles et retard de l'ossification. Déformations squelettiques : genu valgum, genu varum, ostéomalacie. Consolidation des fractures.

Rachitisme dentaire, trouble et retard de la dentition, carie dentaire.

Et en général tous les troubles par déficience phosphocalcaire (prétuberculose, grossesse), ainsi que les accidents d'ordre convulsif (tétanie) qui accompagnent souvent le rachitisme.

A titre prophylactique, on obtient les meilleurs résultats contre le rachitisme de l'enfant en prescrivant le DOHYFRAL pendant la grossesse et l'allaitement.

Avantages. — Traitement rapide et rationnel. Pureté absolue et sûreté du produit. Dosage rigoureux et facile. Innocuité, conservation pratiquement indéfinie. Facilité d'absorption et d'administration.

Posologie. — Les pastilles de chocolat DOHYFRAL présentent un trait central qui permet facilement leur division.

On conseillera à titre préventif : 1/2 à 1 pastille par jour. A titre curatif : 1 à 2 pastilles par jour.

Mode d'emploi. — Croquer la pastille (goût agréable). Pour les nourrissons l'écraser et la dissoudre dans du lait tiède (ne jamais porter à l'ébullition).

Laboratoires CORTIAL

15, boulevard Pasteur — PARIS.

DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon.

Composition. — Carbone-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

Formes. — Poudre, granulé et comprimés.

Propriétés. — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

Indications. — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose.*

Cure antidyspeptique. — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé, ou 6 à 10 comprimés.

Cures reminéralisantes, simple ou intensive — Voir fiche *Cenophos*.

DOLOMA INJECTABLE

Composition. — Citrophosphite Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

Propriétés. — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

Indications. — Epuisement du système nerveux, déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose, Cancer, Prophylaxie de la récurrence post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

Prix.

La boîte de poudre <i>Doloma</i>	18. »
— granulé <i>Doloma</i>	15. »
— 10 ampoules <i>Doloma</i>	15. »
— 100 comprimés <i>Doloma</i> ..	16. »

Communications : à l'Académie de médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Praticiens, mai 1920, etc., etc.

Littérature et échantillons sur demande à

Laboratoire général d'Études Biologiques

S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

DOLOPHOS

Composition. — Anhydroinositophosphate de Chaux et de Magnésie, Chlorure de Magnésium, Carbonate de Manganèse, Carbonate de Magnésie.

Mode d'action et avantages. — Le *Dolophos* constitue un médicament d'ionisation magnésienne renforcée, de conservation parfaite, se présentant sous forme de *granulé sucré agréable au goût*.

Indications thérapeutiques. — Affections gastro-intestinales et hépatiques, déminéralisation et asthénie, *arthritisme*, tumeurs bénignes et malignes, prophylaxie du cancer, *médication post-opératoire du cancer*. Affections de la peau.

Mode d'emploi. — Adultes : 3 à 5 cuillerées à café par jour ; enfants : 1 à 3 cuillerées par jour.

Prix : 12 fr. 50

Laboratoires du DOLOPHOS

59, 61, rue de Saint-Quentin — CAUDRY (Nord).

DOLYSINE

Goutte. — Rhumatismes. — Névralgies.

1° *Cachets.* — Acide phénylcinchoninique, 0 gr. 50. Puissant dissolvant de l'acide urique.

Doses. — De 1 à 4 grammes par 24 heures, puis doses décroissantes. Pas d'accoutumance. A prendre aux repas ou en même temps qu'une boisson alcaline (eau de Vichy).

La boîte de 12 : 9 fr.

2° *Topique.* — Chloral, Chloroforme, Menthol, Ether amylsalicylique en solution éthérée aromatisée.

Badigeonnages suivis d'enveloppements

Le flacon : 9 fr.

3° *Pommade.* — Même formule que ci-dessus avec excipient gras pour onctions douces et applications.

Le tube : 9 fr.

M. ROCHEREAU, Pharmacien
ex-interne des Hôpitaux de Paris
SALBRIS (Loir-et-Cher)

DOSURINE (TROUSSES)

LES EXAMENS D'URINES ET LE DOSAGE DES ÉLÉMENTS ANORMAUX (Sucre-Albumine)

sont grandement facilités par l'emploi des

« Trousse Dosurine »

qui assurent à ces examens la plus grande précision scientifique, permettent de les faire en quelques minutes.

Ces Trousse, sous la forme d'un petit livre facilement transportable, se présentent sous 3 modèles :

- 1° **Trousse Index** « *La Dosurine* » qui permet de déceler la présence de l'Albumine ou du Sucre.
- 2° **Trousse A** « *La Dosurine* » destinée à doser l'Albumine contenue dans l'urine.
- 3° **Trousse D** « *La Dosurine* » destinée à doser la quantité de Sucre (Glucose).

Prix de chaque trousse : 20 fr. (franco par poste : 21 fr. 30).

Ampoules de renouvellement :

La boîte de 10 : 9 fr. (par poste, 10 fr. 10).

La boîte de 20 : 16 fr. (par poste, 17 fr. 30).

Remise de 25 % à MM. les Docteurs.

Envoi franco notice sur demande.

LA DOSURINE, 16, rue Charlemagne — PARIS.

Chèques postaux n° 1352.39 Paris.

DRAGÉE ADRIAN

AU

CHLORURE DE MAGNÉSIUM

Préventive des Néoplasmes.

Dragées dosées à 121 milligr. de Chlorure de Magnésium Anhydre correspondant à 259 milligr. de Chlorure de Magnésium cristallisé.

Mode d'emploi. — 10 à 20 comprimés par jour.

ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle
PARIS (III^e)

DRAGÉES BENGUÉ AU MENTHOL

Composition. — Mentho-cocaïne et borate de soude ou menthol-borate de soude (sans cocaïne).

Indications. — Affections de la gorge, pharyngites, laryngites, angines, faiblesse de la voix, antisepsie de la bouche.

Mode d'emploi. — 8 à 10 dragées par jour. Laisser fondre dans la bouche.

Docteur BENGUÉ

Pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

DRAGÉES DU Dr GELINEAU

Flacons de 100 et de 50 dragées.

Composition :

Bromure de potassium associé à l'arsenic et à la Picrotoxine.

Indications thérapeutiques :

Epilepsie, Affections nerveuses.

Posologie :

Par dragée :

Kbr..... 1 gramme.

Arsenic..... 1 milligr.

Picrotoxine..... 1/2 milligr.

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.

(Doses supplémentaires en cas de besoin.)

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire J. MOUSNIER-DELERME

9, bd Carnot — BOURG-LA-REINE (Seine).

DRAGÉES ELKIN

GRANULES ELKIN

**Digestives, Cholagogues, Laxatives,
Bile, Soufre, Pancréatine.**

(Sans aucun drastique.)

Indications thérapeutiques :

Digestions incomplètes, Douleurs post-prandiales.

(Voir **ELKIN**
page 339.)

DRAGÉES

FERRO-ERGOTÉES MANNET

Composition :

Ergot de Seigle	5 centigr.
Fer	10 —

Par dragée.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause. Ménorragies de la puberté. Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 dragées par jour avant les repas.

Laboratoire MANNET
LOUDUN (Vienne)

DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer).

Propriétés. — Associent les qualités antispasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui répond à cette indication :

Calmer sans affaiblir,

Reconstituer sans exciter.

Indications. — Chloro-Anémie, Nervosisme.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de « Sirop ».)

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

DRAGÉES LEBRUN TONI-CARDIAQUES

Composition.

Strophantus	0,01	pour une	dragée.
Spartéine.....	0,01	—	—
Caféine.....	0,06	—	—
Ext. de Scille	0,04	—	—

Propriétés thérapeutiques. — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Régulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

Indications. — Insuffisance cardiaque, Asystolie, Maladies mitrales, Œdèmes cardiaques, Myocardites.

Posologie. — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

Laboratoire LEBRUN

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX^e).

Téléphone : Trudaine 50-34.

DRAGÉES LUMEVAL

Sédatives, antispasmodiques.

Composition. — Pilules glutinisées renfermant :
 Extrait stab. de Valériane..... }
 Passiflore..... } ââ
 Crataegus } 0 gr. 03
 Butylethylmalonylurée (Syn. Soneryl) ... }

Indications. — Troubles d'origine nerveuse, Insomnies, Agitation, Anxiété, Syndromes Neurasthéniques en général, Palpitations et Troubles cardiaques spasmodiques.

Posologie. — Jusqu'à 7 dragées par jour ; dose moyenne, 2 à 4 par jour. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 27-2.

Prix : 15 francs le flacon de 42 pilules.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS.

Descouraux et Fils, Pharmaciens.

Docteur en Pharmacie.

DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES « YSE »

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée), Nux vomica-Kola-Guarana.

Indications et propriétés thérapeutiques.

— Spécifique de la Neurasthénie, du *surmenage intellectuel*, des *déppressions physique, cérébrale* et des états adynamiques et asthéniques.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). —

Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Les dragées névrosthéniques « Yse » se font sans sucre pour les diabétiques. *Formule B.*

60 dragées par flacon. Prix : 13 fr.

Laboratoire « YSE »

H. Chatelut, pharmacien

65, rue Louis-Blanc — PARIS (X^e).

DRYCO

Lait sec.

Activé par les rayons ultra-violets.

Analyse approximative :

Matières grasses.....	12	p. 100.
Sucre de lait.....	46	—
Matières azotées	32	—
Sels	7	—
Eau	3	—

Indications. — Lait rigoureusement pur, partiellement écrémé.

Pour nourrissons : digestibilité et assimilation parfaites, supprime vomissements et troubles intestinaux.

Pour adultes : régime de suralimentation, affections du foie et de l'estomac.

Doses. — Dilution normale : une cuillerée à soupe arasée de poudre non tassée dans 50 centilitres d'eau bouillie chaude.

A modifier suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

Sucre comme pour le lait ordinaire.

Préparer sans cuisson.

Société Française du Lait Sec DRYCO

5, rue Saint-Roch — Paris (1^{er}). — Central : 25-29.

DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,
extrait de porc vivant.

Procédé du D^r HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

Indications. — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

Doses. — *Adultes :* 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café avant chaque tétée ou prise d'aliments

Adresser toutes demandes :

Laboratoire

de Physiologie du PUIITS d'ANGLE

Le Puits d'Angle — LE CHESNAY (S.-et-O.).

Représentants pour la Belgique :

M. MICHAUD

23, rue Plantin — BRUXELLES.

DYSTHÈNE

Médication tonique et régulatrice, forme gouttes.
Complexe phosphorique et magnésien.

Indications. — Syndromes d'hypotonie, Dépressions, Asthénie, Fatigue, Faiblesse générale, Diminution de l'activité physique et cérébrale, Inaptitude au travail.

Emploi et Doses. — *Adultes* : XL gouttes au total par jour, en deux fois, aux repas, dans un peu d'eau.

Vieillards : XXX gouttes au total par jour.

Enfants : De 7 à 12 ans : VIII gouttes par jour
De 12 à 16 ans : XII — —
De 16 à 18 ans : XX — —

Prix : 18 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

**Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique
appliquées**

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

ECZÉDA

Ichtyosulfosalicylée.

Pommade polyréductrice, ne déterminant jamais de poussées secondaires. C'est à son excipient spécialement étudié qu'elle doit son grand pouvoir absorbant et ses qualités d'épidermisation.

Propriétés thérapeutiques. — Dermatoses suintantes et aiguës et plus spécialement Dermatoses prurigineuses, qui sont améliorées presque immédiatement.

Indications. — Eczémas sous leurs différentes formes ; Dermatoses des nourrissons, Prurits, Erythèmes, Dartres, Brûlures, Intertrigo.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV^e).

ECZOSEC

Pâte adhésive sans corps gras.

Propriétés. — Étendue sur l'épiderme, sèche en quelques instants, constituant ainsi un pansement souple et adhésif, ne nécessitant l'emploi d'aucune bande, ni tarlatane.

Eczosec n'est pas un vernis. Étendue en couche mince, elle permet la perspiration.

Indications. — Dermatoses sèches. Eczémas. Prurits. Dartres. Erythèmes.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV^e).

EDISTOL

Composition. — Acide borique, tartrique, citrique : menthol, huile de Pinus sylv., gaiacol, terpinéol, pinéol, cinéol, Styrax benz.

Indications. — Toutes affections et antiseptie des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

Mode d'emploi. — *Gargarismes* et bains de gorge : 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

Fumigations ; 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau bouillante.

Vaporisations ; 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

Bain nasal ; 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Echantillon sur demande.

Prix : G. M., 13 fr. ; P. M., 8 fr. 75
(exempt d'impôt).

Laboratoire R. O. L.

(Spécialités oto-rhino-laryngologiques).

H. DUFOUR, Pharmacien de 1^{re} classe,
Anc. interne des hôp. de Paris,
40, rue des Carmes — ORLEANS (Loiret).

EKTOGAN BOCQUILLON

Poudre composée à base de ZnO^2 traité, sans odeur ni couleur, se prêtant à toutes les formes de pansements.

Sa formule est : $2(\text{Zn}^2\text{C}^{12}\text{O}^{25}\text{G}^{22})$.

Propriété. — Dégage d'une façon lente et continue de l'oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec un ferment ou un acide organique quelconque (sang, pus, transpiration, moiteur, salive, etc.).

Indications. — En chirurgie, Gynécologie. Obstétrique, Dermatologie, Brûlures, Crevasse.

Formes. — Poudre, Pommade, Pâte, Emplâtre, Gazes. *Méchettes* pour Nez et pour Oreilles, *Ovules* et *Plura-bandes* pour gynécologie.

Laboratoire des
PEROXYDES MÉDICINAUX
12-18, rue Lamartine — PARIS.

ÉLASTOPLASTE

Emplâtre élastique adhésif, sous les formes suivantes :

Elastoplaste pour plaies, avec compresse au dermatol. Dim. : 4 × 4, 6 × 6, 8 × 8 cm., etc...

Elastoplaste pour doigts, avec compresse au dermatol.

Elastofuron, pour furoncles.

Elastoplaste pour plaies variqueuses :

2 1/2 m × 8 cm.;

pour pied bot : 2 1/2 × 3 cm.;

pour extension continue, etc. : 2 1/2 × 6 ou 8 cm.;

pour pansements en bandes ajourées et pleines :
1 m. × 3 à 20 cm. ; 2 1/2 m. × 3 à 20 cm.

Laboratoires FISCH et Cie

4, rue d'Ilzach, MULHOUSE.

Dépôt : 49, rue de Paradis — PARIS (X^e).

ÉLATINE BOUIN

Provient du traitement du Goudron de Sapin de Norvège

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Dose et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

A titre préventif. — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à dessert par verre de liquide.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphysème, asthme) ; de la vessie et des reins (cystites, pyérites, gravelle).

Laboratoire FAGARD

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.
Pharmacie Derneville, 66, boulevard de Waterloo,
BRUXELLES.

ELBON CIBA

Cinnamoyl-p-oxyphénylurée.

Antipyrétique doux, d'action durable, pour le traitement des pyrexies tuberculeuses et des catarrhes infectieux des voies respiratoires. Se décompose avec mise en liberté d'acide benzoïque qui réalise la benzoïlisation continue de l'arbre broncho-pulmonaire.

Indications. — Tuberculose pulmonaire fébrile. Catarrhes pulmonaires et toutes affections bronchiques fébriles.

Doses. — 2 à 4 comprimés par jour. Commencer par la dose forte pour l'abaisser ensuite progressivement à mesure que la courbe thermique descend.

Le tube de 20 comprimés : 18 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

ELGINE JULIEN

Comprimés.

Composition :

Collargol argent colloïdal	0,05 cent.
Benzoate de soude	0,40 —
Urotropine française.....	0,20 —
En comprimés se dissociant rapidement.	

Indications. — Maladies infectieuses aiguës, Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites), Diathèse urique (rhumatismes, goutte, lithiase).

Posologie. — *Adultes* : 3 à 6 comprimés par jour.
Enfants : 1/2 dose. Avaler avec une infusion ou dissoudre dans de l'eau.

Prix : 12 fr. 50. — Boîte gratuite sur demande.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris
105, rue de Rennes — PARIS (VI^e).

ELIXIR BONJEAN

Composition. — Ether et plantes aromatiques.

Mode d'action. — Tonique puissant des voies digestives.

Indications. — Troubles de la digestion par hypofonction, gastropathies d'origine nerveuse, diarrhée de l'adulte et des enfants, choléra infantile, grippe intestinale.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur après les repas ou au moment des douleurs. Renouveler une demi-heure après.

Enfants : Demi-dose.

Prix :

Le flacon : 16 fr. Le demi-flacon : 8 fr. 50.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} classe

AIX-LES-BAINS

ÉLIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

Composition. — Hamamelis virg., Capsicum bras., Æsculus hip.

Indications. — Dilatation des veines, Varices, Varicocèles, Hémorroïdes, Phlébites, Accidents congestifs de la puberté et de la ménopause.

Mode d'emploi. — Un petit verre à liqueur après chaque repas.

Produits NYRDAHL

12, rue de la République
PUTEAUX (Seine).

ÉLIXIR DUCHAMP

Assurances Sociales. Accepté par la Commission.

Composition. — Extrait d'eaux de Foie de Morue, Quinquina, Arrhénal et Phosphates. Cacao vanillé.

Propriétés thérapeutiques. — D'un goût exquis, apéritif puissant, tonique, reconstituant et hématopoiétique, l'*Elixir Duchamp* remplace avantageusement l'huile de foie de morue, les amers et les fortifiants.

Indications. — Tous états de faiblesse physique ou intellectuelle. Manque d'appétit, Grippe, Tuberculose, Rachitisme, Convalescence. Lymphatisme, Scrofule, etc.

Dose. — 1 verre à liqueur (enfants, 1 cuillère à soupe) un quart d'heure avant les repas. Pur ou avec de l'eau.

Prix : 20 fr. le flacon de 350 cc.

Laboratoires C^{te} RENÉ de GRAUWE, 

Pharmacien de 1^{re} classe,

16, rue de Rocroy, PARIS — Usine à Saint-Denis.

ÉLIXIR DUCRO

Ecorces d'oranges amères. Hypophosphite : 10 cgr. par 15 gr. d'élixir.

Tonique *antianorexique* très agréable : asthénie, convalescences, états consomptifs, sénilité, grossesse : 1 cuil. à soupe ou 1 verre à liq., selon l'âge, étendu d'un peu d'eau, avant ou entre les repas.

Eupeptique, euphorisant : mêmes doses, pur, après les repas.

Action *d'épargne* : pneumonie, maladies infectieuses adynamiques : 1 cuil. à café ou à soupe, selon l'âge, chaque 2 heures.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS.

ÉLIXIR DU D^r MIALHE

Préparation. — Suc gastrique complet.
— Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années. ⁹
(*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où le suc gastrique fait défaut : Dyspepsies ; douleurs nerveuses ; digestions lentes et difficiles ; vomissements incoercibles de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche immédiatement après le repas ; demi-dose pour les enfants.

Laboratoire du D^r MIALHE
8, rue Favart — PARIS.

ÉLIXIR DUSSAUD

Véritable suc digestif.
Aliment complet de surassimilation.

Composition. — Pepsine, diastase, pancréatine, en milieu alcalin de lactates et de sels de Vichy.

Propriétés. — Transforme les albuminoïdes en peptones assimilables, les matières amylacées en glucoses ; émulsionne et saponifie les corps gras.

Indications. — *Eupeptique puissant*, réveille l'appétit et facilite la digestion. *Régulateur parfait* des fonctions intestinales, combat la constipation et la diarrhée, même chez les enfants. *Agent d'une assimilation intégrale*, se prescrit dans tous les états de carence : anémie, convalescences, athrepsie infantile, hypogalactie.

Mode d'emploi. — 1° *Premier âge* : 1, 2 ou 3 cuillerées à café (dans un peu d'eau bouillie sucrée). — 2° *Enfants* : 2 ou 3 demi-verres à liqueur. — 3° *Adultes* : 4 à 5 verres à liqueur.

Par jour et après le repas ou les tétées.
Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoire de l'ÉLIXIR DUSSAUD
52, rue de Rome — MARSEILLE.

ELIXIR EUPEPTIQUE TISY

Composition. — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

Avantages. — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

Indications thérapeutiques. — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, athrepsie, vomissements.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur au début, ou à la fin de chaque repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoires VAUDIN et GUILLAUMIN

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS.

ÉLIXIR FERRO-ERGOTÉ MANNET

Composition :

Ergot de Seigle 5 centigr.

Fer 10 centigr.

Par cuillerée à café.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté. Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les repas.

Laboratoires MANNET

LOUDUN (Vienne).

ELIXIR GODFRIN

Formule. — Teinture de simarouba, 7 gr. 50 ;
Teinture de grenadier, 7 gr. 50 ; Elixir parégo-
rique, 12 gr. ; Sirop de cachou, 40 gr. pour
125 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-dysentérique,
Astringent, Sédatif.

Indications. — Diarrhées de toute nature, Enté-
rites et entéro-colites, Dysenteries amibienne et
bacillaire.

Mode d'emploi. — *Cas aigus.* — Prendre toutes
les 2 heures : *Adultes* : 1 cuillerée à soupe. —
Enfants de plus de 10 ans : 1 cuillerée à dessert. —
Enfants de 6 à 10 ans : 1 cuillerée à café. Ne pas
donner au-dessous de 6 ans.

Cas chroniques. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe
par jour, loin des repas.

H. PERIGNON

Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

6, rue de Paris — JOINVILLE-LE-PONT.

ELIXIR GREZ

Chlorhydropepsique.

Spécialement préparé pour combattre l'*insuffisance gas-
trique* sous toutes ses formes.

A base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs.
Son action doit être recherchée dans tous les cas où
les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes,
depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuf-
fisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas
précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles secré-
toires.

Joignant l'utile à l'agréable.

Il est employé dans le monde entier et universellement
apprécié par le corps médical. Le nombre des Docteurs
qui emploient l'Elixir *chlorhydropepsique* pour leur
usage personnel augmente de jour en jour. C'est pour
nous la meilleure preuve de la qualité de notre produit
et de son efficacité.

Posologie. — Un verre à liqueur après chaque repas.

Prix : 18 francs.

Dépôt général :

Laboratoire de l'ELIXIR GREZ

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

ÉLIXIR HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

Titrage. — Par cuillerée à soupe : 0,007 Bi-iodure de mercure. — 0,075 Iodure de potassium.

Originalité. — Excipient spécial à base de Miel, lui procurant un *goût très agréable*, et une parfaite *tolérance* pour l'estomac.

Présentation dissimulée. — Aucune indication de maladie, ni de nature de médicament.

Posologie. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe au début ou au milieu des repas.

Enfants de 9 à 14 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

— de 5 à 8 — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 — 1 à 2 — — —

A prescrire. — Par périodes de 20 jours, intercalées de préférence entre deux périodes de 20 jours de suppositoires Hymel.

Indications. — Traitement d'entretien de la Syphilis, Imprégnation mercurielle (entre les séries de piqûres). Hérédo-syphilis. Dermatoses.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen, PARIS.

ELIXIR IODÉPURATIF PÉPIN

Médication mercurielle active préparée sous une forme à la fois tonique et agréable permettant de remédier en grande partie aux effets débilants de la médication mercurielle.

Composition. — Bi-iodure de mercure solubilisé par l'iodure de sodium, Teinture de cacao, Teinture de vanille.

Indications. — Traitement d'usage. Traitement de l'hérédo-syphilis chez les enfants et les adolescents. Le traitement par excellence pour la femme enceinte.

Médication infantile. — Sirop iodépuratif PÉPIN, parfumé aux sucres de fruits (mêmes caractéristiques).

Mode d'emploi :

Adultes : Une cuiller à soupe, soit 1 cgr. de bi-iodure.

Adolescents : Une cuiller à entremets, soit 1/2 cgr. de bi-iodure.

Enfants : Une cuiller à café, soit 1/4 cgr. de bi-iodure.

Administration. — Toujours au début du repas (condition la plus favorable à une tolérance parfaite).

Prix : 18 francs.

Nota. — Le conditionnement de ce produit ne porte aucune indication concernant sa composition ou son emploi thérapeutique.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS.

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

ELIXIR SPARK

Composition. — Extrait fluide composé d'espèces amères stomachiques et digestives. Au complexe végétal obtenu par des lixiviations successives il est ajouté une quantité de glycérine et d'alcool strictement suffisante pour assurer une stabilité et une conservation parfaites ; le produit final, d'une amertume aromatique, possède une saveur agréable et franchement apéritive.

Propriétés thérapeutiques. — *Affections du foie* : gastro-hépatite, insuffisance biliaire, congestion du foie, lithiase biliaire.

Affections de l'estomac : dyspepsies, stases gastriques, dilatations stomacales ; atonie des voies digestives ; *Affections de l'intestin* : entérites, ballonnement abdominal ; constipation et ses conséquences.

Pas de contre-indications.

Doses. — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau pure ou sucrée, avant ou après les deux principaux repas.

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE :

LABORATOIRES NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS.

ELIXIR SPES DU D^r GUIRAUD

Ex-pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Composition de l'Elixir. — Iodure double d'Arsenic et de Mercure. Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologiquement assimilable au *Sirop de Gibert*.

Une cuillerée à soupe contient exactement :

I.....	0,008	} correspondant à {	0,01 Biiodure Hg. 0,005 Iodure As.
Hg.....	0,006		
As.....	0,001		

Très agréable à prendre.

Indications. — *Syphilis et Hérédo-syphilis*. Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

Doses : { De 1 à 3 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.
De 3 à 7 ans : 2 cuillerées à café par jour.
De 7 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.
De 15 à 20 ans : 3 cuillerées à dessert par jour.
Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

A prendre au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau. Se servir du verre gradué qui accompagne chaque flacon.

Observation importante. — Présenté comme tonique et modificateur, l'Elixir Spes ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure. Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix : 18 francs.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e) — Tél. Marcadet 37-98.

ELIXIR THIOGAIACOLÉ ARQUEVAUX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des
Médicaments sous le n° 439-1, en vue de la possibilité
de prescription aux Assurés Sociaux.

Composition. — Thiogaiacol crist. pur, 0,15 ; Extrait
Thébaïque, 0,0025 ; Codéine. 0,01 ; Bromoforme,
solut. offic., 0,20 ; Teint. Rac. Aconit et Teint. Belladone
titre int., àà XI gouttes = 0,20 ; Benz. Sodique et
Drosera, àà 0,25 ; E. d. Laur.-Cerise t. int., 1 gr.,
véhicule : Elixir de Polygala au Garus, Q. S. pour 15 cc.

Forme. — Liquide.

Indications. — Antiseptique eupnéique cicatrisant
des voies respiratoires. Enrouement. Bronchite et
Toux chroniques. Tuberculose, Asthme. Catarrhes.

Posologie. — Adultes : selon les cas, 3 à 5 cuil-
lerées à dessert ou à soupe par jour, entre les repas,
pures, suivies d'une tasse de tisane très chaude.

Prix du flacon de 210 cc. : 15 francs sans impôt.

Laboratoires ARQUEVAUX ⚗,
Pharmacien à Etampes (S.-et-O.).

ELKIN (Dragées) ELKIN (Granules)

Digestives — Cholagogues — Laxatives.
(Sans aucun drastique.)

Composition.

Adultes.

Bile.....	}	ââ 0 gr. 05.
Soufre		
Pancréatine.....		

Par pilule dragéifiée.

Enfants.

Bile.....	}	ââ 0 gr. 01.
Soufre		
Pancréatine.....		

Par granule.

Indications thérapeutiques :

Digestions incomplètes. Somnolence. Ballonnement. **Douleurs post-prandiales.** Pesanteurs après les repas. Insuffisance hépato-biliaire. Insuffisance pancréatique. Dermatoses hémoclasiques. Rougeurs de la face. Urticaire. Eczéma. Acné juvénile.

Présentation :

Deux formes pharmaceutiques :

Pour les adultes : forme Dragées.

Une ou deux pendant ou après les deux principaux repas (avaler sans croquer).

Pour les enfants : forme Granules.

Deux à quatre par repas (à prendre dans un dessert, compote, confiture, etc.).

Remarque. — Par procédé spécial de fabrication, les Dragées et Granules Elkin sont inaltérables à l'air et solubles dans l'estomac.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

ELZÉVIR-DENTITION

Collutoire spécifique et puissant de la première dentition.

Composition. — 1° Borate de soude (antiseptique et astringent), drosera et safran (sédatifs locaux);

2° *Hamamelis virginica*. Base de l'Elzévir-dentition (1/5 du poids total). A cette dose l'*Hamamelis Virginica* est un *vaso-constricteur puissant* (muqueuse congestionnée) et un topique remarquable (douleurs de la poussée dentaire).

Mode d'emploi. — En frictions douces avec la pulpe du doigt sur les gencives douloureuses. Adopté dans les services d'enfants des hôpitaux.

Littérature et échantillons au Corps médical et à M^{mes} les sages-femmes.

Laboratoire H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

EMBROCATIION SALAS

Sans acide.

Composition. — Gomme adragante, térébenthine, alcool à 90°, extrait de *Capsicum*, glycérine, origan, extrait de gingembre, thymol.

Indications. — Rhumatismes, goutte, sciatique, douleurs névralgiques, migraines, lumbagos, rhumes, maux de gorge, foulures, massages, consolidation de fractures, contractures musculaires.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne — PARIS

EMERSON'S BROMO-SELTZER

(The Emerson drug Company, Baltimore).

Indications :

Céphalalgies, Névralgies, Action rapide.

Composition :

Citrate de soude, Acétanilide, Bromure de Sodium, Caféine.

Posologie :

Une cuillerée à café dans un verre d'eau, et boire de préférence quand le liquide est en effervescence.

Prix : 10 fr., 20 fr. et 40 fr.

Littérature et échantillons au Dépôt général :

PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

62, avenue des Champs-Élysées,
PARIS (VIII^e)

Téléph. : Élysées 22-52.

EMGÉ LUMIÈRE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale.

Constitution. — Thiosulfate magnésien (S^2O^2Mg).

Propriétés. — L'Emgé Lumière tonifie le système nerveux central et le système neuro-végétatif ; il est un antiseptique pulmonaire et bronchique.

Dès son contact avec le suc gastrique, il se décompose en : chlorure de magnésium, sulfuryle et soufre naissant.

L'Emgé Lumière, sous forme de comprimés, est un régulateur des fonctions digestives. Il combat les diarrhées du type lienterie post-prandiale, toutes les constipations, les toxémies d'origine intestinale ; l'anaphylaxie digestive et ses manifestations.

L'Emgé Lumière, sous forme de solution injectable, est aussi un stimulant des fonctions endo et exocriniennes du foie et surtout un médicament : antichoc (tous phénomènes anaphylactiques lui sont justiciables).

Doses. — Ampoules : d'une injection intramusculaire quotidienne à trois et quatre par semaine.

Comprimés : de 2 à 4 par jour, les avaler au milieu des repas.

Formuler : Boîte de comprimés d'Emgé Lumière.

— Boîte de 3 ampoules d'Emgé Lumière.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté — LYON.

EMPLATRES ROGÉ-CAVAILLÈS

Caoutchoutés, Adhésifs (formule de l'hôpital St-Louis).

Oxyde de zinc : Eczémas torpides, Lichénisation.

De Vidal : Furoncles, Impétigo, Folliculites.

Huile de cade : Psoriasis, Dermatoses squameuses.

Le tube. 10 francs.

Colopastre. — Bandes adhésives à l'Oxyde de zinc pour pansements : toutes dimensions.

Gaze anadhère. — Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies.

La boîte de 25 compresses : 18 fr. 50.

Laboratoire du **D^r R. CAVAILLÈS**

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

Détail : Ph^{ie} 116, boulevard Haussmann, et toutes pharmacies.

ENDOPANCRINE

Insuline Française.

Forme et composition :

ENDOPANCRINE : Tube de 5 cc. chaque cc. titré à 20 unités cliniques.

ENDOPANCRINE 40 : — — — — — 40 — —

ENDOPANCRINE 5 : Boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 5 unit. clin.

ENDOPANCRINE 10 : — — — — — 10 d —

Avantages. — La présentation en tubes permet de prélever le nombre exact d'unités que l'on désire injecter, le reste du tube conservant toutes ses propriétés.

La présentation en ampoules est d'un emploi plus commode pour l'insulinothérapie à faible dose.

Indications. — Diabète et ses complications. Acidose, Affections hépatiques, Angine de poitrine, Anémies pernicieuses, Artériosclérose, Artérites oblitérantes, Dénutrition chez l'adulte, Insuffisances cardiaques, Ménorragies d'origine ovarienne, Troubles parkinsoniens, Troubles trophiques des nourrissons, Ulcérations chroniques.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses.

Dose de début dans le diabète. 20 unités cliniques. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

Demandez nos notices :

La Thérapeutique du Diabète par l'Insuline.

Les applications de l'Insuline en dehors du Diabète.

Pour recevoir à titre d'échantillon le modèle de vente, en faire la demande en indiquant exactement le dosage que l'on désire recevoir.

Laboratoire de Thérapeutique Générale

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 26-87.

ENERGINE IODÉE DE BERCK

Bardane — Iode — Noyer — Arsenic.

Forme. — Sirop agréable.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

Indications. — Croissance, lymphatisme, scrofule, ganglions.

ÉNERGINE PHOSPHORÉE DE BERCK

Complexe opo-minéral nucléine.

Forme. — Granulée.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

Indications. — Convalescence, prétuberculose, faiblesse osseuse, asthénie, etc...

Laboratoire du Professeur PANCIER

G. RUIN, docteur en pharmacie,

21, rue Saint-Leu — AMIENS (Somme).

ENIODE LEFEBVRE

Composition. — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

Forme. — Comprimés kératinisés contenant chacun 1 centigramme d'iode en combinaison organique.

Propriétés thérapeutiques. — L'*Eniode* possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

Adultes : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Pharmacie GRIGNON
2, rue Duphot — PARIS.

ENTERIODE

Comprimés combinés d'IODE et d'hydrocarbures de Carbone donnant naissance dans l'intestin seulement à de l'IODE NAISSANT.

Propriétés thérapeutiques.— Puissant désinfectant intestinal.

Facile à absorber, ne provoquant ni irritations ni iodisme
Spécifique de toutes les entérites et plus particulièrement des entérites infantiles.

Posologie.

Nourrissons : 3 fois par jour 1 comprimé écrasé dans un peu d'eau, de bouillon de légumes ou de lait.

Enfants : 3 fois par jour 2 comprimés à la fin des repas.

Adultes : 3 fois par jour 3 comprimés à la fin des repas.

Cures de 3 semaines à 1 mois, renouvelées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Laboratoires de l'Entériode.
39, rue de Clichy — PARIS.
Tél. : Trinité 65-16.

ENTÉRO-ANTIGÈNES

*Préparés d'après la méthode et selon les procédés de M. le professeur
DANYSZ de l'Institut Pasteur.*

Indications.

Maladies des voies digestives : Pharyngites chroniques, Constipations chroniques, diarrhées, intoxications alimentaires, dyspepsies, colites, entérocrites, dysenteries microbiennes (Shiga, Fleixner, etc.). Appendicite chronique et tous les troubles fonctionnels de l'intestin.

Asthme, Rhume des foins, Emphysème, Dyspnée provoquée par certaines odeurs, certaines substances alimentaires, les changements de température, etc.

Migraines, Neurasthénies.

Affections du foie : Insuffisances hépatiques. Cholécyctites aiguës ou chroniques non lithiasiques.

Maladies de la peau : Eczémas chroniques, Eczéma variqueux, Urticaires, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal, etc.), Maladie de Quincke, Psoriasis, Prurigo de Hébra, Furunculose, Acné juvénile, Folliculites.

Rhumatismes chroniques. Troubles de la ménopause.

Colibacillose, Cystites à colibacille.

Et dans tous les cas de *Dysharmonie endocrinienne*, soit par excès, soit par insuffisance.

Deux formes. — 1° Ampoules à injecter ; 2° Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules. Littérature sur demande.

Lab. F. DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV^e).

ENTEROBYL DEHAUSSY

Médication entéro-hépatique rationnelle.

Composition :

Cholérétiques : Chlorure de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Polypeptones (Drainage biliaire).

Antiseptiques : Héxaméthylènetétramine, Charbon animal pur (Désinfection intestinale et biliaire).

Indications. — Lithiase biliaire, Cholécystites chroniques, Congestion hépatique, Cirrhoses (alcool, paludisme), Ictère, Cholémie familiale.

Troubles digestifs et troubles divers d'origine hépato-biliaire : Constipation, Diarrhées, Migraines, Vertiges, Urticaire, Prurit.

Posologie et Formes. — Cachets. Granulé.

Drainage biliaire : 1 à 4 cuillerées à café, 1 à 4 cachets, le matin à jeun avec un demi-verre d'eau chaude ou une infusion. Rester étendu sur le côté droit un quart d'heure.

Tâter la sensibilité du malade en commençant par des doses faibles.

Cure d'entretien : 1 à 2 cuillerées à café, 1 ou 2 cachets, vingt minutes avant les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

66, rue Nationale — LILLE.

ENTÉROFAGOS

Bactériophages intestinaux polyvalents.

Composition. — Bouillon filtrat de bactériophages actifs contre les microbes que l'on trouve dans les infections intestinales.

Dose. — Ampoules à ingérer, 2 par jour, dans un peu d'eau bicarbonatée de préférence.

1 ampoule par jour pour les *enfants*.

Les bactériophages se distinguent par la rapidité de leur action et leur innocuité absolue.

Pas de réaction thermique, pas de choc.

Indications. — Entérites, colites, dysentéries bacillaires, typhoïdes, paratyphoïdes, diarrhées de type varié, constipation, fermentations intestinales, colibacilloses diverses, syndrome entéro-rénal d'Heitz-Boyer.

Remplace avantageusement les ferments lactiques pour le traitement des nourrissons.

Prix : la boîte de 10 ampoules : 18 francs.

la boîte de 5 ampoules : 10 francs.

Laboratoire de Biologie Médicale.

7, Avenue des Sources — NICE

ENTÉROHÉPATINE

Rééducateur opo-physiologique de l'Intestin.

Composition. — Ext. fl. intestinal, Extr. fl. pancréatique, Extr. fl. hépatique, Extrait salicaire, Teinture Belladone, Acide lactique.

Indications. — Toutes formes d'Entérites, Diarrhées, Dysenteries indigènes ou exotiques. Atonie intestinale.

Mode d'emploi et présentation :

Flacon pour *adultes* : 3 cuillerées-mesure par jour.

Flacon pour *enfants* (compte-gouttes) : 11 gouttes par année d'âge, 3 fois par jour.

ENTÉROHÉPATINE SB.

Même formule, moins la Teinture de Belladone.

Mêmes indications, mêmes doses.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoires Henri FOUCHER

77, boulevard de Grenelle — PARIS (XV°).

ENTÉROSEPTYL

Phosphate de B trinaphtyle, 0 gr. 05 par comprimé.

Dose. — 2 à 6 comprimés par jour à jeun.

Indications. — Diarrhées saisonnières, Intoxications alimentaires (gibier, crustacés, champignons), Entérites, Ictères, Urticaire, Colibacillurie, Rougeurs postprandiales, Fétidité d'haleine, Syndrome entéro-uro-génital.

Avantages. — Ne se décompose que dans l'intestin, n'irrite pas l'estomac, ni hépatotoxique, ni déminéralisant comme les ferments lactiques. Peut se prescrire aux enfants.

Dr BRUNERYE, Docteur en médecine.
10, rue Saint-Antoine — PARIS (IV^e).

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Vaccin antitypho-colique polyvalent
Vaccination antityphique par voie gastro-intestinale.

Constitution. — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth-coli-bacille, paratyphique A et B.) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants.

Propriétés :

Préventives : La durée de l'immunité est variable selon les individus, efficacité de même ordre que celle des vaccins s'administrant par voie sous-cutanée.

Pas de contre-indication, pas de réaction.

Curatives : Etats typhiques, paratyphiques et colibacillaires en cours d'évolution.

Doses. — Pour adultes, 4 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs ; 2 le matin et 2 le soir, aussi loin que possible des repas.
Pour enfants, demi-dose, soit 2 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs, aussi loin que possible des repas.

Formuler : Une boîte de 28 pilules d'Enterovaccin Lumière.

Les personnes soumises à la vaccination par l'Enterovaccin n'ont rien à changer à leurs occupations habituelles ni à leur régime normal.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté — LYON.

ENTÉROXIN LECLERC

Vaccin buccal polyvalent contre l'infection intestinale.

Composition :

Mélange de cultures atténuées de B. Coli, Entérocoque, Staphylocoque, autrement dit « bouillon vacciné », tenant en suspension les corps microbiens ci-dessus.

Présentation :

Ampoules de 10 cc. (boîtes de 8 ampoules).

Mode d'emploi et dose :

Le matin à jeun, 3/4 d'heure avant toute alimentation, bien agiter une ampoule et en absorber le contenu dans un demi-verre d'eau froide sucrée.

Aucune réaction à craindre. On peut donner 1 ampoule à un nourrisson, 2 à 3 ampoules à un adulte pour agir plus énergiquement, sans aucun inconvénient.

Durée du traitement : 10 à 20 jours par mois, à renouveler plusieurs mois de suite.

Il est recommandé de faire précéder l'Entéroxin d'un cholagogue léger (Magnétone).
(Voir ce mot, page 629.)

Prix : 25 francs.

ENTÉROCHIR LECLERC

L'ENTEROCHIR LECLERC est obtenu de l'Entéroxin Leclerc, filtré sur bougie, débarrassé des corps microbiens. Il est constitué par un bouillon vacciné polyvalent (Staphylocoque, B. Coli, Entérocoque) et est réservé aux usages chirurgicaux, instillations, lavages, etc.

Prix : 40 francs.

Littérature, échantillon sur demande :

Etablissements T. LECLERC

Docteur P. Lemeland, pharmacien
10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

ENZYPAN

Dragées réunissant la totalité des Enzymes digestifs : Pepsine, Diastase, Trypsine, Lipase et Bile associées. Médication digestive polyvalente pour tous les troubles par insuffisance d'un ou plusieurs ferments.

Bonne solution d'un problème ancien demeuré jusqu'alors sans solutions satisfaisantes.

Pas de cloison de gluten ou de kératine entre les ferments destinés à l'estomac et les ferments destinés à l'intestin. Trop souvent kératine comme gluten, ou se laissent attaquer par le suc gastrique ou traversent l'intestin sans libérer leur contenu.

Dans les dragées d'Enzypan la protection des enzymes intestinaux, pendant leur séjour dans l'estomac, est assurée, particule par particule pour ainsi dire, par l'enduit où elles baignent, et qui s'est révélé aussi bien inviolable par le suc gastrique que détruit par le suc intestinal, dès leur arrivée dans le duodénum.

Doses. — 2 ou 3 dragées au début ou pendant les repas. En cas d'hypochlorhydrie, certaine ou probable, prescrire conjointement :

Acide chlorhydrique officinal : X à XX gouttes pendant ou à la fin des repas.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). Tél. Laborde 08-00.

EPHÉDRINE NATURELLE BÉRAL

Alcaloïde extrait des Ephédras asiatiques à pureté contrôlée.

Propriétés générales. — Stimulant des terminaisons périphériques du sympathique et du métaganglionnaire. Stimulant du système musculaire lisse et du système nerveux central. Tonique du cœur périphérique. Vaso-constricteur local et général.

Actions spéciales. — Dilate les bronches. Arrête les spasmes bronchiques. Accélère la circulation de retour. Anti-choo. Dilate la pupille sans troubler l'accommodation. Décongestionne les muqueuses sans réaction vasodilatatrice.

Indications. — *Asthme. Crises asthmatiformes du Catarrhe chronique et de l'Emphysème.* — *Rhume des Foins.* — *Skeptophylaxie et Skeptothérapie* (Chocs thérapeutiques, sériques, anaphylactiques, opératoires etc) *Hoquet.* — *Mal de mer et des Rayons.* — *Enurésis.* — *Hyposympathicotonies.* — *Hypervagotonies.* — *Etats allergiques.* — *Rhinites.* — *Sinusites.* — *Obstructions nasales, etc.*

Pour prévenir les accès d'asthme ou les arrêter dès leur début :

Asthmes simples. — *Ephédroïdes Béral.* Comprimés à 3 centigr. d'Ephédrine naturelle.

1 comprimé le matin et 1 à 3 comprimés dès les premiers symptômes avant-coureurs d'un accès.

Asthmes chez les hypocardiotoniques. — *Ephédraféine Béral* (Comprimés d'). Comprimés d'Ephédrine caféinée à 3 centigr. d'Ephédrine. Posologie et mode d'emploi comme les Ephédroïdes.

Asthmes rebelles avec insomnie. — *Ephétropine Béral* (Comprimés d'). Comprimés d'Ephédrine, Caféine, Hyosciamine. barbit, à 3 centigr. d'Ephédrine. Posologie et mode d'emploi comme les Ephédroïdes.

Asthme infantile. — *Ephédromel Béral.* Sirop à un demi centigr. d'Ephédrine par cuill. à café. 1 à 8 cuill. à café suivant l'âge.

Pour doses fractionnées. — *Grains d'Ephédrine Béral.* Dosés à 1 centigr. d'Ephédrine par grain. 1 grain toutes les 3-4 heures.

Pour injections s.-cutanées veineuses ou musculaires. — *Ephédrampoules Béral.* Ampoules dosées à 3 centigr. d'Ephédrine par centicube. 1 à 3 centicubes par jour.

Pour juguler un accès déclenché ou un état de choc :

Adréphédrine Béral (Voir Adréphédrine). Ampoules à 1/4 mmgr. d'adrénaline et 2 centigr. d'Ephédrine par centicube.

1 à 4 centicubes sous-cutanés. Débiter par 1 cc.

Entre les accès et dans les états bronchiques chroniques :

Ephéiodrine Béral. Elixir à 3 centigr. d'Ephédrine et Lobélie iodurée ; par cuill. à café. Une cuill. à café le matin ou matin et soir.

Pour les applications externes : (Rhume des foin, Sinusites).

Ephédriol Béral. Hydrolat d'Ephédra à 3 p. 100 d'Ephédrine.

Oléophédrine Béral. Huile d'Ephédra à 2 p. 100 d'Ephédrine.

En pulvérisations nasales avec l'*Ephédrioseur Béral.*

Rhinodrops Béral. Capsules nasales à l'oléophédrine (Voir Rhinodrops).

Pour instillations nasales.

Ephédrops Béral. Poudre à priser à 3 centigr. d'Ephédrine par prise. Pour aspirations nasales.

Nydriédrine Béral. Ampoule. Compte-gouttes. Collyre à 4 p. 100 d'Ephédrine. Pour instill. conjonctivales.

Pour les applications chirurgicales.

Ephédraféine Béral. (Ampoules d') à 3 centigr. d'Ephédrine et 5 centigr. de caféine par cc.

En injections sous-cutanées 20 minutes avant la rachianesthésie.

Laboratoire de l'Ephédrine naturelle BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

EPICRAL

(Solution iodo-arséno-mercurielle (lactate) citratée).

Antisymphilitique, dépuratif et tonique très actif, de goût très agréable, bien toléré, présenté sans indication de sa nature mercurielle.

Composition. — Lactate mercurique, arséniate de soude, iodure de potassium, iode en combinaison organique, citrate de soude et extraits de plantes dépuratives. Chaque cuillerée à soupe contient 0 gr. 006 de lactate mercurique, 0 gr. 001 d'arséniate de soude, 0 gr. 005 d'iode, 0 gr. 100 d'iodure de potassium.

Originalité. — Emploi du lactate mercurique, bien toléré (surtout par les enfants) et très actif et du citrate de soude, qui, outre son action favorable sur les voies digestives, fluidifie le sang et les sécrétions et augmente l'action du mercure et de l'arsenic. Formule nettement tonique.

Indications. — Hérédosyphilis, prophylaxie pendant la grossesse, traitement d'entretien, particulièrement indiqué pour la femme enceinte, les enfants, les adolescents et les adultes vers la cinquantaine (troubles de croissance, troubles nerveux, hépatiques et digestifs, de la vision, de la circulation, états d'anémie, dermatoses, etc...). Se recommande en Pédiatrie.

Doses.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge, dans un peu d'eau.

Laboratoires G. LAMBERT

Docteur en Pharmacie.

6, rue de Longchamp — VICHY (Allier).

ERANOL

Iode colloïdal en suspension aqueuse.

L'*Eranol* ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode libre, à l'état colloïdal, en milieu aqueux, non caustique, ni toxique, même aux doses thérapeutiques élevées.

Propriétés. — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cet iode, l'*Eranol*, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, due à ses ions métalloïdiques, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa teneur en iode (10 p. 1 000), sa parfaite tolérance et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

Indications. — Lymphatisme, Hypertension, Rhumatismes, Prétuberculose, Tuberculoses torpides, mycoses, etc.

Forme. — Flacon, avec compte-gouttes.

Mode d'emploi et Posologie. — Au moment des repas ou entre les repas, dans une boisson quelconque : eau, vin, bière, etc.

Adultes : XX à L gouttes et plus, deux fois par jour. *Enfants* : V gouttes par année d'âge et par jour, en deux fois.

Prix au public : 13 fr. 75.

Laboratoire de L'ERANOL

45, rue de l'Echiquier — PARIS.

ERCERHINOL

Ampoule nasale à l'Argent Colloïdal.

Avantages. — Bactéricide puissant, Traitement *pratique*, rapide et propre.

Indications. — Grippe, infections broncho-pulmonaires, Catarrhe nasopharyngien, Coryza, Sinusite, etc.

Mode d'emploi. — Verser quelques gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, la tête inclinée en arrière.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

ERGORONE

Solution huileuse de vitamine D antirachitique titrée à 6.000 unités physiologiques par cent. cube, soit 200 unités pour une goutte.

Indications. — Rachitisme, Spasmophilie, Ostéomalacie, Déminéralisation dans la grossesse. Pendant la lactation, comme prophylactique contre le rachitisme de l'enfant. Etats précaires accompagnant les croissances déficientes.

Présentation et posologie. — Flacons de 15 cc.
Nourrissons : III à IV gouttes par 24 heures.
Enfants : VI à X gouttes par 24 heures.
Adultes : X à XX gouttes par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21. rue Jean-Goujon. — PARIS (VIII^e).

ERGOTINE LAMANTE

Traitement des hémorragies

Forme. — Gouttes et ampoules pour injections hypodermiques.

Composition. — Solution stabilisée et inaltérable de tous les alcaloïdes de l'ergot de seigle, obtenue par le procédé de fabrication spéciale de Lamante.

Indications. — Hémorragies de toute nature. Hémorragies utérines. Accouchements, Fausses-couches, Fibromes, Accidents de la Ménopause, Hémorroïdes, Crachements de sang, Saignements de nez, Leucorrhée, Troubles de la Puberté, Incontinence d'urine chez les enfants. Contre l'Asthme bronchique et la Toux quinteuse, en injections hypodermiques.

Doses et mode d'emploi. — XXX à XL gouttes par 24 heures chez les adultes en deux fois dans un peu d'eau sucrée XXX gouttes à la fois, 3 à 4 fois dans les 24 heures dans les très fortes hémorragies.

Enfants : 1/3 des doses ci-dessus.

Ampoules. — En injections hypodermiques : 1 ampoule comme préventif d'hémorragie après l'accouchement, ou dans les hémorragies légères. Deux ampoules consécutives dans les hémorragies abondantes. A répéter au besoin 2 à 3 fois dans les 24 heures.

Echantillon et littérature sur demande.

Le flacon gouttes : 12 fr. — La boîte 6 ampoules : 12 fr.

Enregistrés au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous les nos 346-5 et 346-6.

Marc PARIS, pharmacien de 1^{re} classe.

1 rue Lassalle — LYON (La Bourse) (IV^e).

ERYTHRA

DYN

La première et la seule chimiothérapie de la ROUGEOLE

Amidopyrine Lactique pure à pH 3,2

Solution titrée : une goutte = un centigramme.

Antithermique puissant, bien toléré par les nourrissons et les enfants, même à doses élevées.

Indications : Médicament de choix de la Rougeole :

Traitement abortif aux stades de début ;

Médication adjuvante à la période d'état ;

Thérapeutique préventive des complications.

Pyrexies aiguës : Fièvres éruptives, saisonnières et de croissance.

Algies : Migraines, névralgies, zona, tabès, grippe

Posologie : 1^o Dans la Rougeole :

faire prendre, sans interruption, toutes les 4 heures exactement :

Enfants : IV gouttes par année d'âge

Adultes : I à LXXX gouttes.

2^o Dans les autres fièvres et névralgies :

mêmes doses 3 à 4 fois par jour en dehors des repas.

Le flacon compte-gouttes : 18 francs.

Société d'Applications Pharmacodynamiques

5 et 7, rue Claude-Décaen — PARIS (XII^e).

Diderot 37-93.

ESCULÉOL

Composition. — Alcoolé concentré de Marron d'Inde frais, stabilisé.

Indications et propriétés. — Action vaso-constrictive sur le système nerveux périphérique et en particulier dans les cas d'hémorroïdes, varices, varicocèles, phlébites, stase veineuse, etc.

Supérieur aux préparations médicinales parce que concentré, stable et d'action constante.

Mode d'emploi. — **Hémorroïdes** : Administrer 2 fois par j. dans l'intervalle des repas XV gouttes d'Esculéol dans un peu d'eau. Dans les cas rebelles, graduer la dose suivant l'intensité des douleurs, en augmentant de V gouttes par jour. **Varices, varicocèles**, etc., toutes les fois que la médication devra être continuée pendant un certain temps administrer XV gouttes 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas, 20 jours par mois.

Prix : 14 francs.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

MICHEL DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

ESSOFORME

Essoforme simple. — Essences végétales antiseptiques *non caustiques*, solubilisées dans l'huile d'amandes douces.

Flacon de 45 gr. avec compte-gouttes... 9 fr.

Boîte de rhino-capsules 10 fr.

Essoforme éphédriné. — Essoforme simple additionné de 1 p. 100 d'éphédrine.

Flacon de 20 gr. avec compte-gouttes... 18 fr.

Boîte de rhino-capsules 12 fr.

Indications. — Rhinorrhées, rhinites, sinusites. La forme éphédrinée sera réservée aux cas aigus ainsi qu'au traitement de l'*asthme* et du *rhume des foins*.

Mode d'emploi. — En gouttes ou en pulvérisations nasales.

Echantillons sur demande :

Laboratoires GUY SIMON

44, rue d'Inkermann — LILLE (Nord).

EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique pulmonaire)

Composition. — Eucalyptol 0,12 cgr. ; Gaïacol, 0,05 cgr. ; Acide phénique, 0,02 cgr. ; Camphre, 0,05 cgr. ; pour une ampoule de 1 cc., le tout dans une décoction huileuse de plantes balsamiques calmantes, spécialement étudiée et rendant *l'injection absolument indolore.*

Formes. — Amp. de 1, 2 et 5 cc. gaïacolées ou non gaïacolées. — Caps. glutinisées.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire. Anti-oxydant. Antithermique. Sédatif de la toux. Diminue et facilite l'expectoration.

Indications. — Toutes les affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Maladies infectieuses.

Posologie et mode d'emploi. — Sous la forme capsules : 6 par jour, 2 à chaque repas. En injections intra musculaires. Adultes : 1 à 5 cc. par jour. Enfants de 5 à 12 ans : $\frac{3}{4}$ de cc. ; 2 mois à 5 ans, $\frac{1}{2}$ de cc. Le flacon de 42 capsules : 11 francs. La boîte d'amp. : 18 francs

Laboratoire LEBRUN

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX^e).

Téléphone : Trudaine 50-34.

EUCHOL

Tonique Hépatique

Composition. — Extrait *stabilisé* des feuilles de la tige du *Cynara Scolymus* (Artichaut), 0 gr. 30 par comprimé.

Le seul ne contenant que de l'artichaut.

Forme pharmaceutique. — COMPRIMÉS DRAGÉIFIÉS.

Propriétés. — Tonique du foie.

Cholagogue.

Décongestionnant des tissus.

Diurétique puissant.

Innocuité absolue.

Action douce nécessaire dans les cas de crise.

Emploi dans les hôpitaux de Paris.

Remarque. — Le vocable « Artichaut » ne paraît pas dans la boîte vente.

Posologie. — 4 à 6 COMPRIMÉS à avaler par jour.

Etat chronique : **4 comprimés** (2 au moment des 2 principaux repas).

Etat de crise : **6 comprimés** (2 au moment des 3 repas).

Durée moyenne du traitement : 3 semaines.

Indications :

Ictère catarrhal

Cholécystite et angiocholite.

Toute insuffisance hépatique.

Troubles hépatiques des coloniaux.

Paludisme, cholémie familiale, **Cirrheses.**

Coliques

Congestions

Migraine

Constipation

Intoxication

Urticaire

} d'origine hépatique.

Prix au public : 16 francs.

Laboratoire MORELLET

J. MORELLET, pharmacien de 1^{re} classe,
ex-interne des hôpitaux de Paris,

BAGNOLES-DE-L'ORNE

Anciennement : 95, boulevard Magenta — PARIS.

EUFOSFYL "VELY"

Composition. — 1° *Ampoules* à 1 cc. à base de : Méthars. de soude, Phosphonucléate, Magn. Cacod. Glycéro-Phosphate, Caféine (Méthar. de Strychn. 1/2 milligramme). Phosph. de manganèse (ampoules avec et sans Strychnine). Indolores.

2° *Cachets*, à base de Splénine, Méthylarsin. sodique, Phosphonucléate de Chaux, Noix vomique, Glycéro-phosph. calcique, Phosphate tricalcique, Phosph. magnésium, Phosph. de manganèse.

Indications. — Reminéralisateur nerveux et tonique, surmenage, neurasthénie, asthénie, régénérateur des centres nerveux, impuissance, débilité sénile, hypotension artérielle et ses conséquences, stimulant des glandes endocrines.

Posologie. — *Ampoules* : 1 injection sous-cutanée par jour, pendant 24 jours.

Cachets : 1 à 4 cachets par jour aux deux principaux repas. Cesser pendant 8 jours et recommencer une nouvelle cure.

Laboratoire des Produits Vely

132, avenue Victor-Hugo — PARIS.

Tél. : Passy 87-85.

EUGALINE

Hygiène intime de la femme.

Propriétés thérapeutiques. — Comprimés antiseptiques et décongestifs.

Formule. — Sulfate de zinc, Acide salicylique, Naphtalate de soude, Trioxyméthylène, Oxycyanure de Mercure, Fluorure de Sodium, Acide benzoïque, Tanin à l'alcool, Chlorure de sodium, Acide citrique, Acide tartrique, Carbonate acide de Sodium q. s. p. un comprimé de 3 gr, Essence de Géranium rosat q. s. p. parfumer, Colorant rouge q. s.

Doses et mode d'emploi. — *Comprimés* : 2 comprimés par 2 litres eau bouillie chaude pour injections vaginales.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.

EUGASTROL

Charbon animal

purifié à l'alcool exempt de cyanure.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement spécifique des maladies de l'estomac, de l'intestin et du foie.

Indications. — Combat avec une efficacité certaine toutes les maladies de l'appareil digestif, gastrites, dyspepsies, gastro-entérites, cholecystite pure ou associée, colite muco-membraneuse, migraines d'origine gastrique, ulcères digestifs.

Formule. — Charbon animal pur lavé à l'alcool exempt de toute trace de cyanure, carbonate de chaux pur léger, hydrocarbonate de magnésium, sucre de lait, acide acétylsalicylique, mélangé, étuvé, tamisé, suivant procédé spécial.

Dose et mode d'emploi. — *En poudre* : 1 à 2 cuillerées à café après chacun des principaux repas.

En cachets : Un à la fin des repas.

Laboratoires BOUTROY

8, rue de Passy — PARIS.

EUGYNOL GRANDVAL

Composition :

Association d'extraits d'*Hydrastis-Hamamélis-Viburnum Gossypium*.

Propriétés thérapeutiques. — Il favorise la formation chez les jeunes filles, évite les palpitations et provoque l'élimination des toxines.

Vaso-constricteur par excellence ; il régularise la circulation du sang, décongestionne les organes, et apporte toujours un soulagement à la souffrance produite par la moindre affection des organes de la femme.

L'Eugynol permet d'enrayer la formation des Varices ; soit au moment de la grossesse, soit au retour d'âge.

Il rétablit la régularité des règles. Son usage à dose modérée finit par supprimer les douleurs qui accompagnent ou qui précèdent si souvent ce moment désagréable.

Indications thérapeutiques. — Complications du retour d'âge, telles que Varices, Hémorroïdes, Hémorragies, Flux sanguins de toute nature, Eruptions diverses, etc.

Dose. — XV à XX gouttes avant chaque repas. On peut aller jusqu'à XXX gouttes.

Le flacon : 10 fr. (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12, 14, rue Féry — REIMS.

EUMICTINE

Indications thérapeutiques :

Antigonococcique, diurétique, antiseptique, etc.

Affections des voies urinaires :

Blennorrhagie, Urétrite, Cystite, Pyélite, Catarrhe, Prostatisme, etc.

Traitement complet, sans aucun retentissement sur les organes, estomac en particulier.

Doses et mode d'emploi :

Capsules enrobées au gluten pur, contenant chacune 0,20 Santalol, 0,05 Salol et 0,05 Hexaméthylène — Tétramine : 8 à 12 par jour aux repas, ce qui constitue un traitement complet des affections urogénitales et prostatiques.

Prix de vente au public : 20 francs.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e)



EUONYMINE PAUL THIBAUT

Pilules d'Evonymine purifiée, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien Président de la Société de Pharmacie de Paris, Evonymine associée à l'extrait stabilisé de boldo. Le plus actif cholérétique et cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

Indications. — Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

Posologie. — Pilules dosées à 0,06 d'Euonymine et à 0,06 d'extrait de boldo. 1 à 3 pilules par jour, soit au dîner, soit au coucher.

Laboratoire R.-J. SOUDAN

Pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e)

Nota. — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreuses evonymines du commerce, prescrire toujours : *Pilules d'Euonymine Paul Thibault*.

EUPAVERYL PACHAUT

Chlorhydrate de Papavérine
chimiquement pur.

Indications. — Spasmes viscéraux, Asthme, Coqueluche, Déséquilibres vago-sympathiques.

Présentations :

Gouttes : X gouttes = 1 centigramme.
Ampoules : 1 cc. = 5 centigrammes.
Granules : 1 granule = 2 centigrammes.

Posologie :

Adultes : de 0 gr. 05 à 0 gr. 25 en doses fractionnées.

Enfants : 1 centigramme par année d'âge en doses fractionnées.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

Tél. : Laborde 16-72.

EUPEPTIQUE MONAVON

Composition. — Liqueur exactement dosée et renfermant par cuillerée à soupe :

Pepsine pure	0 gr. 12.
Diastase.....	0 gr. 15

Propriétés thérapeutiques. — Digère les viandes et les féculents.

Avantages. — Il supplée à l'insuffisance et à l'inactivité des liquides digestifs, et par là améliore la digestion, augmente l'absorption et l'assimilation et lutte efficacement contre l'amaigrissement.

Indications. — Digestions lentes et difficiles ; dyspepsies, gastralgies, crampes d'estomac, certaines formes de migraine, et tous les états de faiblesse que ces maladies produisent, tels que : amaigrissement, consommation, anémie, etc.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur pour les adultes, après chaque repas, pur ou mélangé d'eau.

Prix : 18 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14 rue Victor-Hugo — LYON.

EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement.

Composition et forme. — Sirop à base d'extraits de plantes et de Produits organiques : codeïne 0,02 + Teinture rac. aconit, 0 gr. 20 ; formiate sodique, 5 + sirop d'erysimum et d'aunée 100.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

Indications thérapeutiques et posologie. — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonie, trachéite, laryngite (simple ou chronique), 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants, ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.

EUPHORYL

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des dermatoses prurigineuses et affections anaphylactiques.

Formulé. — Hyposulfite de soude et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

Présentation. — 1° *Cachets* ; 2° *Ampoules* pour injections intraveineuses.

Indications. — a) *Dermatoses prurigineuses* : Eczémas secs et suintants. Prurits, érythrodermies, dermites médicamenteuses et professionnelles, psoriasis, toxidermatoses.

b) *Manifestations anaphylactiques* : Urticaire, migraines, œdème de Quincke, maladies sériques.

Posologie. — *Cas moyens* : 3 cachets par 24 heures, combinés à un traitement local approprié.

Cas aigus : Une injection intraveineuse bi-hebdomadaire, avec prise de 2 cachets les jours intercalaires.

Nota : Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 cc.

Produits du Laboratoire de Dermatologie de Paris
HOURQUET et VIENNE, Pharmaciens-Concessionnaires.

114, rue du Temple ; 18, Avenue Daumesnil — PARIS

Téléph. : Dorian 52-12.

EUPHYTOSE

Traitement phytothérapique des états anxieux
et des Dystonies du sympathique.

Forme. — Solution.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

Cratægus oxyacantha	31 centigr.
Extrait fluide passiflora incarnata	50 —
Alcoolature Ballota marrubium nigrum	98 —
Extrait fluide de Paullinia sorbilis	16 —
Extrait mou de Valeriana officinalis	12 —

Posologie. — De 1 à 3 cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Indications. — Angoisse et états anxieux, Insomnie anxieuse, Eréthisme cardio-vasculaire, Palpitations, Tachycardie, Angoisse précordiale, Vertiges, Spasmes viscéraux, Douleurs angineuses, Angoisse de la ménopause.

Propriétés thérapeutiques. — L'Euphytose est antispasmodique par la Ballotte. Elle est tonique cardiaque par le Cratægus oxyacantha. Par la passiflore, elle est sédative de tous les troubles nerveux ayant leur point de départ dans le sympathique. Elle modère l'excitabilité réflexe par la Valériane. Enfin, elle doit au Paullinia sorbilis (Guarana) une action tonique puissante, mais non excitante, action régulatrice qui produit cette euphorie spéciale, si appréciée après la phase d'angoisse qu'elle remplace.

L'Euphytose, d'autre part, n'entraîne aucune accoutumance ; ne s'accumulant pas, son usage peut être prolongé, et même alors elle n'arrive jamais à troubler le fonctionnement rénal ou à modifier l'équilibre de la tension artérielle. Enfin, elle est parfaitement tolérée par les voies digestives.

Pour toutes ces raisons, l'Euphytose représente le médicament parfait de la crise d'angoisse.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

Téléphone : Anjou 16-55.

EUPNINE VERNADE

à l'Iodure de Caféine stable.

Doses et mode d'emploi. — Une cuillerée à café matin et soir, au commencement des repas, mélangée dans 2 cuill. à potage d'eau, de lait ou de bière.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique, toni-cardiaque et respiratoire.

Indications. — Asthme, Emphysème, Oppressions, Bronchite chronique, maladies du Cœur et des Vaisseaux, Artério-sclérose, Hydropisies, Angine de poitrine, Intoxications, Urémie, suites de la Grippe.

Laboratoires DARRASSE

7 à 13, rue Saint-Maurice
NANTERRE (Seine).

EUPNOGÉNOL

Forme. — Élixir.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques. Oppressions et toutes affections des voies respiratoires.

Doses. — 4 cuillerées à café par 24 heures pour les adultes et suivant avis du médecin pour les enfants.

Prix du flacon : 16 fr.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par le laboratoire de
l'Eupnogénol.

F. VELLAY

Pharmacien de 1^{re} classe.

116, Avenue Berthelot
VIENNE (Isère).

EURECTOL

Deux formes : Pommade et Suppositoires.

Indications. — Hémorroïdes, Constipation, Prurit anal, Rectite, etc.

Composition. — Marron d'Inde frais stabilisé, Hamamélis. Orthoforme. Extraits biliaires et Nouveauté absolue : *Extrait spécial d'Arum triphyllum*, un spécifique de premier ordre.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnant. Calmant. Vaso-constricteur analgésique, antiseptique. Action rapide et sûre *loco dolenti*.

Dose et mode d'emploi. — Chaque soir, étant couché, introduire dans le rectum, soit de la pommade ou mieux de préférence un suppositoire. Continuer pendant 8 jours. Interrompre une semaine. Terminer le traitement par une nouvelle cure de 8 jours.

Crises aiguës : Traitement matin et soir.

Prix : 12 francs.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires J. PERROCHON

57, rue Origet — TOURS.

EUSKINE

1° *Crème EUSKINE* (Crème au Stéarate neutre).
Dermatoses irritables. Constitue une crème excellente d'entretien pour les peaux grasses. Remplace avantageusement la vaseline dans ses applications.

2° *Baume EUSKINE faible* (Pommade à l'Ichtyol et goudroline).

Dermatoses subaiguës, eczéma subaigu, eczématides, eczéma variqueux, eczéma anal et vulvaire, eczéma artificiel des mains.

3° *Baume EUSKINE fort* (Pommade au camphre, soufre, goudroline et ichtyol).

Dermatoses sèches, torpides, non inflammatoires. Eczéma chronique plus ou moins lichénifié.

Tubes de 10 fr.

Laboratoire RICHIER

7, avenue Marceau — PARIS.

EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée).

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique, sédatif, antialgique.

Indications. — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation, Dyspepsie nerveuse.

Mode d'emploi et dose. — *Comme sédatif* : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

Comme hypnotique : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

L'étui : 6 francs.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle.

Formule. — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Corps thyroïde	0 gr. 02
Muscle cardiaque	0 gr. 50
Parenchyme rénal	0 gr. 50
Iodotyrosine.....	0 gr. 05
Scille.....	0 gr. 06
Scammonée	0 gr. 04

pour une pilule.

Doses et mode d'emploi. — Deux à quatre pilules par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension, athéromateux, néphrite chronique hypertensive, cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension mesurable au sphygmomanomètre, et il compense cette hypotension en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

ÉVINE

OVULES ÉVINE

Composition. — Métaoxyphénol, acide orthoxybenzoïque, Para amino benzoate d'éthyle, tétraborate disodique, glycérine solidifiée, parfum antiseptique et désodorisant.

Indication. — Toutes affections gynécologiques, bartholinites et gonococcies, néoplasmes.

Posologie. — Un ovule le soir au coucher. Au préalable, prendre une injection tiède avec une solution de Poudre Évine. Renouveler cette injection le matin au lever.

POUDRE ÉVINE

Antiseptique, soluble (injections vaginales, lotions, compresses, bains).

Composition. — Saponine pure, acide orthoxybenzoïque. tétraborate disodique, fluosilicate de soude. Césarine, parfum.

Indication. — 1^o Hygiène féminine ; 1 paquet p^r lit, d'eau bouillie tiède, en injections et lotions. — 2^o Gynécologie, leucorrhée, Vulvite, prurit : 2 à 3 paquets p^r 2 lit. eau bouillie (injections, lotions, compresses). précieux adjuvant aux pansements médicaux. — 3^o Obstétrique (même posologie qu'en gynécologie). — 4^o Hygiène masculine : 1 paquet p^r lit. d'eau bouillie en bains et lotions. — 5^o Dermatologie : 1 paquet p^r 1/2 lit. d'eau bouillie tiède (bains, lotions compresses).

THÉ ÉVINE

Contre l'obésité (plantes sélectionnées) adjuvant précieux aux traitements prescrits par le médecin. En infusion le matin à jeun, plusieurs fois dans la journée et le soir en se couchant.

Laboratoires ÉVINE, 16, rue, Barbette — PARIS (3^e).

Téléphone : Turbigo 90-47

ÉVOLAXINE

(Le Laxatif de la Femme.)

Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.

Pas d'accoutumance. Pas de coliques.

Par ses lipoides ovariens stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.

Par son mucilage lubrifie les parois intestinales.

Par son rhamnus frangula excite le péristaltisme.

Par sa duodénase augmente les sécrétions biliaire, pancréatique et intestinale.

Par ses sels biliaires désinfecte le tube digestif.

Indications. — Constipation habituelle de la femme, Entéro-colite chronique, Dermatoxe, Acné, Furunculose, Auto-intoxication intestinale.

Doses. — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide), 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Prix au public : 12 francs.

Laboratoires du Dr LAURENT-GERARD

Docteur ès sciences,

Ancien-Chef de Laboratoire

à la Faculté de Médecine de Paris,

40, rue de Bellechasse — PARIS. Tél.: Littré 97-95.

EVONYL

Composition. — Extraits biliaires, de glandes intestinales, Evonymine, Fucus, agar-agar, ferments lactiques podophyllin, phénolphthaléine, etc., en milieu ergostérique irradié suivant notre méthode de vivification des végétaux donnant à la synergie médicamenteuse un coefficient supérieur pour sa valeur thérapeutique.

Propriétés. — Laxatif doux, absolument certain. Cholagogue de premier ordre. Un seul produit pour toutes les affections du foie et de l'intestin.

Indications. — Constipation aiguë ou chronique. Insuffisance hépatique, cholécystites, lithiases biliaires, hypertension.

Forme. — Tablettes dragéifiées.

Posologie. — Une à deux tablettes le soir au repas (à avaler sans mâcher).

Prix au public : 15 francs pour un mois.

Laboratoires **FLUXINE**

J. BONTHOUX, Pharmacien.

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

EXONEROL

Propriétés thérapeutiques. — Désintoxication de l'organisme, traitement de la constipation.

Indications. — Stase intestinale chronique, constipation atonique et spasmodique, désintoxication à la suite de maladies infectieuses.

Formule. — Magnésie calcinée légère Codex, magnésie lourde anglaise, hydrate de magnésie, peroxyde de magnésium, chacun des produits étuvés séparément mélangés, finement pulvérisés et tamisés, suivant procédé spécial.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le soir au coucher.

Laboratoire **BOUTROY**

8, rue de Passy — PARIS.

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

Composition. — Extrait aqueux obtenu dans le vide, à basse température, contenant les principes solubles et assimilables des céréales, orge, seigle, avoine, très riche en sucres, sels, oxydases, *vitamines*.

Action. — Reminéralisant, tonique général, apport de *vitamines*.

Indications. — Anémie, Chlorose, Troubles dyspeptiques prolongés, Hémorragies, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc.

Formes et mode d'emploi :

Sirop : 2 à 4 cuillerées à soupe dans un peu d'eau.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café.

Granulé : 2 à 6 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

ADRIAN et C^{ie}

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.
Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 3 fr. 30, verre compris.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).

EXTRAIT HAMYD

Composition. — Mélange en proportions définies de Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet, Condurango Gmet.

Propriétés. — Vaso-constricteur. Décongestif pelvien et vasculaire, Sédatif gastrique.

Indications. — Tous les troubles de la circulation veineuse. Tous les états congestifs du petit bassin (fibromes, métrites, prostatites, hémorroïdes, varicocèle, etc.). Troubles de la puberté et de la ménopause. Gastralgies réflexes.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau une ou deux fois par jour.

Laboratoire GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

FACMINE LONGUET

Agent puissant et facilement maniable de désinfection et désintoxication intestinales.

Indications thérapeutiques. — Entérites glaireuses et muco-membraneuses ; constipation chronique et toutes maladies et troubles fonctionnels reconnaissant pour cause

L'AUTO-INTOXICATION intestinale, principalement dans les maladies de la peau :

Eczémas, Furunculose, Acnès, Urticaires, Herpès, etc.

Doses et mode d'emploi. — 3 à 4 comprimés après les repas du matin, de midi et du soir. Chaque comprimé correspond à 0 gr. 30 d'alumine lactique et 0 gr. 05 de phosphate de chaux. Pour les enfants : 1/2 dose.

Les comprimés peuvent être avalés à la façon d'une pilule ou délayés dans un peu d'eau.

Le flacon : 12 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

FA-NER-VAL

Facit-nervum-validum.

Formule du D^r Martin du Theil.

Forme. — Granulé.

Composition. — Ce granulé contient par cuillère à café : Arrhénal, 0,025 ; teinture de noix vomique, 0,10 ; glycérophosphate de soude, 0,333 ; extrait hyd. alcool. de quinquina jaune, 0,0666 ; extrait aq. de quinquina rouge, 0,0666. ☞

Indications. — Toutes les dépressions du système nerveux et les troubles du grand sympathique.

Doses habituelles. — 1 cuillère à café, 2 fois par jour avant les repas. Cures de 4 semaines séparées par un intervalle de 8 jours.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

FANGO FISCH ET C^{ie}

Forme. — Boue volcanique radioactive en poudre.

Mode d'emploi. — Application sous forme de cataplasme de 44° à 54°.

Indications. — Affections chroniques douloureuses, musculaires, tendineuses, nerveuses, articulaires, gynécologiques, uro-génitales et des organes internes.

Contre-indications. — Fièvre et insuffisance fonctionnelle circulatoire.

Prix : Paquet de 1 kg. 500 : 12 fr. 50.

— de 4 kg. 500 : 33 fr.

Pour hôpitaux : Prix sur demande, par 100, 1 000 kilos et par wagon.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE.

Dépôt à Paris :

49, rue de Paradis — PARIS.

Tél. : Provence 30-32.

FANTINE

Composition. — Farine fraîche et vivante, non étuvée, non conservée, possédant ses vitamines intactes.

Indications. Alimentation normale : bébés, enfants, femmes enceintes et nourrices, vieillards, etc... Minéralisation, accélération de la nutrition, carence de phosphore, de chaux et de vitamines.

Formes. — 1° Sans cacao (*céréales*).

2° Légèrement cacaotée (*céréales et légumineuses*).

Votre client enverra la somme de *neuf francs* au compte chèques-postaux : Bordeaux, 411-91

FANTINE ADOUE

PAUILLAC (Gironde)

et recevra Fantine, le lendemain même de sa préparation.

Toutes Pharmacies et maisons de régime
dans le Sud-Ouest.

FARINE DE MALT HEUDEBERT

Composition. — La Farine de malt **HEUDEBERT** produit de la mouture de l'orge germée, est à la fois riche en diastases et en vitamines.

Avantages. — Une bouillie bien maltée est à moitié digérée. La farine de malt doit être employée de préférence aux extraits liquides, pâteux ou secs, dont une partie importante des ferments est détruite pendant la fabrication.

Indications. — Troubles de la nutrition et tous désordres du tube digestif amenant un ralentissement de l'assimilation des substances amylacées.

Mode d'emploi. — On peut en saupoudrer tous les aliments. Les bouillies ou purées, préparées avec une cuillerée à soupe de farine (de céréales ou de légumineuses), seront maltées, avec une cuillerée à farine de malt, 2 à 3 minutes après cuisson. Laisser un quart d'heure en contact et faire suivre d'une courte ébullition.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

FARINES DE RÉGIME BLOCH

Pures, Variées, Riches en Phosphates-Blutage minimum.

Farines de Céréales :

Crème de Riz, d'Orge, d'Avoine, de Blé vert.

Farines de Légumes :

Farine de Pois, de Lentilles, de Haricots.

Farines de Fruits :

Farine de Châtaignes. Farine de Bananes.

Semoules : de Blé, de Riz, d'Avoine.

Flocons : d'Avoine, d'orge.

Rapidoats.

Petits flocons d'Avoine. Cuisson cinq minutes.

Blokao.

Déjeuner de suralimentation à base de Farine de Bananes et Hydrates de Carbone aromatisés au cacao.

Tapiocas — Fécules — Arrow-Root

Indications thérapeutiques. — Alimentation des enfants, régime des Dyspeptiques et Entéritiques, Constipés, Nerveux, Anémisés et Surmenés.

Laboratoire des Etabl. AUG. BLOCH et FILS.

à TOMBLAINE, près NANCY (Meurthe-et-Moselle).

Maison fondée en 1811.

FARINES MALTÉES FAVRICHON

(Maltases).

Dyspepsie et suralimentation.

Composition. — Céréales et légumineuses. Par un début de germination on provoque en elles la formation de diastases (amylase).

Propriétés. — L'amylase, pendant la préparation du potage, solubilise les amidons, opérant ainsi préliminairement le travail des amylases salivaires et pancréatiques. Cette solubilisation facilite le travail des autres ferments digestifs (sur les albuminoïdes et graisses, plus accessibles puisque débarrassés de l'enrobage amylicé). Enfin elle évite l'encombrement ou l'inutilisation en cas de suralimentation, car elle permet une absorption rapide et entière.

Formes. — *Quatre Farines Maltées Favrichon (Maltases).*

MALTASE-CÉRÉALE (Céréales maltées 100 %). La plus légère.

MALTASE-LÉGUMINEUSE (Légumineuses maltées 100 %). La plus nourrissante.

MALTASE-CACAO (Cacao, Avoine maltée, Féculé). Pour les malades qui tiennent au cacao.

FERRO-MALTASE (Avoine et lentilles maltées). La plus riche en fer, la plus stimulante, celle qu'on choisira pour remonter un convalescent.

Emploi. — 1°. Dyspeptiques : potages clairs (1 cuillerée à bouche rase par 100 gr. de lait ou liquide).

2°. Suralimentation : potage, crème (1 et 1/2 à 2 cuillerées à bouche rases par 100 gr. de lait).

Littérature et échantillon sur demande.

Produits diététiques FAVRICHON

Pharmacien-chimiste.

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

FÉLAMINE « SANDOZ »

Association de l'acide cholique cristallisé pur et de l'hexaméthylène tétramine.

Forme. — Comprimés dragéifiés à 0 gr. 30.

Propriétés thérapeutiques. — Cholagogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

Indications. — Cholélithiase et cholécystites, ictères, constipation par hypochole, insuffisances hépatiques.

Posologie. — Après les repas, avaler les dragées sans les mâcher.

1° Cas sub-aigus : 2 à 6 comprimés : 2° Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour.

Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

PRODUITS SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e)

Dépôt général et vente :

USINE des PHARMACIENS de FRANCE

129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

FELICOL

Médicament spécifique des Colibacilluries.

Composition. — Le « Felicol » est une solution huileuse au quart d'Hexylrésorcine.

Présentation. — Capsules de 0 gr. 60 contenant chacune 0 gr. 15 de médicament actif.

Dose et mode d'emploi. — Deux capsules *après chaque repas*, en augmentant progressivement la dose jusqu'à 4 capsules dans les mêmes conditions. Ne jamais absorber le Felicol à jeun.

Prix : La boîte de 60 capsules : 60 francs.
La — — 30 — — 32 —

Etablissements T. LECLERC

Dr P. LEMELAND, pharmacien

10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

FÉMINADÈNE

Synergie d'extraits des glandes génitales, magnésium (oxyde de), phénylethylmalonylurée.

Indications : *Nervosité féminine*, dans toutes ses manifestations, à toutes les périodes de la vie génitale.

Anxiété, émotivité, dépression, subagitation, insomnies, etc.

Troubles à la puberté, à la ménopause, après castration, après couches.

Malaises des femmes célibataires, veuves, stériles.

Doses : 4 dragées par jour, en moyenne.

Prix de la boîte : 21 fr. 20.

(pour un traitement de deux semaines).

Laboratoires du FÉMINADÈNE

120, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

FENUCINE

Fenugrec traité spécialement et sans odeur	0,90	par cachet.
Céréalophosphates de Ca et Mg... .	0,15	—
Poudre d'os frais total	0,15	—
Nucléinate de Manganèse	0,02	—

Propriétés. — Stimulation de l'appétit. Action puissante sur le métabolisme. Fonction hématopoïétique. Recalcification.

Indications. — Anémies, Asthénies, Perte de poids, Diabète, Grossesse, Lactation.

Aucun produit toxique, aucun extrait glandulaire. Donc aucune contre-indication.

Présentation. — Boîte de 30 cachets.

Posologie. — 3 cachets par jour au milieu des repas. Dose pouvant être doublée.

Prix des 30 cachets : 15 fr.

Laboratoires LAMBERT
Place du Châtelet — ORLÉANS

FENUGRÈNE

Poudre de Fenugrec déshuilée et désodorisée.

Propriétés. — Stimulant puissant de l'appétit, Agent d'augmentation de poids, Producteur d'énergie et de forces.

Indications. — Tous les cas d'amaigrissement, Maigreur habituelle, Amaigrissement au cours ou à la suite de maladies aiguës ou chroniques, Amaigrissement chez les nerveux, Stimulant de la nutrition et de la lactation chez les femmes enceintes et les nourrices. Donne des couleurs, de l'embonpoint et des forces aux enfants débiles.

Le Fenugrec donne de très bons résultats lorsqu'il est seul et n'est pas mélangé à d'autres produits.

Mode d'emploi. — Le Fenugrène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulé et d'elixir.

Dose journalière moyenne : 4 cachets ou dragées pour les adultes. Elixir : 3 cuillerées à soupe pour adultes. Deux à quatre cuillerées à café de granulé pour les enfants.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE
2, place des Vosges — PARIS.

FER BRAVAIS

Assurances Sociales.

Accepté par la Commission.

Formule. — Ions de Fer catalysé actifs.

Composition. — Solution colloïdale de Fer à 30 p. 100 et de Manganèse catalyseur à 0,50 p. 1 000.

Propriétés thérapeutiques. — Fer pur (infiniment divisé, puisque colloïdal), accompagné de son catalyseur naturel, le Manganèse (mêmes proportions que dans le sang) ; donc Fer assimilable sans nécessiter de réactions internes.

Indications. — Appauvrissement du Sang et toutes ses conséquences : Anémie, Chlorose, Débilité, Dysménorrhée, Fièvre des pays chauds. Formation de la jeune fille, Incontinence d'urine, Leucorrhée, Neurasthénie, etc.

Dose. — X à XX gouttes (1 goutte par année d'âge) à chaque repas dans de l'eau sucrée.

**Examen du sang
avant et après le traitement
par le Fer Bravais.**
(Moyenne de très nombreux cas).

	Avant.	Après.	Augmen- tation.	Diminution.
Globules rouge.	3.500.000.	1.500.000	30 %	10 %
Globules bl...	7.150	6.500		
Hémoglobine.	60 %	85 %	40 %	

Prix : 20 fr. le flacon pour un mois.

14 fr. le 1/2 flacon pour 15 jours.

Lab^{res} C^{te} René de GRAUWE, 
Pharmacien de 1^{re} classe,
16, rue de Rocroy — PARIS. Usine à St-Denis

FER INTRAVEINEUX FRAISSE

Composition :

Cac. de fer.....	0,01
Formiate de cuivre	0,001
Cac. de soude	0,02
Solution isotonique	5 cc. .

Indications. — Solution Ferro-arséno-cuprique injectable dans la veine, sans crainte de choc hémoclasique.

Ampoules de 5 cent. cubes.

Boîte de 6 ampoules : 16 fr.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin, PARIS (XVI^e).

FER LARCADE

Composition. — Combinaison d'hydrate ferrique et d'acide organique, associée au manganèse, qui renforce son action par l'apport d'oxygène et aux principes toni-aromatiques des oranges amères qui en masquent la saveur styptique.

Forme. — Liqueur d'un goût agréable et d'une très faible teneur en alcool.

Action. — Favorise la formation des hématies, augmente leur richesse en hémoglobine.

Indications. - Spécifique de tous les états anémiques, des cachexies chroniques.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur (2 cuillerées à soupe) au commencement des deux repas.

Prix : la bouteille, 22 fr.

(traitement d'une quinzaine).

La demi-bouteille : 13 fr.

Laboratoire, 151, rue Lafayette — PARIS.

P. ROUX, Pharmacien,
Ex-interne des hôpitaux.

FERMENT PUR DE RAISIN

du Prof. Jacquemin.

(Exposition Pasteur, Strasbourg 1923 —
Hors Concours, Membre du Jury.)

Immunisation et Désintoxication Générale de l'organisme.

Source de *Diastases* et de *Vitamines*.

Indications physiologiques. — Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la Nutrition et de la Croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Thérapeutique. — Furonculose, Maladies de peau, Dyspepsie, Entérite, Diabète, Gripes, Rhumatismes, Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Posologie. — 1 flacon pour une cure de 3 semaines à prendre 1/2 heure avant les repas.

Littérature et échantillons à :

INSTITUT JACQUEMIN

à MALZEVILLE-NANCY (Meurthe-et-Moselle).

FER-OVARINE VITALIS

contre anémie et insuffisance ovarienne.

Composition. — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Excitant de la sécrétion interne de l'ovaire déficient, régénérateur des globules rouges.

Indications. — Anémie, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée.

2 pilules avant les 2 principaux repas, 20 jours par mois.

*Echantillons et Notice documentaire.
sur demande.*

Prix de la boîte : 14 fr. 50.

**Laboratoire
de la FER-OVARINE VITALIS**

38, boulevard de Charonne — PARIS.

BEAULIEU, pharmacien,
ancien interne des hôpitaux.

FEROXAL BUISSON

Granulé de protoxalate de fer
(0 gr. 10 par cuillerée à café)
associé à des phosphates alcalins.

Propriétés thérapeutiques. — Hyperglobulise et minéralise. Tolérance absolue par le tube digestif. Action rapide, ne constipe pas, ne noircit pas les dents.

Indications. — Celles des ferrugineux, Anémies diverses, Prétuberculose, Chlorose, Anémie des jeunes enfants, Grossesse, Allaitement, Convalescences.

Dose. — Une à deux cuillerées à café à chaque repas.

Prix de vente au public : 17 fr. le flacon.

Prix médical : 11 fr. 50 le flacon.

**Société Générale
d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX**

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès-sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

FERROCODILE ET FERRICODILE

Cacodylate Ferreux — Cacodylate Ferrique.

Indications thérapeutiques. — Spécifiques de l'Anémie et de la Chlorose, Malaria, Anémie palustre, etc. Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique. Le Cacodylate Ferrique est le seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques, qui, faites intramusculaires, ne sont pas douloureuses.

Préparations réellement supérieures dans les infections des pays chauds.

Doses et mode d'emploi. — *Ferrocodile* : Pilules à 0,025 : 4 par jour aux repas.

Ferricodile : Ampoules à 0,05. Une injection par jour pendant huit jours ; repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Prix de vente au public : Pilules, 11 fr. 25 ;

Ampoules, 12 fr. 50.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

FERROCOL

Composition. — Complexe colloïdal ferrugineux marin :

$C^{76} - H^{77} - Fe^3 - N^2 - O^{22}$
organo-phosphate de calcium.

Indications. — Anémie, chlorose, neurasthénie, surmenage, faiblesse générale, croissance, convalescence, prétuberculose, paludisme chronique et en général tous les états consomptifs.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés, 2 fois par jour.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne — PARIS

FERROPHYTINE CIBA

Phosphate de fer colloïdal.

Sel ferrique neutre de l'acide inosito-phosphorique, contenant 7,50 p. 100 de fer et 6 p. 100 de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimilable. — Stimulant de l'hématopoïèse et excitant des fonctions cellulaires, c'est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition.

Médicament d'une remarquable tolérance.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofuleuse, Croissance défectueuse.

Doses. — *Adultes* : 3 cachets ou 3 cuillerées à café de granulé. — *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café de granulé.

La boîte de 30 cachets : 14 francs.

Le flacon de granulé : 16 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

FIXASE

Reminéralisateur effectif.

Présentation. — Poudre insoluble agréable à boire dans l'eau.

Composition :

Chaux, Magnésie, Phosphate, Fluor, Silice
sous forme utilisable.

Posologie :

Adultes et enfants : 1 cuillerée à café après les 2 repas. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café. *Avant le sevrage* : 1/4 de cuillerée à café dans un peu d'eau bouillie tiède.

Indications :

Enfants, Adolescents, Bacillaires, Prédisposés, Syphilitiques, Surmenés, Phosphaturiques, Affaiblis, Femmes enceintes, Nourrices.

Prix : 12 francs.

FIXASE IRRADIÉE

Titrée physiologiquement à 400 unités antirachitiques par *Cachet* ou cuillerée à café de *Poudre*.

Poudre : Même posologie que la FIXASE.

Cachets : *Adultes et Adolescents* : 3 par jour.

Enfants : 1 à 2 par jour.

Prix :

Poudre : 18 francs.

Cachets : 20 francs.

Laboratoire PARET

22, rue Guibal — MARSEILLE.

FLAVUROL

Dibromoxymercuri fluorescéine
Antiseptique puissant.

Pommade à 1 %. — Intertrigo, Impétigo, Ecthyma, Eczémas infectés, Staphylococcies cutanées, Sycosis, Balanites, Ulcérations de toute nature.

Solution à 2 %. — Désinfection pré-opératoire. Absès, furoncle, anthrax, ulcérations de toute nature, plaies opératoires suppurantes, phlegmons, fistules, otorrhées aiguës et chroniques, suppurations auriculaires, etc...

Solution à 1 %. — Traitement des uréthrites, cystites, pyélonéphrites, vaginites, métrites, antiseptie obstétricale, Ophtalmologie.

Crayons, bougies et ovules à 1 %. — Traitement des métrites et des vaginites.

Bougies à 1 %. — Traitement des uréthrites aiguës et chroniques, des rétrécissements de l'urèthre, des prostatites.

Letube de pommade à 1 %	Prix public	9 fr. 50
Le flacon solution 1%	—	13 fr. »
Le flacon solution 2%	—	10 fr. »
La boîte de 6 crayons 1 %.....	—	18 fr. »
La boîte de 6 bougies 1 %.....	—	18 fr. »
La boîte de 6 ovules 1 %.....	—	20 fr. »

Laboratoires STENE.

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

FLORHÉPATINE

Calmant et antispasmodique, puissant diurétique, sans toxique, à base d'extraits végétaux.

Composition. — Ether amylvalérianique, Boldo, Artichaut, Arénaria, Uva-Ursi Buchu, Corydalis, Fabiana, Genièvre, Menthe dans solution alcalinée glycerinée.

Indications. — Etats d'anxiété (fausse angine de poitrine, tachycardie), Règles douloureuses, Gastralgies, Coliques hépatiques et néphrétiques, Affections du foie en général (Insuffisance hépatique, ictères du foie, paludisme, etc.).

Mode d'emploi. — *Crises légères* : 1 à 4 verres à madère par 24 heures ; se prend pure ou additionnée d'eau simple ou minérale avant ou après les repas.

Crises aiguës : Il est indispensable de prendre 1 verre à madère tous les quarts d'heure jusqu'à cessation des douleurs.

Enfants : 1/2 dose.

Flacon de 500 cc. Prix : 16 fr. 75.

Laboratoire RICHER

7, avenue Marceau. — PARIS.

FLUDIOSE

à l'Iodure de Manganèse.

Composition. — Iode, Tanin, Lactophosphate de chaux, Fer, Iodure de manganèse, Méthylarsinate de soude, Vanille et Cacao.

Forme pharmaceutique. — Sirop de goût très agréable, Infermentescible, ne constipe pas.

Indications. — Lymphatisme, Rachitisme, Pré-tuberculose, Scrofulose, Mal de Pott, Cyphose, Lordose, Scoliose, Chétivité, Troubles de la croissance, Paresse, Glandes, Ganglions, Impétigo, Engelures.

Mode d'emploi et doses. — En plus des autres éléments constitutifs, chaque cuillerée à café contient : 1 cgr. 25 d'Iodure de Manganèse pur et 2 mmgr. 5 de Méthylarsinate de soude.

Enfants de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.

12 à 16 ans : 3 cuillerées à potage par jour.

Se prend pure ou dans un peu d'eau avant ou pendant les repas.

La *Fludiose* est le plus puissant succédané de l'huile de Foie de Morue.

Par son Iodure de Manganèse, la Fludiose dépasse toutes les préparations iodotanniques.

Prescrire. — *Fludiose* : 1 flacon.

Prix, le flacon : 15 francs.

Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise).
Téléph. : 4-84.

Echantillons et littératures à la disposition
de MM. les Docteurs.

FLUOBYL

Granulé

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire.

Le *Fluobyl*, dépourvu de toute action irritante sur l'épithélium intestinal, provoque une chasse biliaire importante sans effet drastique fâcheux.

Granulé de goût agréable à base de *Lactosérum*, *Citrate de magnésie*, *Peptone de fibrine sèche*.

Le *Fluobyl* réalise le « drainage » des voies biliaires en stimulant le flux de la bile. Il favorise la migration du bol fécal, en rendant ainsi à l'intestin son excitant normal. Il exerce également une action excito-sécrétoire sur le parenchyme rénal, provoquant la diurèse et l'accroissement de la sécrétion des sels et de l'urée.

Indications.

Maladies du Foie : Ictères, Cholécystites, Coliques hépatiques.

Dyspepsies réflexes : Nausées, vertiges, constipation d'origine hépatique.

Maladies rénales.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun ; se coucher 10 minutes sur le côté droit ; attendre une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner.

Le traitement doit être suivi environ deux semaines par mois.

Laboratoires LICARDY

38 boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléph. : Maillot 17-75.

FLUOCHOLINE

Granulé soluble.

Spécifique des maladies du foie.

Formule. — Phosphate de soude, Sulfate de magnésie. Peptone pure, Chlorure de magnésium. Hexaméthylènetétramine.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau.

Pharmacie BLOUIN

50, rue de Turenne — Paris.

FLUODYLE

Forme : Ampoules.

Chaque ampoule renferme :

Fluorure de sodium	0,001
Hypophosphite de manganèse.....	0,001
Cacodylate de soude.....	0,15
Sulfate de strychnine.....	0,002
Sérum physiologique.....	2 cmc.

Mode d'emploi. — Pendant 10 jours consécutifs, faire une injection sous-cutanée. Repos de 10 jours. Puis recommencer une nouvelle série de piqûres. La boîte de 10 ampoules : 12 fr.

Forme : Granulé.

Contient tous les minéraux indispensables à l'organisme. Chaux, Phosphore, Fer, Manganèse, Fluor, Silicium, Zinc, Soufre et Magnésie.

Doses. — 1 ou 2 cuillerées à café, 3 fois par jour.

Indications. — Déminéralisation, Convalescence, Affections pulmonaires, Anémie, Surmenage.

La Boîte : 12 fr. plus impôt 0.75

Établissements SABATIER

A. EMPTOZ, pharmacien.

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVI^e).

FLUOGANESE

(Cachets).

Régénérateur globulaire, Reconstituant du stock minéral.

Composition :

Fluorure de calcium.....	0,01
Formiate de chaux.....	0,20
Glycérophosphate de chaux.....	0,40
Nucléinate de manganèse.....	0,01
Protoxalate de fer.....	0,05

Indications. — Faiblesses, Etats adynamiques et asthéniques consécutifs à certaines maladies infectieuses, Troubles de la croissance, Grossesse et allaitement.

Posologie. — 2 à 3 cachets par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de Thérapeutique normale

Ch. LAVIRE, Pharmacien de 1^{re} classe

46, rue de Rome — MARSEILLE (B.-du-R.)

FLUOSALYL BEAUGOURDON

Formule. — Solution de fluorures alcalins préparée en partant de l'acide fluorhydrique, soumise à l'action de dérivés aromatiques dans des conditions spéciales.

Propriétés. — Détruit le tartre dentaire. Antiseptique buccal de premier ordre, ne coagulant pas l'albumine et ne détruisant pas les cellules vivantes.

Usages. — Dans toutes les affections de la bouche et particulièrement dans la *pyorrhée alvéolo-dentaire* à tous les degrés. Dans les gingivites mercurielles ou bismuthiques les accidents ont un arrêt si rapide que le traitement peut être repris et continué deux ou trois jours après que le FLUOSALYL aura été employé.

Emploi. — A la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède en bains de bouche de cinq minutes.

Dans les cas aigus et en cas d'abcès les séances de bains de bouche devront être répétées 4 à 5 fois par jour.

Employé pour les pulvérisations suivant la méthode Joyeux.

Pour le détartrage mécanique on emploie FLUOSALYL'S PASTE, et brosse à dents FLUOSALYL.

Laboratoire de FLUOSALYL.

M. BEAUGOURDON, pharmacien,
43, avenue Kléber — PARIS (XVI^e).

FLUSAN

Formes. — Elixir, Gouttes.

Composition. — Teinture de noix vomique, extrait de marron d'Inde, extrait d'hamamélis, viburnum, extrait glycéринé de surrénale et de lobe antérieure d'hypophyse, chlorure de calcium, extrait vitaminique A et D d'algues marines, glycérine hydratée.

Indications. — Troubles de la puberté, règles douloureuses et tous les états variqueux (varices, hémorroïdes).

Mode d'emploi. — 2 cuillerées à soupe et II à XXX gouttes, aux repas.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne — PARIS

FLUVEINOSE MAUCHANT

(Gouttes.)

Régulateur circulatoire.

Principes actifs. — Sulfate double de benzyle et de sodium, chlorure de magnésium. Extraits fluides : Yohimbehe, marron d'Inde, hamamélis, sénéçon, armoise.

Indications. — Troubles propres de la ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, métrorragies, hémorroïdes, hypertension artérielle, tendance aux néoplasies, affaiblissement provoqué par l'âge.

Dose. — XXV gouttes 3 fois par jour.

Laboratoire MAUCHANT

14, rue de Birague — PARIS.

FLUXINE (gouttes)

XX gouttes =

0,01 centigr. d'intrait de marron d'Inde Dausse.

IV gouttes d'alcoolat concentré d'anémone.

IV gouttes de teinture de noix vomique.

en combinaison inaltérable, radio-activée par les rayons ultra-violet.

Propriétés. — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

Indications. — Stases sanguines, inflammations de l'utérus et du bassin, inflammations veineuses : métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, hémorragies du retour d'âge, règles douloureuses, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — X gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

Prix au public : 15 francs pour 1 mois.

Laboratoires **FLUXINE**

J. BONTHOUX, pharmacien de 1^{re} classe

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

FŒNUGOL

Composition. — Poudre de fénugrec pure, déshuillée mais renfermant en entier sa phytostérine et ses nucléalbumines.

Présentation. — Cachets.

Indications. — *Tous états d'amaigrissement, anorexie, anémie, lymphatisme, diabète, tuberculose.*

Le fénugrec pur augmente le poids, donne de l'appétit, stimule les forces, fait disparaître la fatigue.

Doses. — 4 cachets par jour pour les adultes, 1 à 3 pour les enfants.

On peut ouvrir les cachets et avaler la poudre avec un peu de confiture ou de potage. L'odeur n'est pas un obstacle à cette façon d'employer le fœnugol.

La boîte : 15 fr.

Laboratoire **G. LESOURD**

18, rue Ferdinand-Flocon — PARIS (XVIII^e).

FOKIENYL

Capsules de Fokienol (0 gr. 10).

Le Fokienol. — Alcool sesquiterpénique $C^{15} H^{26} O$ est retiré de l'huile essentielle du *Fokienia Hodgensii*.

Nouveau balsamique, diurétique, antiseptique et modificateur des sécrétions, non toxique, il est indiqué dans le traitement des affections de l'arbre génito-urinaire.

Balsamique très efficace, parfaitement toléré, sans contre-indications.

Références. — 1. Communication à l'Académie des Sciences, le 26 décembre 1931 par M. le professeur P. Sabatier: doyen de la Faculté de Toulouse.

2. Thèse par M. le Dr Pham-Ba-Vien, interne des hôpitaux, sous la présidence de M. le professeur Carnot, membre de l'Académie de Médecine.

Indications. — Blennorragie, Pyélo-néphrites, Cystites, Congestion rénale, Rétention urinaire.

Doses. — 2 à 4 capsules par jour avant les repas ou au début.

Le FOKIENYL permet des prescriptions peu onéreuses. (La boîte, 18 fr. 50, pour traitement de 12 à 24 jours.

Laboratoire :

94, rue Pasteur. — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

FOLLESTRINE GRÉMY

Hormone folliculaire
physiologiquement titrée.

- 1° En *Granules*, pour traitement par *voie buccale*.
- 2° En *Ampoules*, pour traitement par *voie sous-cutanée*.

Indications thérapeutiques :

1° *Chez la jeune fille :*

Aménorrhées de la formation, hypoménorrhées, dysménorrhées. Contribue à rendre normal l'établissement de la puberté par son action dans toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne de la puberté.

Contribue à la disparition des phénomènes d'ordre extra-génital de l'insuffisance ovarienne : troubles nerveux, dermatoses, obésité de la puberté, symptômes ostéo-musculaires douloureux, etc...

2° *Chez la femme adulte et dans la ménopause.*

Disparition des troubles vaso-moteurs.

Rend les règles douloureuses, indolores et régulières.

Disparition des troubles cataméniaux cutanés.

Combat efficacement l'empâtement.

Diabète ovarien. Hypoplasies utérines.

Posologie :

Pendant la quinzaine qui précède les règles, une injection tous les deux jours, ou 4 à 10 granules.

Continuer le traitement par l'ingestion d'ocréine (Voir à *Ocréine*).

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

FOLLICORMONE BUCCALE HINGLAIS

Première préparation de folliculine par
voie buccale.

Activité buccale contrôlée
(Acad. Méd., 27 Janvier 1931).

Composition. — Solution huileuse, concentrée, d'hormone folliculaire en capsules de gélatine.

40 capsules = 120 unités-rat.

Mode d'emploi. — Trois doses par jour à intervalles de quatre heures au minimum, en augmentant progressivement les doses :

Traitement type :

40 capsules réparties sur 7 jours.

1 ^{er} jour : 1+1+1	5 ^e jour : 2+2+2
2 ^e jour : 1+1+1	6 ^e jour : 3+3+3
3 ^e jour : 1+1+2	7 ^e jour : 3+3+3
4 ^e jour : 2+2+2	

Le traitement peut être intensifié ou réduit suivant les nécessités.

Indications. — Toutes déficiences ovariennes :

Hypoménorrhée, dysménorrhée : Une série dans la semaine précédant les règles.

Puberté, Ménopause ; Castration chirurgicale ou radiothérapique ; Aménorrhées, une série tous les 28 jours.

Cas spéciaux de stérilité, sclérodermie, diabète ovarien, épilepsie menstruelle, etc...

Produits HINGLAIS

30, rue de Miromesnil — PARIS.

Tél. : Elysées 37-14.

FOLLICULINE CHOAY

Nature. — Extrait purifié retiré du liquide folliculaire ovarien et considéré comme l'« hormone sexuelle femelle ».

Indications. — Hypoplasie utérine, Infantilisme génital, Insuffisance ovarienne, Aménorrhée, Troubles de la ménopause naturelle ou opératoire.

Forme pharmaceutique. — Ampoules de 2 cc., contenant, en solution huileuse neutre et stérilisée, 10 unités-rat (40 unités-souris) de folliculine.

Posologie. — 3 à 12 injections intramusculaires, suivant le cas, de 2 jours en 2 jours.

Prix : 40 fr. la boîte de 6 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

FOLLICULINE CRINEX

Active par voie buccale.

Composition. — Sol. alcool. d'extrait ovarien total désalbuminé. Contient, outre la folliculine, toutes les hormones ovariennes. V gouttes (50 par cc.) = 3 unités physiologiques.

Indications. — Tous les cas d'insuffisance ou de suppression de la fonction ovarienne. Troubles de la puberté, menstruation, ménopause, castration, obésité, stérilité.

Avantages. — Seule folliculine active par voie buccale à faibles doses.

Provient exclusivement d'ovaires frais d'animaux jeunes.

Garantie exempte d'extrait d'urine et de placenta.

Prix modéré. Traitement à la portée de tous.

Posologie. — Faire prendre la Folliculine CRINEX soit pendant les 15-20 jours qui suivent, soit pendant les 10 jours qui précèdent les règles.

Prescrire au début une dose moyenne variant entre XV et XXX gouttes par jour. Suivant résultats obtenus, maintenir la dose initiale, l'augmenter jusqu'à XL-XC gouttes ou la ramener à V à X gouttes.

Très important. — L'activité du produit est considérablement augmentée si les doses prescrites sont absorbées *en plusieurs fois, à distance des repas* (1/2 heure avant ou 2 heures après).

Prix :

Le flacon de 240 unités (400 gouttes) environ :
18 fr. Durée : 13 à 25 jours.

Le flacon 480 unités (800 gouttes) environ :
30 fr. Durée : 25 à 50 jours.

Laboratoires UVÉ-CRINEX

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV^e).

FOLLICULINE CRISTALLISÉE

Du Dr Roussel (Gynoestryl).

Deux présentations.

1^o Voie hypodermique. — GYNOESTRYL-ampoules.

Boîtes de 6 ampoules huileuses de 1 cc. contenant chacune 500 unités-rat, soit 1/10 de milligramme de folliculine cristallisée.

Mode d'emploi. — De 1/4 de centimètre cube à 1 ampoule entière, tous les 2 jours, en commençant une semaine après la cessation des dernières règles.

Cesser 10 jours avant la date présumée des prochaines règles.

Indications thérapeutiques. — Toute la vie génitale de la femme. Puberté, Castration, Stérilité, Vomissements incoercibles, Ménopause.

2^o Voie buccale. — GYNOESTRYL-gouttes.

Flacon de 10 cc, de solution hydro-alcoolique. 1 goutte = 10 unités-rat.

Mode d'emploi. — De X à L gouttes par jour et davantage, loin des repas, à prendre 7 jours après les règles.

Cesser 10 jours avant la date présumée des règles suivantes.

Indications thérapeutiques. — Puberté, Aménorrhée, Castration, Stérilité, Vomissements incoercibles, ménopause.

Laboratoire Français de Chimiothérapie.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

FONDANT DE COLA DAUSSE

(Saccharolé-Fondant) titré à 0 gr. 50 d'Extrait de Cola stabilisée par dose (ou 5 gr. de saccharolé).

Toni-nervin et *toni-musculaire* présentant l'activité entière de la noix de cola fraîche (stabilisée par le procédé **PERROT-GORIS**).

Indications. — *Adynamie, asthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescence des maladies infectieuses.*

Posologie. — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à café par jour en moyenne et davantage si nécessaire. En cas d'effort à exécuter, ingérer la cola une heure au préalable et répéter la dose si l'effort doit durer.

FONDANT IODOTANNIQUE DAUSSE

Granulé à base d'iode associé au *Tormentillo-tanin*, tanin facilement absorbable. Remplace avantageusement l'huile de foie de morue et les préparations antiscorbutiques.

Indications. — *Lymphatisme, scrofule, arthritisme, emphysème, rhumatismes, obésité, eczéma, impétigo.*

Posologie. — La teneur en iode dissimulé du Fondant iodotannique étant la même que celle du sirop iodotannique du Codex, sa posologie est la même.

Adultes : 5 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : jusqu'à 15 mois : 1/2 à 1 cuillerée à café par jour ; 3 ans : 1 à 2 cuillerées à café par jour ; 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour ; 12 ans : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

FONDANT MANGANO-FERREUX

Puissant excitant cytoplasmique et nucléaire par le *Manganèse*, vecteur d'oxygène et stimulant de l'hématopoïèse par le *fer*, ce saccharolé active les phénomènes de nutrition et favorise la régénération du sang.

Indications. — Tous les états anémiques : *anémie, chlorose, convalescences, pertes sanguines.*

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : de 1/2 à 2 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (VI*).

FOROIVAL

Aliment nutritif et fortifiant.

Composition. — Concentration des meilleurs aliments naturels : farines de céréales et de légumineuses maltées, sucre, cacao. Aucun médicament surajouté.

Forme. — Farine d'un goût très agréable.

Mode d'emploi. — Bouillie délicieuse à l'eau ou au lait.

Propriétés. — Aliment léger et substantiel, reconstituant, reminéralisateur, d'une grande digestibilité.

Indications. — Suralimentation chez les enfants, les adultes et les vieillards.

La boîte de 250 gr. : 6 fr.

La boîte de 1 kg. : 20 fr.

Laboratoires du FORCIVAL

6, rue Bridaine — PARIS.

FORIOD

Tétraiodophénolphtaléinate de Sodium.

Matière colorante, opaque aux rayons X, s'éliminant par les voies biliaires.

Indications. — **Cholécystographie, Examen radiologique de la région vésiculo-duodénale.**

Posologie et mode d'emploi. — Employer l'une des méthodes suivantes :

1^o *Voie buccale* : Faire prendre 13 heures avant l'examen, soit : 1 flacon de 20 gr. de poudre composée ; soit : 15 dragées à 0 gr. 30.

2^o *Voie intraveineuse* : Solution aqueuse à préparer extemporanément avec le contenu d'une ampoule de poudre cristallisée (2 gr. 40) et 50 à 60 cc. d'eau distillée stérile.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marque Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon. — PARIS (VIII^e).

FORMINE ADRIAN

Composition. — Hexaméthylène tétramine rigoureusement pure.

Mode d'action. — Antiseptique urinaire, hépatique et intestinal.

Indications. — Néphrites, cystites, prostatites, urétrites, phosphaturies, calculs. — Hépatites, cholécystites, angiocholécystites, fermentations intestinales, entérite chronique, etc..

Formes.

Comprimés : dosés à 50 centigr., deux à quatre par jour.

Ampoules : dosées à 0 gr. 5 et 1 gr. une à deux par jour.

Sel cristallisé : flacons de 60 gr., 125 gr., 250 gr. pour formules.

ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

FORMINT MERMINOD

Principe. — Aldéhyde formique polymérisé.

Propriétés. — Associé aux antiseptiques déjà connus, l'aldéhyde formique polymérisé chimiquement pur a un pouvoir microbicide extrêmement puissant, le Formint remplace ainsi les meilleurs gargarismes, réalise la désinfection totale de la cavité laryngo-pharyngée et protège l'entrée des voies respiratoires.

Forme. — Tube de 20 comprimés à 1 gr.

Prix : 5 fr. le tube de 20 comprimés.

Echantillons sur demande :

Laboratoires MERMINOD

49, rue de Paradis — PARIS (X^e).

Tél. : Provence 30-32.

FORMOCARBINE

Composition :

Association de Charbon Animal pur, ultradivisé, absolument privé de Cyanogène, à la Formine (Hexaméthylènetétramine cristallisée).

Forme pharmaceutique :

Granulé friable, aromatisé, agréable au goût, avec ou sans addition de Benzonaphtol :

Formocarbine simple.

Formocarbine naphtolée.

Les granules de Formocarbine ne sont pas durs à la dent, fondent très bien dans la bouche, se désagrègent instantanément dans l'eau.

Propriétés :

Antiseptique interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

Indications thérapeutiques :

Infections gastro-intestinales. — Dyspepsie, Fermentations, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales, Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies infectieuses, Colibacillose.

Infections biliaires. — Désinfecte par la Formine la Vésicule et les canaux, en même temps que son Charbon animal absorbe les bactéries intestinales montant au foie par la veine-porte en ses diverses origines.

Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiase biliaire, Tuberculose des voies biliaires, Hépatisme.

Infections urinaires. — Toutes les infections urinaires, rénales, vésicales, cystite, Pyélonéphrites, Urétérites, Prostatites.

Posologie :

1 à 2 cuillerées à café après les repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau. Par demi-cuillerées à café chez les enfants.

Prescrire :

Formocarbine simple ou Formocarbine naphtolée :
1 flacon.

Il est à remarquer que la Forme Naphtolée ne provoque jamais de constipation.

Prix, le flacon : 12 francs.

**Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue Malherbe — BEAUVAIS (Oise). Tél. : 4.84

Echantillons et littérature à la disposition de
MM. les Docteurs.

FORMOCARBOS

Composition. — Charbon animal chimiquement pur (Carbos). Urotropine. Peptones de poisson, d'œuf, de viande, de lait et sulfate de magnésie.

Forme. — Granulé rond anisé.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique. Congestion du foie. Insuffisance hépatique. Cholécystite. Colibacillose. Migraines. Prurit. Rougeur de la face. Somnolence. Fermentations et en général toutes les manifestations anaphylactiques.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café.
Enfants : 1/2 ou 1 cuillerée à café suivant l'âge.
Avant (de préférence) ou après chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

FORMOCITRINE

Composition. — Hexaméthylène-tétramine à l'état pur et citrate acide de soude.

Forme. — Granulé effervescent soluble extemporanément.

Propriétés. — Antiseptique interne à réaction acide, indispensable à la transformation en formol de l'hexaméthylène-tétramine.

Eupeptique, Cholagogue,

Antivisqueux et anti-agglutinant (ion citrique); prévient les coagulations et les concrétions pathologiques.

Antispasmodique vasculaire (citrate), par action sur le système nerveux sympathique.

Indications. — *Reins et Voies urinaires* (Urétrites, Cystites, Pyélonéphrites, Lithiases),

Foie et Voies biliaires (Insuffisance, Ictères, Cholécystites, Lithiases).

Sang et Vaisseaux (Hyperviscosité, Artérites, Phlébites, Hyposphysie).

Maladies infectieuses (Broncho-pneumonie, Fièvre typhoïde).

Accidents post-opératoires (Thromboses, Embolies).

Doses. — 1 cuill. à café de granulé contient 0 gr. 25 d'hexaméthylène-tétramine et 1 gr. 50 de citrate de soude.

2 à 4 cuill. à café en solution étendue.

4 à 6 cuill. à café et plus dans les maladies des vaisseaux.

Laboratoires du D^r BAREY
37, avenue Jules-Coutant — IVRY-SUR-SEINE.

FORNOSE

La plus fondante des pommades nasales.
Novocaïne, Adrénaline, Baume du Pérou,
Ichtyol, Huile de vaseline et Lanovase-
line geraniée, Désodorisante, Non irri-
tante.

Tous états congestifs du nez et de la gorge.
Soins préopératoires et post-opératoires.
Antisepsie opératoire, Ozène.

Étaler soigneusement à l'intérieur de chaque
narine gros comme un pois de pommade
matin et soir.

Toutes Pharmacies, le tube : 6 fr.

Echantillons :

Laboratoire CHAVIALLE

70, Grande-Rue — SÈVRES (S.-et-O.).

Enreg. au Lab. nat. de Cont. des Médica-
ments, n° 155-3.

FORTOSSAN CIBA

Phyline spéciale pour les nourrissons.

Sel sodique neutre de l'acide inosito-diphosphorique (principe phospho-organique végétal).

Médicament phosphoré très assimilable, spécialement préparé pour la pratique infantile.

Indications. — Retard du développement et de la dentition, scrofule et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc.

Doses. — Poudre s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies, à la dose de 1 à 3 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

La boîte : 8 fr. 50.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

FORTOSSAN IRRADIÉ

Même composition que le Fortossan ordinaire mais avec, en plus, une adjonction d'ergostérine irradiée, correspondant à une dose quotidienne de 40 à 200 unités cliniques.

Le Fortossan irradié est soumis à un contrôle chimique et biologique lui assurant une activité maximum constante. L'ergostérine irradiée s'y trouve sous une forme protégée, absolument inoffensive et, unie à l'élément phosphoré végétal, elle donne son maximum d'action thérapeutique.

Indications. — Rachitisme, Ostéomalacie, Tuberculose, Prétuberculose, Etats de dépression liés à une insuffisante assimilation de la chaux et du phosphore, Fractures, etc.

Doses. — Chez l'enfant : 1 à 3 cuillerées à café par jour ; chez l'adulte : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

La boîte : 12 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

FORXOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-1.

Forme. — Elixir.

Composition. — Acide glycérophosphorique, Nucléinates de Manganèse, de Fe et de Ca., Méthylarsinate de soude.

Propriétés pharmacodynamiques. — Reconstituant complet pour tout organisme, Dynamogénique. Stimulant hématogène, Antidéperditeur, Régulateur des échanges cellulaires.

Indications. — Etats de dépression. — Faiblesse générale. — Troubles de croissance et de formation. — Neurasthénie. — Anémie. — Débilité sénile. — Convalescences.

Mode d'emploi. — Une à deux cuillerées à café, suivant l'âge, au milieu des deux principaux repas, dans un peu d'eau, de vin ou liquide quelconque autre que le lait.

Le flacon : 14 francs. (En France.)

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

FOSFOXYL CARRON

PHOSPHORE COLLOIDAL

Colloïde chimiquement défini par Carron, Bourières et Chevalier. CR. Société thérapeutique, 11 novembre 1925.

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

Formes. — Fosfoxyl sirop : sirop opalin anisé, goût agréable.

Fosfoxyl pilules : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.

Fosfoxyl liqueur : liquide opalin glyciné menthé spécialement destiné aux diabétiques.

Dosage. — 10 cc. de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant des glandes endocrines et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif. Créateur d'énergie physique et mentale. Fixateur de l'ion calcium.

Indications. — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales. Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

Contre-indication. — Etat congestif aigu.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à dessert (10 cmc.) de liqueur ou sirop, étendue d'eau ou d'un liquide froid quelconque, ou 4 pilules, avant les deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

Prescrire :

Sirop de FOSFOXYL CARRON 14 fr.
ou **Pilules de FOSFOXYL CARRON 12 fr.**
ou **FOSFOXYL LIQUEUR 13 fr.**

afin d'éviter les substitutions

Laboratoires du FOSFOXYL

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

CARRON, Pharmacien de 1^{re} classe,
ancien Pharmacien-Chimiste de la Marine.

FOSYLS CARRON

Terpénolhypophosphites minéraux.

Reminéralisateurs chimiques physiologiques
assimilables directement.

Modificateurs de la Nutrition
et de la Composition chimique des Tissus.

Tous ces nouveaux corps — création des Laboratoires CARRON — possèdent les propriétés dynamiques et trophiques du phosphore sur le système nerveux et sur la nutrition générale, mais chacun d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente en outre une électricité d'action particulière qui conditionne sa prescription dans les diverses affections. Ils ne sont ni toxiques ni irritants et ont été reconnus parfaitement assimilables.

Les corps de cette série actuellement à la disposition du Corps médical sont :

Les Terpénolhypophosphites de Calcium, de Magnésium, de Manganèse et de Cuivre. Tous sont présentés sous forme de comprimés lenticulaires dosés à cinq centigrammes (1).

Dénomination.	Titre.	Mode d'emploi.
CALCOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Ca	13,19 % de Phosphore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Calcium.	8,51 % de Calcium	(Sirop pour enfants.)
MAGNÉSOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Mg	13,65 % de Phosphore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Magnésium.	5,28 % de Magnésium.	
MANGANOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Mn	12,57 % de Phosphore.	4 à 6 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Manganèse.	11,34 % de Manganèse.	
CUPROFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Cu	12,57 % de Phosphore.	2 à 4 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Cuivre.	12,77 % de Cuivre.	

Prix de l'unité : 12 francs.

Littérature et échantillons sur demande aux

Laboratoires CARRON

Rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(1) N. B. — Les Terpénolhypophosphites de Fer, de Lithium, d'Uran, de Plomb et de Quinine ont été également obtenus dans les Laboratoires CARRON.

FRANCOPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc.

Avantages. — Adhérence parfaite. Ne sèche pas, ne poisse pas. Garantie de conservation minima 2 ans.

Indications. — Fixation des pansements.

Dimensions. — 1 m. sur 1-2-3-4-5-10-18 cm. de larg. 5 m. sur 1 1/4, 2 1/2 3 3/4, 5, 6 1/4, 7 1/2, 10 cm. de largeur, sur cretonne rose ou blanche ; uni ou perforé. Réduction de 50 p. 100 au Corps médical.

A. KRAUS, Pharmacien de 1^{re} classe.
Fournisseur des Hôpitaux, du Service de Santé, de la Croix-Rouge.

37, r. Godot-de-Mauroy — Usine à Courbevoie.

FREINIX BUISSON

produit non toxique et ne faisant pas partie du tableau B.
Association Chlorh. de Papavérine et Adrénaline en solution isotonique (Ampoules de 1 cent. cube) pour injections sous-cutanées.

Propriétés thérapeutiques. — Freine le Pneumogastrique. Excite le Sympathique.

Indications. — Asthme, Emphysème, Asthme et Rhume des foin, Spasmes viscéraux. Tous les phénomènes liés à l'hypervagotonie.

Mode d'emploi et doses. — Une injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc. suffit à juguler une crise d'asthme en quelques minutes.

Le *Freinix* peut également être employé en pulvérisations nasales dans le rhume des foin, en particulier.

Prix de vente au public : 22 fr. la boîte de 6 ampoules.
Prix médical : 14 fr. 85 la boîte de 6 ampoules.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien
Docteur ès sciences physiques
98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

FREINOSPASMYL

Ephédrine.....	0 gr. 02
Phénylméthylmalonylurée	0 gr. 03
Bromhydrate de quinine	0 gr. 06
Belladone.....	0 gr. 01

Médication élective de tous états spasmodiques,
Régulatrice du système nerveux sympathique.

Indications thérapeutiques. — Asthme, Dyspnées, Eréthisme cardiaque, Hypertension artérielle, Aérophagie, Syndromes solaires, Epilepsie, Migraines, États névralgiques, Affections ovariennes et thyroïdiennes. Préparation pré-opératoire.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par 24 heures.

Cure d'attaque : Périodes de 10 jours à 4 comprimés par jour.

Cures d'entretien : 2 ou 3 comprimés deux ou trois fois par semaine.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

FUCOGLYCINE DU D^r GRESSY

Forme. — Sirop.

Composition. — Principes iodo-phosphorés naturels et hydrocarbonés du fucus.

Indication. — Scrofule, Lymphatisme, Tuberculose, etc.

Posologie. — Mêmes doses que l'huile de foie de morue.

Laboratoires LE PERDRIEL
11, rue Milton — PARIS (IX^e).

FUCOÏODINE

Composition. — Iode organique en suspension colloïdale dans l'eau de mer isotonique, associé à l'extrait frais et concentré d'Hamamélis virginica.

Indications. — Maladies du cœur et des vaisseaux, artério-sclérose, goutte, rhumatisme, goitre, obésité, syphilis, asthme, emphysème, troubles de la circulation du sang, maladies des femmes, varices, dysménorrhée, fibrome, ménopause, etc...

Mode d'emploi. — V à LX gouttes à chaque repas.

Laboratoires PROTHERAPIA
132, rue de Turenne — PARIS

FUCOSINE

Traitement efficace de la Constipation habituelle.

Composition. — Agar-agar, extrait de rhamnées.

Propriétés. — Mucilagineux, émollient, cholagogue ; véritable aliment du constipé ; innocuité absolue.

Formes et Posologie :

Paillettes. 1 à 3 cuillerées à café.

Poudres.. 1 à 3 mesures.

Cachets .. 1 à 3 cachets.

A chaque repas régulièrement.

Indications. — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

Prix : 11 francs la boîte.

Laboratoire L. PROTHIÈRE
55, rue Auguste-Comte — LYON.

FUCUS GMET

Composition. — Extrait total, sans alcool, du fucus vesiculosus. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Par son iode naturel régularise la sécrétion thyroïdienne et combat l'obésité.

Indications. — Obésité, Scrofule.

Posologie. — De 1 à 8 cuillerées à café par jour, *progressivement* dans eau ou vin blanc sec de préférence.

Laboratoire GMET

27, Faub. Montmartre — PARIS (IX^e).

FURONCULASE

Médication interne actuellement la plus efficace contre toutes les suppurations à staphylocoques dont elle empêche les récidives.

Composition. — Combinaison de chloro-lactate de potassium ferrique associé à une forte proportion de *Coculus palmatus* (colombo). Pilules enrobées dans une mince enveloppe de gluten, de manière à assurer la désagrégation de la masse dans le milieu intestinal sans provoquer la moindre action irritante sur une proportion quelconque du tube digestif.

Propriétés thérapeutiques. — Agit :

- 1° Par une action spécifique sur le foie.
- 2° Par son pouvoir oxygénant sur les globules en activant l'action phagocytaire.
- 3° Par une action nettement antiputride sur le tube digestif.

Indications. — Anthrax, Acné, Orgelets, Absès, Furoncles, Phlegmons, certaines Dermatoses, toutes les Staphylococcies et les diverses intoxications d'origine gastro-intestinale.

Posologie. — Dose journalière :

Adultes : 6 pilules, 2 avant chaque repas.

Enfants : 2 à 3 pilules, une avant chaque repas.

Complètement indispensable à la méthode des vaccins, la FURONCULASE ne présente aucune contre-indication. Elle ne contient ni sucre, ni alcool, ni produit toxique.

Prix de vente au public : 15 fr.

Laboratoires DALET

94, bd des Batignolles — PARIS (XVII^e).

GADUAMINE

La GADUAMINE est un extrait opothérapique de foies frais de morue renfermant outre les parties hydro-solubles de la glande vivante, la totalité de l'insaponifiable de l'huile. LA GADUAMINE se caractérise plus spécialement par ses *procédés scientifiques* de fabrication qui en font un produit sans goût ni odeur désagréable, et privé de tous produits de décomposition plus ou moins nocifs.

Action : — La GADUAMINE agit :

Par les principes hydro-solubles du foie, comme anti-anémique et antitoxique.

Par les vitamines naturelles A et D, comme stimulant de la croissance et fixateur du calcium.

Principales indications. — *Anémies* : anémies pernicieuses, toxiques, post-hémorragiques, infantile; chlorose. *Elats d'infection chronique* : Adénites, scrofules, lymphatisme, pré tuberculose et tuberculose. *Avitaminoses* : Rachitisme, allaitement, suites de couche, croissance.

Mode d'emploi. — *Enfants* : X à XL gouttes. *Adultes* : XL à LX gouttes. A prendre en 2 fois, avant les principaux repas, dans un liquide quelconque (eau sucrée, tisane, bouillon, vin, etc.).

Prix : 13 fr. 50

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

GADUASE

Succédané classique de l'hulle de foie de morue sous la forme d'un sirop framboisé très agréable.

Composition.

Hypophosphites de sodium et de calcium (stabilisés par la glycérine), toniques nervins, antirachitiques et reminéralisateurs, stimulants de la nutrition.

Méthylarsinate disodique (0,015 par cuillerée à soupe), reconstituant des tissus nerveux et sanguins.

Iode (en combinaison tannique parfaitement stable et inaltérable), régulateur du métabolisme et anti-infectieux de premier ordre.

*Convient à tous les âges,
aucune incompatibilité.*

Indications.

Anémie, Anorexie, Lymphatisme, Affections pulmonaires, Asthénie.

Posologie.

Pure ou dans un peu d'eau, avant ou après les repas.

Nourrissons: demi à une cuillerée à café *pro die*. *Enfants*: deux à trois cuillerées à café. *Adolescents et adultes*: deux à trois cuillerées à soupe.

Flacon (210 cmc. environ): 9 francs.

Grand flacon (400 cmc. environ): 15 francs.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

GALABACTÉINE

La Galabactéine est une culture de bactéries lactiques sélectionnées en milieu protéino-lacto-sérique.

Forme. — Présentée entubesscellés de 10 cc.

Indications. — Toutes infections intestinales et autres intoxications d'origine digestive, métrites, vaginites, pansement des plaies.

Mode d'emploi. — 1° Prendre le contenu de 2 tubes, le matin, à jeun, dans une tasse d'eau sucrée ;

2° *Enfants* jusqu'à 3 ans : 1 tube dans de l'eau sucrée par la bouche ou en petit lavement ;

3° En pansement lorsqu'il s'agit d'une infection externe.

Prix de vente : 12 francs.

Laboratoires LUCINIA

154 bis, rue de Breteuil — MARSEILLE.

GALACTESIA

Granulé stimulant de la sécrétion lactée.

Composition. — 1° *Principes galactogènes* : extraits de semences de cotonnier, de galéga, de malt, essences d'anis, de cumin, de fenouil.

2° *Éléments reconstituants* : phosphate et polyglycérophosphates (de calcium, de magnésium, de fer, de manganèse).

Indications. — Insuffisance lactée, qualitative ou quantitative. Montée laiteuse tardive. Reprise de l'allaitement.

Douleurs lombaires consécutives à l'allaitement.

Posologie — *Dose stimulante* : 3 cuillerées à soupe par jour.

Dose d'entretien : 3 cuillerées à dessert par jour.

La boîte de 300 gr. environ : 14 fr. 85.

Les Spécialités de l'Enfance.

Laboratoires AXAREL

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga.
Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumin, fenouil, etc.

Indications :

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. — Nourrissons déficients.

Mode d'emploi :

Trois fois par jour, une ou deux cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

La boîte de 250 grammes : 16 fr. 30.

Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Pastilles à l'Aldéhyde formique.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

Indications. — 1^o Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2^o Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites ; 3^o Hygiène de la voix.

Mode d'emploi. — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin, toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

GALLIODINE

Forme. — Bonbon à sucer, absorption perlinguale instantanée.

Composition. — Iode, tanin, acide phosphorique.

Avantages. — Permet de « macher » de l'iode sans fatiguer l'estomac.

Indications. — Angines, Stomatites, Rhinopharyngites, Adénites, Laryngites, Lymphatisme, Pyorrhée alvéolodentaire.

S'emploie également après tous soins dentaires et opérations d'amygdales et végétations adénoïdes.

Posologie. — Six à huit bonbons par jour.
Prix : 10 francs la boîte.

Laboratoires SCHMIT
71, rue Sainte-Anne — PARIS.

GAMBÉOL

Adopté par le Ministère de la Santé Publique.

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Proto-Gambier).

Propriétés. — Antiseptique, Résolutif, Cholagogue, Diurétique, Antiparasitaire, Antisypilitique.

Mode d'action. — Agit en se dissociant en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal sans formation de sublimé.

Indications. — Toutes celles du calomel sans ses inconvénients. Insuffisances hépatiques et biliaires. Infections intestinales Antiparasitaire (oxyures), syphilis acquise et héréditaire de l'adulte et de l'enfant à toutes les périodes.

Formes et posologie

1° Cachets à 1 centigr. 2 ou 3 ch. jour.
Prix : 20 francs.

2° Cartouches de pommade pour frictions à 50 %. Prix : 20 francs.

Adultes : 1 chaque jour.

Enfants : Fractions suivant l'âge.

3° Suppositoires adultes à 10 cent. 1 ch. jour.
Prix : 18 francs.

Suppositoires enfants à 5 centigr. 1 ch. jour.
Prix : 16 fr. 80.

Laboratoire du Gambéol

42, rue Emile-Deschanel
COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 17-67 et 17-68,

GAMÉTOXYL

Traitement du paludisme à toutes ses périodes.

Généralités. — Le Gamétosyl répond à la formule :

Chlorhydrate de dihydroquinamine.....	0,01
Benzylène éthyl-arsianilate de dihydroquinamine.....	0,05
Chlorhydrate neutre de quinine.....	0,35
Uréthane.....	0,175
Solution glucosée et phénolée Q. S pour 5 c/c.	

Il associe donc au chlorhydrate de quinine un composé particulièrement actif : la dihydroquinamine, qui, au contraire de la quinine, agit essentiellement sur les formes sexuées du parasite.

Résultats. — *Tolérance parfaite* même par voie intraveineuse (à la condition de diluer convenablement) et même dans la bilieuse hémogloburique.

Efficacité maxima à quelque période que l'on ait affaire.

Action préventive très marquée.

Posologie. — *Traitement préventif* : Une injection intramusculaire tous les 10 jours.

Traitement curatif : 1 à 2 injections par jour au moment des accès, suivies de 1 injection tous les 2 jours.

Note importante. — Pour l'emploi du « Gamétosyl » par voie intraveineuse, diluer les 5 ou 10 cc. nécessaires dans 10 à 20 cc. de sérum physiologique ou mieux d'eau glucosée à 50 % tiède à 38° et injecter très lentement au rythme de 1 cc. par minute.

Prix : 25 francs la boîte de 8 ampoules de 5 cc.

Echantillons et littérature :

Laboratoires S. F. E. A. T.

15, rue Catulienne, SAINT-DENIS (Seine).

GANDERMA

Pommade renfermant les principes actifs de l'eau d'Alibour associés au Gambéol et à l'oxyde de zinc.

Formule :

Protochlorure de mercure léger et dissociable.....	8 gr.
Sulfate de cuivre.....	0 gr. 50
Sulfate de zinc.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	18 gr.
Excipient (Lanoline et Vaseline)....	72 gr. 50

Indications. — Toutes affections cutanées d'origine inflammatoire ou microbienne : Acnés, Dartres, Ecthymas, Eczémas, Erythèmes polymorphes, Furoncles, Herpès, Impétigos, Intertrigos, Pityriasis, Prurits, Psoriasis, Pyodermites, etc...

Présentation. — En tubes étain imprimés de 30 gr. environ.

Prix : Le tube : 12 francs au public.

Littératures et échantillons sur demande à :

Laboratoire du GANDERMA

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

GARDÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée.

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

Indications :

ÉPILEPSIE,

Chorée, Convulsions, États anxieux, etc.

Présentation et posologie. — Comprimés à 10, 5, et 1 centigr.

Doses maxima par 24 heures :

Adultes : 30 centigrammes.

Enfants : 10 centigrammes.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

GASTRÉPATINE

Sulfate, citrate, phosphate, bicarbonate de soude,
Sels rigoureusement anhydres.

En faisant dissoudre 2 paquets dans une bouteille
d'Eau d'Evian on réalise la solution de Bourget.

Prescrire un verre à bordeaux le matin à jeun.
La solution est d'absorption facile.

Indications. — Insuffisances glandulaires du tube digestif ; prescription courante dans la thérapeutique du foie, de l'estomac, de l'intestin : hyperchlorhydrie, insuffisance hépatique, dyspepsie, entérites, etc. Contribue au traitement des dermatoses et intoxications intestinales

Dépôt O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. O. L.

M. BERGER,

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

GASTRICINE

DU Dr E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait opothérapique, liquide, de muqueuses fraîches, d'estomacs de porcs et de caillettes de veaux.

Renferme tous les éléments naturels du suc gastrique organique, ses ferments lab, pepsine, et toutes les zymases enlevées à la muqueuse gastrique.

Indications. — Affections organiques de l'estomac. Cas de souffrance de l'organe (insuffisance gastrique par excès ou par défaut). Anémie pernicieuse.

Mode d'emploi. — A un 1/2 verre d'eau ajouter une cuillerée à café de gastricine.

Prendre une gorgée de *temps en temps pendant le repas.*

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du Dr E. DUHOURCAU

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).
Anciennement, 10, rue de Turenne — PARIS (IV^e).

GASTROCALCINE

**Affections de l'estomac, Dyspepsies,
Hyperchlorhydrie, Pyrosis, Dilatations
de l'Estomac, Ulcères.**

GASTROCALCINE GRANULÉE

1 cuillerée à café contient environ :

Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
— de magnésie.....	0 gr. 20
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 20
Sucre anisé, Q. s. pour.....	5 gr.

Par cuillerée à café après les repas et au moment des crises.

Flacon de 40 à 50 cuillerées à café.

Prix : 12 fr. 50.

GASTROCALCINE BISMUTHÉE

Par dose moyenne (une mesure).

Carbonate de bismuth.....	2 gr. 50
— de magnésie.....	0 gr. 30
— de chaux.....	0 gr. 30
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 25
Kaolin.....	5 gr.
Gelose Q. s.	
Bromure de sodium.....	0 gr. 25
Codéine.....	0 gr. 005
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 02
Sucre.....	6 gr.

Essence d'anis Q. s. p. aromatiser.

Une mesure ou 1/2 mesure selon les cas ou les besoins. 1, 2 ou 3 fois par jour au maximum après les repas ou au moment des douleurs, délayée dans 1/3 ou 1/2 verre d'eau environ.

Prix : 20 fr.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Pharmacie de Paris

17, rue Cadet — PARIS

GASTROOOL

Pansement gastrique.

Composition. — Parties égales de Silicate hydraté pur d'Alumine et de Silicate hydraté pur de Magnésie, lavés, étuvés, stérilisés-porphyrisés.

Forme. — Poudre insoluble, en sachets de 20 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisant le plus parfait des pansements gastriques, *peut et doit* remplacer dans cet usage les Sels de Bismuth :

Mêmes indications — Plus efficace.

Mêmes doses — Jamais toxique.

Même mode d'emploi — 6 fois moins coûteux

Indications. — Pansement gastrique. — Hyperchlorhydrie. — Ulcères de l'estomac et du Duodénum. — Spasmes du Pylore. — Aérophagie. — Dyspepsies douloureuses. — Hémorragies du Tube digestif. — Diarrhées aiguës. — Diarrhée des tuberculeux — Dysenteries bacillaires et amibiennes. — Etats cholériformes.

Doses. — 1^o Moyennes : 20 gr. par jour (un sachet) en une ou trois fois.

2^o D'entretien : 10 grammes par jour en une ou trois fois.

3^o Exceptionnelles : 100, 150, 200 grammes par jour dans les états cholériformes.

Mode d'emploi. — En suspension dans de l'eau pure, sucrée ou non, soit le matin à jeun en une fois, soit en 3 fois, avant chacun des repas principaux.

Prix. — 12 fr. pour un minimum de traitement de 12 jours.

Laboratoire de la Sulfoléine ROZET
BENDERITTER ET C^{ie}, à VENDOME
(Loir-et-Cher).

GASTRODIUM

Composition. — Carbonate acide de sodium, Bromure de sodium, oxyde de magnésium, carbonate de sodium, pepsine, pancréatine, diastase.

Indications. — Dyspepsies, gastrites, nerveuses en particulier, hyperchlorhydrie, dilatation, aérophagie, digestions difficiles, affections du foie.

Doses. — 3 cachets par jour, au milieu des repas.

Dépôt pharmacie Robert CHANTEREAU
51, rue de Paris — PIERREFITTE (Seine).

GASTRONALDINE

Estomac. — Foie. — Intestin.

Forme. — Paquets.

Formule. — Hépatine, Rénine, Gastérine, Belladone, Kaolin, Carbonate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate acide de Sodium. (Produits opothérapiques en milieu alcalin bien dosé.)

Indications. — Hyperchlorhydrie, Hypersécrétion gastrique, Pyrosis, Brûlures d'estomac, Troubles gastriques d'origine alimentaire ou nerveuse, Ulcères de l'estomac et du duodénum, Insuffisance motrice de l'estomac, Congestion du foie et des reins.

Mode d'emploi. — Suivant avis du docteur, 2 à 4 paquets par jour au milieu, à la fin ou entre les repas.

Prix : 15 fr. la boîte de 28 paquets.

Laboratoire Gastronaldine,

A. ROUX, pharmacien,

58, rue de Maubeuge. — PARIS (IX^e).

GASTROPANSEMENT

du Dr ZIZINE

Pansement polyvalent à base de charbon activé, réalisant la protection intégrale de la muqueuse gastrique.

Forme. — Paquets.

Composition. — Charbon polyvalent activé, très adhésif et d'un grand pouvoir d'adsorption, Kaolin purifié, Carbonate de bismuth, Carbonate de magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des ulcères gastriques et des gastropathies douloureuses.

Indications. — Hyperchlorhydrie.
Gastrites.
Spasmes du pylore.
Atonie gastrique.
Dyspepsies réflexes.
Ulcères.

Posologie. — Prendre le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner, et au besoin le soir, le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie, Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp, — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 28-96.

GASTRO-SODINE

Formé : Granulé.

Trois formules :

GASTRO-SODINE normale ;
GASTRO-SODINE S, sulfatée ;
GASTRO-SODINE B, bromurée.

Indications. — Gastro-entérites simples, Gastro-entéro-hépatites, Gastro-entérites neuro-arthritiques.

Doses. — Une cuiller à café le matin dans un verre d'eau de préférence chaude.

Prix : 10 fr. 75.

**Laboratoires Gastro-entérologiques,
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 69-13.

GASTROZYMASE

Composition. — Ferments gastriques naturels (opothérapie du suc gastrique de porc).

Action thérapeutique. — En plus du simple pouvoir de substitution, utilisable uniquement en cas d'hypo-pepsie ou d'apepsie, le système de ferments gastriques (zymases) rassemblés dans la GASTROZYMASE a la propriété de stimuler les fonctions gastriques déficientes, et, ce qui est le plus généralement intéressant, de régulariser et d'harmoniser ces fonctions digestives, défendant ainsi l'intestin contre l'envahissement des germes ou toxines pathogènes.

Forme. — Comprimés effervescents.

Indications. — Les troubles gastriques (qu'ils proviennent d'hypo ou d'hyperchlorhydrie, d'hypo ou d'hyperpepsie).

Posologie. — Comme médicament de substitution : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau au milieu du repas.

Comme stimulant gastrique : 1 à 2 comprimés dissous dans l'eau, 1 heure avant chaque repas.

Comme régulateur gastrique : 3 à 4 comprimés dissous dans l'eau au cours de chaque repas.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

GATERCODÉINE DOMERGUE

Principes actifs. — Gaïacol, Terpinol, Codéine.

Propriétés. — Antiseptique des Bronches. S'éliminant surtout par les voies respiratoires.

Présentation. — Capsules (boîte de 40).

Indications. — Enrouement, Pharyngites, Laryngites, Toux quinteuses, Catarrhes. Spécifique de la Coqueluche.

Mode d'emploi. — 2 à 6 capsules par jour
2 par 2. Enfants : 2 à 4.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DOMERGUE

AGEN (Lot-et-Garonne).

GAUROL

**Nouveau sel phosphoré, calcique et magnésien
entièrement assimilable.**

Présentation. — 3 formes : ampoules injectables de
1 cc. — Comprimés. — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique général de
l'organisme. — Reminéralisateur. — Récalcifiant.

Indications thérapeutiques. — Asthénie, Anémie,
Convalescence, Croissance, Tuberculose, Grossesse,
Allaitement, Affections dentaires, Rachitisme,
Troubles de l'ossification, Lymphatisme, Consoli-
dation des fractures.

Mode d'emploi. — 1 ampoule injectable par jour,
1 à 3 comprimés par jour ; 1 à 3 cuillerées à café de
granulé par jour.

GAUROL INTRAVEINEUX

Présentation. — Ampoules de 5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique
puissant, Récalcifiant, Reminéralisant.

N'est pas caustique comme le Chlorure de calcium.

Indications thérapeutiques.

En médecine :

Hémorragies et anémies qui en résultent.

Épanchements des séreuses.

Tuberculose pulmonaire (Traitement symptomatique
de l'asthénie, de l'anorexie, de l'amaigrissement).

En Chirurgie :

Hémorragies : à titre curatif et à titre préventif.

Consolidation des fractures.

Tuberculoses osseuses ou articulaires.

Mode d'emploi. — Injecter 10 cc. en cas d'urgence.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC

COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 09-71.

GAZE NÉOLÉE

Demi-grasse, antiseptique, non adhésive.

La *Gaze Néolée*, constituée d'un tissu à mailles assez lâches dont les fibres sont imprégnées d'un corps gras rendu stérile par l'adjonction d'essences antiseptiques (Niaouli, Thym, etc.), est à la fois perméable aux liquides aqueux tout en n'adhérant pas aux tissus. Elle réalise les trois conditions du pansement des plaies (brûlures, ulcères, escarres, amputations, etc.) :

- 1° Ne pas coller, de façon à éviter : douleurs, saignement et arrachement des jeunes flots cicatriciels, cause de réinfection et de retard dans la cicatrisation ;
- 2° Être perméable, de façon à permettre l'évacuation des divers suintements de la plaie et éviter la rétention du pus.
- 3° Ne pas gêner ou détruire l'action thérapeutique des médicaments utilisés pour les pansements.

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e).

GÉLOBARINE

Sulfate de baryum crémeux.

Préparation non toxique, très opaque, de bonne conservation.

Exploration radiologique du tube digestif.

Mode d'emploi :

Le contenu d'un flacon (200 gr.) constitue la dose habituelle pour un repas ou un lavement opaque. La Gélobarine peut s'employer pure ou incorporée à un excipient (chocolat par exemple).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

GÉLOGASTRINE LICARDY

Granulé ou tablettes.

A base de Gélose, Gélatine et Kaolin purifié.

Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.

Posologie. — *Traitement des douleurs de l'estomac :* 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulcère gastrique : 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et 1/2 heure avant chacun des principaux repas.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

GÉLO-PANSEMENTS GASTRO-INTESTINAUX

1^o *Gélo-kaol-belladoné* pour pansements gastriques et intestinaux.

Indications. — *Estomac.* Hyperchlorhydrie avec ses manifestations (brûlures, aigreurs, crampes).

Intestin. Coliques, Gaz, Tranchées, Diarrhées de fermentations.

2^o *Gélo-carbone-bismuthé* pour pansements intestinaux

Indications. — Spasmes douloureux de l'intestin, Coliques, Gargouillements, Intoxication alimentaire, Fermentations.

Mode d'emploi. — Verser le 1/2 contenu du couvercle-mesure dans une 1/2 tasse d'infusion très chaude un quart d'heure avant les 2 grands repas. 1/2 dose pour les enfants.

Prix : 12 fr. 50.

Dépôt général :

Laboratoire LAMBERT

8, avenue de Grammont — TOURS.

GÉLOR

Lubrifiant et régulateur de l'intestin.

Composition. — Emulsion solidifiée d'une finesse microscopique et de stabilité parfaite, de 60 p. 100 d'*huile de paraffine* chimiquement pure et de haute viscosité dans de l'*agar-agar* et du *suc d'oranges douces*.

Propriétés. — Gélor cumule les avantages de l'huile de paraffine et du mucilage sans en avoir les inconvénients ; suintements, saveur huileuse, digestion pénible.

Indications. — Traitement de la constipation sous toutes ses formes.

Son goût très agréable, sans aucune saveur huileuse, permet au malade d'absorber l'huile de paraffine sans s'en douter.

Posologie. — Doses quotidiennes à prendre aux repas :
Bébés : 1/2 cuillerée à café.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café selon l'âge.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café.

Prix en France : 13 fr. 50.

Laboratoires A. CESBRON

63, rue de la Faisanderie — PARIS (XVI^e).

GELOTANIN CHOAY

Nature. — Tannate de gélatine.

Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, dissociable dans l'intestin, en ses éléments antidiarrhéiques : tanin et gélatine.

Indications. — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.

Formes pharmaceutiques et posologie :

1^o Pour *nourrissons* et *jeunes enfants* : Paquets de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud.

2^o Pour *adultes* : cachets dosés à 50 cgr., 4 à 8 par jour.

Prix : 8 fr. la boîte de 20 paquets.

10 fr. la boîte de 24 cachets.

Laboratoire CHOAY

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

GÉNACIDE

Composition. — Granulé acigène contenant pour 100 gr. :

Phosphate bi-ammonique...	12 gr.	75 %
Chlorure ammonique.....	5 gr.	0 %
Ac. phosphorique officinal..	1 gr.	35 %

Cinq grammes représentent comme coefficient d'acidité en $\frac{N}{10}$ 150 cc.

Indication. — Alcalose.

Forme. — Granulé.

Dose. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

GENATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Dyspepsie hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux. Entérite muco-membraneuse.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.
Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Le flacon ou la boîte : 16 francs.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

GÉNERGOSINE

Tonique et reconstituant du Système nerveux.
(Phosphure de zinc, Métavanadate de Soude, Kola,
Caféine, Quassia).

Propriétés thérapeutiques. — Tonique Nervin, médication phosphorée parfaite par le Phosphure de Zinc. La présence du Métavanadate de Soude complète l'action du médicament en stimulant l'appétit et les fonctions digestives.

Indications thérapeutiques. — Etats neurasthéniques, dépression nerveuse, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences difficiles, etc.

Forme. — Comprimés-pastilles.

Dose. — 1 à 3 par jour.

(Conforme aux prescriptions légales, la Générgosine peut être prescrite aux assurés sociaux.)

Le flacon : 14 fr.

Laboratoire JONIDS
DIJON.

GENESERINE

Polonovski et Nitzberg
Salicylate de Gènesérine.

Formes. — Granulés et dragées au 1/2 milligr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules à 2 milligrammes.

Indications. — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

Mode d'emploi. — La dose moyenne est de quatre à six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses, contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours. Le flacon ou la boîte. Prix au public : 16 francs.

LABORATOIRE AMIDO
A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens. Sueurs des tuberculeux.

Formes. — *Gouttes* : XX gouttes = 1 milligr.
Granules au 1/2 milligr. *Ampoules* à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour.
Prix au public : le flacon ou la boîte,

16 francs.

Laboratoire **AMIDO**

A. BEAUGONIN Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

GÉNOMORPHINE

Polonovski et Nitzberg.

Formes. — Comprimés dosés à 2 centigrammes.
Ampoules à 4 centigrammes.

Indications :

La douleur : Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, douleur des cancéreux, crise gastrique du tabès, douleurs de l'ulcère et de l'entéro-colite, angine de poitrine, fractures, douleurs post-opératoires, migraines, névralgies, Dyspnée, asthme, anxiété, angoisse, agitations, délire, insomnies, cure de démorphinisation.

Mode d'emploi. — 4 centigrammes de Génomorphine correspondent à 1 centigramme de morphine.

Comprimés : 2 à 4 par jour.

Ampoules : 1 à 2 par jour.

Laboratoire des **Produits Amido**

A. BEAUGONIN, pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

GENOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications.

ETATS PARKINSONIENS, Paralysie agitante, Syndromes post-encéphalitiques, Anesthésie chirurgicale.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 milligr.

Granules au 1/2 milligr.

Ampoules dosées à 3 milligr. et à 1 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes 2 fois par jour. Quatre à 10 granules par jour. Anesthésie chirurgicale : 4 granules la veille de l'opération. Trois quarts d'heure avant l'opération, 1 ampoule de Génoscopolamine suivie de l'injection de 1 cgr. 1/2 de morphine.

Prix au public : Le flacon : 20 fr.

La boîte d'ampoules : 30 fr.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

Ampoules. Granules. Gouttes.

GENOSTHÉNIQUES

Cacodylate de Genostrychnine et de Gènesérine
Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Asthénies, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Psychasthénie, Surmenage intellectuel, Asthénie intellectuelle et physique des vieillards, Convalescence des maladies graves, Asthénie cardiovasculaire des infections, Asthénie de la croissance, de la grossesse, de la lactation, des anémies.

Formes. — Ampoules de 2 cc. Granules. Gouttes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes ou 2 ou 3 granules aux trois principaux repas.

Ampoules. — Injecter une ampoule tous les jours pendant dix jours.

Prix au public : 18 francs.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges.
PARIS (IV^e).

GENOSTRYCHNINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Système nerveux, Paralysies diphtériques, Paralysies bulbaires, Cœur et circulation, Alcoolisme, Asthénie, Neurasthénie, Affections oculaires.

Formes. — *Gouttes* : XXX gouttes = 5 milligr. *Granules* à 0 gr. 002. *Ampoules* à 0,01.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.

Dose injectable : une ampoule par jour.

Le flacon ou la boîte : 14 fr.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

GÉRANINE

(Vermicide universel)

Composition. — Diméthylcyclooctodiéanol, essence de melaleuca viridiflora.

Action thérapeutique. — Agit sur tous les parasites intestinaux (tænia, oxyures, tricocéphales, ascaris, protozaires, etc.).

Avantages. — Médicament non toxique, sans aucun danger, n'incommodant pas le malade.

Présentation. — Capsules gélatineuses : 16 par boîte.

Mode d'emploi :

Contre le tænia : deux fois 8 capsules à 1/2 heure d'intervalle.

Contre les oxyures : 2 capsules à chaque repas pendant 3 jours.

E. BOULLÉ, Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-Interne des Hôpitaux

Lauréat de la Faculté de Paris

12, avenue de la Grande-Armée — PARIS (XVII^e).

GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme stabilisé dans des extraits végétaux. Non toxique. Goût agréable.

Indications. — Employée contre la coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émetisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-bronchites, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Gripes pulmonaires, etc, etc.

Propriétés. — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif, Combat efficacement l'infection.

Agit sur le symptôme Toux et sur l'affection qui le provoque. N'est pas toxique et n'a aucune action nuisible sur les fonctions digestives, propriétés précieuses qui permettent de prescrire directement la *Germose* aux nourrissons atteints de bronchites, de coqueluche, etc., etc., dans un peu de lait ou simplement dans de l'eau sucrée ou non.

Forme. — Gouttes concentrées : 1 gr. (46 gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé.

Doses habituelles dans les 24 heures. — Jusqu'à 1 an, 4 fois X gouttes; de 1 à 3 ans, 4 et 6 fois XV gouttes; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois XXX gouttes; au-dessus, 4 et 6 fois XL gouttes. A prendre dans une ou deux cuillerées d'eau ordinaire ou sucrée ou un peu de tisane

Nota. — Le médecin peut prescrire, sans inconvénient, la *Germose* à des doses plus élevées; il doit même le faire si les résultats ne lui paraissent pas suffisamment rapides.

Dans tous les cas, les doses doivent être prises aussi régulièrement que possible, toutes les deux ou trois heures, par exemple, sans tenir compte des accès de toux ou des quintes.

Aucune contre-indication.

Laboratoires LEBEAULT

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

GERNAL

Indications. — Traitement des affections des voies respiratoires.

Composition. — Huile d'olive neutre et stérile adrénalinée à 1/50000^e, géranium, eucalyptol, essence de menthe.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne et lubrifie la muqueuse nasale sans aucune irritation, antiseptique et désodorisant.

Mode d'emploi. — En basigeonnages fréquents à l'aide d'un tampon de coton monté sur une tige métallique contenue dans la boîte.

Laboratoires P. SOULIÉ
333, rue de Vaugirard — PARIS (XV^e).

GLANDOCALCYL

Récalcifiant. — Réminéralisateur.

Composition. — Surrénales, fluorure et formiate calciques, carbonate et phosphoglycérate de chaux et de manganèse, di-phosphate tricalcique et poudre d'os frais.

Indications. — Débilité, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, rachitisme, troubles de la croissance, carie dentaire, fractures, maladies des os, lymphatisme, adénites, hérédité et pré-tuberculose.

Formes. — Pour *adultes* : cachets ; pour *enfants* : granulé.

Doses. — 2 ou 3 cachets par jour aux repas. 1 ou 2 cuillerées à café deux fois par jour suivant l'âge de l'enfant. Faire dissoudre dans un peu d'eau ou mieux le croquer comme un bonbon.

Prix : *Cachets*, 12 fr. ; *Granulé*, 14 fr.

Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie médicale
40, rue Claire-Paullhae — TOULOUSE.

GLAXO

Lait sec provenant d'animaux parfaitement sains au pâturage toute l'année. Desséché par le procédé des cylindres et additionné de vitamine D, ce qui assure une assimilation maxima de la chaux et évite toute intolérance des graisses et tout trouble digestif. Composition uniforme et très voisine de celle du lait humain. Contrôle chimique et bactériologique rigoureux : par sa pureté, Glaxo est supérieur à tous les autres laits (1 000 fois plus pur que le lait cru aseptique, 100 000 fois plus pur que le lait ordinaire de consommation).

Digestibilité parfaite. Conservation de longue durée.

Deux formules : degré normal (20% de crème).
demi-crème (10% de crème).

Indications. — Alimentation exclusive ou allaitement mixte du nourrisson. Toutes les intolérances lactées. Troubles gastro-intestinaux (entérites, diarrhées, vomissements). Convient particulièrement aux prématurés, aux débiles, aux athrepsiques. Très utile comme aliment de transition entre la diète hydrique et la reprise de l'alimentation habituelle. Sera encore prescrit chez les adultes qui tolèrent mal le lait de vache, au cours des maladies nécessitant une alimentation substantielle et de digestion facile. Rendra enfin de grands services en voyage et dans les colonies.

Posologie. — Diluer la quantité voulue de Glaxo dans sept fois son poids d'eau bouillie chaude.

Laboratoires RISSA

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.

GLÉSOL COUTURIÉUX

Médication Antistaphylococcique.

Description. — Capsules kératinisées contenant :

Etain colloïdal	0 gr. 03
Levurine Extractive	0 gr. 12
Soufre colloïdal	0 gr. 03
Ferments lactiques.....	0 gr. 06

En flacon de 50 capsules.

Action thérapeutique. — L'*étain colloïdal* est un puissant antistaphylococcique, très bien toléré ; la **LEVURINE EXTRACTIVE** agit comme anti-infectieux polyvalent et augmente notablement la leucocytose ; le *soufre colloïdal* modifie les réactions cutanées et renforce l'action de l'étain ; enfin les *ferments lactiques* transforment le milieu intestinal et s'opposent aux fermentations putrides.

Indications. — Le GLESOL, groupant dans sa formule les meilleurs anti-staphylococciques connus trouve son emploi dans le traitement des furoncles, anthrax, abcès, phlegmons, annexites, acné, folliculites, et en un mot dans toutes les affections dues au staphylocoque.

La dose est de 4 à 10 capsules par jour pour les adultes, selon la gravité des cas à traiter. Pour les enfants, doses proportionnelles suivant l'âge.

Laboratoires COUTURIÉUX

18, avenue Hoche — PARIS.

GLOBEXINE

Les Analbumines

Conception nouvelle de l'opothérapie hématique spécifique. Extrait aqueux total du globule sanguin privé de ses albumines, directement et complètement assimilable. Jamais d'anaphylaxie.

Propriétés thérapeutiques. — Régénération globulaire intensive.

Indications. — Anémies, croissance, grossesse, états infectieux, hémorragies de toutes natures.

Forme. — Ampoules buvables 10 cc.

Dose moyenne :

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour.

Enfants : 1/2 dose.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D. E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS

GLOBULES FUMOUCZE

Iodure de Potassium.

Globules à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac, et à excipient résineux, graduellement soluble dans l'intestin, supprimant les phénomènes d'intolérance de l'estomac et de l'organisme.

Doses. — Les *Globules Fumouze* à l'iodure de potassium sont préparés sous deux formes :

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 25 par globule.

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 10 par globule.

Indications. — Les *Globules Fumouze* iodure de potassium sont prescrits dans toutes les maladies où l'emploi de l'iodure est indiqué.

Établissements FUMOUCZE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

GLOBULES REBAUD

Formule :

Iodure de Caféine bromurée	7.50
Extrait de Polygala.....	0.30
Extrait de Lobelia.....	0,05
Extrait thébaïque.....	0,02
pour 30 globules.	

Indications. — Asthme, emphyseme, oppressions. Soulagement immédiat, guérison rapide.

Posologie. — 4 par jour, 2 à chaque repas.

Prix : 15 francs plus l'impôt, 0 fr. 95.

Laboratoire DALICHOUX

36, rue Verdi — NICE (Alpes-Mar.).

GLOBULES ROMON

Forme. — Globules glutinisés.

Composition. — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'Yohimbine et au phosphore de zinc pur.

Indications. — Traitement le plus rationnel de l'impuissance.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Observation. — La même formule existe également en ampoules : *Ampoules Romon*.

Dose. — Une injection tous les 2 jours.

La boîte de 10 ampoules : 40 fr.

Le flacon de 40 globules : 25 fr.

Laboratoires ROMON

6, rue Bridaine — PARIS.

GLOTTYL

Composition. — Association d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, Drosera, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

Formes pharmaceutiques. — Gouttes et Dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les sécrétions. Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

Indications. — Laryngites aiguës et chroniques, Trachéites, Bronchites, Toux coqueluchoïdes.

Posologie. — *Gouttes* : Jeunes enfants : X gouttes par année d'âge et par jour (en plusieurs prises). Enfants : XX à XXX gouttes, 4 à 5 fois par jour. Adultes : XL à LX gouttes, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane. *Dragées* : sucer 6 à 12 par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DENIS

85 bis, rue du Ranelagh — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 13-89.

GLOXINES

Protéinothérapie spécifique des tumeurs

Formes. — Ampoules buvables de 1 cc.

Composition. — Globulines spécifiques extraites de tissus néoplasiques par la méthode et sous le contrôle scientifique du Dr Rubens-Duval, et diluées en solution physiologique au taux de 10⁻²¹.

Propriétés. — Renforcent les réactions de défense de l'organisme contre le développement des cancers en ramenant les cellules cancéreuses vers une évolution normale.

Doses. — Une ampoule par jour dans un quart de verre d'eau sucrée à jeun ou une 1/2 heure avant le repas.

Durée de conservation. — Illimitée.

Durée du traitement. — Peut être prolongé pendant des mois et des années.

Choix des Gloxines. — Les Gloxines étant spécifiques de la variété des tissus dont elles proviennent, il convient dans chaque cas d'employer la Gloxine provenant d'une tumeur semblable.

L'indication du numéro sur l'ordonnance est indispensable pour éviter toute erreur d'interprétation.

Désignations médicales non portées sur l'étiquette.

- N° 1. Épithéliomas épidermoïdes de la bouche, langue et lèvres et des orifices naturels.
- N° 2. Cancers épithéliaux de l'estomac.
- N° 3. Épithélioma cylindrique du gros intestin et du rectum.
- N° 4. Épithélioma Wolffien de l'ovaire.
- N° 5. Épithélioma germinatif de l'ovaire.
- N° 6. Épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes cornés de la peau.
- N° 7. Épithélioma basocellulaire de la peau.
- N° 8. Adénomes et épithéliomas de la prostate.
- N° 9. Épithélioma du sein, type ordinaire.
- N° 10. Épithélioma du corps thyroïde.
- N° 11. Épithéliomas du col de l'utérus à cellules cylindriques et basocellulaires.
- N° 12. Épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes du col de l'utérus.
- N° 13. Épithéliomas à cellules cylindriques du corps de l'utérus.

Désignations portées sur l'étiquette,

- N° 1. Muqueuse buccale et linguale, orifices cutanés ou muqueux.
- N° 2. Estomac (muqueuse).
- N° 3. Gros intestin (muqueuse).
- N° 4. Ovaire (Wolffien).
- N° 5. Ovaire (germinatif).
- N° 6. Peau — Malformations épidermoïdes cornées.
- N° 7. Peau — Malformations basocellulaires.
- N° 8. Prostate.
- N° 9. Sein (glande mammaire).
- N° 10. Thyroïde.
- N° 11. Utérus col — Malformations à cellules cylindriques. Malformations basocellulaires.
- N° 12. Utérus col. — Malformations épidermoïdes.
- N° 13. Utérus corps. — Malformations à cellules cylindriques.

Prix de la boîte de 20 ampoules buvables : 24 fr. Dépôt : O. C. P.

Laboratoire des Gloxines

H. FOURNIER, Pharmacien

133, Avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVII^e). Tél. : Marcadet 51-87

GLUCALCIUM R. X.

Gluconate de Calcium pur.

Formule. — Solution stérilisée à 10 p. 100 de gluconate de calcium en ampoules de 5 et 10 cc.

Le Gluconate de Calcium ($C^6H^{11}O^7$)₂ Ca est le sel calcique de l'acide gluconique ($C^6H^{11}O^7...$) obtenu par l'oxydation du glucose ($C^6H^{12}O^6...$).

Mode d'emploi. — Injections endoveineuses et intramusculaires.

Indications. — Décalcification, déminéralisation, faiblesse générale, hémorragies diverses, hémoptisie, épistaxis, phlegmatie pulmonaire aiguë, dermatose, manifestations exsudatives.

Laboratoire Chimique et Thérapeutique

A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS.

GLUCOLACTOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous les N^{os} 363-21-22 et 23.

Formes. — Solution. — Ovules. — Topique.

Composition. — Acide lactique glucose, Extrait de matricaire, Extrait de sauge.

Propriétés pharmacodynamiques. — Restitue à la cavité vaginale ses moyens naturels de défense : Acide lactique et Glycogène.

Indications. — Hygiène des muqueuses, Toilette quotidienne, Leucorrhées (Métrite, Vaginite, Salpingite).

Mode d'emploi :

Solution : 3 cuill. à café pour 1 litre d'eau (injection).

Ovules : 1 par jour.

Topique : Pour pansements gynécologiques.

Solution (le flacon)..... 15 fr. (en France).

Ovules (la boîte)..... 15 fr. —

Topique (le flacon)..... 15 fr. —

Laboratoires A. BAILLY.

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

GLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ

Granulé dosé à 0,50 de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

Indications. — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervin. — Médicament des enfants ; des mères pendant la période de l'allaitement ; des déprimés.

Dose. — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Le flacon : 12 fr. 50.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (Xe).

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,15 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,30 centigr. par cuillerée-mesure.

Ampoules injections dosées à 0,20 centigr. par ampoule de 2 cc.

Doses et mode d'emploi. — 2 cuillerées de Granulé ou 4 comprimés : par jour 2 fois dans un peu d'eau ; ampoules, 2 cc. 3 fois par semaine.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

Indications. — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

GLYCOCARPINE

Eléments actifs. — Nitrate de pilocarpine (2 mmgr. par pilule) ou par X gouttes, associé à de faibles doses d'hamamélis et cimicifuga, et à 0,02 de caféine.

A. — Médication vaso-dilatatrice.

Céphalées et vertiges des artérioscléreux, Hypertension artérielle et ses conséquences, Troubles congestifs de la ménopause et de la puberté. Maladie de Raynaud, Claudication intermittente par spasme artériel, Angor par spasme des coronaires, Glaucome, Mouches volantes, Bourdonnements d'origine circulatoire (seulement).

B. — Troubles vago-sympathiques.

Insuffisance du vague, Freinage du sympathique, Asthme, Coqueluche, Basedow fruste, Pelade.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 pilules ou XX gouttes au début des trois repas.

Echantillons (modèles de vente).

C. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe.

49, quai Saint-Vincent. — LYON.

GLYCO-LACTIMASE

Description. — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

Action thérapeutique. — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, entérites, affections du foie.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

GLYCO-M.

Composition. — Benzoate, Salicylate, Bicarbonate et Borate de soude, formant avec le Thymol une solution du Thymolate de soude (dose à 4 p. 100). Glycérine à 30° C. P. 17 p. 100. Menthol, 0,04 p. 100. Essence de Gaultheria, Pinus et Eucalyptol, 0,06 p. 100.

Propriétés particulières. — Antiseptique, analgésique, alcalin et exosmotique, non toxique, non irritant et non caustique. Par ses qualités désodorisantes, est d'une valeur incontestable dans l'ozène et la fétidité buccale.

Indications. — Dans le traitement des affections et infections de toutes les muqueuses. **Pharyngite, angine et laryngite** : 1 partie pour 2 d'eau chaude, en gargarismes ou pulvérisations. **Catarrhe, coryza, rhumes, fièvre des foins et végétations adénoïdes** : Une partie pour 3 d'eau chaude en lavages nasals au moyen de la pipette Kanar. **Gynécologie** : injections à 5 p. 100. Le soir en tampons saturés de GLYCO-M. pure à garder toute la nuit.

Gencives spongieuses et maladies buccales. — En bains de bouche, pure, en brassant toutes les parties de la bouche, pendant un quart d'heure. Au coucher, en tampon saturé, inséré entre les lèvres et la gencive, et à conserver toute la nuit.

A efficacité égale, l'antiseptique alcalin l'emporte sur l'antiseptique acide :

Par ses propriétés qui lui sont toutes particulières, la « GLYCO-M. » attire à travers les tissus les sécrétions congestionnées et enflammées, active la circulation du sang, et rétablit rapidement un état normal. Par sa réaction alcaline, elle s'harmonise avec les tissus traités, de sorte qu'elle n'irrite pas.

LA GLYCO-M. est un antiseptique alcalin non toxique et non irritant. Sa formule, basée sur la composition saline du sang, est approuvée par le Corps Médical et c'est lui seul qui a appris au public sa valeur dans le traitement de toutes les muqueuses.

Se vend dans toutes les Pharmacies :

En flacons de 100 grammes : 6 francs, modèle de poche.

En flacons de 200 grammes : 10 francs, modèle stilligoutte.

En flacons de 500 grammes : 20 francs, demi-litre.

En bocaux de 3 litres..... : 90 francs, modèle familial.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous le N° 333-2.

Laboratoire GLYCO-M.

Etablissements GEO-MIQUEL

3, avenue Lowendal,

PARIS — (VII°).

GLYCO-THYMOLINE

Selon la formule de KRESS et OWEN Co.

Traitement des affections de toutes les muqueuses.

Composition :

Biborate de soude.	2,010	p. 100
Thymol	0.037	—
Menthol.....	0,037	—
Acide benzoïque.....	1,689	—
Bicarbonate de soude...	2,346	—
Cajeputol	0,075	—
Acide orthoxybenzoïque.	0.074	—
Huile de pin.....	0,037	—
Huile de bouleau.....	0,030	—
Glycérine, Colorant, Alcool, Eau distillée.....	93,665	—

Avantages. — La Glyco-Thymoline est une solution dont la formule a été scientifiquement étudiée et dont l'alcalinité et la composition saline ont été mises en harmonie avec l'alcalinité même du sang et des sécrétions muqueuses, ce qui lui permet de n'apporter aucun trouble dans l'équilibre humoral et de n'altérer en rien la vitalité des tissus.

Action thérapeutique. — Par son alcalinité et son pouvoir exosmotique la Glyco-Thymoline provoque un appel des sécrétions muqueuses et vide les culs-de-sac glandulaires de leur contenu vicié, rétablissant ainsi le fonctionnement physiologique des glandes congestionnées. Elle est dépourvue de toute toxicité, ne coagule pas les albumines, et ne produit aucune action irritante.

Indications. — *Voies digestives:* Catarrhe gastrique et intestinal, Fermentations,

Flatulence, Embarras gastrique, Maladies infectieuses, Entérite, Parasites intestinaux, Dysenterie.

Cavité buccale : Stomatite, Aphtes, Gingivite, Pyorrhée alvéolaire, Fluxion dentaire.

Pharynx et gorge : Angines, Pharyngite, Laryngite, Affections des voies respiratoires.

Voies nasales : Coryza aigu ou chronique, Rhinite, Rhume des Foins, Végétations adénoïdes, Sinusite.

Yeux : Conjonctivite, Blépharite ciliaire, Kératite, Granulations des paupières, Trachome, Ectropion.

Maladies de la peau : Erysipèle, Furonculose, Anthrax, Acné, Eczéma, Zona, Ulcères variqueux, Brûlures.

Rectum et région anale : Prurit anal et eczéma local, Hémorroïdes, Prostatite.

Gynécologie et Obstétrique : Pertes blanches, Vaginite, Ulcérations du col, Métrites, Salpingites, Suites de couches.

Plaies de toute nature.

Mode d'emploi. — a) Usage externe : à utiliser pure ou diluée dans 1 à 10 parties d'eau.

b) Usage interne : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau.

Prix :

100 cc.	6 francs.
250 cc.	12 —
500 cc.	20 —
Modèle Hôpital (3 litres)....	90 —

Remise spéciale au corps Médical.

Etablissements WEBER

A. GUILLAUME, Pharmacien

5 bis, rue des Haudriettes — PARIS (III^e).

GLYCTONE PHOSPHATÉE CHARRIÈRE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 439-3, en vue de la possibilité de prescription aux Assurés sociaux.

Zomo-Chimiothérapie.

Nous réclamons près du Corps Médical le bénéfice de la priorité de l'idée et de la première application thérapeutique de la Zomochimiothérapie, ayant été les créateurs de cette association médicamenteuse et de sa mise commerciale à la disposition du médecin.

Forme. — Liquide.

Composition :

Arséniate de soude	5 centigr.
Glycérophosphate de soude.	5 grammes.
Sulfate de strychnine	8 milligr.

Ferments musculaires, Corps Immunisants, Albuminoïdes spécifiques et Vitamines des muscles frais, Matériaux salins vitalisés phosphatiques, Hémoglobine du Plasma de bœuf additionné de sucs de cerise et de framboise, Saccharose, 500 cc.

Dose. — *Après les repas :*

Enfants : 1 à 6 cuillerées à café ou à dessert par jour suivant âge.

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe pure ou non, de préférence dans de l'eau froide gazeuse ou du lait froid.

Indications :

Anémie, Chlorose, Convalescence, Post-opérations, Grossesse et Allaitement, Epuisement musculaire, Surmenage, Rachitisme, Tuberculose, Misère physiologique et Déchéances physiques carentielles. Post-hémorragies.

Contre-indications :

Albuminurie, Diabète et Artério-sclérose.

Prix :

Le flacon de 500 cc. : 35 fr.
Le 1/2 flacon de 250 cc. : 20 fr.
Sans impôt.

Laboratoires L. ARQUEVAUX & Co,
Pharmacien à ETAMPES (S.-et-O.).

GLYKOLAÏNE ROBIN

Association de la kola
aux glycérophosphates.

Granulé.

Dose et mode d'emploi :

1 à 2 cuillerées à café par repas.

Indications :

Stimulant du système nerveux, Surmenage, Névralgies, Neurasthénie.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy
PARIS.

GLYPHOSPHER

Elixir non sucré, à très faible degré alcoolique,
à base de Glycérophosphates chimiquement
purs :

Glycérophosphate de Soude cristallisé.

— de Fer.

— de Quinine.

— de Strychnine.

Stimulant de la nutrition chez les surmenés,
neurasthéniques, convalescents, anémiques.
Réminéralise l'organisme, reconstitue la cellule nerveuse :

Asthénie, anémie, chlorose, phosphaturie, névralgies faciales et sciatique, hystérie.

Sa composition permet d'en recommander
l'emploi dans le diabète.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, Chemin de Combe-Blanche — LYON.

GMET

(Extraits Gmet.)

Extraits végétaux liquides concentrés sans alcool, ni sucre, ni éther, par le procédé spécial Gimbert qui permet d'obtenir une *extraction complète sans altérer la plante.*

Correspondent tous à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Se prescrivent tous : de 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, après ou entre les repas ou un peu avant.

Boldo, v. page 154.	Kola.
Composé, v. page 247.	Piscidia.
Condurango, v. p. 253	Quinquina, v. p. 890.
Crataegus, v. p. 259.	Sauge.
Frêne.	Ulmaire.
Fucus.	Valériane, v. p. 1155.
Gui, v. page 471.	Viburnum.
Hamamelis, v. p. 477.	Diurétique, v. p. 315.
Hydrastis.	Extrait Hamyd, v. page 372.
Jugland.	

Littérature sur chaque produit et échantillons sur demande adressée au :

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 43-10.

GOBEROL

Poudre complètement soluble dans l'eau chaude et donnant une *solution oxygénée, alcaline, isotonique et analgésique*.

Perborate de soude, Métaborate de soude, Menthol.

En poudre et comprimés.

1 paquet ou 1 comprimé pour 2 litres d'eau (plus si cela est nécessaire).

Affections gynécologiques :

Prophylaxie, Obstétrique, Hygiène intime. Toilette, Leucorrhées.

En gargarismes : Toutes les Angines.

Ni toxique, ni corrosif, ni salissant, ni acide.

Alphonse CHARMAISON

Pharmacien de 1^{re} classe de l'Université de Paris,

26, avenue de Royat
CLERMONT-FERRAND

GOBILLETES HYPNOS

Lutte contre le bruit.

Mode d'action. — Obstruent le conduit auditif et permettent l'isolement des bruits extérieurs : sifflet et passage des trains, roulement et avertissement des automobiles, bruit des hôtels, passage des autobus, tramways, etc... Préviennent les effets funestes de notre vie trépidante et assourdissante sur le système nerveux.

Indications. — Assurent le repos des malades sans hypnotiques, suppriment tout bruit ; permettent de dormir malgré les vibrations sonores les plus intenses.

Indispensables aux nageurs, artilleurs, aviateurs, à tous ceux qui vivent au milieu du vacarme et sont exposés à la surdité.

Laboratoires HYPNOS

CHABEUIL (Drôme).

Téléph. 14.

GOMENOL

Essence provenant d'une variété sélectionnée de *Melaleuca viridiflora*.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, anticatarrhal, désodorisant, hautement diffusible. Toxicité et causticité nulles.

Action thérapeutique et usages. — Préconisé, à l'intérieur, comme balsamique et anticatarrhal. Convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires : Bronchites, bronchectasies, tuberculose. On le prescrit utilement dans l'urétrite et la cystite. — A l'extérieur, il est surtout employé en inhalations et pulvérisations dans le coryza, les laryngites, les bronchites, la coqueluche : en pansements chirurgicaux dans les cas de brûlures, plaies septiques, ulcères, furoncles, phlegmons ; en pansements vaginaux dans les métrites. — Le GOMENOLEO à 5 % est un bon antiseptique nasal non irritant. — Sous forme de GOMENOLEO, il est donné en injections intra-musculaires (tuberculose) et intra-trachéales (laryngite tuberculeuse, bronchite fétide, tuberculose pulmonaire) ; en instillations intravésicales (cystites). Contre les infections généralisées, tendre à l'imprégnation goménolée.

Laboratoire du GOMENOL

48, rue des Petites-Ecuries — PARIS (X^e).

GONACRINE

Chlorure de 3-6-di-amino-10-méthyl-acridinium (sel neutre).

Antiseptique puissant très diffusible, peu toxique, non irritant. Action élective à l'égard du Gonocoque.

Indications. — Affections gonococciques et leurs complications, Septicémies, Fièvre ondulante (*M. Melitensis*).

Posologie et mode d'emploi. — Lavages de l'urètre ; solution de 1/8.000 à 1/1.000. Injections intraveineuses : ampoules de solution à 0,50 p. 100 et à 2 p. 100.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

GONAGONE

Vaccin antitoxique et antimicrobien, adopté par les hôpitaux de Paris et de l'armée.

Stock vaccin polymicrobien renfermant :
Corps microbiens + Lysat microbien + Anatoxine.

Indications. — *Toutes les infections génito-urinaires de l'homme et de la femme.*

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les 3 ou 4 jours, de 1/4 de cc. à 2 cc. progressivement.

Ovules au Gonagone pour pansements vaginaux (Modèle spécial pour enfants).

H. CARRION et C^{le}

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

Tél. : Elysées 36-64 et 36-45.

GONO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Lysat de Gonocoques (Souches sélectionnées).

Indications. — Urétrites, métrites. Complications de la blennorragie : Rhumatismes, Epididymite, Prostatite, etc...

Posologie. — En injections sous-cutanées. 3/4 de centicube le 1^{er} jour, ensuite injections quotidiennes de 1 centicube jusqu'à 12 injections, puis 1 cc. tous les deux jours.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 centicube.

Prix : 25 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XXII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

GOSIERINE DALLOZ

Formule p. 100 :

Cocaïne.....	0,05
Menthol	0,40
Borate de soude.....	4,00

Forme.

Dragées.

Propriétés. — Analgésiques, antiseptiques et antispasmodiques.

Action. — Antisepsie de la bouche et des voies respiratoires, soulagement immédiat et guérison des aphtes, gingivites, amygdalites, laryngites, angines, etc...

Doses. — 6 à 8 dragées par jour, pour les adultes.

La boîte : 6 fr. 25.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS.

GOUTTES ANTISPASMODIQUES DAUSSE

A base de benzoate de benzyle et de Gelsémium.

X gouttes = 0 gr. 04 de Benzoate de Benzyle
et II gouttes de gelsémium Dausse.

Indications. — Tous les états spasmodiques : *asthme vrai, coqueluche, hoquet persistant, affections spasmodiques du tube digestif, coliques utérines, vomissements de la grossesse, crises vasculaires des hypertendus.*

Posologie. — *Adultes* : XX à XL gouttes par prise, répétées suivant les cas, 4 ou 5 fois par jour ; à prendre dans un peu d'eau sucrée ou de lait.

Enfants : X gouttes par jour et par année d'âge.

GOUTTES PHOSPHOSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives, en association avec l'acide phosphorique officinal.

XX gouttes renferment :

1 milligramme de sulfate de strychnine ;

III gouttes d'acide phosphorique officinal.

2 centigr. d'extrait de quina ;

2 centigr. d'extrait de Coca.

Indications. — *Asthénie, atonie nerveuse, neurasthénie, adynamie des convalescents, dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.*

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

GOUTTES ARSÉNOSTHÉNIQUES DAUSSE

Association de la Strychnine par voie gastrique à doses progressives, avec le méthylarsinate de soude.

XX gouttes renferment :

Un milligramme de sulfate de strychnine ;

Cinq milligrammes de méthylarsinate de soude.

Deux centigr. d'extrait de quina ;

Deux centigr. d'extrait de cola stabilisée.

Indications. — *Atonie nerveuse, asthénie, amaigrissement, neurasthénie, adynamie.*

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

Laboratoires DAUSSE
4, rue Aubriol — PARIS (IV^e).

GOUTTES BLAGNY

Formes. — Gouttes, Sirop, Dragées.

Formule. — 1 cc. représente L gouttes et contient :

Dionine.....	5	mmgr.
Codéine.....	5	—
Bromoforme.....	5	—
Eau de laurier cerise.....	5	—
Teinture aconit.....	10	cgr.
— de droséra.....	40	—
Alcoolé de Punch.....	10	—

N. B. — Dans les Dragées, l'eau de laurier-cerise est remplacée par du thiocol.

Indications. — Toux spasmodiques rebelles, Coqueluche, Asthme, Emphyseme, Bacillose et toutes les maladies des voies respiratoires.

Pas d'accoutumance, aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — 1° Gouttes : Adultes :

XL à L gouttes 4 fois par jour dans une infusion chaude ou de lait tiède.

Enfants au-dessus de 7 ans : X à XV gouttes, 3 fois par jour. Ne pas donner au-dessous de 2 ans.

2° Sirop : Adultes : 4 cuillerées à soupe. Enfants de 7 à 10 ans : 4 cuillerées à café ; au-dessus de 10 ans, 4 cuillerées à dessert par 24 heures.

3° Dragées : Adultes : 6 à 8 par 24 heures. Enfants à partir de 7 ans seulement : de 2 à 6 par 24 heures.

Nota. — Il est recommandé de prescrire par doses croissantes.

Prix :

Gouttes : 12 fr. ; Sirop : 14 fr. ; Dragées : 12 fr.

Laboratoires R. PAMELA

22, rue de la République

FORGES-LES-EAUX (Seine-Inf.).

GOUTTES DAYNOC

(Fébrifuge antiseptique).

Composition. — Cent grammes contiennent :

Oxyde de méthylène	1 gr.
Huile essentielle d'ail naturelle.....	0 gr. 05
Para-Isopropylmétacrésol.....	0 gr. 10

Indications. — Utilisé pour l'usage interne et l'usage externe.

1° *Usage interne.* — Bronchites récentes et chroniques, Tuberculose, Coqueluche, Fièvre paludéenne (Malaria), Troubles gastro-intestinaux.

Les GOUTTES DAYNOC sont précieuses pour le traitement des gazés de guerre.

2° *Usage externe.* — Infections de la bouche et de la gorge, Maladies de la peau, piqûres, morsures.

Doses moyennes. — *Adultes* : XL à L gouttes 3 fois par jour.

Enfants : XV à XX gouttes 3 fois par jour.

Nourrissons : I goutte par mois d'âge 3 fois par jour.

Prix : 21 fr. 20 (Impôt compris).

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

GOUTTES DE SERÛ

Extrait total et concentré des galbules
de cupressus sempervirens.

Indications. — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. Spécifique *efficace sûr et constant* des varices, ulcères variqueux, périphlébites, hémorroïdes, varicocèles et des troubles de la ménopause.

Dose moyenne. — XXX gouttes avant chacun des deux principaux repas.

Prix au public : 10 francs.

LETTRY

69, rue de Sèvres — PARIS.

GOUTTES HALOGÈNES

Du docteur BERN.

Reminéralisation magnésienne intensive.

XL gouttes = 1 gr. 21 sels halogènes de magnésium chimiquement purs et anhydres.

Indications. — Dépression physique et intellectuelle. Infection des voies intestinales et biliaires. Maladies de la peau, Verrues, Prophylaxie du Cancer.

Posologie. — XL gouttes dans 1/2 verre d'eau le matin avant le petit déjeuner. 1/2 dose pour les enfants.

Prix du flacon : 15 francs.

OVULES HALOGÈNES

du Docteur BERN.

Magnésiées et goménolées, ni toxiques, ni caustiques.

Propriétés. — Antiseptiques. décongestives, cicatrisantes et désodorisantes.

Indications thérapeutiques. — Métrites, Leucorrhées et toutes infections ou ulcérations.

Prix : 18 francs, la boîte de 6.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, Place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE (Haute-Garonne).

GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE

Composition :

Extrait de Gui	0,05
Nitrite de Soude.....	0,01

Indications. — Contre l'artériosclérose et l'hypertension artérielle.

Formes :

1^o *Gouttes* : Le flacon : 14 fr.

2^o *Ampoules* : La boîte : 18 fr.

Laboratoires **FRAISSE**

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

GOUTTES LIVONIENNES DE TROUETTE-PERRET

Capsules de goudron de Norvège, de Créosote de Hêtre et de Baume de Tolu.

Indications. — Rhumes, toux, bronchites, catarrhes, tuberculose, maladies des voies respiratoires, antisepsie des voies digestives.

Le meilleur moyen de faire tolérer la créosote. Médicament préventif et curatif.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 8 Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret par jour *au milieu des repas*.

Bien spécifier : GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET, pour éviter les contrefaçons.

Prix au public : 9 fr. 90.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, rue des Immeubles-Industriels,
PARIS (XI^e).

GOUTTES MAGALO

Composition. — Solution de chlorure de magnésium pur à 50 p. 100 super-activé par un sel de manganèse.

Mode d'action. — Médicament d'équilibre minéral, tonique, cholagogue; de goût agréable, bien supporté par l'estomac; la plus économique de toutes les préparations similaires.

Indications. — Affections du foie et de l'estomac, asthénies, verrues, cancer.

Etablissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

GOUTTES MALONE

du Docteur GUESNE

Composition. — Allylisopropylmalonylurée dans un solvant hydro-glycériné aromatisé.

Propriétés. — Action antispasmodique remarquable non toxique.

Indications. — Véritable médicament spécifique de la *coqueluche* (amélioration immédiate, guérison en huit ou quinze jours), résultats constants, si la dose donnée est suffisante. Indiqué aussi dans les *toux rebelles ou émetisantes*, la laryngite striduleuse, les convulsions, délires et tous états spasmodiques.

Mode d'emploi :

Nourrissons : avant 6 mois, III gouttes toutes les 3 heures ; de 6 mois à 1 an, III gouttes toutes les 2 heures.

Enfants : de 1 à 2 ans, VI gouttes toutes les 2 heures.

de 2 à 4 ans, IX — 2 heures.

de 4 à 6 ans, XII — 2 heures.

de 6 à 10 ans, XV — 2 heures.

Adultes : XX à XXX gouttes toutes les 2 heures.

Ces doses peuvent être *augmentées* largement et même *doublées*, sans aucun inconvénient.

Laboratoires du MALONE

J. Vincent, pharmacien

ANCENIS (Loire-Inférieure)

GOUTTES NICAN

(Sans sucre)

Composition. — Bromoforme et Codéine purs, Aconit Belladone, Drosera, Grindelia, Benzoate de Soude, Eau de Laurier-cerise.

(IV Gouttes = 1 goutte de Bromoforme stabilisé)

Caractéristiques. — Association synergique des principes médicamenteux reconnus les plus efficaces de la toux spasmodique, ramenés par un procédé spécial à un très faible volume et parfaitement dissous. La présentation par gouttes permet la précision du dosage clinique et fractionné à tous les âges, assure la continuité du traitement, et garantit contre les accidents dus à l'insolubilité du bromoforme.

Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite.

Indications thérapeutiques. — Toux spasmodique et quinteuse en général ; Coqueluche, Grippe, Toux des Tuberculeux, Asthme, Toux laryngées, Adénopathie trachéo-bronchique, Coryza, toux rebelles. Hoquet persistant, Dysménorrhée, etc.

Mode d'emploi. — A absorber loin des repas dans une tasse de liquide tiède, eau, grög, ou lait (enfants) qu'on agitera en ajoutant les gouttes.

L'emploi, avec une tasse de lait tiède sucré, supprime en majeure partie le goût du bromoforme désagréable à certains malades.

Doses moyennes par jour en 4 fois :

Adultes : CCXL gouttes.

Enfants : XII gouttes par année d'âge.

Calme et repos immédiats, et dans les toux grippales, jugulation souvent en quelques heures.

Dans la COQUELUCHE, doses fractionnées et croissantes.

Médication permettant l'emploi du bromoforme chez les enfants en bas âge.

Doses initiales :

Adultes : CXX gouttes.

Enfants : VIII gouttes par année d'âge.

A prendre en 3-4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

N. B. — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, cas excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si nécessaire.

Échantillons et Littérature

Laboratoires CANTIN

PALAISEAU (S.-et-O.)

SABOURIN - 51, rue Jean-Robie — BRUXELLES.

GOUTTES PILKA

(Pilka Golaz ou Thymipin).

Composition :

Les gouttes *Pilka* sont essentiellement composées des dialysés de Thym, Grassette et Drosera (absolument sans danger pour les nourrissons).

Propriétés :

Action élective spéciale due aux constituants des plantes entrant dans cette préparation.

Indications :

A recommander dans la *coqueluche* et les *toux convulsives* des enfants et des adultes, ainsi que les *toux des tuberculeux* et les *affections des bronches* en général : bronchite, pneumonie, asthme.

Mode d'emploi :

On donne le matin à jeun et le soir en se couchant : aux *enfants*, I à X gouttes de *Pilka*, dans un peu d'eau ; et aux *adultes*, V à XXX gouttes.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e).

GOUTTES SCANDINAVES

à l'essence de sève de pin, au gaïacol,
au goudron pur.

Forme. — En capsules gélatineuses légères et très digestes. *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Propriétés. — Antisepsie des voies respiratoires par l'essence de sève de pin.

Indications. — Toux, rhumes, bronchites à toutes les périodes, catarrhes, emphyseme, tuberculose chronique.

Dose. — 6 à 8 capsules par jour, dont 3 à 4 avant chaque repas.

Prix au public : 9 fr.

Laboratoire du D^r H. PHILIPPE

14, rue du Palais-Grillet — LYON.

GRAINS DE VALS

Composition végétale et opothérapique.

Podophyllin 0,01.

Cascara et Bourdaine (extrait) ââ 0,025,

Belladone (extrait), 0,01

Bile 0,02 Erepsine 0,01, Entérokinase 0,01.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif régulateur de l'intestin ne donnant pas de coliques, pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation, embarras gastrique ; les grains de Vals décongestionnent le foie et la vésicule biliaire.

Pas de contre-indications.

Prix, le flacon de 30 grains : 4 fr. 50.

Laboratoire H. NOGUÈS

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

Anciennement : 11, rue Joseph-Bara, PARIS

GRAINS D'ÉVIAN

Laxatif entéro-hépatique doux.

Indications. — Constipation chronique, Stase incipiens, accidents stercorémiques, Hépatisme.

Composition. — Extraits biliaires et intestinaux, Podophylline, Purgène, Belladone, Rhamnus frangula, Rhamnus purshiana.

Propriétés thérapeutiques. — Activent les fonctions hépatiques et pancréatiques, accroissent la biligenèse, provoquent une hypersécrétion intense de toutes les glandes intestinales. Ni coliques, ni irritation. Pas d'accoutumance. Laxatif sûr, très doux, atoxique, parfaitement toléré.

Dose et mode d'emploi. — Un ou deux grains au début du souper ou au coucher avec une tasse de thé.

Prix : la boîte : 6 fr.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires J. PERROCHON

57, rue Origet — TOURS.

LES GRANIONS

Diastases métalliques de synthèse

Procédé E. FOUARD, D^r ès sciences.

Propriétés essentiellement nouvelles.

1^o Conservation indéfinie sans altération de l'état colloïdal et des propriétés thérapeutiques.

2^o Suppression de la réaction du choc.

Communications

Académie des sciences, 7 février 1927

Congrès de Lyon (avancement des sciences), 1926.

Granions			La boîte
As	Tuberculoses, dermatosés, anémie, dénutrition, etc.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale, inject. intramusculaires et intraveineuses.	18 fr.
Argent	Infections générales locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.	20 fr.
Cuivre	Cancer, angiocholites cholécystites.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale.	18 fr.
Bismuth	Syphilis.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.	20 fr.
Mercure	Syphilis.	id.	18 fr.
Iode	Hypertension, rhumatismes, syphilis, tuberculose, etc.	En ampoules de 2 cmc. pour infections, en solution pour voie buccale.	18 fr. 14 fr.
Soufre	Sciaticque, rhumatismes.	En flacon : voie buccale.	25 fr.
Or	Tuberculose, infections, générales, locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.	25 fr.
Sélénium	Cancer	Ampoules de 2 cmc. injections intraveineuses, intramusculaires, voie buccale.	25 fr. 25 fr. 18 fr. 25 fr.
Osmium			
Magnésium			
Uranium			

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoires FOUARD

61, rue G.-Lauriau — MONTREUIL (Seine.

F. GAUTIER, pharmacien.

Téléphone : Avron 01-42

GRANOXYL

**Reconstituant bic-énergétique
polyvalent.**

Composition. — Iode, Tanin, Glycéro de manganèse et de chaux, Phosphore végétal, Arséniate de Strychnine.

Indications. — Troubles de croissance. Fatigue de l'adolescence. Décalcification. Anémie. Convalescence.

Deux Présentations :

Adultes : *Granoxyl Elixir*, 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Enfants : *Granoxyl Granulé*, 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

GRANULES DE PANTOFORT

du Docteur BOVEIL

Composé formé des plus énergiques stimulants, destiné à favoriser l'assimilation, à combattre la déminéralisation, le surmenage, la déchéance organique du système nerveux, la dépression générale.

Composition. — Nucléinate de Manganèse, Sulfate de Strychnine, Quassine cristallisée, Arséniate de soude.

Indications. — Surmenage physique ou intellectuel, asthénie, épuisement nerveux, lymphatisme, neurasthénie, suite de grippe, convalescence, état pré-tuberculeux.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 6 granules par jour, 1 ou 2 avant chacun des 3 repas. *Enfants* : demi-dose.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 fr. la boîte de 60 granules.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 346-3.

Marc Paris, Pharmacien de 1^{re} classe.

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e).

GRANULES DES VOSGES

Composition. — Aconit, Drosera, feuilles Belladone, Cte Thébaïque et Dionine.

Indication. — TOUX, Picotements et Mucosités de la Gorge, Rhumes de cerveau, GRIPPE.

Médicament indispensable aux personnes qui, parlant beaucoup, se fatiguent et ont besoin d'un bon tonique des Bronches : Professeurs, Médecins, Avocats, Chanteurs.

Les « Granules des Vosges » sont d'une activité rapide et certaine et, étant d'un petit volume, il est toujours facile d'en avoir sur soi.

Posologie. — 2 granules le matin vers 9 heures, 2 l'après-midi vers 5 heures, 3 le soir en se couchant.

Ne pas en donner aux enfants au-dessous de 6 ans.

Laboratoire G. BERNHARD

11, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

GRASSYL BUISSON

A base de chaton de saule frais.

Antispasmodique d'origine exclusivement végétale, dépourvu de toute toxicité.

Sédatif de l'éréthisme nerveux.

Régulateur du déséquilibre neuro-végétatif.

Indications :

Etats spasmodiques. — Nervosisme. — Angoisse — Palpitations. — Règles douloureuses. — Troubles de la ménopause et de la puberté. — Insomnies diverses.

Posologie :

Une à deux cuillerées à café trois fois par jour et avant de se coucher, dans un peu d'eau ou une infusion.

Prix de vente au public : 16 francs.

Prix médical : 10 fr. 10

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès-sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

GRAVURAL

Composition. — Urotropine, tartrate de pipérazine, formiate, salicylate et benzoate de lithine.

Forme. — Granulé effervescent.

Indications. — 1° Affections du foie, lithiase, constipation, tous troubles de la nutrition, arthritisme.

2° Toutes affections du rein, de la vessie, de l'urètre : cystites, pyélonéphrites, lithiase.

3° Goutte, obésité, rhumatismes, artériosclérose.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour dans 1/2 verre d'eau, 1/2 heure avant ou 2 heures avant ou après les repas.

M. L. DURAND, Pharmacie de l'Institut
28, rue de Seine — PARIS (VI^e).

GUERYSIPÈLE

Pommade.

Formule du D^r Mangin-Bocquet.

Composition. — Saccharosate calcaire, 20 gr. Mercure bichl., 0 gr. 10. Excipient (lanoline, vaseline), Q. s. p., 100 gr.

Propriétés. — Pommade *Anti-infectieuse, Bactéricide, Lénitive, Adoucissante, Antiprurigineuse.*

Indications. — En première ligne : *érysipèle*. Nous insistons sur la guérison sûre et rapide de cette affection, même dans les cas les plus graves et les plus étendus. Guérison de l'*Érysipèle* de moyenne intensité en 3 ou 4 jours.

Lymphangite, Eruptions eczématiformes d'origine infectieuse, Furoncle, Anthrax, Pyodermites, Impétigo, Folliculites, Sycosis, Plaies ou piqûres septiques, Pustules varioliques, Tous les prurits.

Tube petit modèle : 12 fr. Tube grand modèle : 25 fr.

Laboratoire J. MESSIS

71, avenue de la République — CHAMPIGNY (Seine).

GUÉTHURAL

(Allophanate de Guéthol).

Forme. — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques, ni caustique, ni irritant. Calme la toux.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections pulmonaires à hypersécrétions. Bronchites, Bronchorrhées, Catarhes, Grippe, etc.

Mode d'emploi. — 3 à 4 cuillerées à café, prises dans l'intervalle des repas, dans un peu d'eau, de tisane, ou croquées tout simplement.

Laboratoires PÉPIN ET LEBOUCC
COURBEVOIE (Seine). Tél. : Défense 09-71.

GUI BYLA

(Vaso-dilatateur, antiscléreux,
antihémorragique).

Contient l'alcaloïde, les saponines et l'inosite du gui.

Propriétés thérapeutiques. — Hypotenseur par action centrale sur les vaso-dilatateurs. Dépresseur de l'excitabilité exagérée. Toni-cardiaque par action myocardique. Diurétique par action cardio-rénale.

Indications. — Artério-sclérose, hypertension, cardiopathies artérielles, albuminurie, néphro-sclérose, éclampsie, hémoptysies, hémorragies, ménorragies, épistaxis, migraines.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

GUI GMET

Liquide sans alcool ni éther

Composition. — Extrait *total* du viscum album sous forme liquide ; mieux assimilable que les pilules. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés — Régulateur cardiaque et artériel, Hypotenseur, Diurétique, Vaso-dilatateur.

Indications. — Hypertensions, Cardiopathies artérielles, Artério-sclérose, Anévrysmes, Hémoptysies, Hémorragies, Éclampsie (dans la grossesse fait baisser l'albuminurie).

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, une ou deux fois par jour, entre les repas.

Laboratoire GMET

27, Faubourg Montmartre. — PARIS (IX^e)

GUIPSINE

Principes utiles du Gui.

Indications thérapeutiques. — Véritable régulateur du travail du cœur et de la circulation générale, non vaso-constricteur.

Médication hypotensive. — Hypertension, Artério-sclérose, Hémoptysie, Goutte, Troubles de la Ménopause (Spécifique). Néphro-sclérose, Prostatisme.

Doses et mode d'emploi. — Pilules à 0,05 : 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour (réservées aux cas d'urgence).

Prix de vente au public : 18 fr.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e)

GUTTOLÉOL

Huile antiseptique à 2 p. 100, à base d'eucalyptol et de citron.

S'emploie facilement chez l'enfant, en raison de l'huile de citron, qui lui confère, outre ses propriétés antiseptiques, une odeur agréable.

Indications. — Rhinites, Adénoïdites, Coryzas, Grippe, Otites, Rhinopharyngites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

S'emploie en injections intratrachéales.

<i>Nourrissons</i> : II gouttes	} dans chaque narine 3 fois par jour.
<i>Enfants</i> : III à IV gouttes	
<i>Adultes</i> : V à VI gouttes	

Pulvérisations.

Laboratoires MAIRE, pharmacien,
171, rue de Belleville. — PARIS.

GYNERGÈNE « SANDOZ »

Composition. — Tartrate de l'Ergotamine cristallisée ($C^{33} H^{36} N^6 O^5$), principal alcaloïde isolé de l'ergot de seigle et principe actif spécifique. Produit pur, exactement dosable.

Formes. — Ampoules : 1 cc. d'une solution à 1/2 pour mille de tartrate d'ergotamine pour injections intramusculaires et sous-cutanées. — Solution à 1 p. 1000, usage interne. — Comprimés : 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

Propriétés thérapeutiques. — Le Gynergène Sandoz est le plus puissant des hémostatiques utérins et le sédatif du sympathique. Effets constants.

Indications. — Toutes hémorragies utérines. Atonie de l'utérus. Cancer utérin. — Les sympathicotomies. Migraines, Basedow, Tachycardies, Hémoptysies.

Posologie. — 1/4 de cc. à 1 amp. par jour. XV à XXX gouttes ou 1 à 2 comprimés 2 fois par jour.

PRODUITS SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X°).

Dépôt général et vente :

USINE des PHARMACIENS de FRANCE
129, rue de Turenne — PARIS (III°).

GYNOCALCION

Forme M. — Traitement rationnel des troubles de la *Ménopause* naturelle, chirurgicale ou radiothérapique, de la sclérose-utérine.

Forme P. — Traitement des accidents de la *Puberté* chez la jeune fille.

Propriétés. — Agit sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse ; agit par son phosphore sur l'élément douleur ; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques (extrait ovarien et orchitique).

Le *Gynocalcium P* agit en outre par son Hypophyse (lobe antérieur) sur le développement général et le fonctionnement ovarien de la jeune fille.

Doses. — *Gynocalcion M.* — 10 à 12 dragées par jour, huit à dix jours par mois. Dans les formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

Gynocalcion P. — 10 à 12 dragées par 24 heures en série de dix jours par mois.

Effets rapides. Tolérance parfaite.

Echantillons, Littérature :

LABORATOIRES CORTIAL

15, boulevard Pasteur — PARIS.

GYNÆSTRYL

(Folliculine cristallisée du D^r Roussel.)

Deux présentations :

1^o Voie hypodermique. — GYNÆSTRYL-ampoules.

Boîtes de 6 ampoules huileuses de 1 cc., contenant chacune 500 unités-rat, soit 1/10 de milligramme de folliculine cristallisée.

Mode d'emploi. — De 1/4 de centimètre cube à 1 ampoule entière tous les deux jours, en commençant une semaine après la cessation des dernières règles.

Cesser 10 jours avant la date présumée des prochaines règles.

Indications thérapeutiques. — Toute la vie génitale de la femme, puberté, castration, stérilité, vomissements incoercibles, ménopause.

2^o Voie buccale. — GYNÆSTRYL-gouttes.

Flacon de 10 cc. de solution hydro-alcoolique. 1 goutte = 10 unités-rat.

Mode d'emploi. — De X à L gouttes par jour et davantage, loin des repas, à prendre 7 jours après les règles.

Cesser 10 jours avant la date présumée des règles suivantes.

Indications thérapeutiques. — Puberté, Aménorrhée, Castration, Stérilité, Vomissements incoercibles, Ménopause.

Laboratoire Français de Chimiothérapie,

89, rue du Cherche-Midi. — PARIS.

GYNOPAUSINE

Composition. — Association pluriglandulaire (thyroïde-ovarine) à un nouveau sel de Benzyle, le Sedobenzyl ($C^6 H^5 CH^2 SO^3 K$) antispasmodique et hypotenseur.

Propriétés thérapeutiques. — Le Sedobenzyl ($C^6 H^5 CH^2 SO^3 K$) est un nouveau sel de benzyle. C'est un produit stable, très soluble dans l'eau, non toxique aux doses habituelles, qui s'élimine aisément et qui peut être employé sans danger pendant un temps prolongé. Il a surtout une action antispasmodique, aussi a-t-il une action sédative dans les règles douloureuses, les coliques utérines et les douleurs de la métrite aiguë ou chronique.

Indication. — Insuffisance ovarienne, troubles de la ménopause et de la puberté, coliques salpingiennes ou utérines, dysménorrhée.

Dose et mode d'emploi. — 2 cachets ou 4 comprimés par jour avant les repas. Il est possible de prescrire, dans certains cas, 3 et même 4 cachets par jour, avant les repas. Le traitement doit être suivi de préférence dans les 8 à 10 jours qui précèdent l'époque des règles.

Laboratoire ODILIA.

E. LACOMBE, pharmacien

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

HALOCURE IRRADIÉ

Toni-reconstituant phosphoré aux sels halogènes de magnésium.

Formule. — Phytinates de chaux et magnésie, ergostérine irradiée titrant 6 000 unités biologiques antirachitiques au centigramme. (Définition de Lesne. (Communication de l'Académie de Médecine du 5 mai 1931.)(Vitamine D.) Sulfate de manganèse, chlorure de magnésium.

Forme. — Granulé fondant.

Indications. — Toutes les Carences phosphorées-calciques (Grossesse, Dentition, Phosphaturie, Neurasthénie, Rachitisme, Dégénérescences cellulaires, croissance, etc.).

Posologie :

Nourrissons : 1 à 2 demi-cuillerées à café par jour.

Enfants (2 à 12 ans) : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix de vente : 16 fr. 50 dans toutes les Pharmacies.

Peut être prescrit aux assurés sociaux.

Société Française d'Extension bio-chimique
2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre, SAINT-QUENTIN
(Aisne).

HAMAMÉLINE ROYA

Principe actif aromatique de
l'Hamamelis virginica, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en dilution convenable (20 cgr. p. cuill. à soupe) l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extr. actif, inerte au point de vue vasculaire.

Propriétés. — Vaso-constricteur, Tonique des fibres lisses, Sédatif vasculaire, Stimulant circulatoire.

Indications. — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses (Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes). Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dysménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause).

Dose. — Par Cuill. à soupe, 2 à 4 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien
41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). — Lab. 08-00.

HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'Hamamelis Virginica.

Indications. — Maladies du système vasculaire,

Varices, Phlébite.

Hémorroïdes.

Troubles congestifs de la Ménopause, Artério-sclérose.

1° Gouttes concentrées : de XXX à XL gouttes par 24 heures.

Prix : 12 fr. 75

2° Élixir (Préparation très agréable au goût). 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon,

Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris
17, rue Cadet — PARIS.

HAMAMELIS GMET

Composition :

Extrait total, liquide et sans alcool de l'hamamelis virginica, correspondant à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés :

L'absence d'alcool conserve à notre préparation toutes les propriétés décongestives de la feuille d'hamamelis, tandis que les préparations alcoolisées ont une activité restreinte. L'Hamamelis Gmet agit sur les fibres lisses de la paroi veineuse qu'il tonifie. (Plus actif que les cachets de poudre et les comprimés.)

Indications :

Toutes les dilatations et inflammations veineuses, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, conjonctivites, angines congestives, fibromes, prostatites, varicosités du nez et du visage. Accidents de la puberté, de la menstruation et de la ménopause. Vertiges, bourdonnements, bouffées de chaleur après les repas. Varices au cours de la grossesse, etc.

Posologie :

1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant le repas, une ou deux fois par jour. Hémorragies (fibromes) une cuillerée à soupe trois fois par jour dans une tasse d'eau froide. Lavements. Applications locales. Gargarismes.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

HAMAMELIS GRANDVAL

Forme et Composition. — Gouttes renfermant sous le plus petit volume l'activité complète de la feuille d'Hamamelis traitée de façon à fournir un produit soluble dans l'eau, possédant l'arome tout spécial de la plante et d'une activité incomparable dans tous les cas de :

Indications. — Varices. — Hémorroïdes. — Ulcères variqueux. — Métrites. — Accidents du retour d'âge. — Hémorragies. — Œdème chronique. — Congestions, etc., etc.

Dose. — XXX à XL gouttes avant chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. — Dans les cas aigus, on pourra doubler la dose sans inconvénient, pendant quelques jours.

Le 1/2 flacon : 6 fr. — Le flacon : 11 fr.
(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12-14, rue Féry — REIMS.

HECTARGYRE

Spécifique de la Syphilis.

Indications. — Syphilis, Paludisme.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes* : 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou XL gouttes par jour pendant les 4 premiers jours ; ensuite LX ou LXXX pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).

HECTINE

Spécifique de la Syphilis
et succédané du cacodylate de soude.

Indications. — Syphilis, Paludisme, Fièvre des Foins, Tuberculose, Anémie.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes* : 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine)

HÉMAGÈNE TAILLEUR

EMMÉNAGOGUE-ANALGÉSIQUE COMPLET
à effet polyvalent et immédiat.

Forme. — Dragées.

Composition. — Folliculine, Principes vaso-dilatateurs, et analgésiques sélectionnés.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la dysménorrhée et des coliques post-partum.

Indications et posologie.

1° **DYSMENORRHEE** : 2 dragées dès l'apparition des douleurs ; une demi-heure après ; deux autres. Maximum : 8.

2° **AMENORRHEE et MENOPAUSE** : 4 à 6 dragées par jour.

3° **COLIQUES POST-PARTUM** : 2 dragées par heure. Maximum : 10.

Petit flacon de 12 dragées : 8 fr.

Grand flacon de 30 dragées : 15 fr.

Laboratoire SEVENET

10, rue Le Chapelais — PARIS (XVII°).

HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsénicale
phosphorée-strychnique.

Doses et mode d'emploi. — Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

Propriétés thérapeutiques. — Lymphatisme. Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

Tonique puissant, antiscrofuleux.

Eugène PETIT

Pharmacien de 1^{re} classe
Ex-interne des Hôpitaux de Paris
ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

HÉMATOÉTHYROIDINE

Composition. — Sang d'animaux éthyroïdés mélangé à parties égales avec de la glycérine chimiquement pure.

Forme. — Liquide. Comprimés dosés à 0,50 et correspondant à une cuillerée à café du produit liquide.

Indications. — Goitre exophtalmique, Hyperthyroïdie, Troubles d'excitation nerveuse, Insomnie, Hémophilie.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour avant les repas ou 2 à 6 comprimés au moment des repas.

Laboratoire de Biologie appliquée

H. CARRION et Cie

54, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie.

HEMATO-IODINE

États lymphatiques et anémiques,
Adénites chroniques.

La boîte de 36 cachets :

15 francs, prix public.

Le tube de granulés :

15 francs, prix public.

Laboratoires STENE

2, place des Vosges

PARIS (IV^e).

HÉMAXOL

Troubles nerveux dysménorrhéiques.

Etats congestifs et douloureux.

Action. — Sur l'élément congestif utéro-ovarien :
Hamamelis. — Vaso-moteur : Marron d'Inde.
Sur l'élément douleur : Anémone.

Indications. — Règles douloureuses, Hémorragies
utérines, Etats congestifs des Vieillards, Hémor-
roïdes, Varices, Métrites et Ovarites.

Formes. — Elixir et comprimés-pastilles.

Dose et Mode d'emploi :

Comprimés : 4 à 8 comprimés-pastilles par jour
avant les repas.

(Conforme aux prescriptions légales, l'Hémaxol
peut être prescrite aux assurés sociaux.)

La fiocon : 14 fr.

Laboratoire JONIDS

DIJON.

HÉMOANTITOXINE « SOFOS »

de l'Institut du P^r E. Maragliano

Composition. — Sang de bœuf immunisé contre la tuberculose, contenant 20 p. 100 d'antitoxine Maragliano 25 p. 100
 Alcool 14 —
 Glycérine 10 —
 Eau aromatique 51 —

Indications. — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofulose. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

Formes et Posologie. — *Simple* : une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas).

Triple : même dose (s'emploie dans les périodes fébriles). Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Prix : 20 francs.

Echantillons et vente en gros : H. PERRIN-BRUNO

4, rue Désirée — LYON.

MURARD, Pharmacien.

HÉMOCALCIOPECTINE

L'Hémostatique rationnel.

Solution antihémorragique de Pectine et de Chlorure de Calcium.

Inaltérable. Non toxique. Non anaphylactysante.

Indications thérapeutiques. — Toutes les hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies gastriques et intestinales, rénales, vésicales, utérines, Hémophilie, Hémorragies opératoires et post-opératoires.

Présentation. — Ampoules buvables de 10 cc. Boîtes de 3 et 6 ampoules.

Mode d'emploi. — De 1 à 6 ampoules par 24 heures dans de l'eau sucrée ou un jus de citron.

Dépôt général :

Pharmacie J. ROBERT

J. BOUDIER, Successeur,

Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-préparateur à la Faculté de Médecine

37, rue de Bourgogne — PARIS.

Tél. : Littré 64-53.

HÉMO-CYTO-SÉRUM

CORBIÈRE

Composition. — Soluté de cacodylate de sodium chimiquement pur, fer et strychnine.

Mode d'emploi. — Une injection intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, accroît la valeur globulaire.

Indications. — Anémies de toutes origines. Convalescences, Chlorose, Surmenage, Troubles de la croissance et de la puberté.

Présentation. — Hémo-Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 21 francs.

Hémo-Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 15 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques

CORBIÈRE

27, rue Desreñaudes — PARIS. Tél. : Carnot 78-11

HEMODROME

(Berberis vulgaris, Thlaspi)

Forme. — Extrait fluide à prendre en gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Action supérieure à l'hamamelis et similaires. Assimilation plus rapide sous sa forme liquide que les produits présentés en pilules ou comprimés.

Indications. — Varices, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause. Règles irrégulières, Phlébite.

Posologie. — XV à XX gouttes 3 ou 4 fois par jour dans un peu d'eau.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS.

HÉMODUCTYL

Pilules ou Solution.

Extraits d'hamamelis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

Dose moyenne. — 2 pilules, 1 cuillerée à café de solution, matin, midi et soir, avant les repas.

Indications. — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

Laboratoires LICARDY

38, boul. Bourdon — NEUILLY-PARIS.
Téléphone : Maillot 17-75.

HEMOFER

(Cachets)

Reconstituant général.

Formules. — Nucléinate de manganèse, protoxalate de fer, surrénine, phosphure de zinc, arrhénal, Hémoglobine, associés aux sels de chaux et aux amers.

Indications. — Anémie, amaigrissement, grossesse, allaitement, états pré-tuberculeux, manque d'appétit.

Laboratoire LOBRY

6, rue Parrot — PARIS (XII^e).

HÉMOFLUIDOL

(Dragées)

Fluidifie le sang.

Chaque dragée contient :

Silicate de soude..... 0 gr. 12

Citrate de soude 0 gr. 20

Artériosclérose

Hypertension

Troubles circulatoires

Deux dragées matin et soir avant le repas

Laboratoire LÉONARDON

Docteur en Pharmacie, Arcachon.

Dépositaire général : O. C. P. Paris

HÉMOGÉNOL DAUSSE

Sérum hémopoïétique de cheval.

Formes. — Ampoules d'Hémogénol contenant 10 cc. de sérum liquide.

Sirop d'Hémogénol à base de sérum hémopoïétique.

Dragées d'Hémogénol contenant chacune 0 gr. 15 de sérum hémopoïétique desséché, enrobé dans le gluten.

Indications. — Tous les états d'*adynamie* et toutes les *cachexies*. Puissant stimulant de l'hémopoïèse, particulièrement indiqué dans le traitement des *anémies*. Hémostatique énergique recommandé dans les affections hémorragiques et l'*hémophilie*.

Mode d'emploi. — Ampoules d'Hémogénol. — 1 à 3 ampoules par jour prises par la bouche dans un peu d'eau sucrée ou en lavements.

Dragées d'Hémogénol. — Avaler, sans croquer, 4 à 6 dragées par jour.

Sirop d'Hémogénol. — Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour. — Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV°).

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des syndromes anémiques.

Nature. — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine contient :

- 1° Une hémoglobine vivante, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
- 2° Les substances minimales globulaires intactes ;
- 3° Les substances minimales du plasma (Hémo-poïétines, cytopoïétines) non altérées.

Ces éléments sont incorporés à un excipient dosé avec soin, sorte de sérum aseptique où leur vitalité persiste.

Action :

- 1° Apport d'hémoglobine vivante (fer globulaire).
- 2° Stimulation prudente des organes hémopoïétiques (Hémocytopoïétines).
- 3° Puissante action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

Indications :

Anémies.
Chlorose.
Déchéances organiques.
Tuberculose.
Convalescences.
Grossesses.
Suites de couches.
Paludisme.

Posologie. — Une cuillerée à potage au début ou à la fin des 2 principaux repas.

Doubler dans les cas graves.

Pas de contre-indications.

Littérature et échantillons :

DESCHIENS

Docteur en Pharmacie.

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII^e).

HÉMOLUOL

Traitement rationnel des troubles des fonctions menstruelles et des affections du système veineux.

Composition. — Éléments activés par synergie. *Thlaspi* (capsella Bursa Pastoris), *Berberis*, *Hamamélis*, *Quina*, *Viburnum pruni folium*, *Anémone pulsatille*.

Extraits de choix, combinés judicieusement sans perte de substances actives, en un élixir agréable à prendre.

Décongestif, tonique, stimulant des vaso-moteurs centraux. Analgésique et sédatif de l'appareil utéro-ovarien.

Indication. — Troubles des fonctions menstruelles. Aménorrhée, dysménorrhée douloureuse, ménopause naturelle et opératoire.

Insuffisances veineuses. Varices, hémorroïdes, phlébites, etc.

Pesologie. — 1 cuill. à café dans un peu d'eau avant chacun des trois repas, quinze jours par mois.

Laboratoires Docteur FERRE

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

HÉMOPANBILINE

Forme. — Comprimés et Solution

Définition. — L'*Hémopanbiline*, application de la méthode modifiée de Whipple, est une *Panbiline* (voir *Panbiline*) à laquelle est ajouté l'*Extrait Hépatique* spécial, avec toute son *efficacité hémopoïétique*, mais d'où sont exclus les albuminoïdes et les lipoides, source de méccraptés.

Composition. — *Panbiline* (Opothérapies hépatique et biliaire associées aux Chologogues) *Extrait hémopoïétique de Foie*. Hémoglobine et Citrate de fer ammoniacal.

Indications. — Médication hépatique des *Anémies, Chlorose, Convalescence, Etats de déchéance, Ictère hémolytique*.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café, ou 10 à 20 *Comprimés d'Hémopanbiline* par jour à prendre avant les repas.

Enfants : demi-dose.

Prix au public :

17 francs le flacon d'Hémopanbiline liquide.

17 fr. la boîte de 100 *Comprimés d'Hémopanbiline*.

Laboratoire du Docteur **PLANTIER**

ANNONAY (Ardèche).

HEMOPAUSINE

Composition. — Liqueur à base de : Hydrastis, Viburnum, Hamamélis, Capsicum, Cinéraria, Sels de chaux, Gentiane, Ecorce d'oranges amères.

Action. — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

Indications. — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

Mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Adolescents : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Laboratoire de l'HÉMOPAUSINE

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

HÉMO-PHAGOSTYL

Phagostyl ferrugineux
(pour adultes).

Formule :

Cacodylate de soude pur.....	20 centigr.
— de magnésie	10 —
Sulfate de strychnine	2 milligr.
Fer colloïdal.....	2 centigr.
Soluté chloruré isotonique	5 cc.

Indications :

Chloro-Anémie, Anémies de toute origine, Asthénie, Troubles de la puberté, Douleurs périodiques, Surmenage, Convalescences, Leucémies.

Emploi :

Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

HÉMOPHILINE PLANCHE

Elixir et Dragées.

Composition. — Elixir, à base de piscidia, hydrastis, Hamamélis, viburnum, persil, sénéçon, salsepareille spéciale.

Dragées, mêmes plantes fraîches stabilisées sous forme d'extraits obtenus dans le vide.

Tous deux contiennent en plus le catalyseur général de la femme (détecté par analyse vibratoire), ce qui en augmente l'activité et en décuple l'efficacité.

Indications. — Formation de la jeune fille, de la femme mal réglée, malaises précédant ou accompagnant les époques, régulateur du flux menstruel trop ou pas assez abondant dont il calme les douleurs : aménorrhée, dysménorrhée, ménorragie, troubles généraux de la ménopause.

Modes d'emploi. — *Elixir* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau.

Dragées : 12 à 16 par jour, pendant la durée des règles.

Prix : 13 fr. 50, impôt compris.

Laboratoire PLANCHE

Membre de l'Académie de Médecine

P. SAUVAGE, successeur

2, rue Volney — PARIS (II^e).

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Opothérapie sanguine totale.

Toutes les déchéances organiques quelle qu'en soit l'origine.

Constitution. — Extrait protoplasmique de globules sanguins d'animaux réfractaires à la tuberculose contient : Hémoglobine dont l'activité oxydasique est maxima, sérum sanguin, lipoides des globules rouges, lipoides et ferments des leucocytes.

Indications. — Toutes anémies :

- 1° Toxiques d'origine exogène ou endogène ;
- 2° Infectieuses (convalescences, tuberculose) ;
- 3° Par spoliation sanguine (hémorragies) ;
- 4° Par cachexie néo-plasique.

Doses courantes. — L'Hémoplase Lumière peut être administrée par voie buccale, sous forme de granulés, de cachets et de dragées.

Granulés.....	de 2 à 6 cuil. à café par jour ;
Cachets.....	de 4 à 6 par jour.
Dragées.....	de 6 à 10 —

Chez les enfants employer de préférence la forme en granulés : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Ampoules. — Pour l'administration par voie intramusculaire.

Adultes : 2 ou 3 ampoules de 10 cc. par semaine ;

Enfants : 2 à 10 cc. deux fois par semaine.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté — LYON.

HÉMORROÏDINE GOUTTES

Composition. — Hamamelis, hydrastis, intrait de marrons d'Inde.

Propriétés. — Régulateur de l'insuffisance veineuse et de ses conséquences.

Indications. — « L'Hémorroïdine gouttes » est une préparation rationnelle applicable au traitement des hémorroïdes, avant tout, mais dont peuvent bénéficier d'autres manifestations veineuses, à savoir : *varices, varicocèles, ulcères variqueux, œdèmes phlébitiques.*

Mode d'emploi. — Quinze gouttes matin, midi et soir, avant les repas, dans un peu d'eau.

Prix : 12 francs.

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE

HÉMORROÏDINE POMMADE

Composition. — Adrénaline, scuroforme, intrait de marrons d'Inde, carbonate de plomb.

Propriétés. — Spécifique par excellence des hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal, fistules.

Indications. — Arrête les hémorragies, calme les douleurs, décongestionne.

Mode d'emploi. — Pour les hémorroïdes externes : faire une application de la pommade matin et soir et après les garde-robes.

Pour les hémorroïdes internes : adapter la canule au tube. Ce dispositif permet l'application profonde et étendue de la pommade. Après usage, la canule en ébonite sera facilement stérilisée dans l'eau bouillante.

Prix : 10 francs.

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.

HÉMORROÏDINE SUPPOSITOIRES

Composition. — Adrénaline-scufoforme-intrait de marron d'Inde stabilisé, carbonate de plomb.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, analgésiques, calmants.

Indications. — Hémorroïdes internes, fissures, prurit anal, fistules.

Mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires par jour, soit le matin au lever, soit le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.**

HÉMOSAMINE (Utéramine)

Composition :

Solution au centième de chlorhydrate de para-oxyphényléthylamine présentée en ampoules de 1 cc., pour injections, et en flacons de 10 cc., pour l'usage interne.

Propriétés :

Excellent hémostatique, cardio-tonique et bon excitant de l'utérus. Remplace ergotines et extraits pituitaires aux effets inconstants.

Indications :

Obstétrique et gynécologie. Post-partum (hémorragies et atonies utérines), placenta praevia, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées, ménopause.

Médecine interne. Hémophilie, hémoptysie, épistaxis, hémorragies intestinales, choc, collapsus, hémorragies en nappes.

Mode d'emploi :

On utilisera pour les injections hypodermiques (avant-bras ou cuisse) ou intramusculaires (muscle fessier), 1 à 3 cc. et jusqu'à 5 cc. selon les cas. Pour l'usage interne 20 à 30 gouttes, trois fois par jour.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e).

HÉMOSTATIQUE GOY

Formule :

Extrait fluide de seigle ergoté	4
Chlorure de calcium pur	8
Acide citrique	0 50
Sirop d'orties grièche	20
Excipient	67 50

Indications. — Epistaxis, Hématémèse, Hémoptysies, Métrorragies.

Toutes hémorragies (capillaires, cérébrales, pulmonaires, post-opératoires).

Avantage. — La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est complètement masquée par l'excipient spécial.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à café toutes les heures.

Etablissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

HÉMOSTRA " ROCHE "

Thérapeutique biochimique nouvelle des anémies graves par supplémentation de l'organisme en acides aminés hématogènes.

Composition :

Solution isotonique, neutre et stérilisée de Tryptophane et d'Histidine en *ampoules de 5 cc.* (0 gr. 10 tryptophane et 0 gr. 20 histidine) et en *ampoules de 2,5 cc.* (0 gr. 05 tryptophane et 0 gr. 10 histidine).

Propriétés :

Apporte directement à l'organisme, en proportions rationnellement dosées, les principes actifs du foie et réactive immédiatement et d'une façon considérable les processus de l'hématopoïèse.

Avantages :

Ne provoque pas de dégoût chez le malade ; évite l'action destructrice de la flore intestinale et permet de poursuivre le traitement aussi longtemps qu'il est nécessaire.

1 ampoule de 5 cc. équivaut, par ses effets, à plusieurs centaines de grammes de foie de veau.

Indications :

Toutes les anémies graves : biermériennes, leucémiques, néoplasiques, etc. Tous les états de déficience organique : Convalescences difficiles, Inappétence, Maladies consomptives, même chez les enfants, les femmes enceintes et les nourrices.

Mode d'emploi et doses :

1 ampoule de 5 cc. ou de 2,5 cc. suivant les cas, tous les jours par voie sous-cutanée ou intramusculaire rigoureusement indolore. Aucune toxicité ; pas de contre-indication. On peut, dès le début, vérifier l'activité de cette préparation par une numération globulaire.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

HÉMOSTYL DU D^r ROUSSEL

Sérum frais, hémopoiétique de cheval

Action :

1^o Hémopoiétique spécifique (prof. Carnot, Acad. des Sciences 1906) ; 2^o Tous les autres emplois du sérum de cheval : Hémostatique, Hyperleucocytaire général et local.

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. de sérum pur ; 2^o Boîte de 45 comprimés de sang hémop. total desséché ; 3^o Flacon de 300 gr. de sirop de sang hémopoiétique total ; 4^o Boîte de six ovules (usage gynécologique).

Indications et Posologie :

Toutes les *Anémies*, quelle qu'en soit la nature. Convalescence, tuberculose, paludisme, suites opératoires et obstétric. 1 à 2 flacons-ampoules par jour en ingestion ou lavement ou 2-3 cuillerées à potage de sirop.

Syndromes toxi-hémorragiques, hémophilie.

Hémorragies (hémoptysies, entérorragies, métrorragies, etc...) Plaies saignantes. Cas graves : inject. de 30 cc. de sérum. Autres cas : ingest. ou mieux lavement de 3 flacons-ampoules. Application locale.

Enfants : demi-dose.

Littérature et Échantillons

Laboratoires de l'HÉMOSTYL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

HÉMOTAL

Complexe opo-organo minéral granulé, association synergique de toniques organiques et de produits opothérapiques.

Indications. — Spécifique des maladies de la nutrition. Anémie, neurasthénie, tuberculose, surmenage, débilité générale, croissance.

Posologie. — *Adultes.* — Laisser fondre dans la bouche 2 cuillerées à café de granulé au début des repas.

Enfants : 1 cuillerée par repas.

Laboratoires UNIS SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS.

HÉMOTONINE BUISSON

Complexe de Fer-Strychnine, arsenic et phosphore organique.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique sanguin complet.

Indications. — Tous les états anémiques, Convalescence, Asthénie, toutes causes de déchéance organique.

Forme. — Ampoules.

Posologie. — 1 ampoule par jour, par séries de 12 ; injections intramusculaires profondes.

Injections absolument indolores.

Prix de vente au public : 25 fr. la boîte de 12 amp.

Prix médical : 16 fr. 90 la boîte de 12 amp.

**Société Générale
d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX**

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

HEMOVEINE

Comprimés.

Composition. — 1° Extraits secs de Marron d'Inde, d'Hamamélis, de Viburnum, de Cupressus.

2° Poudres d'organes à sécrétion interne : ovaire, thyroïde, hypophyse, surrénale.

Action. — Pharmacodynamique multiple : Vasoconstriction et diminution progressive du calibre de la veine, disparition du spasme vasculaire et de la douleur consécutive, sédation utérine, régulation des règles, réapparition rapide du potentiel d'énergie tout en empêchant l'hypertension.

Fait merveille dans tous les cas de Stase Veineuse.

Indications. — Maladies nerveuses en général : Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles congestifs de la fonction ovarienne : Dysménorrhée, Métrorragie, Troubles de la ménopause, Troubles de la circulation générale.

Mode d'emploi. — 6 dragées par jour à raison de deux avant chacun des trois repas.

Laboratoires **BRICHARD et Fil-**

BAR-LE-DUC (Meuse).

HÉMYPNAL CIBA

Analgésique obstétrical et urinaire.

Trichloro-butylalcooI-diallylmalonylurate d'éthyl-morphine. Analgésique particulièrement propre à atténuer considérablement les douleurs de l'accouchement, sans aucun danger ni pour la mère ni pour l'enfant. Utilisable également pour les petites interventions gynécologiques ou urologiques.

Trois formes : Cachets, Suppositoires, Ampoules.

Indications. — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine). Curettages, cystoscopies. Cathétérismes, prostatectomies.

Doses. — Pour un accouchement : 2 à 4 suppositoires, 1 à 3 ampoules. Interventions : 1 à 2 cachets ou suppositoires dans l'heure qui précède ; 2 à 4 suppositoires par 24 heures après l'opération.

Le tube de 10 cachets.	} 20 francs.
La boîte de 4 suppositoires.	
La boîte de 4 ampoules.	

Laboratoires **CIBA, O. ROLLAND**

109 113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

HEPANÈME

Composition. — Extrait de foie très concentré (méthode de Whipple) associé au Protoxalate de fer et au Phosphate de soude.

Forme. — *Comprimés seulement.*

Indications. — Recommandé pour le traitement des anémies ordinaires.

Mode d'emploi. — *Enfants* : 2 comprimés par jour aux repas.

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.

Prix de la boîte de 50 comprimés : 20 francs.

Laboratoire de Biologie appliquée

H. CARRION et C^{ie},

54, Faubourg Saint-Honoré
PARIS (VIII^e).

V. Borrien, Docteur en Pharmacie.

HEPAPHOS

Reconstituant général.

Composition et forme. — Granulé fondant à base de : Extrait de Foie, Protoxalate de fer, Phosphore végétal, Vitamines.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant âge et indications du médecin.

Indications thérapeutiques. — Anémies légères, Convalescences, Troubles de croissance, Surmenage, Déminéralisation.

Aucune contre-indication.

Prix : 20 francs (traitement d'une semaine).

Si Anémies graves, prescrire HEPATROL.

Laboratoires A. ROLLAND

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV^e).

HÉPARBILINE

(Cholagogue complet.)

Forme. — Granulé soluble et aromatisé.

Composition. — Sulfate de magnésie, Peptone (agissant sur l'excrétion biliaire). Bile, Boldo (agissant sur la sécrétion biliaire).

Propriétés thérapeutiques. — Cholagogue complet, efficace, à base de substances choïcysto-kinétiques et cholérétiques. Agit sur l'excrétion et la sécrétion biliaire.

Indications. — Toutes les affections du foie et des voies biliaires (ictère, cholécystites, lithiase biliaire, engorgement du foie et de la vésicule biliaire). Inappétence, migraine, urticaire, affections dermatologiques, certaines formes d'asthme, fatigue générale, etc.

Posologie. — Le matin à jeun, 1/2 h. avant de manger, deux cuillerées à café dans un verre d'eau tiède.

Laboratoires « OPTIMA » S. A.

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

HÉPARMONE

Adoptée par les Hôpitaux de Paris.

Traitement des Anémies (méthode de Whipple).

Composition. — Hormone hépatique purifiée, présentée en ampoules ingérables de 10 cc. (boîte de 6 et 12 ampoules). *Chaque ampoule correspond à l'activité de 125 gr. de foie frais.*

Enfants : ampoules de 2 cc. = 25 gr. foie frais.

Indications thérapeutiques. — L'Héparmone trouve son emploi non seulement dans l'anémie pernicieuse cryptogénique, mais encore dans toutes les anémies où la méthode de Whipple est indiquée.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 ampoules par jour. *Enfants* : 3 à 5 ampoules par jour, à prendre dans une demi-tasse de bouillon tiède ou même d'eau légèrement tiède, une demi-heure avant les repas.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

HÉPATERGOL

Ampoules buvables.

Indications thérapeutiques. — Anémies, déficiences organiques, pré-tuberculoses, Rachitisme, Carences.

Formule. — Chaque ampoule correspond à 100 gr. de foie frais et 32 gr. de rate.

Posologie. — Une à deux ampoules par jour dans un peu d'eau.

Laboratoire COUSIN
rue Albert-1^{er}
BEAUMONT-SUR-OISE

HEPATHEMO

DESCHIENS

Méthode de Whipple — Technique de Minot et Murphy.

Traitement des anémies par le foie de veau associé au fer globulaire (technique de Minot et Murphy).

Nature. — *L'Hépathemo* est constitué : 1^o Par un extrait de foie de veau hydrosoluble préparé à froid sans traumatisme et contenant physiologiquement intact le principe anti-anémique du foie.

2^o Les substances minimales (hémopoïétines) sériques et globulaires.

3^o Une proportion rigoureusement déterminée de fer globulaire.

Action. — 1^o Action spécifique du principe anti-anémique du foie de veau frais.

2^o Action stimulante sur les organes hémopoïétiques.

3^o Action réparatrice par apport de fer globulaire.

Indications. — Anémies pernicieuses. Anémies symptomatiques graves.

Formes. — *Hépathemo* ampoules ingérables de 10 cc. correspondant à 125 gr. de foie frais.

Hépathemo sirop.

Posologie :

Ampoules : 2 à 3 ampoules par jour. **Sirop :** 2 à 8 cuillerées par jour.

Pas de contre-indications.

DESCHIENS, Docteur en Pharmacie
9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII^e).

HEPATIC EFA

du Docteur Lecacheux.

Traitement phytothérapique des maladies du foie.

Composition. — Elixir végétal, composé uniquement d'extraits non alcooliques de plantes fraîches.

Indications. — Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Cirrhoses, Auto-intoxications, Dermatoses.

Présentation. — Boîte contenant 12 cachets et 12 ampoules buvables de 5 cc.

Mode d'emploi. — Prendre 1 cachet le matin à jeun dans un peu d'eau et un quart d'heure après prendre le contenu d'une ampoule dans 1/4 de verre d'eau.

Laboratoire HEPATIC EFA

16, rue du Château — CARENTAN (Manche).

HÉPATINE GAD

Foie desséché à froid, de poissons Gad
et phosphate de chaux.

Formule :

<i>Extrait hépatique</i> de foie de gaduïdés..	0,50
Phosphate calcique.....	0,15
Saccharolé aromatisé, 1 cuillerée à café.	5

Indications. — Affections bronchiques et laryngées
Préphymatose, convalescence.

Granulé d'un goût très agréable, très apprécié par les enfants.

Doses. — 2 cuillerées à café à chacun des principaux repas. Granulé à délayer dans un peu d'eau ou de lait.

Laboratoire de Biothérapie OLIVIERO

41, rue Denfert-Rochereau — PARIS (V°).

HÉPATISMINE

Synergie médicamenteuse à doses homœopathiques.

Composition. — Extraits : biliaire, 0,10 ; hépatique, 0,01 ; pancréatique, 0,01 ; duodénal, 0,01 ; boldo, 0,005 ; évonymine, 0,005, podophylline, 0,005 ; oléate de soude, 0,05 ; urotropine, 0,05, en comprimés glutinisés dragéifiés.

Cholagogue, excitant des fonctions hépatique, vésiculaire, pancréatique et intestinale. Antisepsie biliaire et urinaire. Prophylaxie des maladies dites par ralentissement de la nutrition.

Indications. — Hépatisme, cholémies familiales, insuffisances hépatique et biliaire, constipation, goutte, arthritisme, dermatoses, asthme uricémique, glycosurie, pléthore abdominale.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés à chaque repas.

Produits SANOVA

29, rue Liège — PARIS (VIII^e).

Tél. : Europe 60-39.

HÉPATO-BYL

Opothérapies entérique, hépatique et biliaire en ovoïdes glutinisés.

Dose. — 4 à 8 ovoïdes par jour, en trois fois, dix minutes avant les repas, avec un demi-verre d'eau, ou le soir, la dose complète en une seule fois avant de se coucher.

Propriétés. — L'extrait biliaire seul est thérapeutiquement insuffisant. Aussi le Corps Médical prescrit de préférence l'extrait total de la glande hépatique (bile et foie) additionné d'extrait intestinal, dans la Constipation, l'Entérocologie et toutes les affections du foie.

Médication sans similaires.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
PARIS OUEST

Précédemment :

8, rue de la Source — PARIS (XVI^e)

Tél. : Auteuil 11.86

HÉPATODIASE

Composition :

Opothérapie gastro-intestinale associée aux ferments. En comprimés dragéifiés à base de diastase, pepsine, duodénum, orchitine, chlorure de magnésium, bromure de calcium et noix vomique.

Indications :

Traitement rationnel de toutes les affections du tube digestif. Dyspepsie nerveuse, entérite muco-membraneuse, aérophagie. Décongestif du foie.

Posologie :

Deux comprimés après chaque repas.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14 rue, Demarquay — PARIS.

HÉPATOSODINE

Médication alcaline polyvalente associée au benzoate de soude et à l'héxaméthylène tétramine. Syndrome hépato-entéro-rénal.

Action. — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.

Indications. — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes, Angiocholécystites chroniques ou subaiguës, congestion hépatique, lithiase biliaire, ictère, hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation, désintoxication pré ou post-opératoire.

Doses. — *Avant une opération:* Une cuillerée à café dans un verre d'eau au réveil, pendant les 8 jours qui précèdent l'intervention.

Troubles gastriques: Une demi-cuillerée à café dans 100 gr. d'eau tiède, à jeun le matin, et le soir à 18 heures.

Troubles hépatiques: Une demi-cuillerée à café dans un verre d'eau le matin à jeun, 10 jours chaque mois.

Constipation: 1 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau au réveil.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DURET et REMY
et du Docteur Pierre ROLLAND réunis
ASNIERES (Seine).

HÉPATOZYL CALDO

Traitement opothérapique
des Fonctions hépatiques.

Composition. — Boldine cristallisée, Hépatine, Extrait Combretum, Fiel de bœuf, Rhamnus purshiana, Rhamnus frangula.

Indications. — Constipation, Entérocolite, Coliques hépatiques, Cirrhose et Précirrhoses, Ictère, Affections d'origine colonicale.

Forme. — Pilules à enrobage de gluten.

Dose :

4 à 8 par jour aux principaux repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale.
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

HÉPATROL

(Forme buvable.)

Extrait hydro-soluble de foie de veau frais.

MÉTHODE DE WHIPPLE

Sans contre-indication. Adultes et enfants.

Indications. — Toutes Anémies, Asthénies, Insuffisances hépatiques.

Formes thérapeutiques. — Ampoules buvables non injectables.

Adultes : 1 ampoule 10 cc. = 125 gr. de foie.

Boîte de 6 ampoules. Coffret 18 ampoules.

Enfants : 1 ampoule 2 cc. = 25 gr. de foie.

Boîte de 12 ampoules.

Ce dosage est indiqué également dans les anémies légères et les insuffisances hépatiques de l'adulte.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour à prendre dans un liquide quelconque au début des repas.

HÉPATROL INJECTABLE

Extrait de foie de veau entièrement déprotéiné ayant conservé toutes les hormones hépatiques de l'organe frais (activité standardisée par contrôle biologique.)

Indications — Anémies graves et cas d'intolérance absolue au traitement *per os*. Permet démarrage rapide.

Mode d'emploi — Par voie intramusculaire. Injecter chaque jour 2 à 4 cc. jusqu'à démarrage et disparition de l'intolérance, puis associer Hépatrol buvable.

Présentation — Ampoules de 2 cc.

Activité égale à celle de 250 gr. foie de veau *per os*.

Boîtes de 6 et 12 ampoules.

Ampoules de 1 cc.

Activité égale à celle de 125 gr. foie de veau *per os*.

Boîtes de 6 et 12 ampoules.

Voir communications { *Presse Médicale* 20 Sept. 1930
(Achard)
Soc. Méd. Hôp. 19 Mai 1930
(Aubertin)
Soc. Dermato. Janv. 1931 (Pinard)

Laboratoire Albert ROLLAND

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV^e).

HÉRACLÉOL

(Héraclès-Hercule).

Nucléi-arrhénocalcium (procédé Elzévir). Fixe le calcium organique. Active l'hémopoïèse et la phagocytose. Nourrit la cellule nerveuse. Augmente l'appétit et le métabolisme basal. Augmente le coefficient respiratoire et l'assimilation des aliments.

Indications. — *Tuberculose, Rachitisme, Décalcifications, Anémie, Asthénie, Convalescence.*

Posologie :

Granulé : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Elixir : *Enfants* : dose moitié.

Ampoules : 1 ampoule sous-cutanée (indolore) tous les jours.

Adopté par les hôpitaux et cliniques de Paris.
Littérature et échantillons au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

HERGENOL

Indications. — Coqueluche, Toux spasmodiques et bacillaires, Asthme.

Composition. — Essences naturelles balsamiques et carbures halogènes, antispasmodiques.

Forme. — Produit volatil, usage externe.

Emploi. — Verser XXX gouttes sur un carré de flanelle. A maintenir en permanence à proximité des voies respiratoires.

Doses. — *Bébés et enfants* : renouveler 2 à 3 fois au cours des 24 heures.

Adultes : 3 à 4 fois suivant besoin.

Prix : le flacon stilligoutte : 15 fr.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antisypilitique, Cholagogue, Diurétique.

Constitution. — Mercure phénol disulfonate de sodium représenté 40 p. 100 de mercure métallique.

Propriétés. — Élimination rapide, sans aucune réaction nocive sur le rein. Son hypotoxiciété permet à chaque injection intra musculaire d'administrer 5 fois plus d'Hg métallique qu'avec le cyanure.

Indication et doses.

1° *Syphilis* : Accidents primaires, secondaires et tertiaires.

a) Par voie sous-cutanée (injections intra musculaires ou dans le tissu cellulaire). 10 à 20 centigr. par injection. Une injection tous les 2 ou 3 jours.

b) Par voie stomacale : De 20 à 30 centigr. d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE par jour.

2° Antisepsie.

a) Chirurgie : Antisepsie des surfaces et des cavités purulentes, lavages des mains et des instruments, solution de 1 à 10 p. 1 000.

b) Antisepsie des voies génito-urinaires : Blennorrhagies, injections urétrales, instillations et grands lavages urétraux ou vésicaux, solutions à 1 p. 100 et 1 p. 200. Cystites : Lavages vésicaux à 7 p. 1 000.

Formuler. — Selon les cas :

Boîte d'ampoules d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE, 10 centigr. par cc. titrée à 5 centigr.

Flacon de dragées d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

Boîte de comprimés d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE.

23, Cours de la Liberté — LYON.

HÉTÉROLYSINE OLIVIERO

Capsules vaccin à enveloppe glutinisée, renfermant des *Diplocoques fallax*, des Staphylocoques, des Entérocoques, des Colibacilles. Capsules à prendre par voie buccale et titrées à 2 milliards d'éléments par capsule.

Cette préparation a pour but d'amener la création d'un milieu infertilisant et la vaccination *per os*, dans les cas d'affections rebelles, *chroniques*, relevant d'infections rénales, *vésicales*, de *colibacillurie*, de *pyélonéphrites* et surtout *urétrales* suite de *blennorrhagies aiguës*.

3 capsules le matin ; 3 capsules le soir pendant 20 jours.

Laboratoire de Biothérapie OLIVIERO

41, rue Denfert-Rochereau

PARIS (V^e).

HEXAFEL

Régulateur des fonctions biliaires et digestives.
Cachets globulaires : extrait biliaire, magnésie, térébenthine modifiée, hexaméthylène-tétramine.

Mode d'action. — Favorise l'assimilation des aliments. Active la digestion intestinale. Régularise la fonction hépatique. Excite le péristaltisme intestinal.

Indications. — Insuffisances biliaires, troubles hépatiques.

Fermentations intestinales, entéro-colites.

Insuffisance ou stase du bol fécal, constipations chroniques.

Prix : 20 francs

Echantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

HEXARANOL

Composition. — Héxaméthylène-tétramine, amido-pyrine, exalgine, teinture de guarana, codéine.

Indications. — Grippe, douleurs de toutes sortes, goutte, lumbago, rhumatismes, névralgies, migraines, règles douloureuses, sciaticque, crampes, zona.

Pas d'action nocive sur l'estomac.

Doses. — 2 à 5 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Le flacon : 16 francs.

Laboratoire de l'HEXARANOL

88, rue Duhesme — PARIS

HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

Composition. — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine ; Santalol pur et gluten.

Avantages. — Stabilisation de l'eurotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogénèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

Emploi et doses. — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

Cas chroniques : 6-8-10 globules par jour.

Indications. — Cystites, Prostatites, Gonococcies, Bactériuries, Pyélites, Pyélonéphrites, Colibacilloses, etc. Phosphaturies, Urines ammoniacales, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cholécystites, Diathèse urique. — Echantillons. Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS.

Laboratoires CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS

HIPPOSARCINE ROY

Suc musculaire total exprimé à froid.

Provenant du cheval vigoureux et reposé.

Supérieur au suc musculaire des bovidés :

Par sa plus grande richesse en Azote, en Glycogène, en Hémoglobine, en Phosphate et en Fer ;

Par l'absence totale de Bacilles tuberculeux, de Cysticerques du Taenia.

Assimilation parfaite.

Aucun inconvénient digestif.

Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades qui en retirent toujours grand profit.

Tuberculoses pulmonaires et chirurgicales. Tout état d'affaiblissement et de consommation. Maladies de l'estomac et des intestins.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, Chemin de Combe-Blanche — LYON.

HIRUDINASE

Le premier produit spécialisé à base d'extrait de sangsues.

Indications. — Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Acrocyanose, Œdèmes trophiques, Artérites aiguës et chronique, Troubles de la ménopause, Troubles de la menstruation, Hypertension Artérielle.

Formule :

Extrait de sangsues (procédé spécial), — Iode-citrate de soude, — Extrait d'hypophyse, — Hamamélis-hydrastis-marron d'Inde, — Extrait hépatique.

Présentations. — *Dragées.*

Mode d'emploi. — a.) 2 dragées au milieu de chacun des principaux repas. (Affections vasculaires).

b) 3 dragées au milieu des 2 principaux repas (Dysménorrhées).

c) 8 à 16 dragées par jour (Hypertension Artérielle).

Produits du Laboratoire de Dermatologie de Paris

HOURQUET et VIENNE, Pharmaciens-Concessionnaires.
114, rue du Temple 18, Avenue Daumesnil — PARIS
(Tél. : Dorian 52-12).

HISTOGÉNOL

Puissant reconstituant général.

Indications. — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc.

Formes. — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

Posologie. — *Adultes* : Une cuillerée élixir ou une mesure de granulé avant chaque repas ou un comprimé matin et soir ou une ampoule par jour.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue de Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

HOLASEPTINE

Selon la formule du Dr T.-L. Roux contre la Coqueluche et toutes maladies des poumons : bronchite, grippe, pneumonie, tuberculose, etc...

Composition. — Huile étherée, camphrée, gommolée et essences balsamiques.

Formes et posologie. — **Liquide.** — S'administre par voie rectale sans irritation du rectum, même chez les nourrissons. Est employée avec succès pour le pansement de toutes plaies irritées.

Ampoules. — 1 à 6 par jour en injections sous-cutanées profondes ou intramusculaires.

Prix :

Holaseptine liquide : 25 francs.

Holaseptine ampoules : 20 francs.

Laboratoires CH. LAVERGNE

5, rue Grande — CANNES (Alpes-Maritimes).

HOLOS

Opothérapie osseuse.

Nature. — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

Indications. — Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogenèse. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences. Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une prompte reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

Posologie. — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants, se contenter d'une 1/2 mesure.

Littérature — Echantillons.

DESCHIENS, Docteur en Pharmacie,

9, rue Paul-Baudry — PARIS.

HOLOVARINE

Forme et composition. — Cachets ou dragées dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

Avantages. — Desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes ; troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 20 par jour.

Adolescentes : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 10 par jour. Cures successives de 5 à 10 jours.

La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 20, 15 francs. La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 10, 9 fr. 50.

Laboratoire de Thérapeutique Générale

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 26-87.

HOPOGAN BOCQUILLON

Composé organo-minéral, à base de Peroxyde de Magnésium retraité pour l'emploi thérapeutique (interne).

Les Sels d'HOPOGAN-BOCQUILLON se désagrègent, entrent en réaction et agissent à volonté (suivant formes médicamenteuses), soit dans l'estomac, soit dans l'intestin, dont ils recouvrent et « tapissent » la paroi, à l'exemple d'un véritable pansement interne et Alcalin, chargé de détruire par l'Oxygène et la Magnésie les fermentations anormales et les acides gastro-intestinaux qu'ils transforment, par réaction lente, en produits d'élimination.

L'emploi de l'Hopogan assure : a désinfection la plus complète, la désintoxication et la vivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires normales.

Sous les formes *intestinales*, il constitue le *Traitement Magnésien*, le plus efficace (oxygène et magnésie), contre la *Dialhèse Cancéreuse* (VOIR Technique du Professeur Delbet, 1928.)

Formes. — *Estomac* : comprimés, cachets. — *Intestin* : pilules kératinisées, gélacapsules, prise-bébé. — *Arthritisme* : Hopoganase.

Laboratoire des Peroxydes médicaux

12-18, rue Lamartine — PARIS.

HORMOBILINE

Laxatif opothérapique.

Médicament héroïque et rationnel de la CONSTIPATION et des affections chroniques du gros intestin.

Composition. — Hormones cœco-appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

Indications. — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères, cholémies.

Avantages. — Ne provoque ni dégoût, ni accoutumance, est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

Posologie. — *Forme liquide* : 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Clystère : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie. *Forme pilulaire* : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n° 586-1 et 586-2.

Echantillons et littérature

Laboratoires DORANT-OWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 14-12.

HORMOCLINE

Chlorhydrate de Choline

Traitement des Etats Tuberculeux

Propriétés thérapeutiques. — Le chlorhydrate de choline est une hormone qui agit sur le métabolisme du cholestérol, excite les surrénales aux propriétés anti-toxiques puissantes et opère ainsi une transformation du terrain biologique se manifestant par un relèvement de l'état clinique général.

Indications. — Toutes les formes de la tuberculose à tous les stades d'évolution, aussi bien dans les formes médicales que dans les formes chirurgicales. Amaigrissements, Asthénies, anorexies rebelles.

Adjuvant précieux des cures hygiéno-diététiques. Abaissement de la température, diminution des signes fonctionnels, engraissement rapide et durable.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite, aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée tous les deux jours.

Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. dosées à 2 centigr. de chlorhydrate de choline.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Adresse télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

HORMOVARINE BYLA

Adoptée dans les Hôpitaux de Paris.

(Folliculine).

(En ampoules injectables, comprimés et ovules.)

Composition. — Folliculine, ou hormone ovarienne spécifique, physiologiquement titrée.

Propriétés thérapeutiques. — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion interne de l'ovaire.

Indications. — L'HORMOVARINE BYLA peut être utilisée dans tous les cas d'*hypo-fonctionnement ovarien* et donne des résultats très favorables dans l'aménorrhée, la dysménorrhée, l'hypoplasie utérine, les troubles de la ménopause, l'ovariectomie, la stérilité, l'obésité, etc., et dans certains cas de diabète ovarien résistant à l'insuline.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les jours en injection lente, intramusculaire ou 2 à 3 comprimés quotidiens, ou un ovule le soir en se couchant.

L'HORMOVARINE doit se prescrire de préférence par séries de 6 à 10 jours, dans la période qui précède immédiatement la date présumée de la prochaine menstruation.

Les Établissements BYLA,
26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

HUILAXINE

Forme. — Solution (270 cc.).

Composition. — Huile de paraffine distillée et rectifiée.

Indications. — Rééducation de l'intestin.

Traitement physiologique de la constipation et de toutes affections provoquées par la stase intestinale.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 fois par jour, 1 cuillerée à soupe.

Enfants : 2 fois par jour, 1 cuillerée à café.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour, mêlée au lait.

Le flacon de 270 cc. : 12 francs (en France).

Laboratoires A. BAILLY
15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

HUILE CROLAS

de Ricin, chimiquement pure

Obtenue par des procédés purement mécaniques, sans l'intervention d'aucun produit chimique.

Absolument sans saveur et sans odeur, ne contient cependant que de l'huile de Ricin.

Le purgatif par excellence des enfants et des personnes délicates.

En flacons spéciaux à bouchage hermétique de 15, 30, 45, 60 grammes et flacon provision de 250 grammes.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, chemin de Combe-Blanche — LYON.

HUILE DE FOIE DE MORUE

Médicinale suractivée
Rhône-Poulenc.

500 unités Vitamine A,
500 unités Vitamine D,
par centimètre cube.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue ordinaire avec l'avantage d'une posologie à la goutte parfaitement supportée.

Posologie (par 24 heures) :

Première année : XXX gouttes à 1/2 cuillerée à café.

Enfants : A partir d'un an et suivant l'âge : 1/2 à 1 cuillerée à café.

Adolescents et adultes : 1 à 2 cuillerées à café.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

HUILE GALLINA

Tipoïdes des Galli résistants au Bacille de Koch, Morhuate d'Éthyle, Cinnamate de Benzyle.

Formes :

Ampoules de 5 cc. (voie parentérale, tissus).

Indications :

Toutes les formes de la tuberculose viscérale.

Prix, 10 ampoules de 5 cc. : 24 francs.

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V^e).

HUILE GRISE ARGENTIQUE SFÉAT « ou SFÉOL »

Tolérance, activité, dosage rigoureux.

Généralités. — L'association d'argent au mercure, *à condition que sa préparation soit irréprochable*, renforce l'activité de la thérapeutique mercurielle, diminue sa toxicité, rend l'injection indolore.

L'huile grise argentique SFEAT représente la meilleure assurance contre les manifestations nerveuses de la syphilis.

Dosage. — Le dosage du produit est 40 p. 100 de Hg, 20 p. 100 d'Ag, en suspension dans une huile *minérale* ne rancissant pas. En se servant de la seringue à huile grise spéciale, de Barthélémy ou de Lévy Bing, une division correspond à 0 gr. 01 de mercure.

L'huile grise argentique SFEAT se prépare également dosée à 16 p. 100, ce qui permet l'emploi de seringues ordinaires.

Posologie. — Celle de l'huile grise avec une activité bien supérieure.

Traitement d'entretien : 8 à 10 piqûres hebdomadaires de 0,08 à 0,10 de Hg.

Traitement d'assaut : On peut injecter chaque semaine 0 gr. 20 à 0 gr. 30 sous surveillance.

Prix :

Huile grise argentique SFEAT à 40 p. 100 :

Le flacon 5 cc. : 20 fr. Le double flacon : 32 fr.

Huile grise argentique SFEAT à 16 p. 100 :

Le flacon 10 cc : 20 fr.

Il existe, pour le traitement dissimulé, des suppositoires d'huile grise argentique SFEAT ou « Suppositoires SFEAT » ne portant aucune mention de formule ou d'indication.

Deux dosages :

Pour adultes : 0,05 d'Hg et 0,025 d'Ag.

Pour enfants : 0,02 d'Hg et 0,01 d'Ag.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires S. F. E. A. T.

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

HUILE GRISE ERCÉ

Constitution. — Huile grise de formule spéciale, complètement résorbable, sans huiles minérales.

Forme. — Ampoules-seringues auto-injectables.

Avantages. — 1^o *Indolore*, neutralité absolue.

2^o Assimilation totale. *Résorption* rapide.

3^o *Dosage* absolument rigoureux.

Posologie. — 0,02 à 0,15 de Hg. complètement injecté.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

HUILE IODÉE SCIENTIA

et Chlorure de Calcium intraveineux Scientia.

Méthode du Dr. A. FINIKOFF

pour le traitement des Tuberculoses chirurgicales.

Indications. — Tuberculoses osseuses, articulaires, ganglionnaires, glandulaires, séreuses et cutanées. Innocuité absolue.

Contre-indications. — Tuberculose pulmonaire évolutive, tuberculoses viscérales avec dégénérescence amyloïde du foie et du rein, cachexie et septicémie bacillaires, méningites bacillaires.

Formes. — Huile iodée à préparer extemporanément : une ampoule d'huile d'arachides, une ampoule d'iode en solution au 1/10.

Chlorure de calcium pour injections intraveineuses. Ces injections ne sont à pratiquer que chez les malades robustes ayant une intégrité viscérale totale.

Remplacer ces injections par la Tricalcine chez tous les autres malades.

Doses et mode d'emploi. — Un prospectus indiquant la posologie accompagne chaque boîte. Il est envoyé sur demande au Corps médical.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS.

HYDRALIN

Antiseptique gynécologique.

Composition. — Perborate de soude, Borate de soude, Bicarbonate de soude, Fluorure de sodium, Essences aromatiques.

Propriétés. — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline, Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

Indications. — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

Présentation. — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

Mode d'emploi. — Prescrire pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 sachets : 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-2.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e)

Téléphone : Invalides 12-63.

HYDROCAMPHRE

Composition. — Camphre soluble dans l'eau, solution à 10. p. 100 de campho-sulfonate de sodium.

Action. — Celle de l'huile camphrée. Avantages : injection facile, action plus rapide et plus durable, aucune toxicité, ni nodosité, ni réaction, élimination très rapide.

Indications. — Syncope, adynamie, collapsus cardiaque, défaillances cardiaques au cours des maladies infectieuses, asphyxies de toutes sortes, manifestations cutanées des affections gastro-intestinales, pneumonies, broncho-pneumonies, etc.

Forme. — Ampoules de 3 cc.

Doses. — 1/2, 1, 2 ou 3 ampoules.

La boîte : 18 fr.

Laboratoire de la SPLÉNOCARBINE

88, rue Duhesme — PARIS

HYDRORRHÉOL

(Ancien Hydrastol)

Sous forme de cachets.

Composition. — Terpentol et Hépatine sans aucun toxique.

Propriété. — Désensibilisateur de la Muqueuse nasale.

Indications. — Écoulement nasal, Hydrorrhée nasale, Rhinite spasmodique, Rhume au début.

Mode d'emploi. — 3 à 4 cachets par jour.

Laboratoire Laryngologique

VOCALDOP ET HYDRORRHÉOL

222, faubourg Saint-Martin — PARIS (X^e).

HYDROXYDASE

Anti-toxine naturelle vivante, eau minérale naturelle du Breuil et du Broc (Puy-de-Dôme).

Composition. — *Eau minérale naturelle* chlorurée, bicarbonatée sodique, magnésienne et ferrugineuse ; jusqu'ici *unique en hydro-minéralogie*, donne des réactions oxydasiques.

Mode d'action. — Grâce à ses nombreux colloïdes naturels, elle fixe l'oxygène intérieur et le rétrocède aux toxines et déchets de l'organisme, les brûle, les détruit et les élimine. Augmente le pouvoir d'oxydation du système endocrinien, et supplée aux sécrétions des glandes déficientes.

Indications. — Intoxications endogènes (rhumatismes, goutte, diabète, eczéma, obésité, etc.).

Intoxications exogènes (convalescences difficiles, arthritismes, uricémie, indicanurie, urobilinurie).

Mode d'emploi. — Cure normale : un verre le matin à jeun et un verre une heure avant chaque repas pendant 20 jours (souvent renforcée par des injections sous-cutanées ou intramusculaires).

L'Hydroxydase, embouteillée au griffon sans contact avec l'air, doit être consommée aussitôt débouchée. Elle est livrée en caissettes de 20 petites bouteilles de la contenance d'un verre, et en ampoules de 10 cent. cubes.

Compagnie de l'HYDROXYDASE.

Siège social, 10, rue Blanche — PARIS. — Tél. : Trinité 08-21.

HYOL

(Norwegian Essence).

Composition. — A base de menthol, gaïacol, et de plantes aromatiques (Cedrus, Abiès, Epicéa, Pinus, Larix).

Indications. — Asthme, Bronchites, Coryza, Coqueluche, Grippe, Laryngites, Toux spasmodique, etc...

Mode d'emploi. — Inhalations, évaporations à froid, Pulvérisations, Gargarismes.

Le flacon : 16 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoire NEUVILLE

239, faubourg Saint-Honoré
PARIS.

HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Hyoscyamine Houdé. — Produit pur cristallisé, extrait de l'*Hyoscyamus Niger*.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, calmant, hypnotique, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 granules *pro die* ; les prendre avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

HYPALÈNE

Composition. — Combinaison de l'acide Cyclopenténylallylbarbiturique avec le Phényl-diméthyl-diméthylamino-pyrazolone.

Action. — Analgésique, Sédatif, Hypnogène.

Indication. — Traitement de l'insomnie douloureuse, algies diverses, angoisse pré-opératoire, et douleurs post-opératoires.

Force pharmaceutique. — Comprimés divisibles permettant de graduer les doses. Ne contenant pas de toxique du Tableau B.

Dose. — Angoisse pré-opératoire, 1 à 2 comprimés d'Hypalène quelques minutes avant l'intervention.

Algies diverses, douleurs post-opératoires : 1 à 4 comprimés dans les 24 heures au moment des douleurs.

Dose hypnogène : 1 à 2 comprimés le soir au moment de se coucher, 1 heure ou 2 après le repas.

Prix : 13 francs.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

HYPERSAN

Médication hypotensive-diurétique

Composition. — Association d'extraits fluides de Gui, cratœgus, Stigmates de maïs et Cascara.

Action. — Le gui diminue la tension par action vasomotrice périphérique et action excitante sur la sécrétion rénale (Chevalier, Gaultier). Selon Leclerc, le Cratœgus équilibre la pression sanguine en diminuant l'éréthisme vasculaire.

Indication. — L'hypertension sous toutes ses formes.

Doses. — XXV gouttes, 3 fois par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES

HYPHÉDRINE

Ephédrine végétale française corrigée.

Composition :

Ephédrine végétale.....	0 gr. 03
Hypophyse totale.....	0 gr. 05
Ext. de Lobélie.....	0 gr. 01
par dragée.	

Indications. — **Asthme. Rhume des Foins. Bronchites emphysémateuses.** Tous états dyspnéïques.

Avantages. — Ne provoque ni tachycardie, ni troubles urinaires, ni insomnie.

Posologie. — 3 à 4 dragées par 24 heures. Sucrer la dragée avant d'avaler le noyau.

Laboratoires DEPRUNEAUX
18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

HYPOTAN

Le Régulateur du débit Artériel.

Dérivés de la choline hypotenseurs par voie digestive, associés à une faible dose de chloral et présentés sous la forme de comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — L'Hypotan constitue une synergie hypotensive par dilatation artériolaire et sédation des spasmes. Il améliore la circulation périphérique si profitable à l'état clinique des hypertendus. L'Hypotan réalise une véritable prophylaxie des accidents graves de l'hypertension. Il excite en outre les organes à musculature lisse.

Indications. — Thérapeutique d'entretien des hypertendus, Hypertension, Spasmes vasculaires (même sans hypertension rencontrés souvent à la ménopause). Cure complémentaire de l'**Acécoline**, Hypovagotonie.

4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS.

Adresse tél. : Chevreton, 90 — PARIS.

« I. A. M. »

Iodo-méthyl, Arsinate de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Composé organique, réalisant sous une forme optima l'action synergique de :

L'ion iode histotrope, leucopoïétique, lymphagogue.

L'ion arsenic stimulant de la nutrition et agent d'épargne.

L'ion manganèse vecteur d'oxygène, facteur capital d'oxydation cellulaire (*Thèse de Bordeaux 1928*).

Indications. — *Lymphatisme*. Affections ganglionnaires, Anorexies, Etats anémiques, Bronchites, Asthme, Convalescences.

Posologie. — Gouttes « I. A. M. » (*adultes*) XV à XX gouttes matin et soir.

Sirop « I. A. M. » (*enfants*), 1 cuillerée matin et soir.

Littérature et échantillons

Docteur LAVOUÉ — RENNES.

IFRANOL

Quinine (0 gr. 20 par dragée ou par grande cuillerée-mesure).

Arsenic trivalent, Fer, Strychnine, Cholagogues.

Paludisme

Dragées (traitement habituel de l'adulte). *Curatif* : 8 à 10 dragées par jour. *Préventif* : 2 dragées tous les soirs au dîner.

Granulé : (spécialement destiné au traitement de l'enfant ; de l'adulte dont l'estomac fragile supporte mal la quinine ; de la femme enceinte.)

Une grande cuillerée-mesure correspond à une dragée.

Adulte : même dose qu'avec les dragées.

Enfant : *Préventif* : une petite cuillerée-mesure par année d'âge. *Curatif* : cinq fois la dose préventive.

Grippe et ses complications.

(*Angine grippale* en particulier.)

Adulte. Période aiguë : 5 dragées ou 5 grandes cuillerées-mesure par jour.

Convalescence : 3 dragées ou 3 grandes cuillerées par jour pendant 10 jours.

Enfants. Période aiguë : 2 petites cuillerées-mesure par année d'âge.

Convalescence : 1 petite cuillerée par année d'âge.

Laboratoire de Thérapeutique Exotique.

à ARPAJON (Seine-et-Oise).

ILOGLANDOL « ROCHE »

Solution aqueuse stérilisée des principes actifs des îlots de Langerhans.

1 cc. = 15 unités internationales.

Titrage conforme aux décisions prises par la Convention de Genève.

Activité correspondant à l'activité de l'étalon officiel de Londres.

Indications thérapeutiques :

Toutes celles de l'insulinothérapie.

Doses et modes d'emploi.

N. B. — Le médecin traitant est seul juge de la posologie et des modalités d'application de l'ILOGLANDOL « ROCHE », car le traitement insulinién est toujours conditionné par l'état général (poids) du malade et par les examens systématiques répétés de son sang et de ses urines (glycosurie, glycémie, acidose, réserve alcaline du plasma).

Doses d'urgence (Coma diabétique).

Voie endoveineuse : 1/2 à 3 cc. en 1 fois, puis 1/2 à 1 cc. toutes les heures.

Voie intramusculaire : 2 à 4 cc. en 1 fois, puis 1cc. toutes les heures.

En même temps : Sérum glucosé, sérum physiologique et bicarbonate de soude (par voies buccale, rectale, intramusculaire, endoveineuse) et tonicardiaques.

Doses habituelles (Tous autres cas).

Voie intramusculaire (intrafessière) : 2 cc. par jour (un quart d'heure à une demi-heure avant les repas) pendant 21 jours.

En même temps : Chez les diabétiques, régime alimentaire aussi riche en hydrates de carbone, graisses et albuminoïdes, que le permettra l'état du malade.

Iloglandol « Roche »

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}.

21, place des Vosges — Paris (III^e).

IMMUNIZOLS

Vaccins

I. Ampoules

- 10. Furonculose, Ostéomyélite.
- 11. Entérite, Appendicite.
- 13. Asthme, Asthme des foins.
- 15. Eczéma, Psoriasis.
- 16. Bronchites chroniques.
- 17. Rhumatismes.
- 18. Urétrites.
- 19. Acné.
- 22. Typhoïde.

II. Bouillon-Vaccins pour pansements.

- 10. Furonculose, toutes staphylococcies.
- 24. Streptococcies.
- 25. Pneumococcies.
- 26. Colibacilloses.
- 31. Abscess chauds.
- 35. Ulcères variqueux.
- 36. Brûlures infectées.
- 41. Métrites.
- 50. Otites, Rhino-Pharyngites.

III. Hivébé-Bouillon-Vaccin.

Concentré polyvalent à diluer pour obtenir :
1/2 litre de bouillon-vaccin normal.

IV. Comprimés

Avec pilules adjuvantes de bile.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 10. Furonculose-Ostéomyélite. | 22. Typhoïde. |
| 11. Entérite-Appendicite. | 31. Abscess, plaies infectées. |
| 13. Asthme, Asthme des foins. | 40. Cystites, Pyélonéphrites. |
| 15. Eczéma, Psoriasis. | 41. Métrites. |
| 18. Urétrites. | 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire. |

14, rue de Clichy

GRÉMY

Microbiens

Injectables.

- 23. Grippe.
- 24. Streptococcies, infections puerpérales.
- 31. Absès chauds et froids, plaies suppurées.
- 34. Gangrène.
- 40. Cystites, Pyélonéphrites.
- 41. Métrites, Salpingites.
- 50. Otites, Sinusites, Rhino-Pharyngites.
- 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire.

Immuniphages (bactériophages).

- N° 10. Toutes staphylococcies.
- N° 11. Affections intestinales.
- N° 26. Colibacillooses.
- N° 31. Infections pyogènes.

Ovules à l'Immunizol n° 41 pour pansements gynécologiques.

V. Immuniperos.

(*Vaccins liquides pour vaccination buccale simple ou associée au bactériophage.*)

- 10. Furunculose.
- 11. Infections intestinales.
- 15. Dermatoses.
- 22. Fièvre typhoïde.

VI. Immuniderm.

Pommade à l'Antivirus et au Bactériophage.

— PARIS (IX^e).

R. C. Seine. 229.088 B.

IMMUNOVACCIN ANTIRHUMATISMAL

(Formule du Dr L. Bertrand d'Anvers).

Composition. — Emulsion du diplostreptobacille isolé de l'organisme des malades atteints de rhumatisme articulaire aigu. (Achalme, Thiroloix, G. Rosenthal, Bertrand, Triboulet, Leyden, Wassermann, de Vecchi et R. Lautier).

Présentations. — 1° Forme injectable : 5 séries d'ampoules de 5 à 425 millions ; 2° Forme à ingérer : ampoules dosées à 500 millions.

Indications et mode d'emploi :

Forme injectable. — Rhumatisme articulaire aigu : débiter par série II. — Complications du rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme cardiaque, rhumatisme chronique : débiter par série I.

Forme à ingérer. — Formes bénignes du rhumatisme chronique, douleurs arthritiques ; troubles intestinaux, syndromes entéro-hépatiques, entéro-rénaux, entéro-génitaux des arthritiques, hypertension : 1 ampoule par jour, 20 jours par mois.

Laboratoires IMMUNOS

8, avenue des Sources — NICE (A.-M.).

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Médications végétale et opothérapique associées.

Composition.

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune **simple** associés aux sucres glandulaires de : Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

Indications.

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les troubles de la ménopause et de la puberté, dans les métrites, salpingites non suppurées, ovarites chroniques, sclérose utérine, etc.

Mode d'emploi.

XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 15 francs.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII°).

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale.)

Composition. — Principes actifs d'Hamamelis, marron, d'Inde, condurango viburnum, anémone, séneçon, piscidia (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la circulation générale. Décongestif par vaso-constriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensibles. Tonivasculaire et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

Indications. — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 12 francs.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

INFANGYL CARLIER

Composition :

Thiocol, antipyrine, tolu	ââ 0 gr. 02
Benz. de Na, Eau de laurier cerise.....	ââ 0 gr. 04
Teinture de Droséra.....	0 gr. 08
Sirop de Desessartz pour 1 cuillerée à café.	

Indications. — Traitement des affections des voies respiratoires des *enfants*, toux, bronchites, trachéo-bronchites, coqueluches, laryngites aiguës et striduleuses.

Propriétés. — Expectorant puissant, Calmant de la toux, Laxatif léger.

Posologie. — 4 cuillerées à café avant 5 ans (nourrissons : demi-dose), 4 cuillerées à dessert après 5 ans.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires René CARLIER

Grande-Rue, à SAINT-FLORENTIN (Yonne).

INFRA-ROUGES

- 1° *Plaies et ulcérations atones, infections cutanées et sous-cutanées ;*
- 2° *Troubles circulatoires (œdèmes, cellulite, stase veineuse, troubles de la circulation artérielle, engorgements ganglionnaires) ;*
- 3° *Rhumatismes chroniques, arthralgies et myalgies ;*
- 4° *Douleurs abdominales : entéro-colite, périviscérites, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux ;*
- 5° *Néuralgies et névrites.*

Vente et location de tous appareils et accessoires à

La Verrerie Scientifique

12, avenue du Maine — PARIS (XV^e).

Tél. : Littré 94-62 et Littré 01-63.

INHALATION-GARGARISME

« VOCALDOP »

Composition. — Perborate et salicylate de soude, eucalyptol, menthol.

La poudre VOCALDOP réunit en une seule prescription médicale, synthétisant la thérapeutique externe naso-pharyngienne :

une inhalation et un gargarisme.

1 cuillerée à	Inhalation
café de	+ H ² O chaude = Respiration nasale
Poudre	et gargarisme.
Vocaldop.	Bain buccal.

L'Inhalation-Gargarisme *Vocaldop* remplace avantageusement les solutions alcooliques et les teintures (benjoin, eucalyptus, tolu). En effet, les vapeurs éthyliques sont nocives pour la Voix, l'alcool « fixe » les tissus des organes phonateurs. (Thèse de Doctorat 1924.)

Laboratoire laryngologique du D^r CORDIER

222, faubourg Saint-Martin — PARIS (X^e).

INHALATION LANCOSME

Composition. — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la créosote de hêtre pure.

Présentation. — Liquide.

Propriétés. — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

Indications. — Coryza. Rhinite. Ozène. Laryngites aiguë et chronique. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

Contre-indications. — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

Emploi. — Avec un inhalateur : verser la valeur de 2 à 3 compte-gouttes, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante, deux à trois inhalations par jour.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

INHALO-BOL

Cornet pour inhalations

(en papier parcheminé),

Simple,

pratique,

bon marché.

Indications thérapeutiques :

Toutes affections bronchiques ou rhinolaryngologiques nécessitant une inhalation.

Prix : 5 fr.

Laboratoire de l'INHALO-BOL

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

INHALOL

Médication
des voies aériennes supérieures.

Composition. — Association d'essences volatiles (Isopropylmétacrésolmenthol et Cajeputol) sans alcool.

Action thérapeutique. — Antiseptique, anticongestif, analgésique.

Indications. — Coryzas, rhinites, pharyngites, laryngites, sinusites, trachéites, bronchites.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans un verre d'eau bouillante en inhalations, ou quelques gouttes sur le mouchoir à titre préventif.

Prix : 12 francs.

Laboratoires BOUVELOT

62, rue d'Antibes — Cannes (A.-M.)

INHALONE

Inhalation *solide* à l'état pulvérulent.

Exempt d'alcool.

Formule :

Cupressol, hydrure de naphtyle, essence de thym, goménol, benjoin en milieu carbo-gazeux.

Donne des résultats surprenants, dans tous les cas d'inflammation des muqueuses buccales et rhinopharyngiennes. Diminue rapidement l'intensité des quintes et leur fréquence, dans la coqueluche.

Modifie nettement les sécrétions nasales. N'irrite jamais, ne dessèche jamais les muqueuses. Jouit vis-à-vis d'elles de propriétés antiseptiques inégalables.

Prix : 12 fr. la boîte.

Echantillons et littérature sur demande 5

AUX LABORATOIRES CH. DEHAY

Pharmacien de 1^{re} classe, licencié ès sciences.

58, rue Saint-Géry — ARRAS.

INHALO-SEL

Composition. — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles.

Avantages thérapeutiques. — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

Indications thérapeutiques. — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Prix : 5 fr. 50.

Laboratoire de l'Inhalo-Bol
32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, docteur en pharmacie.

INHALOXYL

Comprimés pour inhalations. Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau, sans menthol.

Composition. — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

Mode d'emploi. — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre 1 ou 2 comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques.

Indications. — Coryza, Laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Se fait aussi en huile pour instillations et pulvérisations.

Prix : 9 fr. 75 et 12 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

“ INNERCLEAN ”

Composition. — Algue de Java, Thé de santé, Herbes aromatiques en plantes coupées menues.

Indications ou Propriétés. — Espèces laxatives aromatiques pour le traitement spécial de la constipation.

Posologie ou mode d'emploi. — Un tiers de cuillerée à café. Augmenter graduellement cette dose si nécessaire.

Pour le prendre, la meilleure façon est de le déposer sur la langue et de l'avaler à l'aide d'un peu d'eau fraîche.

Pour les Enfants et les Bébés, commencer par une très petite quantité, en tenant compte de leur âge.

Prix, en France : 15 fr.

Dépôt général pour la France :

« EVANS DRUG STORE »

J. M. RICARDOU, Docteur en Pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar de *saveur agréable*.

Propriétés. — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réaction alcaline.

Indications. — Gingivites, stomatites, pharyngites, amygdalites, angines, abcès, fistules dentaires, soins post-opératoires. Hygiène de la bouche. Soins de la gorge et du nez.

Mode d'emploi :

Lavages : 2 à 3 cuillerées à café par litre d'eau.

Gargarismes : *Bains de bouche* : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.

Badigeonnages : pur ou au demi.

Inhalations.

Dentifrice : X à XX gouttes dans un verre d'eau.

SPÉCIALITÉ S INOLÈNE

Inolène simple : Rhino-Laryngo-Stomatologie. (Voir ci-dessus.)

Inolène vaseline (Nazolène) : Antisepsie des fosses nasales.

Inolène thymolé : Antisepsie générale. (Injections, pansements 2 à 3 cuill. à café par litre d'eau).

Inolène olvules : Gynécologie.

Inolène pommade et Inolène poudre : Dermatologie.

Laboratoires ODILIA

E. LACOMBE, Pharmacien.

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

INOTYOL

Eczémas, ulcères, prurits.

INOSEPTA

Acnés, furoncles, pyodermites.

Inosepta ophtalmique

Conjonctivites, blépharites, orgelets.

Filtrat Inosepta

Infections du conduit auditif.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Prony — PARIS (XVII^e).

INSTITUT PASTEUR

SÉRUMS :

Antidiphthérique, antitétanique, antistreptococcique, antiméningococcique, antidysentérique, anticharbonneux, antipneumococcique, antipesteux, antigrangréneux.

Sérums desséchés :

Antidiphthérique, antitétanique.

Sérums purifiés et concentrés :

Antidiphthérique, antitétanique.

Sérums antivenimeux :

E. vipères d'Europe ; A. N. serpents africains ; A. O. serpents Afrique occidentale et équatoriale ; C. serpents Inde et Egypte.

VACCINS :

Antidiphthérique, antitétanique, antipesteux, anticholérique, antityphoïdique et antipara (T. A. B.), antigonococcique, antistaphylococcique (furonculose), antistaphylococcique (ostéomyélite), antipyogène, antipneumonique, antiméningococcique, B. C. G., B. C. G. = S. C.

Extrait d'antigène tuberculeux méthylique. Tuberculine.

Les sérums et vaccins ne sont délivrés qu'aux Droguistes et aux Pharmaciens.

C'est à ces derniers que doivent s'adresser exclusivement les Médecins et le Public.

Institut PASTEUR

22, rue Dutot — PARIS.

INSULANOL

Pommade à l'Insulyl du Dr Roussel.

Mode d'action. — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

Indications. — 1° Ulcères variqueux et plaies atones ;
2° Prurits de toute nature ;
3° Hémorroïdes ;
4° Brûlures.

Mode d'emploi. — En onctions sur les parties malades.

Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

Laboratoire des PROXYTASES

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

R. C. 18.000. Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

INSULINE

Voir **ENDOPANCRINE**

Page 343

Voir **POUDRE ET POMMADE
D'INSULINE PHYLOZE**

Page 851

**Laboratoire
de Thérapeutique Générale**

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Téléph. : Ségur 26-87

INSULINE BUCCALE FORNET

Principe actif :

Extrait des îlots de Langerhans du Pancréas.

Présentation :

Concentration III (Pilules rouges : 4 unités par pilule).

Concentration I (Pilules vertes : 1 unité par pilule).

Posologie :

3 pilules 3 fois par jour une 1/2 heure avant les repas.

Indications :

Tous les cas justiciables de l'Insuline (cas graves exceptés). (Glycosurie, anorexie, amaigrissement, vomissements incoercibles, acétoniques, etc...)

Observations :

Avoir toujours recours à la concentration forte au début du traitement.

Prix : 49 francs et 25 francs.

Vente et Échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie

23, rue du Caire — PARIS (II^e).

Service d'Étude et de Fabrication :

Institut de Microbiologie

SARREBRUCK (Sarre).

INSULINE BYLA

*Autorisée par l'Académie de Médecine
Adoptée dans les hôpitaux.*

Purifiée, débarrassée des matières salines et protéiques de la glande. Présentée sous deux formes injectables :

- 1° *Insuline Byla* (poudre) soluble dans l'eau, enfermée dans des ampoules stériles de 15 unités internationales (enfants, 5 unités). Chaque ampoule est accompagnée d'une ampoule de 2 cc. sérum physiologique, dans laquelle on la fait dissoudre.
- 2° *Insuline Byla liquide*, en flacon de 5 cc. à 100 unités (20 u. par cc.) et en flacon de 5 cc. à 200 unités (40 u. par cc.) En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. à 5, 10 et 20 unités par ampoule.

Indications. — Traitement du diabète et de toutes ses manifestations.

Posologie. — 1 à 5 ampoules, ou 1 cc. à 5 cc. de solution. par jour, suivant avis du médecin.

Traitement des plaies atones :

Pommade à l'Insuline Byla — Poudre à l'Insuline Byla

L'Insuline Byla est titrée en unités internationales, conformément à la décision du Comité d'Hygiène de la Société des Nations.

Envoi sur demande de la notice détaillée.

Les Établissements BYLA,

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

INSULYL DU D^r ROUSSEL

Autorisé par l'Académie de médecine.

Adopté dans les Hôpitaux.

Produit de la sécrétion interne du pancréas.

Action. — Abaisse la glycémie, permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

Indications. — 1° Diabète et ses complications ; 2° Athrepsie des nourrissons ; 3° Acidose ; 4° Cure d'engraissement.

Formes. — 1° Boîte de 10 ampoules de 1 cc. environ. Chacune renfermant 20 unités ; 2° Tube de 5 cc., chaque centicube contenant 20 unités.

Doses. — En moyenne une ampoule en injection intramusculaire avant chaque repas. Il est nécessaire d'associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

Laboratoire des PROXYTASES

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

INTRAIT DE MARRON D'INDE DAUSSE

Préparation conservant intacts les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Vaso-constricteur veineux spécifique des *Hémorroïdes*, *varices*, *phlébites*.

Forme. — *Solution d'Intrait de marron d'Inde*: X gouttes = 0 gr. 01 d'Intrait.

Mode d'emploi. — *Usage interne*: V gouttes matin et soir de *solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse*.

INTRAIT DE STROPHANTHUS

Préparation de *Strophanthus gratus* conservant intacts tous les principes actifs de la semence fraîche. (Stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Toni-cardiaque puissant.

Formes. — *Solution d'Intrait de Strophanthus*: X gouttes renferment un milligr. d'Intrait.

Ampoules d'Intrait de Strophanthus dosées à un milligr. d'Intrait par cc.

Indications. — Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, chez les cardiaques vrais, chez les cardiorénaux et toutes les fois que la Digitale ne réussit pas.

Posologie. — **SOLUTION D'INTRAIT**: *Dose d'entretien cardio-tonique*: V gouttes par jour pendant 15 jours.

Dose antiasthysytolique. — XX à XXX gouttes en une fois.

AMPOULES D'INTRAIT — Exclusivement par *voie intramusculaire*: 1/2 à 1 ampoule, en cas de collapsus cardiaque imminent

INTRAIT DE VALÉRIANE DAUSSE

Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

**Antispasmodique,
sédatif du système nerveux.**

Forme. — *Solution d'Intrait de Valériane Dausse*.

Indications. — *Insomnie* d'origine nerveuse due à un éréthisme sensoriel ou cérébral.

Nervosisme, *irritabilité nerveuse*, *affections spasmodiques*, *dermatoses prurigineuses*, *chorée*, *tics*, *convulsions infantiles*.

Posologie. — *Solution d'Intrait de Valériane*: 2 à 3 cuillerées à café par jour. Doubler la dose si nécessaire.

Laboratoire DAUSSE
4, rue Aubriot — PARIS (IV°).

IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant 5 centig. d'iode par centim. cube. Première combinaison directe de l'iode avec la peptone. Communication au XIII^e Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iodes et Iodures dans toutes leurs applications internes sans iodisme.

Arthritisme. — Goutte. — Rhumatisme. — Artério-sclérose. — Maladies du cœur et des vaisseaux. — Affections glandulaires. — Rachitisme. — Goitre. — Fibrome. — Syphilis. — Obésité.

Pour les adultes : XX à LX gouttes par jour.

Pour les enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix de vente au public : 14 fr. 50.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

IODAMÉLIS LOGEAIS

Formule :

Véritable combinaison définie, en gouttes concentrées, d'*Hamamelidine* (extrait glyciné total d'hamamélis sans alcool) et d'*Iodo-Iodure de Potassium* (forme la plus active de l'Iode thérapeutique). Cette combinaison, découverte par M. Logeais, exalte considérablement l'activité pharmacodynamique du produit.

Propriétés :

Spécifique cardio-vasculaire total :

Par son *Hamamélidine*, chez les hypertendus veineux, cyanotiques, variqueux ;

Par son *Iodo-Iodure de Potassium*, chez les artério-scléreux, uricémiques, hypervisqueux.

L'Iodamélis diminue la viscosité sanguine, combat les stases, stimule le tissu lymphoïde, abaisse la tension artérielle, oxyde les toxines organiques, favorise la circulation en retour.

Indications.

Toutes les affections vasculaires, artérielles et veineuses :

Artério-sclérose, Hypertension, Pléthore des hypervisqueux, Cyanose des hypotendus, Obésité, Jambes en poteau, Varices, Hémorroïdes, Asthme, Emphysème, Troubles circulatoires de la Puberté et de la Ménopause, etc...

Posologie :

50 gouttes d'Iodamélis = $\begin{cases} 0,03 \text{ Iode.} \\ 0,20 \text{ Iodure de Potassium.} \\ 0,20 \text{ Hamamélidine.} \end{cases}$

Doses :

De 20 à 40 gouttes aux deux principaux repas, dans un peu d'eau, 3 semaines par mois.

Tolérance parfaite, pas d'iodisme.

Prix : un flacon = 1 mois de traitement = 18 fr.

Laboratoires J. LOGEAIS

22 bis, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE
près Paris. Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16,

IODARSENIC GUIRAUD OU GOUTTES PAIDOPHILES

du Docteur Guiraud

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux

Formule. — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

Indications. — Tous engorgements ganglionnaires, Lymphatisme, Rachitisme, Scrofule, Emphysème, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...). Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

Posologie. — Enf. de 6 mois à 2 ans II à X gouttes par jour
 — 2 ans à 8 ans IV à XX —
 — 8 ans à 15 ans IV à XXX —
 Adultes X à XL —

à prendre en se conformant à la notice jointe à chaque flacon, dans un peu d'eau, ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

Présentation. — Flacon compte-gouttes 45 gr.

Prix : 14 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). — Tél. : Marcadet 37-98.

IODASCLÉRINE

Combinaison organique d'Iode directement assimilable par voie digestive sans dommage pour l'estomac.

Formule. — Iode 3 — INa, IK, BrNa, chimiquement purs à à 1 gr. substratum peptoné 94 gr., soit 0,05 par 1 cc.

Champ d'action. — 1^o Affections cardio-vasculaires, aortites, douleurs angineuses, hypertension chronique, artériosclérose, phlébosclérose, hémorroïdes.

2^o Goitre exophtalmique, arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, obésité, maladies de la ménopause, etc.

3^o Lymphatisme, adénopathies, scrofule, etc.

4^o Bronchites chroniques, asthme, emphysème, etc.

5^o Maladies spécifiques, héréditaires et acquises, infections, mycoses etc.

Dans l'intervalle des médications toni-cardiaques, l'Iodasclérine est le traitement de fond des scléroses vasculaires et viscérales (une seule contre-indication commune à toutes les préparations iodées : l'œdème du poumon).

Par son action sur les glandes endocrines et la nutrition, l'Iodasclérine est le spécifique de la goutte, de l'obésité, du rhumatisme chronique. Dans le lymphatisme, les affections chroniques des voies respiratoires, dans les vieilles affections syphilitiques et mycosiques, l'Iodasclérine est antiscclérosante, antiseptique et résolutive.

Dose. — Adultes de X à L gouttes dans un peu d'eau au milieu des repas. Enfants de IV à X gouttes suivant l'âge.

Produits SANOVA

29, rue de Liège — PARIS VIII^e. — Tél. : Europe 60-39

IODASEPTINE CORTIAL

Composition. — (Iodobenzométhylformine) contenant 42 % iode, soluble dans l'eau, dialysable, injectable, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

Propriétés thérapeutiques. — Dérivées de la nature de ses composants ; iode et antiseptiques (Formol de l'Hexaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzoylés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires : Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysie), Adénopathies, Paludisme, Spirillose. Puissant tonique du cœur.

Prép. Pharm. Posologie. — *Ampoules* : A. 2 cc., B. 5 cc., C. 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire à doses progressives.

Tuberculose (doses faibles) : 2 à 5 cc.

Rhumatismes chroniques (doses fortes) : 5 à 20 et même 25 cc. *pro die*.

Gouttes : XX à C par jour (*enfants* : X à XXX).

Iodaseptine salicylée.

Dans les rhumatismes aigus ou subaigus en injections intraveineuses, joint à l'effet Iodaseptine l'action salicylée. Tolérance parfaite. Supplée le traitement salicylé à haute dose qui ne peut être continué longtemps.

Ampoules de 5 cc.

Doses. — Une ampoule matin et soir en injection intraveineuse.

Laboratoires CORTIAL

15, boulevard Pasteur — PARIS.

IODASSIUM

Composition. — Solution iodo-iodurée répondant à la formule du Lugol d'une stabilité parfaite, édulcorée, anisée et préparée avec de l'iode et de l'iodure de potassium de tout premier choix. Pas d'inconvénients d'iodisme.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les indications de l'iode et de l'iodure de potassium : bronchite chronique et emphysème pulmonaire ; tuberculose osseuse, ganglionnaire ; syphilis à toutes les périodes ; artério-sclérose ; vertiges ; insuffisance thyroïdienne ; maladie de Basedow ; obésité ; troubles circulatoires de la ménopause ; asthme ; ulcères variqueux ; maladies mycosiques : sporotrichose, actinomyose, trichophyties cutanées, kérion ; lymphogranulome suppuré ; angines de toutes natures (badigeonnages et *per os*).

Posologie. — Une cuiller à café de cette solution contient 5 cgr. d'iode métalloïde et 10 cgr. d'iodure de potassium.

Adultes :

Dose faible : 2 cuillerées à café par 24 heures.

Dose moyenne : 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Dose forte : 6 à 12 cuillerées à café par 24 heures.

Enfants :

De X à L gouttes matin et soir, c'est-à-dire de X gouttes à une demi-cuillerée à café matin et soir, et plus suivant tolérance.

Mode d'emploi. — A prendre dans n'importe quel liquide, mais de préférence dans du lait sucré, immédiatement avant les repas.

Laboratoire G. WARIN

4, chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e). Tél. : Auteuil 18-30

IODÉINE MONTAGU

(Iodhydrate de Codéine.)

Propriétés. — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique, facilite l'expectoration.

Indications. — Toux, Emphysème, Asthme.

Formes pharmaceutiques :

Sirop. — 0,03 cgr. d'Iodéine par cuillerée à soupe. 15 francs.

Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

Gouttes. — X gouttes = 0,01 cgr. d'Iodéine crist. 15 francs.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Pilules. — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule. 12 fr. 50.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

Ampoules (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour. 15 francs.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

IODENTÉROL

Iode métalloïdique et iodure de potassium en *solution* alcoolique, et *poudre* iodophile (substances amylacées et calcifiantes) assurant : 1° la tolérance parfaite de l'iode pur par la voie stomacale ; 2° la calcification simultanée de l'organisme.

Indications. — Toutes les manifestations de la bacillose extra-viscérale : adénopathies, synovites, ostéites, etc...

Formes et doses. — *Gouttes* administrées par la voie entérale ou digestive, selon un régime progressif jusqu'à quantités massives.

Prix n° 1 : 20 francs. — N° 2 : 28 francs.

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V^e).

IODE ORGANIQUE BOISSY



Comprimés de 10 centigr., glutinisés et dragéifiés.

Propriétés. — L'*Iode organique Boissy* (Iodéthylhexaméthylènetétramine) est un corps cristallisé, blanc, renfermant 43 p. 100 d'iode. Très soluble dans l'eau, il donne des solutions neutres, incolores, très dialysables. Ne provoque jamais d'iodisme. Se dissocie dans l'organisme avec mise en liberté d'*iode naissant*, puissamment *antiloxyque* et *antiseptique*. Abaisse la tension artérielle et provoque une diurèse surtout manifeste au début de son emploi.

Indications. — Plus actif que l'iode et les iodures, les remplace avec avantage. Particulièrement efficace contre Hypertension, Angine de poitrine, Artériosclérose, Asthme, Emphysème, Rhumatisme, Goutte, etc.

Doses moyennes. — 2 à 8 comprimés par jour.

Prix : 15 francs le flacon de 60 comprimés.

Laboratoires BOISSY

49, rue Hoche — COURBEVOIE, près Paris.

IODEX

Toutes les propriétés thérapeutiques de l'iode libre, aucun des inconvénients de la teinture d'iode.

Iodex simple.

Pommade renfermant 5 p. 100 d'iode éminemment absorbable. Excellent résolutif, exempt d'iodures alcalins et de substances irritantes. Ses principales indications : adénopathies, oreillons, goitres, impétigos, tricophyties, furoncles, blessures.

Prix : 12 francs.

Iodex au Salicylate de Méthyle.

Iodex combiné à 5 p. 100 de salicylate de méthyle. Analgésique et résolutif. Préconisé dans les douleurs articulaires, rhumatismes scarlatins, pleurites, points de côté, névrites, lumbagos, entorses.

Prix : 12 francs.

Iodex liquide.

Formule non irritante d'iode à 2 p. 100 pour la médication externe. Efficacité et sécurité en oto-rhino-laryngologie (pulvérisations ou badigeonnages), en gynécologie (tamponnements vaginaux, instillations intra-utérines), et en chirurgie (pansements des plaies opératoires, brûlures).

Prix : 12 fr. 50.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires RISSA

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.

IODHÉMA

Iodo-alcoylate-méthyle-benzyle d'hexaméthylène tétramine, en solutions aqueuses (43 p. 100 d'iode assimilable).

Indications :

Toutes les formes du rhumatisme chronique.

Formes :

- 1° *Ampoules* de 5 cc. (16 fr.) et de 10 cc. (30 fr.) ;
1 ou 2 par jour (veines et tissus), en boîtes de 10 ;
- 2° *Flacons* (30 fr.) (voie entérale ou digestive), 1 ou 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau sucrée entre les repas.

Mêmes présentations pour :

- 1° *Iodhéma M* (Méthyle pur) indiqué dans la goutte aiguë et chronique (14 et 28 francs) ;
- 2° *Iodhéma B* (Benzyle pur) utilisé dans les infections urinaires et hépatiques (20 et 35 francs).

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V^e).

IODINJECTOL JAMMES

Médication iodée intensive indolore.

Composition. — Iodure de formine benzosodique :
20 cgr. par ampoule de 3 cc.

Indications. — Celles de l'iode et des iodures :
Arthritisme, Hypertension artérielle, Affections glandulaires, Septicémies.

IODINJECTOL salicylé (Iodinjectol + 20 cgr. de salicylate de soude).

Action rapide et énergique sur les crises aiguës de tous Rhumatismes. Sciatique.

Posologie des deux formes :

Une injection intramusculaire par jour.

Prix au public : 18 francs.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

iodo-BISMUTHATE DE QUININE FRAISSE

Composition :

Iodo-Bismuthate de Quinine : 0 gr. 20 ;
huile d'olive : 4 cc.

Indications :

Dans toutes les formes de la syphilis.
Traitement ordinaire : 30 à 35 ampoules,
dont une tous les trois jours.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 18 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin — PARIS.

iodo-BISMUTH ERCÉ

Iodo-bismuthate de quinine.

Forme. — Ampoules-seringues auto-injectables, pour injections intramusculaires.

Avantages sur les préparations analogues.

- 1° Trois fois *moins* d'excipient à injecter.
- 2° Suspension *stable* permettant d'éviter une agitation longue et pénible.
- 3° Suppression du transvasement toujours difficile d'une suspension huileuse.
- 4° *Résorption parfaite.*

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

IODOCALCIUM

LA FORME MODERNE DU SIROP IODOTANNIQUE

D'un goût agréable, ne contient ni arsenic, ni phosphore. Epargne le tube digestif.

Composition. — Par XX gouttes : Chlorure de Calcium, 0 gr. 20 ; iode, 0 gr. 01.

Indications. — Toutes celles de l'iode et du calcium : états de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, pré tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc.

Forme. — Flacon de 45 grammes pour 20 à 25 jours de traitement.

Posologie. — A partir de 2 ans : XX gouttes et plus (jusqu'à L gouttes) deux fois par jour dans un peu d'eau sucrée au début des repas.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France.
3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

IDOGENOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale.

Remplace Iode et Iodures sans Iodisme.

Propriétés. — Très grande proportion d'iode substitué (25 %) :

Absence d'acide iodhydrique libre.

Grande stabilité des iodures organiques.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Indications. — Artériosclérose. Hypertension. Arthritisme, etc...

Posologie. — XL à LX gouttes par jour, en deux fois, dans un peu d'eau, au début des deux principaux repas.

Laboratoires PÉPIN ET LEBOUcq

COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 09-71.

iodo-maïsine

Globules.

Combinaison directe de l'*Iode* d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goîtres, asthme, emphysème, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes.

Posologie. — Chaque globule contient un cgr. d'iode actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour en deux fois, avant les repas.

iodo-maïsine

Pommade

Iodo-Maïsine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

Propriétés particulières. — Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre. Aucune coloration des léguments.

Indications. — Adénites, engorgements glandulaires, goîtres, sporothricoses, arthrites, lymphangites, ostéites, dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

Mode d'emploi. — Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux ou trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

L'*Iodo-Maïsine pommade* est présentée en *tube*. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

Laboratoire R.-J. SOUDAN

Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-interne des hôpitaux de Paris.

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

IODOMÉTINE

Solution concentrée et titrée d'iodhydrate d'hexaméthylène tétramine.

Combinaison organique d'iode soluble et assimilable, V gouttes représentent 1 centigramme d'iode ; XX gouttes agissent comme 1 gramme d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques. — Excitateur puisant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense. Agent anti-infectieux énergique par son radical hexaméthylène tétramine.

Indications. — Toutes affections glandulaires. Adénites, Végétations adénoïdes, Scrofulides, etc., Maladies de la nutrition, Goutte, Rhumatismes chroniques, Sciatique, Asthme, Emphysème, etc.

Posologie. — *Adultes* : XX à LX gouttes par jour.
Enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire E. HAUTDIDIER

37, rue Galilée — PARIS (XVI^e)

IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes : XX gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. d'iodure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — X à XL gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

Propriétés thérapeutiques. — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

Indications. — Maladies par ralentissement de la nutrition ; artério-sclérose : obésité ; polysarcie ; dégénérescence graisseuse ; intoxications chroniques ; asthme ; emphysème, rhumatisme ; arthritisme ; goutte ; tertiarisme.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

IODONESYL

Complexe organo-iodo-magnésien, correspondant à la formule suivante :

Formule. — Iode métalloïdique, 10 p. 100. Réducteurs hydrocarbonés, 6,5 p. 100. Magnésium combiné, 1 p. 100.

La présence de réducteurs puissants augmente considérablement la capacité d'oxydation de l'iode. (Prof. Desgrez).

Le magnésium prépare le terrain à l'action iodique et potentialise le métalloïde.

Pas d'iodisme. Toutes les indications de l'iode, en particulier infections, adénites, rhumatismes, dermatoses.

Doses d'attaque pour infections aiguës : deux cuillerées à café à deux heures l'une de l'autre, puis XXX gouttes 2 fois par jour.

Posologie. — XXX gouttes au début de chacun de principaux repas.

Prix : 20 fr.

Laboratoires REVEL

34, rue Saint-Lazare — PARIS.

IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoïodobenzoate de soude).

Forme. — Gouttes.

Odeur et saveur agréables. Pas de manifestations d'iodisme.

Indications. — Hypertension, Artériosclérose, Emphysème, Asthme, Obésité, Adénites, etc.

Doses. — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

Laboratoire P. MAÜCHANT

14, rue de Birague — PARIS (IV^e).

IODOSAN ZAMBELETTI

Composition :

Solution hydro-alcoolique à 6 p. 100 d'iode métalloïdique à caractère colloïdal, exempte d'iodures, iodates, etc...
Dégage l'iode bi-atomique naissant par dilution dans l'eau potable ou par contact avec les tissus et les sécrétions organiques.

Indications :

Hygiène quotidienne de la bouche : en collutoires et gargarismes contre toutes les affections de la gorge et comme préventif des maladies infectieuses.

Irrigations et lavages du nez et de l'oreille.

Hygiène intime de la femme.

Usage externe : traitement iodique ; tolérabilité parfaite.

Flacon compte-gouttes de 90 grammes.

Prix : 15 francs.

Dépositaire :

Office Commercial Pharmaceutique

71, rue du Temple. — PARIS

Les Établissements

du Docteur L. Zambelletti

MILAN (Italie).

IODOSTARINE « ROCHE »

Dérivé di-iodé de l'acide élaïdique. 47,56 p. 100 d'iode organique assimilable ; sans saveur spéciale ; absorbé seulement dans l'intestin.

Indications thérapeutiques :

Remplace KI aux mêmes doses.

Posologie et modes d'emploi :

Cachets dosés à 0 gr. 25. *Adultes* : 1 à 4 par jour.

Comprimés dosés à 0 gr. 125. *Adultes* : 2 à 8 par jour ; *Enfants* : 1 à 4 par jour selon l'âge.

N. B. — On prend l'Iodostarine « Roche » de préférence à la fin des repas.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE
ET Cie**

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

IDO-THYROÏDINE CATILLON

Forme :

Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

Indications :

Obésité, Goitre, Myxoedème, Dermatoses.

Doses :

1 à 2 contre Myxoedème ; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin, PARIS (III^e).

iodo-vitasine

Iodo-protéine à formule organique nettement définie. Attaquée en milieu *intestinal* par la *trypsine* (digestion). Libère son code *naissant* seulement à ce niveau. Pas de troubles gastriques, pas d'iodisme (iode *naissant* à dégagement constant mais *non brutal*).

Avantages de l'iode et des iodures sans leurs *incon-vénients*. Cinq fois plus actifs.

Posologie. — 1° Solution : XX à XXX gouttes par jour ;

2° *Pilules* : 4 à 8 par jour.

Enfants : dose moitié.

Ces doses peuvent être augmentées.

Pommade à l'Iode-Vitasine (antiseptique et ne tachant pas le linge).

Son action résolutive la fait employer avec efficacité dans les métrites du col.

Echantillon et littérature au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

iodural novat

Formule. — Comprimés contenant chacun 25 centigr. d'iodure de potassium très pur. Chaque comprimé contient également 25 centigr. de bicarbonate de soude alcalin qui, neutralisant dès leur formation dans l'estomac les acides iodique et iodhydrique, permet d'administrer l'iodure de potassium pur sans les inconvénients habituels (iodisme, pyrosis, etc....).

Ces comprimés doivent être absorbés avec un liquide sans y être dissous.

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

IODURASE

Description. — Capsules kératinisées contenant :

Iodure de potassium pur ... 0 gr. 50

Levurine extractive 0 gr. 10

Action thérapeutique. — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

Indications. — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

IODURE D'AMIDON LUMIÈRE

Antiseptique énergique

dépourvu de toute action irritante et de toute toxicité.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique élevé, réalise une antiseptie douce et continue, due à sa faculté de dégager lentement, au contact des sécrétions humorales, de l'iode à l'état naissant.

Infections gastro-intestinales (Dyspepsies, Entérites, Entéro-Colites, Flatulences, Diarrhées, Dysenterie).

Formule. — 1 flacon pilules Iodure d'amidon Lumière.

Dose. — *Adultes* : 6 à 12 pilules par jour.

Usages externes. — *Pansements et chirurgie* : La Pâte et la Poudre possèdent un pouvoir antiseptique prolongé, par dégagement lent de l'iode à l'état naissant.

Pansement Lumière : L'usage combiné de l'Iodure d'Amidon Lumière (pâte ou poudre) et *Tulle gras Lumière*, constitue un pansement dit Pansement Lumière, adopté par beaucoup de chirurgiens, l'Iodure d'Amidon Lumière entretient un état prolongé d'antiseptie. On obtient ainsi des cicatrisations d'une rapidité surprenante.

Formuler. — 1 tube de Pâte Iodure d'Amidon Lumière. 1 flacon de Poudre Iodure d'amidon Lumière.

LABORATOIRES LUMIERE

23, cours de la Liberté — LYON.

IODURE PHILIPPE

Forme. — En *pilules kératinisées* ; elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Prière de prescrire :

Pilules Philippe à l'iodure de potassium { à 0,50
à 0,20
à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les **Pilules Philippe** à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium à 0,20.

Indications. — Artério-sclérose, Adénopathies, Tension artérielle, Goître, Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour, en deux ou trois fois.

Prix au public : 14 fr.

Littérature et Echantillons :

Laboratoire du Dr H. PHILIPPE

14, rue Palais-Grillet — LYON.

IODURES PACHAUT

chimiquement purs

Tubes dosés d'Iodure de potassium à faire dissoudre au moment de l'emploi. — Conservation parfaite.

Présentation :

Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

Téléph. : Laborde 16-72

IODURES SOUFFRON

Chimiquement purs, titrés inaltérables, ne provoquant jamais d'intolérance.

Composition :

Iodure de potassium et Iodure de Sodium :

Solution A 1/15 { 1 cuil. à soupe contient

Sirop A 1/20 { 1 gr. d'iodure.

Dragées à 0,25 d'iodure.

Gouttes : 1 goutte = 1 cgr.

Bi-iodure de Mercure. — *Solution* KI., 1 gr.

+ Hg. I² 0,01 par cuillerée à soupe ; *Dragées*

KI. 0,25 + Hg. I² 0,0025 par dragée ; *gtes*

HgI² 1 milligramme par goutte ; *Ampoules*

aqueuses à 0,01 ou 0,02 par cc. ; *huileuses*,

0,01 par cc.

Indic. habit. des iodures et du bi-iod. de merc.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS

IONYL

Médication bio-énergétique complète.

Composition. — Complexes phospho-marins, Acide phosphorique physiologique, Magnésium et Manganèse glycéro-phosphoriques activés et vitalisés par solution et combinaison en milieu marin.

Action thérapeutique et indications :

1° Stimulant, réparateur et neurotonique (Surmenage physique et intellectuel, Asthénies, Dépressions fonctionnelles. Usure sénile).

2° Oxydant et modificateur de la nutrition (Troubles alcalosiques, Arthritisme, Phosphaturie, Scléroses, Anoxémie).

Action immédiate. Innocuité absolue.

Posologie. — XX gouttes (dose moyenne) au milieu des deux principaux repas, en dilution dans un verre de boisson quelconque.

Littérature et échantillons gratuits.

Laboratoires LA BIOMARINE

DIEPPE (Seine-Inférieure).

IOSORBINE

Onguent ioduré (10 p. 100 KI) caractérisé par son absorption totale.

Propriétés thérapeutiques. — Action kératolytique, kératoplastique, résolutive, sédative, analgésique.

Désinfectant de la peau.

Pas d'accident d'iodisme, pas d'irritation ni de coloration locale.

Indications. — 1° *Adénites* ; entorses, foulures, plaies traumatiques.

2° *Algies* : névralgies, névrites, rhumatismes, courbatures, contusions.

3° *Dermatoses sèches* : dermites squameuses et kératosiques, psoriasiformes, eczémas secs, dermo-épidermites, pyodermes, dermites staphylococciques, Réactions cutanées d'ordre anaphylactique (urticaire), brûlures, coups de soleil, radiodermes.

4° Désinfection de la peau (emploi journalier comme crème prophylactique).

Mode d'emploi. — Friction légère jusqu'à absorption. Faire plusieurs applications de suite.

Présentation. — *Crème blanche* en pots de deux dimensions :

Le pot : 12 francs. — Le double pot : 20 francs.

Echantillons et littérature :

LABORATOIRES VANDA

16, rue Ficatier — COURBEVOIE.

IRÉNINE GONNON

Composition. — Cachets dosés à 0 gr. 71, à savoir :

0 gr. 53 d'Irénine proprement dit (combinaison fixe cristallisable de pyramidon, analgésine, phénacétine). 0 gr. 13 de sulfate de quinine, 0 gr. 05 de caféine.

Indications. — Spécifique des douleurs violentes et rebelles, névralgies, maux de tête, rages de dents, migraines, crises de rhumatisme, fièvres, grippe, influenza, douleurs périodiques, accès de goutte, etc...

Posologie. — 1, 2 ou 3 cachets par jour.

Toujours toléré par l'estomac, pas de vertiges.

Prix : 8 fr. la boîte de 12 cachets.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

IRRASTÉRINE

Vitamine D. Standardisée.

Ergostérine irradiée par les rayons ultra-violet.

Adoptée par les Hôpitaux.

Solution — Dragées,

Composition. — Ergostérine pure irradiée aux rayons ultra-violet, en solution dans l'huile d'olives, sans aucune addition de cholestérine.

Propriétés thérapeutiques. — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'*Irrastérine* peut être considérée comme la médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Indications. — Traitement spécifique du rachitisme, de la tétanie et de tous les états spasmophiles. Troubles de l'ossification, Caries dentaires, Ostéomalacie, Prétuberculose et tous états de déminéralisation.

Dose et mode d'emploi. — *Solution huileuse* (1 goutte = 200 unités antirachitiques) jusqu'à 1 an, X gouttes ; de 1 à 10 ans, XX gouttes ; adolescents, adultes, XXX gouttes. — *Dragées* (1 dragée chocolatée = 1 200 unités antirachitiques) 2 à 4 par jour.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

ISACÈNE « ROCHE »

Laxatif synthétique nouveau.

Action thérapeutique. — L'Isacène « Roche » est la diacétyldioxyphénylisatine, insoluble dans l'eau et l'acide chlorhydrique, soluble seulement dans le milieu alcalin du côlon, où se constitue la constipation. Il est absolument atoxique, sans odeur, sans saveur, sans aucun effet nocif ; il agit d'une manière douce, constante, certaine, sans coliques, sans épreintes et sans ténésme. Il n'est pas absorbé au niveau de l'intestin, il ne passe pas dans l'organisme, et il est éliminé en totalité avec les matières fécales.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas de constipation (sans aucune exception), adultes bien portants ou malades, alités, opérés, rénaux, vieillards, intoxiqués, femmes enceintes, enfants, etc.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes :

Dose laxative légère	2 granules.
— moyenne .	2 à 4 granules.
— forte	4 à 8 granules.

Enfants.

1/4 ou 1/2 dose, selon l'âge et le cas.

ISACÈNE « ROCHE »

Flacon de 40 granules.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — Paris (III^e).

ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne.)

Action.

L'Estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire atteindre toujours le point cryoscopique de 0,38, nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'Isotonyl Bouret aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction sécrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyper-acide, assure l'évacuation gastrique.

Formes et mode d'emploi.

Paquets, 1 pour 1 litre. Discoïdes, 2 pour 1 verre.

Adultes : 2 à 3 verres par jour.

Enfants : 1/2 verre à Bordeaux à 2 verres par jour.

Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs et le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

Prix au public : 13 francs.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

IXIUM BUISSON

Solution isotonique stérilisée de Thorium X
pour usage médical.

(Injections intramusculaires profondes
ou intraveineuses).

Principales utilisations et posologie du Thorium X

<i>Affections traitées.</i>	<i>Doses de thorium X employées.</i>	<i>Marche et durée du traitement</i>
Rhumatismes chroniques	Commencer par 50 à 80 microgrammes et augmenter progressivement de 20 jusqu'à la dose de 150 à 200 micros.	8 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Goutte	Débuter par des doses légères, en dehors des crises douloureuses, — de 50 à 200 micros environ, par augmentations progressives de 20.	8 injections consécutives, au rythme d'une par semaine.
Psoriasis	1 ^{re} injection : 50 mgr. 2 ^e injection : 100 mgr. les 6 dernières : 150 mgr.	8 injections, au rythme d'une par semaine.
Névrite Sciatique	Débuter par 50 à 80 microgrammes et augmenter progressivement de 20 jusqu'à la 150 à 200 micros.	8 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Anémie Chlorose Neurasthénie	De 25 à 75 microgrammes, par augmentations successives.	8 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Leucémies Maladie de Hodgkin et Tumeurs	Commencer par 100 microgrammes pour arriver à 350 par augmentations successives de 25 microgrammes.	5 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.

Il est bien entendu que les doses ci-dessus peuvent être modifiées au gré du médecin et que les séries peuvent être renouvelées après un intervalle d'environ 2 mois de repos.

Toutes les doses sont exprimées en microgrammes de bromure de radium.

Prix de vente réglementé à 30 p. 100.

Tarifs sur demande.

L'Ixium est préparé à Paris tous les mardis par la

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

IXOGYNE

Antiseptique gynécologique

(Usage externe.)

Composition. — Association de formaldéhyde, aldéhyde trichlorée, excipient spécial au baume benjoin de Siam. Parfum très agréable.

Action. — Antiseptique, antiprurigineux, décongestionnant, cicatrisant, désodorisant, non irritant.

Indications. — Affections gynécologiques : vaginites, bartholinites, métrites, salpingites, prurit vulvaire, hygiène quotidienne de la femme. Soins obstétricaux.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café dans un litre d'eau chaude pour une injection, deux par jour.

Prix au public : 12 fr. 50.

**LABORATOIRE CHIMICO-THÉRAPIQUE
DE PARIS**

24, rue Paul-Bert — PARIS (XI^e).

Téléphone : Marcadet 20-28.

JÉCOL

Régulateur entéro-hépatique.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-2.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'hépatisme sous toutes ses formes :

Congestion et Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite muco-membraneuse, Auto-intoxication, etc.

Formule. — *Combretum* (extrait spécialisé de kinkélibah).

Boldo (extrait aqueux).

Evonymus (extrait titré).

Forme. — Petits cachets.

Prescription. — 1 ou 2 cachets à la fin de chaque repas. — 3 à 6 semaines.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés, par le médecin traitant, chez le malade.

LABORATOIRE DU JÉCOL

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine)

JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue
et d'extrait de malt à l'état de paillettes.

Composition. — Huile de foie de morue, 30 p. 100,
Extrait de malt, 64 p. 100 ; Cacao, 6 p. 100 ;
Essences aromatiques, Q. S.

Indications. — Le jemalt réalise la médication à
l'huile de foie de morue renforcée des éléments
nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de
malt. Anémie en général. Croissance des enfants.

Doses. — Enfants jusqu'à 2 ans, 1 à 2 cuillerées à
café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 3 à
6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel
que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué
dans du lait tiède ou dans une infusion.

La boîte : 12 francs.

Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

JUGLANE

Composition. — Principe actif du noyer sauvage.

Indications. — Toutes les formes du diabète
et ses complications : acidose, acétonémie, en
particulier les diabètes gras, arthritiques, hépa-
tiques. Aucune contre-indication, tolérance par-
faite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pilules avant chacun des
trois repas. Cette dose peut être doublée sans
inconvenient. Continuer progressivement le trai-
tement jusqu'à complète disparition du sucre
dans les urines.

Prix en France : 15 fr. la boîte de 150 pilules

Produits Euthérapiques

Camille CONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon.

12, rue des Ecoles — CHAMBÉRY (Savoie).

KALMOBROL

(Spécialité absolument française.)

Composition. — Extrait de bouillon bromuré à base de bromure de sodium très pur.

Doses. — 1 cuillerée à café : 1 gr. de bromure de sodium.

Indications. — Tous les cas les plus divers d'Excitation nerveuse (Insomnie, Neurasthénie, etc., etc.).

Mode d'emploi. — Verser dans une tasse d'eau très chaude le nombre prescrit de cuillerées à café. On obtiendra immédiatement un délicieux bouillon que l'on absorbera bien chaud, soit au début du repas, soit à n'importe quel moment de la journée.

Laboratoires R. NIEL

60, rue Auguste-Comte — LYON (Rhône).

KAOBROL

Composition. — Bromure de sodium et Poudres absorbantes. Kaolin, carbonate de magnésie, carbonate de chaux, gomme pour homogénéiser la poudre.

Poudre blanche de saveur agréable, sucrée et aromatisée à la menthe.

Indications. — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites. Aérophagie.

Sédatif puissant de toutes douleurs gastriques.

Posologie. — Une cuillerée à café après les repas et au moment des crises douloureuses.

Littérature et Echantillons à Messieurs
les Docteurs.

Laboratoire du KAOBROL

J. LAROZE, Pharmacien

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

Tél. : Entrepôt 01-41.

KAOLINASE

Pour pansements gastriques.

Kaolin purifié, en poudre fine très adhésive, lavé et stérilisé.

Dose et mode d'emploi. — 1 ou 2 paquets le matin à jeun (*détail* sur prospectus).

Propriétés thérapeutiques. — Le KAOLIN constitue le médicament de choix pour le *plâtrage* de l'estomac (Prof. Hayem, A. M., 13-5-1920).

Indications. — Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Ulcères et ulcérations de l'estomac, Colites, Fermentations gastro-intestinales, etc.

La boîte de 20 paquets de 10 gr. : 12 fr.

Echantillons gratuits :

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 76-85.

KENOL

Compensateur intestinal.

Extrait duodénal total 0 gr. 045

— biliaire total purifié .. 0 gr. 045

— Gladiolus ceruleus.... 0 gr. 019

— Evony. atropur..... 0 gr. 019

Hyd. de soufre purifié 0 gr. 035

pour un comprimé-dragée.

Propriétés thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre des sécrétions intestinales. Agit sur le péristaltisme. Action antiseptique puissante.

Indications. — **Constipation**, Affections hépatiques, Cholécystites, Dermatoses, Auto-intoxication.

Doses. — 1 à 3 dragées au repas du soir ou 1 à 2 à chaque repas. Avaler sans croquer. Action évacuante douce, activité constante. Pas d'accoutumance.

Prix au public : 10 fr.

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS.

KERLACTINE

Composition. — Pilules kératinisées d'acide lactique pur de ferment (principe actif de tous les ferments lactiques comprimés ou liquides) enrobées selon un procédé spécial et nouveau, qui permet de libérer l'acide lactique dans l'intestin seulement, à l'endroit précis où doit se produire sa puissante action.

Indications. — Entérites, Entéro-colites, Diarrhées, Dysenterie, Fermentations, Dermatoses d'origine intestinale, Auto-intoxications, Grippe intestinale, Entérites des Tuberculeux.

Posologie. — 5 à 6 pilules à la fin des deux principaux repas.

Pas de contre-indication.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 francs l'étui de 60 pilules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 346-7.

Maro PARIS, Pharmacien de 1^{re} Classe
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e).

KERLOL

Antiseptique — Astringent — Absorbant.

Expérimenté avec succès dans les hôpitaux.

Réussit où tous médicaments ont échoué.

Mode d'emploi. — *Maux de jambes, Plaies, Ulcères, Blessures, Eczémas* : Employer en lavages et compresse le *Kerlol liquide* au 1/3.

Varices, Enflures : Compresse de *Kerlol liquide* au 1/3.

Eczémas, Dartres, Maladies de la Peau, Furoncles : *Pommade au Kerlol* n° 2.

Hémorroïdes internes : Matin et soir, un *Suppositoire au Kerlol* ; s'il y a Hémorragie, faire, avant l'introduction des suppositoires, une injection peu profonde (au moyen d'une seringue à oreilles avec du *Kerlol liquide* au 1/3).

Hémorroïdes externes : Employer compresse au *Kerlol liquide* et la *Pommade au Kerlol* n° 3.

Fistules : Employer les *Suppositoires* et la *Pommade au Kerlol* n° 3.

Littérature et échantillons :

Laboratoire LERCK

63, place Saint-Roch — SAINT-ETIENNE.

KIDOLINE

Huile adrénalinée au millième.

Indications.

- 1) Coryza aigu du nourrisson chez lequel la kidoline permet l'alimentation en rétablissant en partie la perméabilité nasale.
- 2) Adénoïdite aiguë de l'enfance ; décongestionne puissamment les muqueuses, modifie la nature des sécrétions et permet l'usage *utile* de sels argentiques qui sans cela pénétreraient trop insuffisamment.
- 3) Accès de faux croup.
- 4) Rhinites aiguës avec menace de sinusite.

Mode d'emploi.

Chez les nourrissons instiller à la fois V à VI gouttes dans chaque narine 5 minutes avant la tétée.

Chez l'enfant : 4 fois par jour instiller VI à X gouttes. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Flacon de 20 centilitres.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS.

Prix : 13 fr. 50.

KINÉCHOL

Composition. — Granulé soluble à base de sulfate de magnésie desséché, peptone de fibrine, extrait de boldo, hyposulfite de magnésie.

Indications. — Affections du foie et de la vésicule biliaire (calculs et coliques hépatiques).

Troubles digestifs d'origine hépatique : Vomissements, Pesanteurs, Constipation, Diarrhée d'origine hépatique.

Manifestations hépatiques : Migraines, Urticaires, Nausées, Prurit.

Contre-Indications. — Cholécystites aiguës et dysenterie.

Posologie. — Une, deux ou trois cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun. Se coucher ensuite 20 minutes sur le côté droit.

Prix : 16 francs.

Laboratoire du KINÉCHOL

GENEVET, Docteur en Pharmacie

40. Boulevard Saint-Ruf — AVIGNON (Vaucluse).

KINECTINE

Spécifique de la Fièvre des Foins
et du Coryza aigu.

Indications. — Fièvre des foins, Coryza aigu.

Forme. — Comprimés.

Posologie. — *Adultes.* — 3 comprimés par jour.

Enfants. — Moitié dose.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE - LA - GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anéthol Solubilisé.

Forme. — Sirop d'un goût très agréable, bien accepté des enfants. — Non toxique.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc...

Posologie. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants.

Moins d'un an	2 à 4 cuill. à café par jour.		
1 à 5 ans	4 à 8	—	—
5 à 10 ans	5 à 10	—	—
Au-dessus de 10 ans	8 à 10	—	—

Nota.

L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

LABORATOIRE REMEAUD

38, avenue J.-Baptiste-Clément — Boulogne-sur-Seine.

Téléphone : Molitor 04-59.

Dépôt général O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS

KOLA GRANULÉE ASTIER

Composition. — Extrait de Kola granulée contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, rouge de Kola et tanins actifs.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

Indications. — Neurasthénie, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescence des maladies infectieuses et des maladies graves, asthénie, surmenage physique et intellectuel. Entraînement à tous les sports.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 12 francs.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e)



KOLA MONAVON

Présentation et composition :

Elixir (26°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur (30 cc.).

Vin (21°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à bordeaux (75 cc.).

Granulée : dosée à 6 p. 100 d'extrait de kola.

Pastilles : 0 gr. 035 extrait de kola par pastille.

L'Extrait de Kola rentrant dans la composition de la Kola Monavon renferme tous les principes actifs de la noix de kola fraîche : Caféine libre et combinée, théobromine, kolatine et rouge de kola, qui, sous l'influence des liquides digestifs, se dédouble en glucose, kolatannin et caféine à l'état naissant.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment d'épargne sans égal. Agent de conservation et d'augmentation des forces musculaires et nerveuses. Régulateur de la circulation. Stimulant du système cérébrospinal. En un mot : Excitant tonique général.

Indications. — Œdèmes, anasarques et la plupart des troubles fonctionnels du cœur, migraine, céphalalgie, névralgie d'origine circulatoire, neurasthénie, surmenage, asthénie grippale, convalescences, dyspepsie, diarrhées chroniques et diarrhées des pays chauds.

Posologie :

Elixir : 1 à 2 verres à liqueur par jour, avant ou après les repas.

Vin : 1 à 2 verres à bordeaux par jour.

Granulée : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pure, dans du café, du thé ou de l'eau.

Pastilles : 10 à 15 par jour.

Prix :

Elixir et *Vin* : 18 francs. — *Granulée* : 13 francs. —
Pastilles : 8 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

KREPTOL

Granulé.

Composition. — Kola, méthylarsinate de soude, phosphure de zinc, glycérophosphate de chaux, soude, magnésie.

Doses. — Une cuillerée à café, sec ou dans un peu d'eau, avant le repas de midi et du soir.

DOCTEUR

Si vous avez des malades fatigués, déprimés, neurasthéniques, ayant besoin d'un coup de fouet rapide, prescrivez du KREPTOL.

Echantillons sur demande :

Laboratoire LOUINET, Pharmacien

39, rue de l'Arcade — PARIS.

Tél. : Central 60-77.

KYDALOSE

Poudre non toxique.

Iode organique non caustique.

Salicylate de soude.

Priser 5 à 6 fois par jour.

Coryza aigu et chronique, Obstruction nasale et ses conséquences, Sinusites, Otites, Hypertrophie des cornets, Ozène.

N.-B. — Par le salicylate de soude que contient la KYDALOSE, ce médicament convient aussi au coryza aigu et l'enraye si l'on s'en sert dès le début de la crise. Il est de plus en plus avéré que le coryza aigu n'est autre chose qu'une fluxion rhumatismale « a frigore », par conséquent justifiable du salicylate de soude employé localement.

Son effet préventif n'est pas douteux.

Echantillons (modèles de vente) :

G. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe.

49, quai Saint-Vincent. — LYON.

KYMOSINE ROGIER

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Dose. — Une cuillerée-mesure dans 200 cc. de lait tiède à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon : 12 fr. 50.

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS.

LAB LACTO FERMENT MIALHE

Digestion du lait.

Indications. — Diarrhées vertes des nourrissons et dans tous les cas de mauvaise digestion du lait, troubles gastro-intestinaux, régime lacté où le malade doit absorber une forte quantité de lait.

Dose. — Pour *adultes* et *enfants* : une cuiller-mesure par verre de lait. *Nourrissons* : une demi-cuiller-mesure par biberon ou par tétée.

Mode d'emploi. — Mettre la dose indiquée dans 1 à 2 cuillerées d'eau, puis ajouter le lait, froid ou tiède.

Laboratoire du Dr MIALHE
8, rue Favart — PARIS.

LACCODERMES

Vernis semi-gras, soluble à l'eau.

Pansement dermatologique.

Laccoderme à l'oxyde de zinc : Affections légères de la peau.

Laccoderme sulfo-cadique : Eczematides-Impetigo.

Laccoderme au goudron de houille : Dermatoses suintantes.

Laccoderme à l'ichtyol : Eczéma-Ecthyma.

Laccoderme ichtyol-stovaine : Dermatoses prurigineuses.

Mode d'emploi. — Nettoyer la peau au savon Denisol. Étendre le Laccoderme. Laisser sécher et saupoudrer avec l'Anytal Brisson.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et C^{ie}, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

LACHÉSINE

Extrait du venin
du *Trigonocephalus lachesis*.

Forme. — Comprimés solubles dans l'eau.

Mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour en dehors des repas. Résultat rapide.

Indications. — *Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.* (Bouffées de chaleur, sueurs, vertiges, congestion céphalique, dyspepsie, mélancolie, etc.)

S'abstenir pendant les règles.

Prix : 12 francs le tube de 40 comprimés.

Laboratoire RENAUD

2, rue Demours — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Étoile 23-82.

LACPININE

Forme. — Liquide blanc.

Composition. — Emulsion d'essence de pin naturelle.

Indications. — Pour vaporisation, douches vaginales, bains de siège contre hémorroïdes, bains complets en cas de neurasthénie.

Mode d'emploi. — Lavages et douches vaginales : 1 à 3 cuillerées à café par 1 à 2 litres d'eau.

Vaporisation et désodorisation des locaux : 5 cuillerées à soupe par litre.

Frictions : pure ou diluée de moitié.

Pour un bain complet ou partiel, la Lacpinine s'emploie à raison de 1 cuillerée à soupe pour 100 litres d'eau.

Prix.	{	Flacon de	60 gr. :	5 fr. 80
		—	150 gr. :	13 fr.
		—	750 gr. :	43 fr. 80
		—	1 000 gr. :	50 fr.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Dépôt à PARIS, 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

LAC-SER

Composition. — Lactosérum desséché.

Propriétés. — Provoque dans l'intestin des fermentations acides qui s'opposent aux putréfactions albuminoïdes toxiques. A, en outre, une action diurétique et cholagogue.

Indications. — Auto-intoxications intestinales, entérites des nourrissons, affections hépatiques.

Formes et posologie. — Paquets : 5 gr. de lactosérum desséché par paquet correspondant à 100 gr. de lactosérum liquide.

Dose : 3 à 4 paquets par jour dans un liquide (300 à 400 gr.).

Prix : 15 francs (boîte de 30 paquets).

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS (XIII^e)

LACTARIS

Médication lactique entièrement nouvelle

par sédiment massif de cultures lactiques vivantes.

Présentation. — Ampoules-flacons à boire.

Composition. — Par dose : environ 2 000 000 000 de plusieurs anaérobies facultatifs.

Indications. — Chez l'enfant et l'adulte : diarrhées, entérites aiguës, hyperintoxication intestinale. *Colibacillose*.

Prix : 25 francs la boîte de 18 ampoules-flacons (cure de 9 jours).

Laboratoire CENTRAL

129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

M. MASSON,

Pharmacien de 1^{re} classe.

LACTICHOLÉINE TULIVET

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés
Extrait de fiel de bœuf.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique infail-
lible dans les affections du tube digestif, dans les
affections intestinales et cutanées, dans l'insuf-
fissance biliaire et la désinfection intestinale.

Mode d'emploi. — A prendre 10 minutes avant le
repas dans de l'eau sucrée ou du lait.

Adultes : 3 à 8 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 5 comprimés par jour.

Nourrissons : 1/2 comprimé 2 fois par jour.

Laboratoire TULIVET

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

LACTIMASE

Description. — Comprimés de ferment
lactique de 0 gr. 50 ; par flacons de 40 com-
primés.

Action thérapeutique. — La *Lactimase*
détruit les microbes pathogènes de l'intes-
tin par accaparement du milieu, action
renforcée par la symbiose du bacille Bul-
gare et d'une levure spéciale.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour
dans les intoxications intestinales, diar-
rhées vertes des nourrissons, constipation,
dysenteries, entérites.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques
sélectionnés.

Doses et mode d'emploi. — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

Propriétés thérapeutiques. — Remplacement de la flore intestinale nocive par une flore bienfaisante.

Indications. — Auto-intoxication intestinale, entérites, diarrhées, dermatoses.

Laboratoires DARRASSE

7 à 13, rue Saint-Maurice
NANTERRE (Seine).

LACTOBYL

Composition :

Sels biliaires.

Poudre de muqueuses intestinales.

Charbon poreux hyperactivé.

Ferments lactiques sélectionnés.

Extrait Cytoplasmique de *Laminaria flex.*

Pancréine.

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Rééducateur intestinal.

Indications. — Toutes les modalités de la constipation.

Doses et Mode d'emploi. — De 2 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par 2 comprimés 10 minutes avant ou après les repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Prix de vente au public : 12 francs.

LE « LACTOBYL »

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

LACTOCHOL

Composition. — Ferments lactiques. Sels biliaires.

Forme. — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

Propriétés thérapeutiques. — Infections intestinales, entérite. Adultes et nourrissons, Insuffisance biliaire.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : Comprimés : 2 à 6 par jour avant les repas dans de l'eau sucrée (avaler sans mâcher).

Enfants : 2 à 6 comprimés par jour dans miel, confiture, 1 cuillerée à café avant les repas.

Nourrissons : 1 cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

Prix de vente au public : 14 francs.

Laboratoires « LOBICA »,

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin sans la moindre irritation.

Doses. — 1 à 3 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau sucrée.

Enfants : 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de 6 tubes de 6 comprimés.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

LACTO-SÉRUM LAVRIL

Sérum intégral du lait.

Facteur d'activité glandulaire dosé par la glande mammaire.
Active sécrétions, éliminations, régite flore microbienne intestinale.

Cholagogue. — Diurétique. — Antitoxique.

- a) *Isotonique* : pH : 6,5. Foie, Intestin, Rein, Diète. Médic. Infant.
b) *Hyperacide* : pH : 4,5. Sp. désinfectant urinaire et intestinal.
Entérite, Colibacillose, Pyélo-néphrite.

Foie : 2 à 3 verres de 80 à 120 gr., à jeun, à 20 min. d'interv.

Rein : 2 à 3 verres de 120 à 150 gr., à jeun, à 45 min. d'interv.

Cure de désintoxication : (5 à 10 jours) : 2 verres de 120 gr. à jeun, à 20 minutes d'intervalle.

Grande Cure : (6 j.) 2 à 3 verres le matin et 1 verre 1 heure avant les repas.

Enfants : 1 biberon pur le matin, 60 gr. ou 25 gr. par biberon.

Diète : Premier aliment d'opéré, fiévreux, typh., convalescent.

Remplace bouillon de légumes, lait, tisane, etc., X à 120 gr. espacés de 2 à 3 heures.

Défendre laitage, Aromatiser avec café. Alcaliniser si aigreurs.

Boîtes 5 flacons de 240 gr. (petite cure). Le flacon : 5 fr.

Flacons de 960 gr. (grande cure). Le flacon : 13 fr. 30.

26, Boulevard des Batignolles. — PARIS.

Tél. : Marcadet 21-14.

LAIT DE MAGNÉSIE PHILLIPS

Combinaison chimique définie de magnésie et d'eau (hydroxyde de magnésium) ne contenant aucun excipient destiné à maintenir la magnésie en suspension.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-acide, sédatif gastrique, Laxatif.

Indications. — Gastralgies, Dyspepsies acides et nerveuses, Eructations, Etats bilieux, Constipation, Coliques, Diarrhées d'origine dyspeptique, toutes les affections dues à l'acidité buccale.

Posologie. — *Anti-acide.* Adultes. — D'une cuillerée à café à une cuillerée à soupe dans un verre d'eau froide, 2 heures après les repas. Enfants : 1/2 à une cuillerée à café. Nourrissons : X à XX gouttes suivant l'âge.

Laxatif. Adultes. — D'une à quatre cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de limonade, une heure et demie avant le petit déjeuner du matin. Enfants : de une à deux cuillerées à café. Bébés : une demie à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Anti-acide buccal. — Après s'être brossé les dents, bien se rincer la bouche avec une cuillerée à soupe de Lait de Magnésie Phillips. Il se forme sur les dents et les gencives une pellicule alcaline qui dure plusieurs heures et les protège contre les attaques de l'acide.

Présentation : flacon de 120 cc., triple-flacon de 360 cc. environ.

Echantillons et littérature sur demande à

O. C. P.

108, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

LAIT MONT BLANC

1° CONCENTRÉ SUCRÉ.

Composition moyenne :

Eau.....	24	p. 100.
Matière grasse (beurre).....	10,20	—
Matières azotées (caséine).....	9,80	—
Lactose (sucre de lait).....	13,40	—
Saccharose (sucre raffiné).....	40,75	—
Cendres.....	1,85	—

Nature et caractéristiques. — Lait de vache pur et intégral condensé en vase clos et à basse température, après pasteurisation, additionné de sucre raffiné de premier choix. — Riche en vitamines et en beurre.

Propriétés et indications. — Allaitement mixte ou artificiel. Spécialement indiqué chez les nourrissons atteints de troubles de la digestion ou de la nutrition, d'arrêt de croissance et de rachitisme, indiqué également chez l'adulte en cas d'entérites, de dyspepsies, de tuberculose intestinale ou pulmonaire.

Présentation. — Boîtes de fer-blanc serties, de 75, 200 et 400 grammes net de contenance.

Mode d'emploi. — Suivre les indications portées sur l'étiquette des boîtes. Pour l'allaitement des nourrissons utiliser de préférence le biberon gradué « MONT BLANC » en vente dans toutes les pharmacies, ou demander à la Compagnie Générale du Lait son barème de dosages normaux.

2° CONCENTRÉ NON SUCRÉ.

Composition moyenne :

Eau.....	72	p. 100.
Matière grasse (beurre).....	8	—
Matières azotées (caséine).....	8	—
Lactose (sucre de lait).....	10,5	—
Cendres.....	1,5	—

Nature et caractéristiques. — Successivement concentré, homogénéisé, mis en boîtes hermétiques et enfin stérilisé, ce lait est rigoureusement pur, c'est-à-dire exempt de germes saprophytes et pathogènes. Il se conserve indéfiniment et se digère parfaitement.

Propriétés et indications. — A peu près les mêmes que pour le lait sucré mais en ne perdant pas de vue que ce lait est stérile. Il est donc recommandé — lorsque son emploi est exclusif et prolongé — de faire absorber journellement aux nourrissons une à deux cuillerées à café de jus de fruit frais (orange, citron ou raisin), de façon à compenser l'absence de vitamines.

Présentation. — Boîtes de fer-blanc serties, de 170 et 450 grammes net de contenance.

3° LAIT NATUREL HOMOGÉNÉISÉ STÉRILISÉ.

Composition moyenne :

Eau.....	87,60	p. 100.
Matière grasse (beurre).....	3,50	—
Lactose (sucre de lait).....	4,70	—
Matières azotées (caséine, albumine).....	3,50	—
Cendres.....	0,70	—

Nature et caractéristiques. — Les mêmes que celles du lait concentré non sucré, la concentration en moins. S'emploie comme du lait ordinaire.

Propriétés et indications. — Lait de sécurité, rigoureusement aseptique. Recommandé dès le début de l'allaitement et spécialement pour les bébés débiles ou prématurés. Réussit particulièrement bien aux nourrissons constipés et vomisseurs. Également précieux à l'époque du sevrage et pendant les chaleurs.

Présentation. — Boîtes de fer-blanc serties de 165 et 420 grammes net de contenance.

Echantillons, littérature et prix spéciaux sur demande à la

COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LAIT

RUMILLY (Haute-Savoie).

Société anonyme au capital de fr. : 10.000.000.

R. C. Annecy n° 2.946. — C. C. P. Lyon 106-83.

LAIT SEC « C. G. »

(Cow et Gate Milk Food).

Aliment pour enfants dès la naissance.

Analyse :

Graisse	27,3	p. 100.
Protéine	26,6	—
Lactose	37,6	—
Matières minérales	6,0	—
Eau	2,5	—

100,

Valeur calorifique par 100 grammes : 518.

Indications. — Préparé avec du lait de vache de l'ouest de l'Angleterre par le procédé perfectionné à rouleaux « Cow et Gate » tout en conservant intacte la teneur exceptionnelle en vitamines naturelles et sels minéraux pour laquelle le lait de ces pâturages est très renommé.

Le « Lait C. G. » est un aliment complet pour enfants dès la naissance. L'aliment est strictement standardisé, point très important pour le médecin. Il contient invariablement le même pourcentage de graisses et il est exempt des variations et des irrégularités du lait liquide et d'autres aliments.

Pour nourrissons : Le « Lait C. G. » forme dans l'estomac de l'enfant un caillé velouté et léger complètement assimilable et qui pratiquement ne se distingue pas du lait de la mère.

Préparation. — Suivant les doses indiquées sur la boîte. A modifier suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

Société de Spécialités Diététiques et Pharmaceutiques

22, rue des Belles-Feuilles — PARIS (XVI^e).

Et W.-P. WRATHALL

204, rue Royale — BRUXELLES

LAMINAROL

Composition. — Hormones et ferments gastro-intestinaux, extrait hépatique, sels biliaires dépigmentés, ferments lactiques sélectionnés, mucilage endocellulaire d'algues marines, charbon hyperactivé, gomme, résine.

Indications. — Insuffisance hépatique, arthritisme, constipation sous toutes ses formes, infections intestinales, troubles gastro-intestinaux, etc...

Mode d'emploi. — 2 à 8 comprimés par jour.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne — PARIS

LAMINIODE

Médication iodo-marine.

Comprimés de Laminiodé :

Tube de 50 comprimés : 12 fr.

1 à 2 comprimés après chaque repas.

Ampoules de Laminiodé :

Boîte de 10 ampoules : 24 fr.

1 à 2 ampoules par 24 heures.

Sels de Laminiodé :

Paquet de 250 g. : 6 fr.

Ablutions et toilette : 1 c. à café p^r 4 lit. d'eau.

Bains pour enfants : 1 c. à soupe p^r 20 lit. d'eau.

Bains de pieds : 1 cuil. à soupe p^r 10 lit. d'eau.

Grands bains : 1/2 à 1 paquet par bain.

CAMA-LAMINIODE

Médication

iodo-marine-calciqne-magnésienne.

Comprimés de Cama-Laminiodé :

Tube de 50 comprimés : 12 fr.

1 à 2 comprimés après chaque repas.

FERRO-LAMINIODE

Médication iodo-marine-ferrugineuse.

Comprimés de Ferro-Laminiodé :

Tube de 50 comprimés : 12 fr.

1 à 2 comprimés après chaque repas.

Sirop concentré de Ferro-Laminiodé :

Flacon de 150 cc. : 15 fr.

1 cuillerée à café après chaque repas.

Littérature et échantillons :

Laboratoires OCEANA

Paul GLOESS, pharmacien

29, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII^e).

LAMINOLAX

Régulateur marin naturel
de l'intestin.

Comprimés de Laminolax :

Tube de 50 comprimés : 12 fr.

1 à 2 comprimés après chaque repas.

Littérature et échantillons :

Laboratoires OCÉANA

Paul GLOESS, pharmacien

29, avenue de Saint-Mandé

PARIS (XII^e).

LANSOYL

HUILE DE PARAFFINE ROBERTS

Deux formes. — Liquide et gelée.

Liquide : Huile de paraffine chimiquement pure, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

Gelée : Contient 90 p. 100 de Lansoyl liquide et 10 p. 100 de sucs de fruits et d'agar-agar. Goût, odeur et aspect d'une véritable gelée de fruits. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

Indications. — Constipation chronique, Inflammations, Entéro-Colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Doses. — *Adultes* : Une cuillerée à soupe le matin et le soir.

Enfants : Une cuillerée à café trois fois par jour.

Nourrissons : Une demi-cuillerée à café trois fois par jour.

Prix : *Liquide* : G. M., 20 fr. ; P. M., 12 fr.

Gelée : 18 fr, 50.

ROBERTS et C^{ie}, Pharmaciens

5, rue de la Paix — PARIS.

Tél. : Central 89-86.

LANTOL

(*Procédé A. Lancien*)

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium à 0 gr. 20 par litre ; en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules, et en capsules kératinisées pour la voie gastrique en flacons de 60 capsules.

Action thérapeutique. — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose considérable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

Indications. — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux. Les capsules servent à compléter et achever le traitement tout le temps nécessaire.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

LAROCAÏNE « ROCHE »

Composition. — Chlorhydrate de 1-p-amino-benzoyl-2, 2-diméthyl-3-diéthyl-aminopropanol.

Propriétés. — Anesthésique local non stupéfiant plus actif et moins toxique que la Cocaïne.

Avantages. — Ne détermine ni euphorie, ni accoutumance; n'appartient pas au Tableau B. — N'irrite pas les tissus et ne possède pas l'action mydriatique si souvent désagréable de la Cocaïne.

Indications. — Peut remplacer la Cocaïne dans toutes ses applications, surtout en Ophtalmologie, en Oto-rhino-laryngologie, en Stomatologie et en Urologie.

Posologie et modes d'emploi. — La solution de Larocaïne « Roche » se prépare facilement quel que soit son titre et peut être soumise sans inconvénient à la stérilisation ou à la tyndallisation. Il convient parfois de l'additionner de quelques gouttes d'une solution à 1 p. 1000 d'adrénaline.

Titres des solutions à utiliser : Anesthésie de surface : 5 à 10 p. 100 en badigeonnages (oto-rhino-laryngologie); 2 à 5 p. 100 en instillations (ophtalmologie); Anesthésie par infiltration : 0,5 à 1 p. 100 en injections.

La Larocaïne « Roche » peut encore remplacer la Cocaïne dans les formes pharmaceutiques les plus diverses : solutions, collyres, collutoires, pommades, suppositoires, potions, etc.

Tube de 1 gr. Flacons de 5 et 25 gr.

Produits

HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21. Place des Vosges, PARIS (III^e).

LAROSAN « ROCHE »

Caséine-Calcium

Spécifique de la Diarrhée infantile.

Avantages. — Alcalinisation du milieu intestinal. Suppression du petit lait. Apport minimum de sucre. Taux élevé de caséine.

Indications. — Diarrhées infantiles et troubles dyspeptiques des nourrissons (Diarrhées simple, lientérique, verte, infectieuse, cholériforme. Diarrhées de dentition et de sevrage. Athrepsie, etc.)

Diarrhées toxiques des enfants et des adultes. États dyspeptiques des adultes. Ulcère de l'estomac, etc.

Modes d'emploi et doses :

On prépare des mélanges : Eau bouillie, Lait, Larosan contenant 2 cuillerées à soupe et plus de Larosan « Roche » par litre. L'administration de ces mélanges et la conduite de la cure sont variables selon les cas.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS (III^e).

LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

Indications. — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène médecine générale.

Mode d'emploi. — Pansements, injections vaginales. Puissance antiseptique absolue (solution 3 p. 100).

Doses. — Suivant les indications.

Le litre : 10 fr. — Le demi-litre : 6 fr. 25.

Formes actives. — SAVON LAURÉNOL (antiseptie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

LAURENOL n° 2, désinfectant, sans odeur, ni mercure.

Savon Laurénol : 4 fr. — Savon dentifrice : 6 fr.

Ovules Laurénol : 12 fr. — Pommade : 10 fr.

Laurénol n° 2 :

Le litre : 6 fr. — Le demi-litre : 4 fr.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX°).

LAXADONAL

Composition. — A base d'oxyde de magnésium hydraté, forme dans l'estomac, en s'associant à l'acide chlorhydrique, un

Chlorure de magnésium

le plus physiologique, le plus naturel, le plus assimilable. Additionné de peroxyde de magnésium, de lactose et de Saccharure d'anis, il désinfecte le tube digestif et constitue une boisson laxative, cholagogue agréable, dépurative diurétique.

Indications. — Effets remarquables dans les engorgements du foie et de la vésicule biliaire, la constipation, les accidents arthritiques, migraines, rhumatismes chroniques, médication magnésienne, stimulant biologique, augmente les défenses de l'organisme contre les intoxications chroniques et l'envahissement des tumeurs.

Doses. — Dans la constipation : deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau, 2 à 3 fois par semaine, le soir au coucher. Augmenter les doses selon les cas.

Dans les engorgements du foie et de la vésicule biliaire migraines, accidents arthritiques, prophylaxie des tumeurs ; une cuillerée à café le soir, au coucher. 12 jours par mois.

Echantillons sur demande :

Laboratoire LOUINET, Pharmacien

39, rue de l'Arcade — PARIS. — Tél. : Central 60-77.

LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.

Poudre cristalline d'un goût très agréable.

Posologie :

Nourrissons : 1 cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

Enfants : 2 cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

Adultes : 3 ou 4 cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

Pastilles Miraton Châtel-Guyon. — Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Châtel-Guyon, stimulant idéal du peristaltisme intestinal, non irritant.

Dose. — 1 à 2 pastilles le soir au coucher.

Grains Miraton Châtel-Guyon. — Sels de la Source Miraton Châtel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques, Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

Dose. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Littérature, Echantillons :

Laboratoire R.-J. SOUDAN

Pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

LAXOCHOLÉINE TULIVET

Composition. — Extrait de fiel de bœuf, 0 gr. 20.

Forme. — Ovoïdes glutinisés.

Propriétés thérapeutiques. — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Ictères, Cholémie, Constipation, Entéro-colite.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 8 par jour avant les repas.

Laboratoires TULIVET

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

LAXOGÉLOSE TULIVET

Composition. — Agar-Agar et Extrait de Rhamnées.

Forme. — Cachets.

Propriétés thérapeutiques. — Action laxative. Agit mécaniquement par augmentation du bol fécal et massage intestinal. Sans action irritante sur la muqueuse intestinale.

Mode d'emploi. — Un cachet au début du repas. 1 à 3 par jour.

Laboratoires TULIVET

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

LAXOPEPTINE GIRARD

Laxatif pour Enfants.

Poudre à base de ferments de céréales, de citrate de soude et d'eupeptiques divers.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cuillerées à café dans du lait ou de l'eau bouillie, le matin au réveil ou le soir au coucher. Doubler la dose pour les enfants de 2 à 7 ans.

Propriétés thérapeutiques. — La Laxopeptine combat la constipation, régularise les fonctions digestives en assurant une bonne antiseptie intestinale.

Indications. — Gastro-entérites, ballonnement, gros ventre, vomissements, maladies aiguës, fébriles et toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Laboratoire A. GIRARD
48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

LÉCITHINE VACHERON

Granulé dosé à 0 gr. 10 de lécithine par cuillerée à café.

Propriétés thérapeutiques. — Elle accélère les échanges nutritifs, accroît les forces, augmente très rapidement le poids du corps et le nombre des globules rouges du sang, tonifie la cellule nerveuse.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, affections du cerveau et de la moelle ; Chlorose, diabète, rachitisme ; Convalescences longues et pénibles.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

LÉNICURE-VICHY

Médication préventive et curative des affections hépatiques et biliaires.

Ajouvant précieux de la cure de Vichy.

Composition. — Acides oléique et palmitique associés au combretum R.

Forme. — Capsules enrobées de gluten pour les soustraire à l'action dissolvante des sucs de l'estomac.

Propriétés thérapeutiques. — Le Lénicure-Vichy a une action dissolvante remarquable sur les calculs hépatiques. Il empêche la formation des boues biliaires en maintenant en dissolution la cholestérine, désagrége et permet l'élimination des calculs sans douleur, excite et fluidifie la sécrétion biliaire.

Indications. — Coliques hépatiques, Congestion douloureuse du foie et de la vésicule biliaire, Hépatite paludéenne, Cirrhoses, Constipation d'origine hépatique.

Posologie. — 1^o Action préventive des coliques hépatiques : 8 capsules par jour, 10 jours par mois.

2^o Action curative des coliques hépatiques, 12 capsules par jour.

3^o Congestion douloureuse du foie et autres cas, 6 à 8 capsules par jour, 10 jours par mois.

4^o Pendant la cure de Vichy : action adjuvante, de 4 à 8 capsules par jour.

L'action du LÉNICURE-VICHY peut être prolongée sans inconvénient.

Prix de vente au public : 17 fr.

Laboratoires DALET

94, bd des Batignolles — PARIS (XVII^e).

LÉNIFORME

Composition. — Huile à 2, 5 et 10 p. 100 d'Essences végétales antiseptiques.

Indications. — Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

Forme et mode d'emploi. — Se vend en flacons pour instillations et pulvérisations.

Est également présenté à 2, 5 et 10 p. 100 sous forme de **Rhino-Capsules** en gélatine pour auto-injections nasales.

L. E. V. A.

26, rue Pétrelle — PARIS (XI^e).

LEUCAGINE

Médication radioactive et bactéricide des infections utérines aiguës et chroniques.

Application. — Pansements utérins, 2 formes :

1° — **CRAYONS**

Présentation. — Crayons stérilisés à base d'organale d'argent et de bromure de radium, dosés à 1, 3, 5 et 10 micros.

Indications. — Métrites, Affections du col et du corps : 2 applications par semaine (Consulter la Notice).

N.-B. — Utiliser pour l'application l'appareil « *Porto-pansement* » spécial.

2° — **OVULES.**

Indications. — Tous les cas d'infections des voies génitales. Un ovule tous les jours.

Le crayon à 1 micro : 12 fr. ; à 3 micros 18 fr.

à 5 micros : 25 fr. ; à 10 micros : 35 fr

La boîte de 5 ovules : 30 fr.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. Q.

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

LEUCOSEPTYL

**Thérapeutique anti-infectieuse
rationnelle.**

Composition. — Le *Leucoseptyl* est un extrait leucocytaire total injectable de l'Institut biologique Mérieux de Lyon. Il est obtenu à l'aide des globules blancs de cheval éclatés par congélation. C'est une véritable préparation opothérapique spécifique, contenant les endo-ferments, les exo-ferments et le stroma leucocytaires.

Propriétés thérapeutiques. — Le *Leucoseptyl* stimule la leucopoièse, active la phagocytose, exalte les moyens de défense de l'organisme contre les infections, constitue la base biologique de toute thérapeutique anti-infectieuse.

Indications. — Toutes les infections aiguës ou chroniques, localisées ou généralisées, attribuables à des agents pathogènes identifiés ou méconnus.

Forme. — Le *Leucoseptyl* se présente en boîtes de 5 ampoules de 2 centimètres cubes.

Emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire. Ne jamais recourir à l'injection intraveineuse. L'injection n'est pas douloureuse et ne provoque pas de choc.

Le *Leucoseptyl* peut être employé seul ou en association avec la Vaccinothérapie, la Sérothérapie ou la Chimiothérapie.

Injecté en même temps que les vaccins, il en décuple l'action.

Doses. — *Adultes et enfants* de plus de 3 ans.

Infections aiguës : 1 à 3 ampoules par 24 heures.

Infections chroniques : 1 ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Enfants en bas âge ou nourrissons — 1 à 2 centimètres cubes par jour.

Littérature et échantillons sur demande.

Dépositaire exclusif :

Laboratoires de l'Opocalcium

A. RANSON, Docteur en pharmacie.

121, avenue Gambetta — PARIS.

Tél. : Ménilmontant 62-80, 62-81, 62-82.

LEVURE B-17

de H. BOULARD

Levure vivante, rigoureusement pure de ferments étrangers. Isotherme (vit et se développe à 37° C).
Livrée en boîtes de 6 ampoules de 3 cc. 5, contenant la levure en *milieu isotonique* où elle reste vivante plusieurs années.

Propriétés. — Elimine les ferments pathogènes de l'intestin par concurrence vitale, sans produire d'acidité notable.

Indications. — Diarrhée infantile, Diarrhée banale des adultes, Dysenterie amibienne ou bacillaire, Entérites, Furonculoses et Dermatoses, Colibacilloses intestinales et urinaires.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour dans un liquide sucré, froid ou tiède.

Laboratoire des Ultra-Levures

L. G. TORAUDE, O. ✱, O. I. ☼.

D^r de la Faculté de Pharmacie de Paris

Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine

Membre de la Société de Pharmacie de Paris

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

LEVURE DE BIÈRE ADRIAN

Pure et sélectionnée. Obtenue par un procédé spécial conservant à la cellule mycodermique, malgré la dessiccation, sa forme et sa vitalité premières.

Présentation. — Poudre, granulé : 3 gr. représentent environ 2 cuillerées de levure fraîche. Comprimés dragéifiés contenant 25 cgr. de levure de bière sèche. Cachets dosés à 25 cgr.

Action thérapeutique. — Traitement spécifique des affections à staphylocoques. Furonculose, psoriasis, lichen et toutes les maladies parasitaires de la peau. Renferme les ferments totaux, diastases, vitamines et l'ergostérine.

Posologie. — *Poudre et granulé* : 2 cuillerées à café par jour. *Cachets et comprimés* : 2 à 6 par jour.

ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

LEVURE FRAICHE MYCÉTA

Composition :

La *Levure fraîche Mycéta* est une levure pure fraîchement essorée, appartenant au type *Saccharomyces cerevisiae*, sélectionnée et active, sans aucune addition de matières étrangères.

Propriétés :

Par son action fermentaire, ses diastases et ses vitamines, la levure Mycéta régularise les fonctions digestives, entrave le développement des putréfactions intestinales, agit sur les troubles de la nutrition, désintoxique le sang et augmente la résistance de l'organisme aux infections microbiennes.

Indications :

Infections microbiennes, troubles digestifs et maladies de la nutrition, en particulier : états arthritiques, insuffisance hépatique, goutte, diabète, et maladies de peau (urticaires, furoncles, orgelets, etc.).

Mode d'emploi :

Une dose par jour, de 15 gr. environ, en une ou deux fois, une demi-heure au moins ou une heure avant les repas. La livraison est faite par le Laboratoire tous les deux jours.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e).

LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — Comprimés de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, en particulier les vitamines et les corps anti-infectieux, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme poisons vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les cas d'abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

LEVURO - MALTINE DÉJARDIN

Levure de bière fraîche, pure, sélectionnée, extrêmement riche en vitamines B anti-névritiques.

Indications. — Anthrax, Clous, Furonculose, Eruptions cutanées, Fermentations intestinales, Tuberculose pulmonaire.

Posologie. — Avant chaque repas une forte cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou d'extrait de Malt français DÉJARDIN.

Etablissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e)

LICHÉNOSE DUCLOY

Acide fumaro-*proto-cétrarique* pur.

Médicament de la nausée et des vomissements nauséeux.

Forme. — Tabloïdes de 1 cgr. dragéifiées.

Doses. — 3 à 6 par jour en moyenne. On peut doubler cette dose en cas de besoin.

Mode d'emploi. — A avaler avec une gorgée d'eau, 10 minutes avant les repas.

Indications. — *Toutes les nausées, mal d'auto, de chemin de fer, de bateau, d'avion, de théâtre, etc. Nausées d'origine psychique (émotions, dégoûts), d'origine auriculaire (vertiges), d'origine digestive, pharyngée, gastrique, duodénale, vésiculaire, colique, affections utérines, grossesse.*

Contre-indications. — Aucune. Médicament atoxique.

Laboratoires DUCLOY ET C^{ie}
ARQUES (Pas-de-Calais).

LIENTINE GRÉMY

Sels biliaires	0,10
Thyrénine.....	0,005
Extraits intestinaux.....	0,10
Evonymine.....	0,003
Extrait de cascara et bourdaine.	0,005
Bacterium coli.....	} ââ 150 millions.
Entérocoques	
Bacterium proteus.....	
Staphylocoques	

pour 1 pilule de 0,55.

Traitement de la constipation.

Constipation par atonie intestinale, par défaut de sécrétion intestinale ; entérocolite muco-membraneuse.

Agit à la fois sur la tonicité et sur la sécrétion de l'intestin.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

LIMOL CHURCHILL

(Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose).

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Préparation de *chaux* et de *phosphore* au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable. Recalcifiant idéal.

Indications. — Recalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement.

Mode d'emploi. — *Adultes* :

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

Enfants :

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indication du médecin traitant.

Exiger la signature du docteur Churchill.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix 15 francs.

Laboratoire CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (1^{er}).

LIMONADE GODFRIN

Limonade purgative concentrée
au *Citrate basique de Magnésie*

Avantages. — Seule limonade liquide au citrate de Magnésie, pouvant être conservée.

De saveur agréable, elle ne possède aucun arrière-goût médicamenteux et n'occasionne ni nausées, ni coliques.

Formes. — Flacon pour *adultes* de 100 cc. ; flacon pour *enfants* de 50 cc.

Mode d'emploi. — Vu sa concentration, elle ne doit pas être prescrite pure, mais étendue de une à deux fois son volume d'eau. A dose réduite (1 cuillerée à café ou à soupe, suivant le cas, dans un demi verre d'eau) elle constitue un parfait laxatif salin.

Prix au public : flacon pour adultes : 5 fr. 50 ;
flacon pour enfants : 3 fr. 50.

Laboratoires P. GODFRIN

5, avenue Watteau — NOGENT-SUR-MARNE
(Seine)

LINADÉLINE

POUDRE DU BON DOCTEUR

Composition. — Silicate de magnésie retamisé spécial. Stéarates secs de magnésie et de zinc.

Propriétés. — Spéciale pour la toilette des bébés.

Evite rougeurs et démangeaisons.

Indications. — Feux du rasoir, Gerçures, Hâle, Transpiration, Prurits.

Recommandée aux obèses, aux malades couchés, aux marcheurs.

Mode d'emploi. — En applications locales.

Présentation. — En boîte poudreuse.

La boîte : 5 fr. 50.

Laboratoires J. VARIOT

151 bis, Grande-Rue — VILLEMOMBLE.

O. C. P. — C. N. P.

LIN-TARIN

Graine de lin officinale (mucilage naturel).

préparée par les procédés de M. Tarin,

*Pharmacien de 1^{re} classe, ancien chef de Laboratoire
du professeur Trousseau.*

Phytothérapie de l'intestin.

Traitement intégral de la constipation.

Préparation. — C'est grâce à une sévère sélection dans le choix des graines spécialement cultivées, ainsi qu'au mode scientifique de criblage et de préparation, qu'est due l'efficacité réelle et reconnue depuis de longues années du Lin-Tarin.

Après criblage et dépoussiérage par les procédés mécaniques les plus techniques et les plus modernes, la graine est soumise à un traitement physico-chimique ayant pour but d'augmenter ses vertus mucilagineuses, carminatives, digestives, et d'y incorporer un parfum la rendant agréable à absorber.

Indications. — Le Lin-Tarin doit être prescrit dans tous les cas de constipation opiniâtre, d'atonie intestinale ou digestive, d'insuffisance de sécrétion biliaire, de difficultés d'évacuation rénale. Ses propriétés diurétiques le font recommander dans les maladies de la vessie : son emploi n'engendre jamais de douleurs.

Le Lin-Tarin est spécialement indiqué chez les futures mères et nourrices, dont l'état ne permet pas l'absorption de purgatifs ou laxatifs drastiques.

Le Lin-Tarin doit être ordonné à titre de régime pour l'entretien des voies digestives et intestinales. C'est un lubrifiant de premier ordre, son usage constant prévient l'obésité.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche matin et soir, dans un demi-verre d'eau naturelle ou de Contrexéville, ou de lait chaud. Laisser macérer l'eau et la graine le plus longtemps possible. Absorber ensuite l'eau et la graine *sans la mâcher*.

Laboratoires de PHYTOTHÉRAPIE

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 15-86

LIONCYL

Composition. — Caféine, quinquina, cannelle, cacao ; ions potassium, sodium, calcium, magnésium ; phosphates.

Indications. — Troubles de croissance, anémies, lymphatisme, neurasthénie, surmenage intellectuel, sénilité, convalescence des maladies aiguës, débilité due aux affections chroniques (tuberculose, maladies de coeur, entérites, ptose gastrique, diabète, paludisme).

Mode d'emploi. — 2 ou 3 cuillerées à café par jour, au début du premier déjeuner et du repas de midi.

Laboratoires Médico-Pharmaceutiques de France

6-8, rue Lacretelle — PARIS (XV^e).

LIPAUIROL

Solution huileuse de Campho-Dithio-Carbonate double d'Or et de Sodium.

Indications. — Tuberculose pulmonaire ; Tuberculose ganglionnaire suppurée ou non ; Tuberculose pleurale ; Tuberculoses cutanées diverses.

Mode d'emploi. — Faire chaque semaine 2 injections intra-musculaires de 1 ampoule de 1 ou 2 cc.

Durée du traitement. — 3, 4, 5 mois, selon les cas.

Présentation. — En boîtes de 3, de 6, ou de 12 ampoules de 1 ou de 2 cc. (1 cc. correspond à 3 cg. or métal).

Prix de vente au public :

La boîte de 3 ampoules de 1 cc	15 fr.
La boîte de 3 ampoules de 2 cc.	24 fr.
La boîte de 6 ampoules de 1 cc.	27 fr.
La boîte de 6 ampoules de 2 cc	45 fr.
La boîte de 12 ampoules de 1 cc.	50 fr.
La boîte de 12 ampoules de 2 cc	80 fr.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND.

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

LIPIODOL LAFAY

Huile iodée à 40 p. 100
contenant 540 milligrammes d'iode par cc.

Emplois en thérapeutique. — Générale : Toutes les indications de l'iode et des iodures sans iodisme.

Locale : Sciatiques, Lumbagos, Algies diverses, etc...

Emplois en radiologie. — Lipiodo-diagnostic de Sicard et Forestier. Exploration du système nerveux, des voies respiratoires, de l'appareil génital de l'homme et de la femme, des abcès, des fistules, etc.

Présentations. — Flacons de 20 cc, 22 fr. ; boîtes d'ampoules, 12 amp. de 1 cc., 23 fr. ; 8 amp. de 2 cc., 23 fr. ; 6 amp. de 3 cc, 25 fr. ; 4 amp. de 5 cc., 25 fr. ; 1 amp. de 10 cc., 11 fr. Flacons de capsules, 20 centigr. d'iode par capsule, 50 capsules, 20 fr. ; 25 capsules, 11 fr. Etais de comprimés chocolatés, 4 centigr. d'iode par comprimé, 50 comprimés, 12 fr.

André GUERBET et C^{ie}

22, rue du Landy — SAINT-OUEN (Seine).

LIPO-BISMUTH ERCE

Bismuth liposoluble indolore.

Constitution. — Campho-carbonate de Bismuth, rigoureusement pur, dissous dans de l'huile d'olives.

Présentation. — Ampoules de 1 et 2 cc., dosées à 4 cgr. de Bi métal par cc.

Avantages. — Le LIPO-BISMUTH-ERCE est le « juste milieu » entre les Bi hydrosolubles et les Bi insolubles.

Il a la *rapidité d'action* des premiers sans leur brutalité d'élimination et la tolérance des seconds permettant l'*imprégnation* de l'organisme sans leurs difficultés de résorption. Aucune réaction douloureuse locale, jamais de nodules indurés, ni de stomatites ; aucune réaction rénale. Possibilité de réaliser le *traitement d'attaque* de la syphilis.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes.

Posologie. — A. *Traitement d'attaque.*

Période primaire ou secondaire : chancres, plaques muqueuses, syphilitides, roséoles etc...

Deux injections par semaine. Trois séries de 10 piqûres (5 semaines) séparées d'un repos d'une durée égale à celle de la série.

B. *Traitement d'entretien.* Deux séries par an, pendant 4 à 5 ans.

Dans les cas où le médecin juge qu'il faut agir vite et énergiquement, la dose habituelle de 1 cc. (4 cgr. de Bi) peut être portée à 2 cc. (8 cgr. de Bi). Dans ce cas, surveiller les muqueuses et les reins.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE
37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de substance cérébrale.
mpoules de 2 cc. contenant 0 gr. 20 d'extrait.

Dragées dosées à 0 gr. 05 d'extrait.

Propriétés thérapeutiques. — Agit par ses phosphatides, lipoides et antitoxines. Contient 50 p. 100 de lécithines (soit 2 p. 100 de phosphore actif) et 25 p. 100 de cholestérine. Antitoxique, Sédatif, Anticonvulsivant, Tonique.

Indications. — *Etats dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.*

Dose. — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégr. : Chevrematte-90 Paris.

LIPODÉTERPÉNOL

Composition. — Le Lipodéterpénol est un composé d'huiles essentielles déterpénées, de camphre, de lipoides et d'huiles purifiées. Il est utilisé sous deux formes : en *pommade* et en *injections* sous-cutanées.

Propriétés. — Le Lipodéterpénol injectable possède une action à la fois antigénique, antihémolytique, antitoxique, leucogénétique et auto-protecteur de l'organisme.

Indications. — *Toutes les infections graves chroniques : larges phlegmons, septicémies, pleurésies purulentes, hématomes infectés, complications pulmonaires, etc., spécialement chez les malades manquant de réaction (37°5 à 38° de température). On obtiendra des résultats encore plus nets, notamment dans le traitement des affections graves et de l'ostéomyélite, en associant le traitement par la Thémaline au Lipodéterpénol. Il n'y a guère de contre-indications que dans l'hypercholestérinémie.*

Mode d'emploi. — Une *injection* sous-cutanée tous les deux jours dans la région du flanc ou de la cuisse. Frictions journalières de 10 minutes avec la *pommade*, alternativement sur la poitrine, le dos, l'abdomen, les reins et les membres.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV°).

LIPOÏDES ISCOVESCO

**Extraits éthéro-alcooliques imputrescibles
de tous les organes.**

Les Lipoïdes H. I. par eux-mêmes, ainsi que par les vitamines lipo-solubles qu'ils contiennent, représentent dans certains cas la totalité et dans d'autres la partie la plus importante des substances actives des organes dont ils proviennent.

Formes :

- 1° Pilules, dosées à 2 centig. de substance active.
- 2° Ampoules huileuses, de 1 cc. stérilisées à 110° pour injections hypodermiques, indolores. Elles sont titrées à 2 centig. de principes actifs.

Posologie :

6 à 9 pilules par jour ou une injection hypodermique.

Nomenclature :

Adrénol Cortex

(Partie corticale des glandes surrénales).

Adrénol total

(Glande surrénale totale) sans adrénaline.

Androcrinol (Testicule).

Cérébrocrinol (Cerveau).

Gynocrinol (Contient la folliculine).

Gynolutéol (Corps jaune).

Hépatocrinol (Foie).

Mammol (Mamelle).

Splénocrinol (Rate).

Afatyl (Thyroïde iodée).

etc., etc... Lipoïdes de tous les autres organes.

LIPOÏDES ASSOCIÉS

Andro-Polycrinol

(Testicule, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale).

Gyno-Polycrinol

(Gynocrinol, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale).

Gyno-Hypophysol

(Hormone ovarienne, Hormone hypophysaire associées).

Le tube de 60 pilules : 20 francs.

La boîte de 12 ampoules : 30 francs.

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Galvani 07-90.

Adresse télégraphique : Lipoïdes — PARIS, 54.

LIPOIODINE CIBA

Iode organique assimilable.

Diiodo-brassidate d'éthyle, 41 p. 100 d'iode. D'une élimination plus lente que les iodures de potassium et de sodium, la Lipiodine remplace avantageusement ces deux médicaments à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

Indications. — Celle de l'iode et des iodures : Artériosclérose, hypertension artérielle, Angine de poitrine. Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goitre, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. — *Enfants* : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Le tube de 20 comprimés : 14 francs.

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

LIPOSEPTINE

Antitoxine polyvalente du professeur Lemoine.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycètes. Possède les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

Indications. — Toutes les maladies infectieuses, principalement celles qui sont dues au streptocoque : fièvres éruptives : scarlatine, rougeole; oreillons, érysipèle, fièvre puerpérale, fièvre typhoïde, paralysie infantile aiguë, ostéomyélites, etc., etc.

Mode d'emploi. — Faire l'injection d'une ampoule sous la peau, chaque jour : matin et soir dans les cas graves. L'injection ne provoque ni choc ni réaction locale.

La Liposeptine se présente également sous la forme granules, pour ingestion par voie buccale. Complètent et renforcent l'action des injections. Dose moyenne : 4 pilules par jour.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE
2, place des Vosges — PARIS.

LIPOSPLÉNINE DU D^r GROG

Opothérapie splénique spécifique (Soula)

Références scientifiques propres à la Liposplénine du D^r Grog :

Communications à l'Académie de médecine :
18 janvier 1927 ; 18 juillet 1928.

Communications à la Société de biologie :
22 décembre 1928, 16 février 1929, 21 décembre 1929.

Communication au XX^e Congrès de médecine
de Montpellier, 18 octobre 1929.

Communication au II^e Congrès du Paludisme
(Alger, 19-21 mai 1930).

Communication à la Société de Thérapeu-
tique (Paris, 12 novembre 1930).

Communication à la Société d'Hématologie
(Paris, 3 février 1932).

Thèses : D^r E. Cauquil, *Rate et Rachitisme*
(1928) ; D^r Fau, *Action des Extraits*
Lipidiques d'organes (1928) ; D^r Radji,
Contribution au traitement des Anémies avec
splénomégalie (1929).

Composition. — 1^o Lipides insaponifiables
contenus dans la pulpe splénique, dont le
cholestérol, extraits par un procédé spé-
cialement établi par le P^r L.-C. Soula ;
2^o l'Insaponifiable X partiellement soluble.

Indications. — 1^o *Médication spécifique*
des :

- a. Anémies (quelles qu'en soient la cause et la nature, sauf les anémies de Biermer).
- b. Amaigrissements graves et persistants.
- c. Grossesses et retours de couches pénibles et difficiles.
- d. Retards de croissance, débilité infantile, tous états rachitiques, déminéralisations.

Surmenage, Convalescence, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Faiblesse et fatigue générale, tous états de déchéance organique.

2° *Puissant modificateur du terrain dans* : Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.

Présentations. — 1° *Comprimés* dosés à 3 centigr. de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement, 18 fr.) séparées par un repos de trois jours.

2° *Ampoules* de un cc. titrées à 2 centigr. de principes actifs.

Une injection *sous-cutanée, indolore*, tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection ; puis reprendre et continuer le traitement selon le rythme jusqu'à la guérison ou une amélioration nettement consolidée.

(La boîte de huit ampoules : 20 fr.)

3° *Sirop*, dosé à 8 cgr. de principes actifs, par cuillerée à café. *Spécialement réservé aux enfants*. Une à deux cuillerées à café par jour. *A prendre dans l'intervalle des repas*.

(Prix : 18 fr.)

**Approvisionnement
médical et littérature :**

40, rue d'Enghien — PARIS (X^e).

Tél. : Provence 37-13.

Vente en gros : **J. OLIVE, Ph^{ien}**

14, rue des Minimes — PARIS (III^e.)

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

A base d'acide phosphorique associé à la peptone de viande et aux principes volatils de l'orange amère et de l'orange douce.

Présentation. — Liqueur agréable contenant par cuillerée à café 25 cgr. d'acide phosphorique anhydre. Grand flacon, demi-flacon.

Action thérapeutique. — Liqueur préparée spécialement pour l'application de la médication de Joulie, créatrice d'énergie et de force musculaire. Spécifique de l'asthénie nerveuse.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 cuillerées à café par jour, aux repas. *Enfants* : demi-dose ou quart de dose suivant l'âge. Se prend diluée dans un peu d'eau sucrée.

ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

LISTOSE VICARIO

Huile de paraffine chimiquement pure.
Spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale.

(*La première en date en France*).

MANQUAT, Académie de Médecine, 27 janvier 1914,
(*Paris Médical*, 25 avril 1914).

VICARIO, Nouvel emploi pour usage interne, (*Journal de Pharm. et de Chim.*, 16 février 1914).

Laxatif mécanique, doux, inoffensif, non assimilable, non fermentescible.

La **LISTOSE** se présente sous deux formes :

LIQUIDE légèrement aromatisée).

GELÉE (consistante et sucrée).

Mode d'emploi. — Liquide : Une cuillerée à soupe matin et soir. — Gelée : Une cuillerée à café matin et soir.

Indications. — Constipation, Entérites, Colites, etc. Pendant la grossesse et après les opérations intestinales.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

LITA

(Séro-médicament du Dr DUFOUR.)

Composition. — Mélange de sérum de lapin ayant reçu des doses croissantes de tuberculine (1 partie) et d'iodaseptine (2 parties).

Présentation. — Se présente sous forme d'ampoules de 3 cc. qui peuvent être injectées par voie intramusculaire ou intraveineuse.

Mode d'emploi. Doses. — Deux injections par semaine d'une façon continue ou par séries de 20 injections. Ne pas arrêter le traitement après amélioration ; continuer jusqu'à guérison.

Les injections seront faites de préférence *intramusculaires profondes*. On peut associer l'action hémotherapique en prélevant 3 cc. de sang dans la veine du pli du coude que l'on mélange dans la seringue à 3 cc. de Lita. On injecte immédiatement le tout dans la masse musculaire.

Indications. — Toutes formes de Tuberculose à toutes les périodes. Pas de choc, pas d'intolérance, pas d'accidents (hémoptysies ou autres).

Laboratoires CORTIAL

15, boulevard Pasteur — PARIS.

LOBÉLIANE LALEUF

Composition. — Préparation exclusivement végétale à base de Lobélie, Valériane stabilisée, Aubépine, de goût et odeur agréables, dénuée de toxicité, exempte de toute addition de produits chimiques.

Propriétés et Indications thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, agissant sur le système neuro-végétatif.

Médicament de choix des affections spasmodiques névropathiques, névroses et insomnies.

La **Lobéliane Laleuf** est présentée sous deux formes : liquide et comprimés.

2 comprimés correspondent à 1 cuillerée à café de **Lobéliane** liquide.

Dose calmante : 2 à 3 cuillerées à café ; 4 à 6 comprimés par jour.

Dose hypnotique : 1 ou 2 cuillerées à café ; 2 ou 4 comprimés, après le repas du soir.

La **Lobéliane** se prend avec un peu d'eau ou mieux avec une infusion de tilleul.

Le flacon ou l'étui de 50 comprimés : 15 fr.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).

LOBÉLINE « SANDOZ »

Composition. — Chlorhydrate de lobéline pur. Alcaloïde principal de la lobélia inflata, totalement exempt d'alcaloïdes secondaires et d'impuretés toxiques.

Avantages. — Pureté chimique. Actions physiologique et thérapeutique toujours identiques. Solution stable dosée rigoureusement. Titre constant.

Indications. — Asphyxie bleue des nouveau-nés. Laryngite striduleuse. Broncho-pneumonie. Toutes asphyxies accidentelles et médico-chirurgicales.

Posologie et présentation. — Boîtes de 3 ampoules, dosage faible et dosage fort. 1 ampoule à la fois, à répéter si nécessaire.

Produits Sandoz

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e).

M. CARILLON, pharmacien de 1^{re} classe.

Dépôt général et vente :

Usine des Pharmaciens de France,
129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

LOBULINE

Insuline "per os".

Composition. — Extrait des îlots de Langerhans du pancréas associé à une levure glycolytique pure.

Forme. — Comprimés dragéifiés pour administration *par voie buccale*.

Indications. — Diabète.

Avantages. — Innocuité absolue. Simplicité d'emploi. Action très persistante.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour, suivant la glycosurie.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS.

LORAGA

Traitement rationnel de la constipation.

Emulsion stable et homogène, sans goût, sans arôme artificiel, *miscible à tous liquides* (lait, eau sucrée, infusions, potages).

Composition :

Huile de Paraffine neutre et de haute viscosité, Agar-Agar, Phénolphthaléine (45 mgr. par cuillerée à café).

Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalis.

Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications ; utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices ; constipations post-opératoires. Absence totale d'inconvénients.

Action Physiologique :

Lubrifie l'intestin, pénètre et ramollit le résidu alimentaire, active le péristaltisme sans provoquer l'irritation ou la constipation secondaire consécutive à l'usage des purgatifs usuels.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion — ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement. Aucune accoutumance.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : De 1 à 4 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir, au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué.

Deux modèles :

210 cc. : 17 fr. 50 — 420 cc. : 30 francs.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

Laboratoires SUBSTANTIA S. A.

F. Guillemoteau, pharmacien

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

LUDIN

Traitement Arséno-Mercuriel dissimulé.

Formes :

Sirop. — Granules.

Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop ou 3 granules contiennent 1 cgr. Hg. + 1 milligr. As.
Sans iodure, sans alcool.

Doses moyennes :

Sirop :

Adultes : de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Juniors : 2 à 4 cuillerées à dessert.

Enfants : par cuillerées à café.

Granules :

Adultes : 6 à 12 granules par jour.

Juniors : 4 à 8 granules par jour.

Enfants : 2 à 3 granules par jour.

Nota. — Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

Propriétés thérapeutiques :

Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc.). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

Indications thérapeutiques :

Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc.

Peut être prescrit aux enfants en bas âge en diluant le sirop dans eau ou sirop simple.

Prix : Granules, 15 francs. Sirop, 16 fr. 80.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les n^{os} 302-1 et 302-2.

Laboratoires REY — DIJON.

LUGOCALCION

Composition. — 1 cuillerée à soupe contient :

Chlorure de calcium.....	1,50
Adrénaline sol 1/1000	X gouttes.
Teinture belladone.	II —

Goût agréable.

Indications. — *Recalcifiant* (croissance, tuberculose, grossesse, allaitement, convalescence, etc...). *Hémostatique* (hémoptysies, gastrorragies, menstruations abondantes, toutes hémorragies, préventif des hémorragies post-opératoires). *Déchlorurant* (albuminurie, néphrite, pneumonies, etc...). *Antianaphylactique* (urticaire, éruptions digestives, rhume des foins, etc...). *Thérapeutique oculaire* (glaucome, rétinite, choroïdites, etc.).

Doses. — *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.
Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

LUSOFORME

Formol saponiné, liquide :

Lusoforme médical. — Antiseptique général de 1/4 à 1 p. 100.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 p. 100.

Le Lusoforme est un savon légèrement alcalin contenant 20 p. 100 de formol et fabriqué à l'autoclave.

Indications. — Gynécologie, Obstétrique, Hyperhydroses, Pansements d'urgence.

Prix de vente au public :

Lusoforme médical, flacons de 100, 250 et 500 gr., à 3 fr. 50, 7 fr. et 12 fr.

Lusoforme brut, bidons de 2, 5 et 10 kilos, à 10 fr., 9 fr. 50 et 9 fr. 25 le kilo.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

LUTÉOVAR

(Produit Foulon.)

Extrait total ovarien.

(Folliculine et corps jaune.)

Propriétés. — Synthèse biologique des principes actifs (Folliculine et Corps Jaune) de l'ovaire frais de génisse. Le LUTÉOVAR, par sa technique très spéciale de préparation, constitue non seulement la médication de choix des Insuffisances ovariennes, mais encore un Régulateur très sûr du flux menstruel.

Conserve sa fraîcheur initiale, donc son activité ; grâce à sa présentation, qui est :

Forme. — Comprimés lenticulaires dragéifiés, dosés à 0 gr. 20 d'extrait actif (Le noyau enrobé au sucre dur est mis complètement à l'abri de l'air).

Indications. — Insuffisances ovariennes et leurs conséquences :
Troubles congestifs de la Ménopause naturelle ou chirurgicale.
Accidents dus à la puberté : Chlorose et anémies des jeunes filles.
Troubles sexuels de la raison chez la femme.

Posologie (sauf indications spéciales du médecin traitant).

4 à 6 dragées par jour (par deux, aux trois repas).

Prix (très réduit) : 15 fr. le flacon de 60 dragées de 0 gr. 20.

Produits FOULON

Laboratoire du Lu téovar

14 bis, rue de la République — ERMONT (Seine-et-Oise).

LYSACRÈME L. M. L.

D'après les travaux des Docteurs Larget, Moreau et Lamare

Constitution. — Emulsion savonneuse stable d'antivirus lysats concentrés à 70 p. 100.

Avantages. — 1° Le savon de constitution spéciale permet une concentration considérable des antivirus, et facilite la pénétration de l'émulsion d'antivirus.

2° Souches microbiennes non repiquées et fraîchement prélevées.

3° Lyse par le B. Pyocyanique facilitant la concentration des antivirus.

4° Aucune réaction. Aucune contre-indication.

Indications. — Suppurations aiguës ou chroniques de la peau et des muqueuses : furoncles, orgelets, panaris, anthrax, ulcères variqueux, pyodermites. Engelures, brûlures, coups de soleil, eczéma, conjonctivites, blépharites. Plaies de toutes natures.

Mode d'emploi. — Deux à trois pansements par jour, avec massage doux et prolongé si possible. Recouvrir avec un taffetas. Dans les cavités : une mèche imbibée de LYSACREME L. M. L.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

LYSARTHROL

Complexe opochimiothérapique sous forme de granulé effervescent non sucré.

Dose et mode d'emploi. — 4 mesures par jour dans un demi-verre d'eau.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant puissant de la fonction rénale par les diastases tissulaires qu'il contient. Augmente rapidement le taux des urines.

Indications thérapeutiques. — Toutes les diathèses, toutes les maladies par ralentissement de la nutrition.

Obésité, Goutte, Gravelle, Lithiase biliaire, Migraines, Rhumatismes chroniques.

Laboratoires GOBEY

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

LYSAXINS L. M. L.

Constitution. — Trois constituants :

- 1° LYSATS PYOCYANIQUES.
- 2° CORPS MICROBIENS FORMOLÉS.
- 3° PEPTONES POLYVALENTES.

Avantages :

Trois avantages :

- 1° Lysats très *polyvalents* (souches extrêmement nombreuses et sélectionnées). Très *actifs* (souches non repiquées, PH spécialement étudié).
- 2° Vaccins microbiens très efficaces grâce à l'atténuation par la formaline (pouvoir fixateur remarquable, conservation de la sensibilité cellulaire aux agglutinines, du pouvoir antigénique des cultures, atténuation des toxines).
- 3° Adjonction du *choc peptonique* à volonté (le choc peptonique peut être supprimé par la Panphylase).

Indications :

- a) **LYSAXIN ANTIPYOGÈNE.** — Suppurations dues aux Pyogènes communs : furoncles, anthrax, érysipèles, otites, panaris, pleurésies purulentes.
Préventivement. — Avant toutes interventions, sur les membres en particulier, larges plaies infectées, fractures ouvertes, brûlures, etc...
- b) **LYSAXIN ABDOMINAL.** — Suppurations digestives : appendicites, cholécystites, pyélonéphrites, salpingites.
Préventivement. — Avant toutes interventions sur l'abdomen (intestin, appareil génital de la femme, appareil urinaire).
- c) **LYSAXIN ANTIGONOCOCCIQUE.** — Urétrites anciennes, orchites, prostatites, vaginites, métrites, arthrites, etc.

Posologie :

- 1° *Traitement curatif.* — Première injection : 1/2 cc. et augmenter ensuite jusqu'à 2 cc. Faire au minimum 3 injections de 2 cc.
- 2° *Traitement préventif.* — 4 injections de 1 cc. Espacer toujours les injections de 48 heures au minimum.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

MAGBROMYL

Soluté de Bromure de sodium pur, renforcé par le Chlorure de Magnésium tonique et stabilisateur du système nerveux.

Seule préparation de goût vraiment agréable masquant totalement la saveur désagréable des Bromures.

Avantages. — $MgCl^2$ augmente l'activité thérapeutique des Bromures tout en supprimant la dépression et la torpeur.

Emploi facile en médecine infantile.

Indications. — Toutes celles des Bromures.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour chacune prise dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucré ou non.

Dose variable.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 50 de Bromure de Sodium et 0 gr. 25 de $Mg Cl^2$.

Laboratoire DELISS

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

MAGIODYL

Soluté d'Iodure de Sodium cristallisé pur, renforcé par le Chlorure de Magnésium.

Seule préparation au goût vraiment agréable masquant totalement la saveur insupportable des iodures.

Avantages. — Le Chlorure de Magnésium augmente l'activité thérapeutique des iodures, supprime les accidents d'iodisme. Emploi facile en médecine infantile et chez les personnes délicates.

Indications. — Toutes celles des iodures.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures, chacune prise dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucrés ou non.

Dose variable.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 25 d'iodure de sodium et 0 gr. 25 de $Mg Cl^2$.

Laboratoire DELISS

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

MAGNECYTHINE

Agent spécial de la minéralisation cellulaire.

Le rapport du magnésium au calcium est particulièrement intéressant. Calcium minéral = charpente, et magnésium minéral = activité en entretien.

Quand le magnésium s'use et disparaît, la cellule vieillit. Et quand l'âge ou la fatigue arrivent, le magnésium et ses dérivés disparaissent. Il y a rapport de cause à effet dont on constate les résultats. La déficience magnésienne est souvent cause chez les affaiblis de l'inaction des toniques normaux : fer, manganèse, arsenic, etc...

La diminution progressive de la vitalité cellulaire en fonction du retrait magnésien, est acquise scientifiquement. La cellule morte cause la déchéance générale ou locale quel que soit le nom qu'on lui donne. Et on constate que le taux magnésien est excessivement bas. *Les chlorures seuls ne sont pas supportés sans inconvénients. Le Magnécythine à ce point de vue n'est comparable à aucun autre produit.*

Mode d'emploi et dose.

Comprimés : de 1 à 6 par jour, généralement, 2 dans un petit verre d'eau avant ou après les repas.

Granulés : 1, 2, ou 3 cuillerées par jour, croqués dissous dans de l'eau thé, tisane ou lait.

Laboratoire du Docteur TISSOT

24, boulevard de Clichy — PARIS.

MAGNELAX

Composition. — Emulsion de Magnésie et d'Huile de paraffine.

Indications. — Laxatif ne contenant aucun drastique, contre la constipation, les fermentations, les acidités.

Posologie (Doses moyennes) :

Adultes : 1 cuillerée à soupe par jour.

Enfants : 1 cuillerée à dessert par jour.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour dans le lait du biberon.

Prix : 15 fr. 50.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} classe

AIX-LES-BAINS.

MAGNÉSIE BISMURÉE

(Contre l'acidité stomacale).

Indications de la magnésie bismurée. — La magnésie bismurée donne d'excellents résultats dans la plupart des troubles digestifs. Elle peut être considérée comme le médicament-type de la douleur et de l'hyperacidité stomacale.

Elle sera donc particulièrement recommandée dans les affections suivantes :

DYSPEPSIE, GASTRITE AIGUE ET CHRONIQUE, GASTRITE ETHYLIQUE, DOULEURS ET SPASMES GASTRIQUES, HYPERCHLORHYDRIE, HYPERSECRETION, ULCERES DE L'ESTOMAC.

Forme. — Poudre, comprimés, cachets.

Posologie. — Une demi-cuillerée à café de poudre dans un peu d'eau chaude ou 3 à 4 comprimés ou 1 cachet, à prendre au moment des malaises ou des douleurs, mais en général il est préférable de la prendre immédiatement après les repas.

Littérature, Echantillons :

SCOTT et fils, Pharmaciens
348, rue Saint-Honoré — PARIS (1^{er}).

MAGNESIO-CACODYLINE JAMMES

Sérum cytophile, neurotonique et phagocytaire

Composition :

Chl. de magnésium.....	0 gr. 20
Cacodylate de soude atoxique.	0 gr. 30
Sérum physiologique.....	Q. s. p. 3 cc.
Injections intramusculaires absolument indolores.	

Réalise l'apport direct du magnésium au niveau de la cellule nerveuse sans léser la muqueuse intestinale.

Combine la reminéralisation magnésienne à une médication cacodylique intensive qui a fait ses preuves.

Injections intramusculaires quotidiennes.

Boîte de 10 ampoules. Prix marqué : 22 fr.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS

MAGNÉSIUM HARDY

Le seul chlorure de magnésium vraiment agréable.

Ses deux formes :

Sirop (14 jours traitement) : 16 fr.

Tablette-bouillon (20 jours traitement) : 18 fr.

Dose quotidienne. — 1 cuillerée à soupe de *sirop*
ou 1 *tablette-bouillon* contiennent 1 gr. 20
Mg Cl^2 pur, sec.

Posologie recommandée par M. le professeur Delbet.

Indications. — Asthénie nerveuse, Régulateur
hépatique, Dermatoses, Prurits, Verrues, Vieil-
lesse prématurée, Prostatisme. Soutien et pro-
longation des cancéreux inopérables. Défense des
cancéreux opérés.

Laboratoires PAUL HARDY

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e).

Tél. : Gobelins 36-96.

MAGNESO-TUBES ROBINET

Chlorure de magnésium (plus de 50 p. 100) associé à des acides phosphoriques organiques : glycér phosphates, anhydrooxyméthylène diphosphates de chaux et de magnésie, acide nucléinique.

Présentation. — 30 tubes d'une poudre où se trouve masqué le goût si désagréable du chlor. de magnésium.

Emploi. — Un tube deux fois par jour (aux repas), mélangé au café, au lait, au potage, à la boisson, aux purées, etc...

Posologie. — 15 jours tous les deux mois comme reminéralisant, reconstituant, préventif du cancer, etc... Presque sans arrêt, dans les cas de lésions précancéreuses, tumeurs déclarées, et après une intervention chirurgicale.

Indications. — Amélioration des troubles du système nerveux végétatif : nerfs sympathiques. — Régulateur du tonus vago-sympathique et du fonctionnement défectueux des glandes endocrines. — Troubles ovariens de la puberté et de la ménopause (Syndromes pluriglandulaires). — Séquelles post-opératoires. — Asthénie. — Fatigue générale. — Rhumatismes, constipations, prostatites, cholécystites, etc... — Affections de la peau : acné, psoriasis eczéma. — Lutte contre les tumeurs en général. — Prophylaxie du cancer. — Donne une sensation de grand bien-être.

Laboratoires ROBINET

MORET-SUR-LOING (S.-et-M.).

TERRAINS MAGNÉSIENS ET CANCER,
par L. Robinet (Présenté à l'Académie de Médecine par M. le Professeur P. Delbet (avril 1930) et conférence à l'Association française pour l'étude du Cancer (avril 1930).

MAGNÉSOVULES

Ovules au chlorure de magnésium
(0 gr. 25 par ovule) conservés suivant la

MÉTHODE SOLACTIVE

Méthode de *conception nouvelle* donnant des résultats remarquables, consistant à conserver les ovules dans un récipient de verre neutre contenant un liquide spécial.

Avantages. — Fusibilité parfaite. Activité décuplée. Asepsie. Conservation intégrale du pouvoir hygroscopique.

Indications. — Les inflammations aiguës ou chroniques de l'utérus et des annexes. Métrites, Salpingites, Ulcérations du col. Vaginites, Prurits vulvaires etc...

Mode d'emploi. — Retirer du flacon un Magnésovule en le piquant avec la petite fourche, et l'introduire dans le canal vaginal, le soir au coucher. Se garnir ensuite au moyen d'un tampon de coton et d'une serviette périodique.

Les Magnésovules s'appliquent tous les soirs ou tous les deux soirs. Dans les cas aigus, ils peuvent être employés plusieurs fois dans la journée.

Présentés de même façon, il existe des ovules à l'Ichtyol blanc véritable, dénommés Ovules à l'Albichtylol.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

MAGNÉTONE

Cholagogue léger.

Composition. — Sulfate de magnésie anhydre.
Extrait biliaire. Peptone.

Présentation. — Comprimés glutinisés.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés le matin à jeun. Boire aussitôt une tasse d'un liquide chaud (tisane, eau sucrée).

Agit comme cholagogue léger en provoquant le drainage de la vésicule.

Aide puissamment à l'action de l'Entéroxin avant lequel on doit le prendre à un quart d'heure de distance.

Voir page 953 **Selamon-Leclerc.**

Prix : 18 francs.

Etablissements T. LECLERC

D^r P. Lemeland, pharmacien.

10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

MAGOL CHURCHILL

(Hypophosphite de manganèse : 0 gr. 20 par dose.)

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Préparation assimilable de *phosphore* et de *manganèse*.
Métal-Ferment grand Catalyseur, Agent et Cause de toutes les oxydations qui régissent le Substratum vital.

Remplace avantageusement le Fer.

Indications. — Anémie, troubles de l'ovulation, croissance difficile, insuffisances hépatique et mitrale, diabète, chlorose.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans, par cuillerée à dessert. Au dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.
3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 15 francs.

Laboratoire CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (1^{er}).

MAGSALYL Mg.

Soluté de Salicylate de soude cristallisé pur, associé au chlorure de magnésium à dose catalytique.

Innocuité absolue, pas de dépression, empêche l'évolution des accidents cardiaques.

Seule préparation de goût vraiment agréable masquant totalement la saveur insupportable du salicylate de soude.

Possibilité de traitement prolongé. Activité intense.

Indications. — Toutes celles du Salicylate de Soude.

Mode d'emploi. — De 2 à 20 cuillerées à café en 24 heures par dose de 1 à 2 cuillerées prises dans 1/2 verre d'eau, d'eau de Vichy ou de lait tiède, sucré ou non.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 50 de *Salicylate de soude cristallisé*, 0 gr. 05 de Mg Cl².

Laboratoire DELISS

10, rue de la Mairie — IVRY-SUR-SEINE.

MALARSAN

Sel de quinine de l'acide acétyl-amino-oxyphénylarsinique.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement par voie buccale : du **Paludisme** (*Plasmodium vivax* et *Plasmodium malariae*) et des **Parasitoses intestinales** à protozoaires (diarrhées rebelles à amibes, spirilles ou lamblies).

Présentation. — Tube de 30 pilules vernies et inaltérables à 0 gr. 20 de sel actif.

Posologie. — 3 pilules par jour, pendant 10 jours. Activité remarquable, tolérance parfaite. Action sur l'état général.

Prix au public : 16 francs.

Laboratoires P. AUBRY

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 15-26.

Belgique et Congo :

Agence Pharmaceutique Française

51, rue Jean-Robie — BRUXELLES.

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid dans le vide. Aliment-ferment. Tonifiant. Digestif. Nervin. Minéralisateur. Renfermant la totalité des ferments et des substances de l'orge germé. Entièrement soluble dans l'eau.

Composition :

Humidité	2 000 p. 100.
Cendres.....	0,900 —
Matières albuminoïdes	3,325 —
Acidité ou acide phosphorique	0,500 —
Maltose	60,730 —
Saccharose	10,600 —
Dextrine.....	21,940 —

Mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café ou plus suivant le cas.

Indications alimentaires. — Dyspepsies, Entérites muco-membraneuses, Sevrage des nourrissons, Nourriture des enfants en croissance Augmentation de la sécrétion lactée chez les nourrices, Suralimentation des malades et convalescents.

Prix du flacon : 10 fr. 50.

Littérature et échantillons gratuits à MM. les docteurs pour leurs essais.

Dépôt général :

Brasserie FANTA

77, route d'Orléans — MONTROUGE (Paris).

Tél. : Vaug. 16-39. Alésia 00-13.

MALT BARLEY

Bière de santé, non alcoolisée, tonique, digestive, pasteurisée, phosphatée.

Dose et mode d'emploi. — Se consomme comme toute boisson ordinaire.

Indications. — Maladies de l'estomac et de l'intestin, Anémies, Convalescence, Maigreux, Rachitisme, Suralimentation des nourrices.

Prix, la bouteille : 2 fr.

Littérature et échantillons gratuits à MM. les docteurs pour leurs essais cliniques.

Dépôt général :

Brasserie FANTA

77, route d'Orléans — MONTROUGE.

Tél. : Vaugirard 16-39. Alésia 00-13.

MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Extrait de Malt sec, absolument pur.

Aliment-ferment vitaminé, pour tous les âges.

Indications. — Alimentation rationnelle (suralimentation et adjuvant des régimes). Saveur agréable.

Régulateur des fonctions digestives (entérites, entérococolites infantiles et des adultes).

Galactagogue efficace.

Préparation rapide des bouillies maltosées pour alimentation infantile.

Reconstituant général anticonstipant.

Mode d'emploi. — Se prend pure ou mélangée à toute boisson.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs le flacon (usage 15 jours).

MOSER et C^{ie}

8, chemin de Montbrillant — LYON (Monplaisir).

MALT FRANÇAIS DEJARDIN

(Extrait de)

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.

Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 3 fr. 30 verre compris.

Etablissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).

MALTOSAN

Soupe maltée en poudre.

Composition. — Maltose, 30 p. 100. Dextrines, 25 p. 100. Céréales, 40 p. 100. Sels minéraux, 2 p. 100. H²O, 3 p. 100. Diastases.

Indications. — Affections gastro-intestinales de la première et seconde enfance : diarrhée estivale, dyspepsies diverses, etc. Réussit dans les cas les plus rebelles. Rend aisé le sevrage et en évite les périls.

Doses. — 2 cuillerées à café par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 cuillerée nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer.

Retirer du feu au premier bouillon.

La boîte : 9 fr. 50.

Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

MALT PAILLETÉ

Composition. — Extrait de malt cristallin garanti pur. Reconstituant diastasique vitaminé.

Préparé par évaporation dans le vide des liqueurs extractives du malt. Renferme la totalité de la diastase, du malt du maltose des phosphates naturels, de la lécithine des peptones et des vitamines.

Propriétés. — Aliment très concentré de digestibilité parfaite.

Indications. — Convalescents Anémiés, Surmenés, Opérés, Dyspeptiques, Cardio-Rénaux, Hépatiques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour, soit tel quel, soit dans de l'eau ou dans une infusion.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à faire prendre de la même façon.

Prix : 16 francs la boîte de 300 grammes environ.

Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

MALT WANDER ou GLOMA

GLOMA PUR

(*Extrait de malt sec.*)

Composition. — Matières azotées 5,87 p. 100, Hydrates de Carbone (maltose et dextrine), 89,17 p. 100 ; Substances minérales, 1,56 p. 100 ; Eau, 3,40 p. 100 ; Acide phosphorique en pour cent des substances minérales, 9 p. 100. Diastases. Vitamines.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Aliment végétal nutritif et digestif. Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocolite chronique par insuffisance amyloïdique. Scorbut et maladies par avitaminose. Permet la préparation des bouillies maltées.

Le grand flacon : 15 fr. Le flacon : 10 fr.

PEPSO-GLOMA

Composition. — Pepsine, pancréatine extrait de malt diastasique.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Insuffisances digestives : digestions pénibles, dilatation et pesanteur de l'estomac ; accidents d'anaphylaxie alimentaire : eczéma, urticaire, prurit, etc. ; maladies de la dénutrition : amaigrissement, débilité ; convalescence.

Doses. — *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café ; *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe à la fin des principaux repas dissous dans de l'eau ou une infusion, ou délayé dans un peu de compote, de purée ou de bouillie.

Le flacon : 12 francs.

GLYCÉRO-GLOMA

(*Gloma aux glycérophosphates.*)

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 40 de Glycérophosphates combinés de chaux, de soude, de fer, de magnésie.

Indications. — Convalescence des maladies aiguës (grippes, bronchites, typhoïdes, etc.). Surmenage, déminéralisation, anémie, tuberculose. L'extrait de malt facilite la digestion et favorise l'assimilation des médicaments qui lui sont, ici, associés.

Doses. — *Enfants* : 1-3 cuill. à café 3-4 fois par jour.

Adultes : 1-3 cuill. à soupe 3-4 fois par jour.
Au début des repas pur ou dissous dans de l'eau ou du lait.

Le flacon : 10 francs.

CALCIO-GLOMA

(*Gloma au Phosphate de chaux.*)

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 15 de chlorhydrophosphate de chaux.

Indications. — Contribue par son phosphore à la nutrition du système nerveux, par sa chaux à celle des tissus osseux (rachitisme, scrofule, etc.). Permet la cure de récalcification dans la tuberculose. Utile aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Doses. — (Voir *Glycéro-Gloma.*)

Le flacon : 10 francs.

Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville

CHAMPIGNY (Seine).

MANCOBENE

Complexe opo-mangano-calcique associé à un catalyseur de premier plan, le *Carbonate de Cobalt*.

Composition. — Présenté sous forme de granulé dont 100 grammes contiennent :

Carbonate de cobalt.....	0,02	Chlorure de magnésium....	1,50
Nucléinate de manganèse..	0,20	Hypophosphite de chaux...	0,50
Méthylarsinate de soude...	0,20	Hypophosphite de soude...	0,50
Phosphate tricalcique.....	1,50	Surrénale.....	0,50
Glycérophosphate de Chaux.	4,50	Thymus.....	0,50

Propriétés thérapeutiques. — La présence d'extraits de glandes endocrines et d'un catalyseur, le carbonate de cobalt, favorise le métabolisme du calcium dans l'organisme. Récalfifiant et reminéralisateur de tout premier ordre.

Indications. — Asthénie, Croissance, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Lymphatisme, Prétuberculose, Tuberculose, Fractures, Carie dentaire, Grossesse, Allaitement.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants de 5 à 12 ans : 3 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Laboratoire du Docteur TAVERNIER

32, rue de l'Oues — PARIS Tél. : Ségur 08-13

MANGAÏNE

Polyoxyde de Manganèse
chimiquement pur.

Forme et Dose :

Tablettes 0,10 de Polyoxyde de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

Indications thérapeutiques :

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

Dose :

4 à 6 tablettes par jour.

Prix : 12 francs.

Pharmacie SCHMIT

71, rue Sainte-Anne — PARIS.

MANGANESIA

Solution permanganique arsenicale

Traitement du Diabète.

Propriétés thérapeutiques. — Le Manganésia diminue la soif, diminue la quantité des urines et celle du sucre qu'elles contiennent, favorise les échanges nutritifs, tonifie le système nerveux, rétablit les fonctions de la peau et rend au sang son alcalinité normale.

Dose et mode d'emploi. — XX gouttes au commencement de chaque repas dans du vin.

Continuer pendant trois semaines, se reposer une semaine, puis reprendre.

En cas d'intolérance, commencer par X gouttes par repas, puis augmenter progressivement.

On doit compter dans le diabète moyen sur un traitement d'environ 3 mois.

Les diabétiques qui font usage du Manganésia peuvent s'alimenter comme en état de santé.

Laboratoires des Produits DANNEC'H

BRUN et MARTINEAU

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e).

R. C. Seine 218.670.

MANGANO PHOSPHAL**Julien****(GOUTTES)****Sans aucun toxique.****Composition :****XX gouttes contiennent :**

Acide phosphorique offic. pur .	0 gr. 40
Magnésium et polyglycéroph	} 0 gr. 80
Sels de manganèse	

En solution sans alcool et sans sucre.**Propriétés et indications :**

Puissant reconstituant. Sans aucun toxique, convenant à tous.

Médication mangano-phosphorée intensive.

Enfants. — Manque d'appétit, Retards de la dentition et de la marche, Rachitisme, Insuffisance du poids et de la taille, Troubles de la nutrition.

Adultes. — Anémie, Faiblesse, Neurasthénie, Surmenage intellectuel et physique, Convalescences, Carie dentaire, Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Diabète.

Vieillards. — Dépression, Faiblesse, Troubles nerveux, Fatigue avec hypertension.

Posologie :

Enfants : II gouttes par jour, par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

Adultes : XX gouttes à chacun des repas de midi et du soir dans 1/2 verre de liquide.

Aucune contre-indication.**Prix : 15 francs. — Flacon gratuit sur demande.****Louis JULIEN**

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
105, rue de Rennes (angle de la rue d'Assas)
PARIS (VI^e).

MANGARSENIC

Composé organique d'Arsenic et de Manganèse,
Activité intense, Toxicité nulle.

Propriétés thérapeutiques. — Possède les propriétés classiques de l'ion As, complétées et exaltées par le catalyseur de choix qu'est l'ion Mn. Agit comme un catalyseur intense des réactions d'oxydation.

Indications. — Tous les états de dénutrition, Tuberculose à tous les degrés, Anorexies, Amaigrissements, Athrepsies, Hypotrophies, Diabète.

Posologie. — Deux comprimés midi et soir au début des repas (4 par jour).

Enfants : 1 comprimé midi et soir.

Echantillons :

Docteur LAVOUÉ — RENNES.

MANGRATINES

Composition. — Nucléinate de manganèse, Extrait splénique, Sérum de cheval.

Propriété. — Tonique. Cytoplasmique par excellence.

Indications. — Toutes dépressions, anémie, chlorose, troubles de la puberté et de la ménopause. Convalescences, rachitisme, paludisme.

Doses. — 2 à 4 dragées par jour 1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 16 francs l'étui de 40 dragées.

Laboratoire E. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

MARIMINE

Le Médicament des Enfants.

Forme. — Granulé irradié, à base de Vitamine D et de Parathyroïde.

Indications. — Insuffisances pluriglandulaires, affections ganglionnaires et osseuses. Rachitisme, Déformations osseuses. *Adénopathies trachéo-bronchiques*, anémies diverses de l'enfance. *Anorexie* de l'enfance et du nourrisson.

Formule. — Glycérophosphate chaux, fer et magnésie, Nucléinate manganèse. Persulfate de soude formiate de chaux. Hypophosphate chaux. Silicate de chaux. Surrénine. Parathyroïdes ergostérine irradiée.

Doses. — *Enfants* au-dessous de 3 ans : 1 cuillerée à café rase aux repas ou dans un des biberons.

Enfants au-dessus de 3 ans : 1 cuillerée à café aux deux repas.

La Marimine se prend dissoute dans l'eau ou croquée.

Littérature et échantillons :

Laboratoires HOCQUETTE

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

MARINOL

Reconstituant marin physiologique.

Inaltérable. De goût agréable.

Composition. — Eau de mer captée au large. Iodalgol (iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

Particularités. — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

Indications. — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculose. Anémie. Convalescences.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe. *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.

Littérature et échantillons

Laboratoires LA BIOMARINE

DIEPPE (Seine-Inférieure).

MARRUBENE

Principes actifs végétaux du Marrube et de l'Aunée en association synergique avec la Terpène et le Benzoate de soude.

Propriétés. — Possède la triple action : *luidifiante, Expectorante, Aseptisante*, sur produits d'expectoration. Facilite l'expectoration, calme la toux.

Indications. — Rhumes, Bronchites, Catarrhe des bronches, suites de Grippe, Dilatation des bronches, Tuberculose.

Mode d'emploi. — Le Marrubene se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulés et d'élixir. Prendre chaque jour en moyenne 4 cachets, ou 6 dragées, ou 4 cuillerées à café de granulés, ou 3 cuillerées à soupe d'élixir.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

MARRUBIASE

Extrait de plantes « incisives » et surtout de Marrube blanc.

Formes. — Dragées et sirop.

Propriétés. — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

Indications et Posologie. — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).

Inloxications, Dysenteries (selles nombreuses) : 2 cuillerées à soupe ou 4 dragées toutes les 2 heures.

Entérite chronique : Progressivement 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

Enregistré au laboratoire National de contrôle des Médicaments n^{os} 103-3 et 4.

Prix : 14 francs.

COMTE, Pharmacien,

60-62, rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER.

MARRUCOL

Composition. — Sulfogaïacolate de potasse, Marrube blanc, Glycérophosphate de chaux, Méthylarsinate de soude, Noix vomique pulvérisée.

Forme. — Cachets.

Indications. — Toux, rhumes, catarrhes, asthme, bronchites aiguës ou chroniques, grippe, pleurésies, pneumonies, tuberculose, anémies, rachitisme.

Mode d'emploi. — Un cachet matin, midi et soir, avant les repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).

MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay.

Indications. — Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression, ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

Composition. — Vin : Muscat de Samos et Maté. Prix : 20 fr.

Elixir : Crème de Cacao et Maté. Prix : 18 fr.

Granulé : Maté glycérophosphaté composé.

Prix : 12 fr.

Littérature et échantillons au Dépôt Général :

**PHARMACIE ANGLAISE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES**

62, avenue des Champs-Élysées Paris (VIII^e)

Téléph. : Elysées 22-52.

MÉGATHION OLIVIERO

Composé **Soufré** donnant lieu à la formation de produits analogues au **Philothion** et au **Glu-tathion**, ayant pour base le **Soufre**, l'**Hyposulfite de Magnésium** et la **Levure**.

Soufre très assimilable.

Utile au point de vue du métabolisme du soufre.

Indications majeures. — Toutes les *Dermatoses*.
Eczémas, Prurits, Acné.

Affections *laryngées, bronchiques, rhumatismales*.
Adjuvant très indiqué du mercure et de l'arsenic dans le traitement de la Syphilis.

1 à 2 cuillerées à café à délayer dans un peu de lait ou d'eau à prendre à 1 ou 2 repas.

Laboratoire de Biothérapie OLIVIERO

41, rue Denfert-Rochereau — PARIS (V^e).

MENACRINE

Antiseptique puissant, d'une diffusibilité extrême, s'attaquant à tous les microbes aérobies ou anaérobies. Modificateur heureux des sécrétions vaginales.

Indications. — Toutes affections gynécologiques.

Formes et composition :

Ovules : 1 cgr. de chlorométhylate neutre de diamino acridine par ovule.

Crayons : 5 mmgr. par crayon.

Solution : 10 cgr. par 100 gr.

MENACRINE colore en violet plus ou moins fluorescent, mais les taches s'enlèvent en les frottant avec des tampons imbibés d'alcool à 90°.

a boîte ou le flacon : 20 fr.

Laboratoire G. LESOURD

18, rue Ferdinand-Flocon — PARIS (XVIII^e).

MÉNATOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 363-2.

Forme. — Dragées.

Composition. — Poudre d'ovaires, Marron d'Inde, Genêt, Rhamnus, Viburnum Capsicum, Hydrastis, Hamamélis.

Propriétés pharmacodynamiques. — Vaso-constricteur utérin. Sédatif et hémostatique, Tonique et décongestif du réseau veineux.

Indications. — Troubles de la ménopause. — Règles douloureuses. — Régulateur des fonctions utéro-ovariennes.

Mode d'emploi. — Deux à six dragées par jour, au début des repas.

L'étui : 15 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

MÉNOSÉDINE

Extraits végétaux associés à calmants minéraux et substance protéidique tirée de l'ovaire. Sans toxicité.

Indications. — 1° Sédatif utérin. Calme les phénomènes douloureux et malaises qui accompagnent et précèdent les règles.

2° Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles espacées.

Deux formes : Comprimés. Liquide.

Comprimés. — 3 comprimés dès le début des malaises occasionnés par la menstruation avec une infusion chaude ou dans un peu de confiture. — 3 comprimés une demi-heure après, si besoin est.

Liquide. — Une cuillerée à bouche, une deuxième une demi-heure après, si la première n'a pas suffi (de préférence dans une infusion chaude).

Prix : 10 francs.

LABORATOIRES DEMASLES

à VIENNE (Isère).

MENSUOSEDYL

**Sédatif spécifique inoffensif
des Douleurs Menstruelles.**

Composition :

Un analgésique	Pyramidon.
Un diurétique	Théobromine.
Un antispasmodique	Extr. Valériane.
Un sédatif	Extr. Anémone.
Un tonique	Guaranine.

(Procédé spécial de conservation.)

Avantages. — 1° La suppression de la douleur et des troubles nerveux, quelle qu'en soit la cause, est presque instantanée; 2° La théobromine (physiologiquement contrôlée) décongestionne le rein, généralement hyperémié pendant cette période et pallie à l'inconvénient du pyramidon vis-à-vis de certains reins; 3° La fonction ovarienne n'est pas influencée autrement que par la sédation et la décongestion pelvienne; 3° La guaranine soutient heureusement le coeur et évite toute dépression possible par le pyramidon.

Indications. — Malaises menstruels et douleurs des suites de couches. Troubles nerveux de la vie génitale. Adjuvant à tout traitement de la dysménorrhée.

Pesologie. — 1 cachet dès l'apparition des douleurs. 3 cachets par 24 heures

(Aucune contre-indication).

Paul AUGIER, pharmacien.

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.
2-4, rue des Lombards — PARIS (IV°).

MESOFORME

BACTÉRICIDE PUISSANT

Désodorisant — Antiseptique — Désinfectant.
Non caustique, non irritant, non toxique.
(Ne tache pas le linge.)

Composition. — Solution saponifiée de thymol et de paraldéhyde, avec adjonction de sels alcalins supprimant toute causticité.

Indications. — *Gynécologie* : Hygiène de la femme. Leucorrhée, Métrite, Salpingite, *Accouchements*. — *Laryngologie* : Angines, Amygdalites, Abscess. — *Stomatologie* : Gingivites, Carie.

Mode d'emploi. — *Action prophylactique* : 1 cuillerée à dessert pour 2 litres d'eau bouillie, chaude. — *Accouchements* et *Gynécologie* : 1 ou 2 cuillerées à dessert pour 2 litres d'eau bouillie chaude. — *Laryngologie* : 2 cuillerées à dessert pour 1 litre d'eau bouillie chaude. — *Stomatologie* : XXX gouttes dans 1 verre d'eau.

Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS

MESOGASTRINE

Μησος (milieu). γαστρ (estomac).

Normalement, le chyme possède au moment de passer dans l'intestin une concentration moléculaire constante répondant au degré cryoscopique $\Delta = 0,38$.

La MESOGASTRINE en colution (1 cuill. à café de poudre dans une tasse à thé d'eau ou d'infusion non sucrée) possède ce même degré cryoscopique. Elle servira à diluer le contenu gastrique pour ramener à « un juste milieu » ses écarts de concentration moléculaire ; assurer l'évacuation normale et supprimer toute douleur liée à un trouble de cette évacuation.

Action. — Physique, sur la fonction musculaire.

Ne trouble en rien le chimisme gastrique.

(Évite les gastrites médicamenteuses secondaires.)

Indication. — Véritable traitement « omnibus » pour tous syndromes douloureux gastriques, qu'ils soient liés à un fonctionnement hyper ou hypo de l'estomac.

Composition. — Poudre composée soluble (Phosphate de soude + Citrate de soude + Lactose).

Mode d'emploi. — 1 cuill. à café dans une tasse à thé d'eau ou d'infusion non sucrée (1 tasse à thé = 120 cc. ou 8 cuill. à soupe d'eau).

Bien respecter ces proportions pour obtenir une solution à degré cryoscopique $\Delta = 0,38$.

Laboratoires du Dr BAREY

37, avenue J.-Coutant — IVRY-SUR-SEINE

MÉSOTHINE

Comprimés radioactifs à base de Bromure de Mésothorium, associé à la médication dyalitique du Professeur HAYEM (lithine-citrate de soude-hexaméthylène-tétramine.

Action. — 1° La MÉSOTHINE augmente la solubilité de l'Acide urique et de la Cholestérine.

2° Elle en ralentit la production en les détruisant en partie au moment de leur formation par activation des ferments uricolytiques (travaux de Sarvonat et Rebattu sur l'émanation du Radium).

Diathèse arthritique.

Indications. — Goutte, Rhumatisme, Sciatique, Hypertension, Maladies de la cinquantaine, Affections vésico-rénales et biliaires.

Laboratoires RHEMDA

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89.

MÉSOTHORIUM BUISSON

Solution de bromure de mésothorium pour injections intramusculaires, intraveineuses ou intratumorales.

1° Concentration A : dosée à 1/4 de micr. par cc. Injecter de 1 à 3 cc. par jour, pendant une ou deux semaines. Observer des intervalles de repos d'environ une semaine entre chaque série.

Indications. — Artériosclérose, états asthéniques et anémiques, prétuberculose.

2° Concentration B : dosée à un micr. par cc.

Indications. — Rhumatisme chronique, anémie. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une piqûre tous les jours ou tous les deux jours, intervalles de repos d'une semaine entre deux séries. Dans l'adénite tuberculeuse, une à deux injections intratumorales par semaine.

3° Concentration C : dosée à 2 micr. par cc.

Indications. — Rhumatisme chronique, rebelle et déformant, rhumatisme infectieux, rhumatisme blennorrhagique, sciatique, névrites, leucémie, cancers inopérables, tumeurs de la prostate et de la vessie. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une piqûre tous les jours ou tous les deux jours, intervalles de repos d'une semaine entre deux séries.

4° Concentration D : 2 micr. par cc. en ampoules de 5 cc.

Indications. — Tumeurs malignes, cancers de la vessie.
— Plus spécialement réservée aux instillations vésicales.

	Prix vente au public	Prix médical
Concentration A. Boîte de 6 amp. 1 cc.	16,50	11,15
— B. Boîte de 3 amp. 1 cc.	22 »	14,85
— C. Boîte de 6 amp. 1 cc.	55 »	37,15
— D. Boîte de 2 amp. 5 cc.	82,50	55,70

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).

MÉSOTHORIUM RHEMDA

Solution isotonique de Bromure de Mésothorium en ampoules.

Primesol. — 1/5 de micro par centimètre cube. Boîtes de 6 ampoules de 1 cc. Traitement prolongé des états morbides peu graves : arthritisme, convalescence des maladies infectieuses, lymphatisme. Traitement d'une douzaine de jours : 1 à 3 cc. par jour.

Bimesol. — 1 micro par centimètre cube. Boîtes de 3 ampoules de 1 cc. Angine de poitrine, artériosclérose, hypertension, manifestations goutteuses, rhumatisme. 1 à 3 cc. par jour pendant une douzaine de jours.

Trimesol. — 2 micros par centimètre cube. 2 ampoules de 5 cc. par boîtes. Utilisé pour effet rapide, infections de haute gravité. (Prompte amélioration de la formule sanguine), traitement palliatif et analgésique du cancer. 5 à 20 micros par jour pendant 8 jours.

Laboratoires RHEMDA

51, rue d'Alsace. — COURBEVOIE (Seine)

Tél. : Wagram 58-89.

MÉTACUPROL

Puissant antiseptique gynécologique et dermatologique. Ni caustique, ni irritant. Peut s'employer sans eau bouillie.

Propriétés. — Efficacité certaine dans toutes Streptococcies et Staphylococcies.

Indications. — *Gynécologie* : Leucorrhées, Métrites, Démangeaisons, Hygiène intime.

Dermatologie : Furonculose, Impétigo, Eczémas, Brûlures, Affections suintantes.

Forme. — Comprimés effervescents de 1 gramme.

Posologie. — *Gynécologie* : 1 à 2 comprimés par litre d'eau. Position couchée.

Dermatologie : 1 comprimé par litre d'eau.

Prix de vente au public : 10 francs.

Laboratoire du MÉTACUPROL

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e).

Téléph. : Auteuil 35-25.

MÉTAFORMINE

Formine spéciale, purifiée, à 0,50 par comprimé

Indications. — Reins, Vessie, Infections.

Posologie. — 2 à 5 comprimés dissous dans un verre d'eau.

Comprimés solubles. Prix : 14 fr.

Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu

PARIS (V^e).

Approvisionnement pharmaceutique :
O. C. P. PARIS

MÉTA-TITANE

Pommade introduisant le titane en thérapeutique.

Indications. — *Prurits, Erythèmes* : Eczémas, Intertrigo, Brûlures du 1^{er} degré, Coups de soleil, Engelures, Piqûres d'insectes, Erythèmes des nourrissons, Croûtes de lait, Gerçures des seins, etc.

Propriétés et Avantages. — Donne des résultats encore jamais atteints jusqu'ici par aucun autre topique (Cf. Thèse Delahaye, Prof. Nicolas, Tourneux, Juster etc.).

Aucune toxicité. — Antiseptique, Epidermisant, Antiprurigineux à action durable. *Absolument aucun similaire.*

Remarque. — Les sels de titane utilisés ne se trouvent pas dans le commerce. D'ailleurs, ils sont obtenus par un procédé tout particulier qui n'est pas encore publié. Ils sont *rigoureusement purs.*

Présentation :

Tube : 15 fr. — Tube d'essai : 7 fr.

**Laboratoires METADIER
TOURS.**

MÉTA-VACCIN

Vaccin en pommade aux antiviruses de Besredka.

Indications. — Toutes les suppurations : Plaies, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Abscès, Panaris, Pyodermes, Sycosis, Ulcères, Ecorchures, Brûlures, Orgelets, Blépharites, tous pansements après accouchement.

Avantages. — 1° Activité due à l'origine des souches, directement extraites de malades et jamais repiquées ; 2° Polyvalence extrême ; 3° Essai avant mise en vente, d'où garantie d'activité ; 4° Absorption parfaite ; 5° Commodité ; 6° Aucune réaction ; 7° Innocuité absolue.

Emploi :

1. *Immunisation locale* : Bien faire pénétrer par un léger massage, si possible ; sinon, mettre sur gaze, et faire pansement habituel. Renouveler deux ou trois par jour.
2. *Immunisation générale* : Dans les cas de furonculose générale ou de phlegmons avec lymphangite, il est recommandé de faire faire des frictions aux plis des aines et aux aisselles, et même d'introduire du Meta-Vaccin dans le rectum.

Présentation. — En tubes grand modèle : 18 fr., et en boîtes d'essai : 7 fr.

Laboratoires **MÉTADIER**
TOURS.

MÉTHYLARSINATES BOUTY

Tous les produits arsénicaux présentés par les **LABORATOIRES BOUTY** sont à base d'acide méthylarsinique remplaçant avantageusement, dans tous les cas, l'acide cacodylique.

Gaïarsol Bouty. (Méthylarsinate de Gaïacol.)	1° ampoules de 1 cc. renfermant 0,05 de sel.	Bronchites chroniques. Catarrhe. Tuberculose, pulmo- naire.
	2° solution renfermant 0,05 de sel par XX gouttes.	
	3° sirop renfermant 0,04 de sel par cuillerée à soupe.	
	4° dragées renfermant 0,02 de sel.	
Sérosthényl Bouty. (Méthylarsinate de strychnine glycérophosphaté.)	1° ampoules de 1 cc. renfermant 0,001 de méthylarsinate de strychnine et 0,10 de glycérophosph. de soude.	Convalescence. Surmenage. Fatigue nerveuse. Anémie. Asthénie.
	2° solution dosée par XX gouttes comme une ampoule.	

Laboratoires BOUTY, 3, rue de Dunkerque — PARIS
Téléphone : Nord 32-52, (2 lignes).

METOPHAN

Composition. — Acide carbolquinolique, ferments lactiques, Formine citratée.

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tique par l'acide carbolquinolique où le radical phényl si souvent nocif pour le rein a été neutralisé grâce à notre procédé spécial de préparation.

Eliminateur d'acide urique, diurétique par ses ferments lactiques, antipyrétique, analgésique puissant.

Aucune action nocive sur l'estomac, le cœur, les reins et le système nerveux.

Plus puissant que l'Atophan seul.

Indications. — Tous les cas de rhuma-tismes, goutte, lumbago, sciatique, névral-gies, etc...

Mode d'emploi :

1 à 6 cachets par 24 heures, avant les repas, *dans les cas aigus.*

1 à 2 cachets par jour, pendant 20 jours, *dans les cas chroniques.*

Doit être accompagné de boissons alcalines abondantes, à prendre aux repas.

M. HY, Pharmacien

61, avenue de Choisy — PARIS (XIII^e)

LA METRICINE

Formule. — Tanin, Borate de Soude, Acide Borique, Bicarbonate, Perborate, Coumarine, Vanilline, Musc. Essence de Lavande.

Indications. — Traitement de toutes les affections organiques de la femme. Métrites, Leucorrhées, etc.

Prix : 14 fr. 95.

Echantillon sur demande

Laboratoire R. LEBRETON

23, Grande Rue

ASNIERES (Seine).

MÉTRITOLS

Comprimés Gynécologiques effervescents, antiseptiques alcalins, astringents.

Composition. — Acide picrique, oxyquinoléine, oxycyanure de Hg, thymol, bicarbonate, amidon, formaldéhyde. Parfum agréable des essences de labiées alpestres associées à l'essence de cèdre.

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tiques, alcalins, astringents, les Métritols donnent des résultats certains dans les leucorrhées de toute nature et les vaginites.

Mode d'emploi. — Injections vaginales. Un comprimé dans un litre d'eau bouillie chaude 40° à 45°. Position couchée, bock très bas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire LEES

Dépôt : 127, Bd St-Michel — PARIS (V^e).

MIALBAÏNE

Solution d'ouabaïne Mialhe à 1/1000,
XXV à C gouttes par 24 heures.

Laboratoire du Docteur MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

MICROLYSE

Nouvel antiseptique de synthèse à pouvoir fortement bactéricide sur le

COLIBACILLE

et sur les autres microbes des voies **INTESTINALE**
et **GÉNITO-URINAIRE**.

Travaux du professeur Louis Gaucher
et de **G. Rollin**.

Action. — Eclaircit rapidement les urines; Tarit l'urétrite et arrête la pyurie; Calme la douleur; Remonte l'état général; Pas de toxicité ni d'action congestive.

Composition. — C'est le premier antiseptique conçu dans un but thérapeutique déterminé et étudié d'après les données de la pathogénie moderne.

Son efficacité rapide et constante est due à la synergie de ses deux facteurs α et β .

<p>α Chlorhydrate de Paracrésol-Pyridine imprègne l'organisme grâce à son élimination lente et progressive par le foie et l'intestin.</p>	<p>Action bactéricide sur le terrain entéro-hépatique.</p> <p>et sur l'ensemble des systèmes sanguin et lymphatique.</p>	<p>Syndrome entéro-rénal Heitz-Boyer.</p> <p>Syndrome entéro-hépatique. Chauffard Desgeorges.</p> <p>Etape sanguine du <i>colibacille</i> Legueu et Fisch.</p>
--	--	--

<p>β Chlorhydrate de Phénol Pyridine. Passe rapidement dans le courant circulatoire et se libère par les voies urinaires.</p>	<p>Action bactéricide et sédative sur l'arbre urinaire, action élective sur le Gonocoque.</p>	<p>Chimiothérapie anti-colibacillaire et anti-gonococcique par voie buccale ou sanguine. Duhot-Erlich.</p>
---	---	--

Indications :

COLIBACILLOSES et autres infections des voies *intestinales* et biliaires. Entéro-colites. Cholécystes. Lithiases.

PYÉLONÉPHRITES, CYSTITES et infections *urinaires* en général.

GONOCOCCIES. Urétrites, Métrites, Salpingites.

Mode d'emploi. — Trois formes.

Comprimés : 2 à 3 par jour pendant les repas.

Ampoules : pour lavages uréthro-vésicaux ou pyéliqués à 4/1 000.

Ampoules : pour injections intra-veineuses.

Prix : 18 fr.

Pour 10 jours de traitement.

Laboratoires de Biologie médicale
10, rue de Strasbourg — PARIS (X^e).

MICTASOL

DÉCONGESTIF PELVIEN

Composition.

Comprimés : Bromure de Camphre 0,02, Formine 0,05, Noix de Malva purpurea 0,25.

Suppositoires : Stovaïne 0,01, Ext. de Jusquiame 0,05, Ichtyol 0,25, Malva purpurea 0,50.

Propriétés thérapeutiques.

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Innocuité absolue. Sans contre-indication.

Indications thérapeutiques.

Prostatisme vasculaire. Rétention. Incontinence, Cystites, Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Métrites, Salpingites. Vaginites. Hémorroïdes.

Mode d'emploi.

Comprimés : 6 à 10 comprimés par jour, matin, midi, soir, avec un peu d'eau

Suppositoires : 1 ou 2 par jour

Comprimés : 14 fr. — Suppositoires : 15 fr.

Laboratoires du MICTASOL

COUDERC, Pharmacien de 1^{re} classe,
28 et 30, rue du Four — PARIS (VI^e).

Téléphone : Littré 17-42.

MICTOPHILE RICHER

Antiseptique. — Diurétique. — Analgésique.

Comprimés glutinisés au bleu de Méthylène.

Composition :

Bleu de méthylène	0,02
Lactose	0,28
Extrait de belladone	0,003
— de mauve	0,05

pour 1 comprimé glutinisé.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et vésical. Cystites aiguës ou chroniques, Pyérites, Pyélonéphrites, Blennorragies, Prostatites, Colibacillurie.

Mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour (de préférence avant les repas). Avaler sans croquer avec un peu d'eau.

Le flacon de 40 comprimés. Prix : 15 fr.

Laboratoire RICHER

7, avenue Marceau — PARIS.

MICTOSEPTOL

(Antiseptique urinaire liquide).

Composition. — Synthèse nouvelle diurétique, antiseptique et balsamique de benzoate d'Hexaméthylène-tétramine et d'*Arbutine* dans un excipient légèrement stomachique.

Indications. — Toutes les affections et infections urinaires : Lithiases, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites, Blennorragie à toutes ses périodes ; maladies infectieuses : Grippe, Rougeole, Scarlatine.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau ou de tisane avant ou entre les repas.

Doses. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour ;

Enfants : par demi-cuillerée à café

Prix : 15 francs.

Laboratoires B. C. L.

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.

MICTUALINE

Antiseptique, Sédatif, Décongestif.

Composition :

Collargol à 80 p. 100 Ag. pur.....	0 gr. 02
Urotropine recristallisée.....	0 gr. 10
Bleu de méthylène pur.....	0 gr. 01
Bromure de camphre.....	0 gr. 02
Extrs. d'Uva-ursi et seneçon, q. s. p. 1 pil.	
1/2 molle enrobée de.....	0 gr. 50

Indications. — 1° *Maladies des voies urinaires* (Urétrites Cystites, Pyélonéphrites, Prostatites, Hypertrophie de la Prostate, etc...

2° *Maladies des voies génitales* des deux sexes.

3° *Maladies intestinales* dans leurs rapports avec le Tractus Génito-Urinaire (Syndrome Entéro-Rénal, colibacilloses), etc...

Posologie. — 6 à 9 dragées par jour avec un peu de liquide.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE.

MINERGIL

Médication minérale sous forme organique assimilable.

Propriétés. — Apporte tous les éléments minéraux indispensables à la constitution des tissus comme au bon fonctionnement de l'organisme. Donne toutes les vitamines qui, directement ou indirectement, sont ou peuvent être intéressées à l'utilisation des matières minérales.

Indications. — Tous les cas de menace de déminéralisation de l'organisme (grossesse, lactation, tuberculose, diabète). Croissance, convalescence, anémie. Rachitisme, dépression nerveuse, etc.

Conditions d'emploi. — Avant chaque repas, matin, midi et soir : *Enfants* : 1 comprimé. *Adultes* : 2 comprimés. Ces doses pourront être augmentées suivant avis du médecin. Elles seront doublées et triplées dans les cas de rachitisme.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

Laboratoires PROGIL

77, Rue de Miromesnil — PARIS (VIII°).

MIROXYL

FORME SIROP

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, Expectorant d'action antiphlogistique certaine. Phagocytogène. Puissant modificateur de toutes les bronchites aiguës ou chroniques.

Propriétés actives. — Action synergique du Méthylarsinate de Codéine et du Sulfogaïacolate de Potasse.

Une cuillerée à bouche contient :

Méthylarsinate de codéine.....	0 gr. 024
Sulfogaïacolate de potasse	0 gr. 60
Iodhydrate de codéine.....	0 gr. 0048
Cinnamate de soude.....	0 gr. 0163
Préparation agréable au goût, pas d'intolérance, pas de constipation.	

Posologie. — *Affections aiguës* : 3 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures éloignées des repas.

Affections chroniques : 1 cuillerée à soupe matin et soir.

Indications thérapeutiques. — Toutes affections des bronches. Bronchites sous toutes ses formes, Tuberculose, Toux rebelles et émetisantes, Grippe, Asthme, Emphysème.

Prix : 15 fr.

FORME GOUTTES

Composition. — Méthylarsinate de Codéine associé à l'éther de Kay et au Chlorhydrate d'Ephédrine. Action renforcée par l'adjonction de teinture de serpolet, thym, gélsemium, grindelia, drosera ; ballote, aconit et belladone.

Indications thérapeutiques. — Toux spasmodique et quinteuse en général. Coqueluche, Grippe, Toux rebelles et nerveuses, Asthme, Toux émetisante, Toux laryngée, Médication symptomatique de l'adénopathie, Trachéo-Bronchique.

Mode d'emploi. — A absorber loin des repas dans un liquide tiède, sucré de préférence. Tisane béchique, eau, grog ou lait.

Doses moyennes par jour, en 4 fois. — *Adultes* : CCXL gouttes.

Enfants : XII gouttes par année d'âge à partir de deux ans.

Dans les Coqueluches, doses fractionnées et croissantes.

Doses initiales. — *Adultes* : CXX gouttes.

Enfants : VIII gouttes par année d'âge à partir de deux ans.

A prendre en 3 à 4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

En cas de somnolence accentuée, interrompre le traitement pendant 24 heures.

Prix : 15 fr.

Laboratoires TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS.

Tél. : Ségur : 08-13.

Pour la BELGIQUE : HERMAN Labor. S. A.

19, rue des Cultivateurs — BRUXELLES.

MITIGANS

(Phénacéthéïnopyrazolone)

Analgésique puissant, anti-rhumatismal. Les propriétés thérapeutiques du Mitigan en font un spécifique de l'élément douleur.

Médication aussi inoffensive qu'efficace. Aucune intolérance.

Indications. — Toutes les algies, névralgies, migraines, rhumatismes, etc.

Doses. — 1 à 4 cachets par jour.

Laboratoires Médico-Pharmaceutiques de France.

6-8, rue Lacretelle — PARIS (XV^e)

MOLENE

Indications. — Tuberculose pulmonaire à toutes périodes (action d'autant plus rapide que le traitement est appliqué à une période plus précoce de l'infection tuberculeuse); adénites tuberculeuses évolutives, à tendance suppurative; tuberculose pleurale; tuberculoses cutanées diverses.

Contre-indication. — Néphrite avec albuminurie abondante.

Mode d'emploi. — Voie intraveineuse ou voie intramusculaire. La dose moyenne est d'une injection d'une ampoule de 1 cc. tous les 2 ou 3 jours; chez les grands fébricitants, espacer les injections de 4 ou même 5 jours; dans les lésions torpides, injecter de 1 à 5 cc. tous les 3 jours.

Présentation. — En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (1 centimètre cube correspond à 0,05 centigrammes d'anhydride Molybdique pur).

Prix de vente au public : 25 fr. la boîte de 12 ampoules.

Laboratoire LECOQ et FERRAND

14, rue Gravel — LEVALLOIS-PERRET (Seine

MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Ethyle : solution huileuse à 25 p. 100
(Ampoules de 2 cc.)

Traitement de la tuberculose pulmonaire.

Indications. — L'action du Moréthyl se fait sentir sur toutes les formes de la tuberculose pulmonaire, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique en même temps qu'il diminue l'expectoration bacillaire et fait, dans certains cas, rétrocéder les lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent, par contre, nullement influencées.

Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

Posologie. — 20 injections quotidiennes successives par voie sous-cutanée ou intra-musculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

MORISLAND IRRADIÉ

(Granulé lipoïdique, Ergostérine Vitamine D.)

Composition. — Ergostérine irradiée, Lipoïde de Foie de Morue, Iode, Tanin, Lécithine, Cholestérine, Glycogène, Acide nucléinique, Distéaro-glycérophosphate de Choline.

Indications. — Engorgements ganglionnaires, tous états de Faiblesse générale, Rachitisme, Bacillose.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr.

Echantillons sur demande.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo-arsénée (entièrement assimilable).

Forme. — Sirop (saveur agréable sans action nocive, ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

Compos. — Iode physiologique stable et inaltérable ; fer organique d'origine protéique, entièrement assimilable ; sel sodique de l'acide phospho-glycérique ; méthylarsinate disodique, rhamnus frangula.

Action physiol. — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses ; modificateur vaso-moteur ; excitant des organes hématopoiétiques ; reminéralisateur puissant ; tonique général ; excitant de la nutrition.

Indicat. — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo), Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

Posologie. — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour ; de 5 à 10 ans, 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour. (Avant les repas dans un peu d'eau).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous le n° 586-10.

Echantillons et littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ
Avenue Parmentier — PARIS (XI^e).
Téléphone : Roquette 14-12.

MORRHUÉTINE JUNGKEN et MORRHUÉTINE JUNGKEN VITAMINÉE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Forme et Composition. — Liqueur à base de glycérine pure contenant : Iode métallique, 15 mgr. Hypophosphites composés (Nao, Cao, Manganèse), en tout 15 cgr. par cuillerée à soupe. Phosphate de soude : 15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

La Morrhuéline Jungken Vitaminée est le même produit avec, en plus, toutes les Vitamines d'huile de foie de morue.

Propriétés. — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

Indications. — Anémie, Lymphatisme, Tuberculose, Convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

Doses et Mode d'emploi. — *Enfants* : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes* : 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau ou au début des principaux repas.

BRACQUEMOND et C^{ie}

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

R. C. Paris 207-767 B.

MORRHUOL

Composition. — Principes actifs de l'huile de foie de morue isolés de la matière grasse.

Chaque capsule correspond à 5 grammes d'huile de foie de morue dont le Morrhuol supprime le goût désagréable et la mauvaise digestibilité.

Indications. — Lymphatisme, débilité, scrofule, rachitisme, affections chroniques de l'appareil respiratoire sous toutes leurs formes.

Action. — Reprise rapide de l'appétit et des forces, augmentation du poids, diminution de l'expectoration et de la toux.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 8 capsules par jour, à prendre au début des 2 principaux repas.
— *Enfants* : 2 à 4 capsules par jour.

LABORATOIRE

DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE

D^r PH. CHAPELLE. 8, rue Vivienne — PARIS.

MORRHUXINE

Composition. — Iode organique. — Brome. — Glycérophosphates alcalins et arrhénal à raison de un demi-centigr. par cuillerée à soupe. — Véhicule glyciné et sirop de fruits très agréable au goût et très assimilable.

Propriété. — Apéritif tonique, reconstituant antilymphatique.

Indications. — Succédané de l'huile de foie de morue ; est indispensable dans tous les cas où l'huile de foie de morue n'est pas tolérée par le malade.

Doses. — *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café par jour.
Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

La bouteille pour 12 jours de traitement : 12 francs.

E. VERGELOT, Pharmacien,

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

Tél. : Nord 48-22.

MORUBIASE

Extrait hépatique total de morue irradié et sans corps gras.

Principes actifs :

Lipophosphatides, acide morrhuique, vitamines.

Formes :

Pilules et granulé. Une pilule ou une cuiller à café de granulé contient les principes actifs de 30 gr. d'huile de foie de morue.

Avantages :

Petit volume, aucun goût, parfaite digestibilité, sans corps gras, se prend l'été comme l'hiver.

Indications :

Celles de l'huile de foie de morue : Anémie, Lymphatisme, Rachitisme, Affections chroniques des voies respiratoires.

Posologie :

Adultes : 6 à 8 pilules, par jour au début ou à la fin des repas.

Enfants : 2 à 6 cuillers à café suivant l'âge.

Arrhéno-Morubiase : Synergie thérapeutique : extrait hépatique et méthylarsinate disodique (0,005 mgr. par pilule).

Gaiaco-Morubiase : Extrait hépatique et 0,05 carbocinamate de gaiacol par pilule.

Laboratoires MEYNET-CROSNIEF

6, rue Chanoinesse — PARIS.

MORUXASE

Deux formules :

1° **Gouttes de Moruxase** concentrée : 15 fr.

XX gouttes renfermeront :

Triodure d'arsenic .. 5 centigr.		Extrait iodotannique 50 centigr.
— de manganèse 5 —		Glycérine 50 —

Doses. {	2 à 7 ans	XX gouttes	} deux fois par jour.
	7 à 15 ans	XL —	
	Adultes.....	L —	

2° **Moruxase**, sirop : 12 fr.

1 cuillerée à soupe renferme :

Triodure {	de fer.....	5 centigr.
	d'arsenic	5 —
	de manganèse	5 —
Extrait iodotannique.....	50	—
Lactophosphate de chaux	40	—
Sirop au suc naturel de groseilles.....	20	grammes.

Doses. { 2 à 7 ans..... 1 à 2 cuill. à café } deux fois
 { 7 à 15 ans et adultes..... 1 à 2 cuill. à soupe } par jour.

Indications. — Carence physiologique, Anémie, Lymphatisme, Troubles de croissance, Inflammations ganglionnaires.

Action catalytique puissante du manganèse. Le sirop fait à froid contient intactes les vitamines du suc de groseilles.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, Place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE (Hte-Garonne).

MUCICARBOS

Composition. — **Charbon animal chimiquement pur** (Carbos), **associé à un mucilage pur** pour éviter la constipation.

Forme. — Granulé rond : **Mucicarbos simple** ; **Mucicarbos benzo-naphtolé**.

Indications. — Diarrhées avec hypersécrétion avec lésions ou avec infection de la muqueuse, Entérites, Entérocolites, Diarrhées des tuberculeux, Dyspepsies gastro-intestinales avec constipation et flatulences, Colites avec fermentations, Colites avec putréfactions.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

MUCILAXINE

Composition. — **Huile de Paraffine** de haute viscosité et neutre, **associée à un mucilage pur sans cellulose** (*action purement mécanique sans aucune addition de produit laxatif*).
Suppression du suintement.

Forme. — *Crème-émulsion* facile et agréable à prendre.

Indications. — Rééducation et pansement de l'intestin. Constipation. Colite. Entérocolite muco-membraneuse. Constipation des opérés, des accouchées, des enfants, des nourrissons, etc.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à soupe, à dessert ou à café par jour, suivant l'âge et **au début des repas**.

Prix : 14 francs.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

MUCINUM (Comprimés de)

Composition. — Association de nombreux produits végétaux ou organiques (à l'exclusion de tout drastique), dont chacun à la dose utilisée serait sans action, mais dont l'ensemble réalise une véritable synergie laxative.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

Forme. — Petits comprimés très friables, sans saveur, pouvant être croqués ou avalés.

Posologie. — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

Laboratoires CHANTEREAU
26 bis, rue Dombasle — PARIS.

MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Composition. — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

Propriétés. — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, Rhinites, Rhume des foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale, Gargarismes, Bains de bouche, Irrigation.

Le flacon : 8 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-1.

Laboratoires CAILLAUD
37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).
Téléphone : Invalides 12-63.

MURONES DU D^r ROBERT JACQUES

1^o **MURONE** aérogène. — Redressement fonctionnel du poumon par activation des échanges respiratoires et oxydation.

Indications. — S'adresse aux anémiés, aux troubles de la croissance, et à tous les *menacés* de tuberculose.

Composition. — Essences oxydées et essence phénol en proportion juste : ampoule n^o 1, et essence diffusible : ampoule n^o 2, contenues dans la même boîte.

Mode d'emploi. — Injecter quotidiennement en alternant ampoule 1 et ampoule 2 pendant 24 jours, repos 6 jours. Traitement : trois mois.

2^o **MURONES A. B. C.** — Oxygénation et oxydations intratissulaires par oxydoréduction.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, osseuse, laryngée, suppurations pulmonaires, bronchites fétides.

Composition. — Murone A : essences oxydantes à doses plus actives ; Murone B : balsamique très diffusible ; Murone C : doué de grande activité infertilisante, ne doit être employé qu'après amélioration des signes généraux et fonctionnels.

Mode d'emploi. — Alternier les injections chaque jour, au début dans l'ordre A. B. B. A. B. B., puis A. B. A. B. A. B., puis A. B. C., B. A. B. C.

Voir notices et formules dans chaque boîte. — Prix en France : 15 fr.

Fabrique par les laboratoires **AUG. LUMIERE.**

Dépôt et vente :

Etablissements **SILBERT** et **RIPERT**

30, rue Bénédict — MARSEILLE

MUSCULOSINE BYLA

Suc de Viande crue hyperactivé par les oxydases et la catalase du sang et les vitamines musculaires.

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire, Toni-nutritif, Excitant physiologique.

Indications. — Convalescence, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours froide ou tiède, gazeuse ou non.

Voir page 1204.

ZOMO-MUSCULOSINE BYLA

(Sèche).

Les Établissements **BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère porpnyrisé.

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes.

Dose normale : Ampoule de 2 centimètres cubes renfermant 13 centigrammes de Bismuth métal.
Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

Double dose : Ampoule de 3 centimètres cubes renfermant 26 centigrammes de Bismuth métal.
Boîte de 10 ampoules : 40 francs.

Dose infantile : Ampoule de 1 centimètre cube renfermant 2 cgr. 6 de bismuth métal.
Boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 2 jours ou 2 ampoules tous les 5 jours. Dans les cas rebelles : 2 ampoules tous les 2 jours.

Traitement de sécurité. Suppositoires Muthanol, adultes et enfants.

Laboratoire du MUTHANOL : G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

R. C. Seine 143.981.

MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN.

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Stimule la phagocytose.

Formes et doses :

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuillerées par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

Pastilles de Mycolysine, 15 à 20 pastilles par 24 h.

Indications. — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc.

Laboratoires LEBEAULT

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

MYODEN

Elixir Antirhumatismal et Antigoutteux
au Phospho-Hexahydroparadiazine-ammonium.

Composition. — Phospho - Hexahydroparadiazine - ammonium, Sel de Grégory, Teinture de Narcisse, Teinture de Gantelée, Extrait hydro-alcoolique de Belladone, Ethanol à 15°.

Indications. — Rhumatismes, Arthralgies et Arthropathies aiguës ou chroniques, Goutte, Arthrite goutteuse, Rhumatisme polyarthritique progressif, Sciatique, Affections articulaires chroniques, Lumbago.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour pur ou dans de la tisane de feuilles de frêne.

Enfants au-dessus de 10 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.

Nota. — Le MYODEN peut être prescrit par le Corps médical pour les Assurances Sociales.

(Formule conforme au décret du 13 juillet 1926.)

Laboratoires E. DAUPEZ

CAPVERN-LES-BAINS (Htes-Pyrénées).

Dépôt général des Spécialités :

37, rue des Lois, 37

TOULOUSE (Hte-Haronne). Tél. : 24-55.

MYOTHERMINE

Médication externe, imprégnation par essences végétales, réaction thermogène, révulsion atténuée. Onguent non coloré en tube étain.

Indications. — Douleurs articulaires, Courbature, Lumbago, Torticollis, Point de côté, Engelures, Congestions de la gorge, Trachéites, Bronchites, Grippe pulmonaire, Congestion pulmonaire, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Pleurésies.

Mode d'emploi. — Étendre une couche de Myothermine avec un tampon de coton, recouvrant largement le point douloureux, la gorge ou le thorax, suivant les cas.

Pour obtenir une révulsion atténuée, non pénible, couvrir avec le papier imperméable spécial contenu dans la boîte.

Prix du tube : 13 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique
appliquées

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

MYOVARSYL

Composition. — Dérivé méthylène-sulfonate du Dioxy-diamino-arsénobenzol.

Forme. — Poudre jaune se dissolvant aisément et rapidement dans l'eau ou le sérum en fournissant une solution injectable sans douleur, par la voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Présentation en tubes scellés aux doses suivantes : 6, 12, 18, 24 cgr. — 30, 36, 42, 50 cgr. — 1,5 et 3 cgr.

Indications. — Traitement commode, aisé, sûr, de la syphilis à toutes ses périodes.

Usines Chimiques

des Laboratoires Français

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e)

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 58-43.

NADOLOR

(Cachets.)

Propriétés thérapeutiques. — Grippe, migraines, névralgies rebelles, névralgies dentaires, rhumatismes, lumbagos, règles douloureuses.

Formule. — Phénacétine, citrate de caféine, aconit, amidopyrine, dionine 1/4 centigr., bicarbonate de soude, craie préparée, extrait de jusquiame.

Dose et mode d'emploi :

1 à 4 cachets par 24 heures.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.

NAIODINE LOGEAI

Formule : 1° *Normale*, solution aqueuse à 1 % d'iodure de sodium stabilisé (pour intramusculaires ou intraveineuses) :

2° *Concentrée*, solution B aqueuse à 5 %. *Spéciale pour intraveineuses.*

Formes :

Solution normale à 1 % :

Boîte 6 ampoules de 10 cc. : 23 fr. net.

Boîte 6 ampoules de 20 cc. : 30 fr. net.

Solution B à 5 % :

Boîte 6 ampoules de 10 cc. : 27 fr. net.

Boîte 6 ampoules de 20 cc. : 35 fr. net.

Boîtes vrac de 50 ou 100 ampoules réservées au Corps Médical. Prix courant réduit sur demande.

Propriétés. — *Solution normale : sédatif type de l'élément douloureux dans les algies rebelles*, grâce à l'action neurophile intense de NaI stabilisé (imprégnation nerveuse par l'ion I de la NAIODINE).

Véritable traitement spécifique de la sciatique, c'est en outre un précieux succédané des stupéfiants (algies rebelles, toxicomanies, etc.).

Solution B à 5 %. — Action antiseptique et anti-infectieuse puissante par voie intraveineuse dans le traitement des maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles. Cure intraveineuse des algies rebelles.

La NAIODINE est atoxique, stabilisée, indolore à l'injection, immédiatement assimilable, sans réactions secondaires.

Indications. — *Solution normale.* Tout syndrome douloureux, aigu ou chronique : Sciatique, Lumbagos, Zonas, Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme déformant, Névralgies faciales, intercostales et lombaires, Névrites, Myalgies, Asthme, Emphysème, Toxicomanies, etc.

Solution B à 5 %. — Maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles. Algies rebelles.

Posologie. — *Solution normale :* Traitement d'attaque à doses massives : 20 à 40 cc. par jour, en une seule séance, jusqu'à sédation. Injections intramusculaires indolores lentes (loco dolenti si possible). Ni réactions, ni incompatibilité, ni contre-indications. Pas d'iodisme, ni d'accumulation.

Solution B. — Injections strictement intraveineuses très lentes : 20 à 40 cc. par jour pendant dix jours, 20 jours de repos entre chaque série d'injections.

Laboratoires J. LOGEAI

BOULOGNE-SUR-SEINE, près Paris.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

NARCYL

Médicament spécifique de la Toux.

Laryngites, Bronchites, Coqueluche.

En particulier : *Toux de la Tuberculose.*

Sirop dosé à 0 gr. 03 ctg. de Narcyl par cuillerée à soupe (chlte d'éthyl narcéine synt.).

Comprimés dosés à 0 gr. 02 de narcyl et 0 gr. 25 de benzoate de Na.

Doses :

Sirop :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour.

Enfants : 2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour.

— 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill à café par jour.

— 7 à 15 ans : 1 à 2 cuill à bouche par jour.

Comprimés : *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

Sirop, le flacon : 14 fr — Comprimés : 14 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

NASARGINE

Solution à base d'argyrol de Barnes et de résorcine.

Avantages. — Associés à la résorcine, les sels d'argent ont une action antiseptique plus efficace sur les muqueuses.

Indications. — Rhinites, Coryzas, Grippe, Sinusites, Adénoïdites, Otites et toutes les affections du rhinopharynx et du larynx.

Modes d'emploi :

<i>Nourrissons</i> : I à II gouttes	} dans chaque	
<i>Enfants</i> : III gouttes.		narine 2 à 3
<i>Adultes</i> : IV à VI gouttes.		fois par jour.

Badigeonnages. Pulvérisations.

Laboratoires MAIRE

171, rue de Belleville. — PARIS.

NASOBORE (Comprimés)

Puissant désinfectant des voies respiratoires
Non irritant, Non toxique.

Composition. — *Chloramine T.* : associées aux essences balsamiques et aux principes de plantes sélectionnées.

Formule. — *Chloramine T.* : Baume du Pérou, Borate de Soude, Bicarbonate de soude, Essences aromatiques.

Indications. — Antisepsie des voies respiratoires, Affections de la gorge, Enrouement, Angines, Laryngites, Trachéites, Trachéo - Bronchites, Sinusites, etc.

Mode d'emploi. — 1° *Inhalations* : 2 à 3 comprimés dans un bol ou inhalations d'eau bouillante. Respirer les vapeurs plusieurs fois par jour.

2° *Gargarismes* : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau bouillie chaude.

E. MONGE, Pharmacien
OULLINS (Rhône).

NASO-SULFOLARSAN

Antiseptique sulfureux sans odeur.
Non caustique, non toxique.

Indications. — Affections du nez et de la gorge : Coryza aigu ou chronique, Sinusites, Ozènes, Erysipèle, Otites, Muguet, Angines.

Présentation. — Pommade en tube à embout nasal.

Mode d'emploi. — Gros comme un pois, 2 à 3 fois par jour.

Le tube : 10 francs.

Laboratoires DOMERGUE
AGEN (Lot-et-Garonne).

NATIBAÏNE

Seule association de
la Digitaline Nativelle et de l'Ouabaïne Arnaud.

Formes. — Solution glycéro-alcoolique au millième, renfermant 1/3 de Digitaline Nativelle et 2/3 d'Ouabaïne Arnaud.

Ampoules à 3/10 mgr. pour injections intraveineuses.

Indications. — Myocardites avec tachycardie
Hypertendus en voie d'arythmie complète.

Doses. — *Pour adultes :*

D'entretien cardiotonique : X gouttes par jour les 5 premiers jours de chaque dizaine.

De soutien : XX gouttes par jour les 5 premiers jours de chaque dizaine.

En cas d'amélioration : cure d'entretien.

D'attaque : XXX gouttes par jour les 5 premiers jours de la dizaine et XX gouttes par jour les 5 jours suivants.

Interrompre et reprendre si nécessaire.

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (15°).

NATIROSE

Dragées de Trinitrine
à noyau liquide.

Composition. — Azotate de glycéryle (Trinitrine), Chlorhydrate de Codéthyline (Dionine), Sulfate neutre d'Atropine, Essence de Menthe.

Indications. — Angine de Poitrine, Aortite, Artérite, Asthme cardiaque, Bradycardie, Crises gastriques du tabès, Hypertension artérielle, Œdème aigu du pœmon.

Doses. — Une à deux dragées au moment de l'accès sans dépasser 8 à 10 dragées par 24 heures.

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (15°).

NATROSYL

Forme pharmaceutique. — Soluté.

Composition. — Soluté alcalin à base de baume du Pérou et d'essences antiseptiques aromatiques.

Action. — Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

Indications. — Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie en injections vaginales.

Prix : 10 francs.

Laboratoires
du Dr Pierre ROLLAND

Dépôt : 127, Bd St-Michel — PARIS (V^e).

NAZINETTE

(Baume Nasal.)

Composition. — Mélange complexe d'essences choisies d'après leur pouvoir antiseptique et d'après leur coefficient de volatilité. *Pas de menthol. Pas d'adrénaline. Pas de toxiques. Pas de poudres insolubles. Pas de produits chimiques.*

Avantages. — Homogénéité absolue. Consistance fluide, fusible à 36°. Laisse les narines libres. Adhère aux muqueuses (action prolongée) et partiellement absorbable par elles (action immédiate et exceptionnelle). Tient lieu d'inhalation. Usage prolongé possible. N'irrite jamais. Ne tache pas le mouchoir.

Présentation. — Tube d'étain pur avec une canule permettant l'introduction facile dans les narines.

Prescription. — Un tube de *Nazinette* : introduire gros comme un petit pois dans chaque narine.

Propriétés. — Calmant, décongestionnant, bactéricide. Supprime les irritations de la muqueuse.

Indications. — Rhumes de cerveau, rhinites et toutes inflammations de la muqueuse rhino-pharyngée, végétations, sinusites (action remarquable), ozène, surdité, etc. ; prévention des maladies infectieuses, coqueluche, etc.

Laboratoires Biologiques
E. GILBERT, Docteur en Pharmacie
6, rue du Laos — PARIS (XV^e).

NÉOARSITE

(Liquueur de Fowler spéciale.)

Propriétés. — Les composés arsenicaux, tels que cacodylates, méthylarsinates, etc. ont été adoptés thérapeutiquement pour remplacer les sels arsenicaux anciens, arseniates, arsenites, mais leur efficacité n'est réelle qu'à des doses importantes, c'est-à-dire à des doses voisines de leur toxicité spécifique.

De tous les arsenicaux, seule la liqueur de Fowler a une valeur thérapeutique bien définie. Aussi le prof^r Roger a-t-il étudié pour ce médicament de toute efficacité les conditions optima de son absorption sous des formes nouvelles.

Formes :

1^o *L'Ampoule isovisqueuse de Néoarsite*, grâce à sa viscosité qui est égale à la viscosité moyenne du Myoplasma sanguin, est résorbée presque instantanément et sans réaction.

2^o *Les Perlules de Néoarsite*, solubles seulement dans l'intestin, suppriment les inconvénients de l'absorption gastrique. Chaque perle correspond à IV gouttes de Liqueur de Fowler et à un milligramme de quassine.

Posologie :

Ampoules : 1 par jour.

Perlules : 1 au repas du midi. 1 au repas du soir.

Prix : Ampoules, 20 fr. ; Perlules, 15 fr.

Dépôt : **Laboratoire NOGUÈS**

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS.

Anciennement : 11, rue Joseph-Bara — PARIS.

NÉO-ARSYCODILE

Méthylarsinate disodique

(Syn. Arrhénal)

Indications thérapeutiques. — Tous les avantages de l'arsenic organique. Plus particulièrement destiné à l'usage interne par la voie gastrique. Un long emploi (depuis 1900) a établi la supériorité de cette préparation.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,01 : 4 à 5 ou plus par jour aux repas, pendant 12 jours, repos 8 jours et reprise.

Ampoules à 0,05, même usage que pour l'ARSYCODILE et spécialement dans le paludisme et l'anémie des pays chauds.

Prix de vente au public : pilules : 11 fr. 25 ; ampoules : 12 fr. 50.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

NÉOBIOL

Composition. — Soufre colloïdal et complexe hydrocarburé spécial, dégraissant et d'odeur agréable.

Indications. — *Séborrhée* et ses manifestations : chute des cheveux, pellicules, peaux grasses, points noirs, acné.

Mode d'emploi :

Au visage :

En applications externes quotidiennes.

En frictions douces avec un tampon de coton hydrophile.

Au cuir chevelu :

Écarter les cheveux par quelques raies faites au peigne, et procéder de même qu'au visage.

Prix au public : 18 fr. 90.

Laboratoire L. JAUFFRET, Pharmacien.

Ex-Interne des Hôpitaux.

4, place du Val — VANVES (Seine).

NÉO-CALCILINE

Reconstituant biologique, para-hépatopanoréato-splénique.

Composition. — Os frais épiphysaire, Parathyroïde Thymus, Surrénale, Diastase pancréatique, Poudre de Muqueuse intestinale, Extrait lipoidique de Foie, Extrait lipoidique de Rate.

Doses. — 2 comprimés, 2 cachets, 2 mesures (granulé) avant chaque repas.

Enfants : 1/2 doses.

Prix : 16 francs.

Laboratoires Gastro-Entérologiques

ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 69-13.

NÉO-CHLORAL-NAU

Une nouveauté thérapeutique.

Antiseptique puissant, ni caustique, ni irritant. Décongestif, astringent, analgésique, hémostatique.

Formule. — Thymol crist. 2 gr. — Hydrate de chloral, 100 gr. — Résorcine, 50 gr. — Novocaïnum, 2 gr. 50. — Adrénaline au 1 000^e, 25 gr. — Excipient aqueux spécial, 1 000 gr. — La nouveauté consiste en la **solubilisation** (sans intervention de sels sodiques ou autres) et la **stabilisation** du thymol cristallisé en milieu rigoureusement aqueux.

Indications :

1^o Affections du RHINO-PHARYNX : Angines, rhinites, amygdalites, etc...

2^o En **STOMATOLOGIE** : interventions traumatisantes, abcès, pyorrhée alvéolaire, etc...

Posologie. — 1 à 2 cuill. à café dans un grand verre d'eau bouillie chaude, en bains de bouche, gargarismes, etc...

1 à 3 cuill. à soupe par litre d'eau en lavages de la gorge, irrigations nasales, etc...

Présentation. — En flacon de 2 grandeurs :

P. M. à 8 francs ; G. M. à 16 francs.

Laboratoires du NÉO-CHLORAL-NAU

21, Grande-Rue — ARGENTEUIL (S.-et-O.).

NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevée (80 p. 100 d'argent métal).

Ni irritant, ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergiques dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectieuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïne pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïne pour frictions dans maladies infectieuses.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin. Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites.

Pilules Néo-Collargol pour les entérites, la coli-bacillose et l'appendicite chronique.

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

Laboratoires du Dr MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

NEO-DMEGON

Vaccin curatif des complications de la gonococcie.

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par des émulsions de cultures diverses de *gonocoques* et de *synocoques* traitées par le fluorure de sodium.

Indications. — Complications diverses de la Blennorragie (Orchi-épididymites, cystites, prostatites, arthrites, ophtalmie, etc...), dans lesquelles le Néo-Dmegon agit notoirement sur les symptômes douloureux et inflammatoires.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cc. (boîte de 6) à étiquette blanche ou bleue (races diverses). En principe, 1 ampoule tous les 2 jours, en alternant les ampoules à étiquette blanche et bleue. Voie hypodermique ou intra-musculaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

NÉO-DMÉTYS

Vaccin curatif et préventif de la coqueluche.

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par une émulsion de cultures diverses de Bacilles de Bordet traitées par le fluorure de sodium.

Indications. — Traitement et prophylaxie de la coqueluche.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cc. (boîte de 6) à étiquette blanche ou bleue. Une injection intra musculaire, de préférence (ou sous-cutanée), en principe tous les 2 jours ; commencer par 1/2 ampoule pour atteindre 1 ampoule à la troisième ou quatrième injection. Chez les très jeunes enfants, s'en tenir à 1/2 ampoule. Le traitement comporte en général de 6 à 10 ampoules (soit 10 à 20 jours environ). Alternier les ampoules à étiquette blanche ou bleue.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

NÉOL

Constitution. — Préparation aqueuse peroxy-sulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Ozone naissant.

Propriétés. — Aucune toxicité, antiseptique-cicatrisant, essentiellement cytophyllactique, kératoplastique et décongestif.

Indications. — Brûlures par le feu, le radium ou le froid. Ulcérations cutanées et muqueuses. Plaies phagédéniques. Métrites, angines, pharyngites.

Mode d'emploi. — L'eau néolée (*Néol*, 1 partie, *eau*, 4 parties) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications. — Attouchements, badigeonnages (Angines, Stomatites, Laryngites, Métrites et Endométrites) : *Néol pur*. — Pansements (Brûlures, Plaies diverses) : *Eau néolée*. — Gargarismes : une cuill. à soupe par verre d'eau avec une pincée de bicarbonate de soude. — Injections, grands lavages : Quatre cuill. à soupe par injection de deux litres d'eau.

Laboratoires BOTTU

Anciens Laboratoires du Néol,

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e).

NÉOLYSE

et NÉOLYSE RADIOACTIVE

Préparations à base de sels silico-magnésiens.

Indications thérapeutiques. — Traitement des affections cancéreuses par les composés magnésiens.

Propriétés thérapeutiques. — La Néolyse est établie d'après les observations du Prof. Robin et les arguments cliniques de MM. Richet, Delbet et J. Regnault (*Acad. de méd.*, avril 1918).

Formes usuelles :

Néolyse : *Cachets* (en boîte de 60). — 20 fr.

Ampoules (en boîte de 4). — 10 fr.

Compresses (en boîte de 10). 15 fr.

Néolyse radio-active : *Ampoules* (boîte de 4).

Prix : 20 fr.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

NÉO-NEUROSINE PRUNIER

Saccharure granulé à base de :

Phospho-glycérate de calcium pur...	0,05 centigr.
Glycéro-phosphate de sodium pur....	0,10 —
Chlorure de magnésium pur.....	0,15 —

par cuillerée à café, soit 5 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Médication tonique, phosphorée, calcique et magnésienne. Prophylaxie des affections cancéreuses.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre en nature ou dans de l'eau.

Prix du flacon en France : 12 fr. 75.

Dépôt général :

CHASSAING, LE COQ ET C^{ie}

(Anc. M^{re} Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NÉOPANCARPINE

Extrait total hydro-alcoolique étheré de *Jaborandi*.

Formes. — Gouttes et Granules.

Indications thérapeutiques. — Les altérations de la sensibilité organique et les maladies anaphylactiques, *traitement de fond*, ne s'adressant nullement aux manifestations paroxystiques (crises), mais à l'altération permanente qui prépare et détermine ces dernières :

Coqueluche, Toux quinteuses, Asthme, Coryzas spasmodiques, Urticaire, Névro-dermites, Eczéma.

La meilleure thérapeutique de désensibilisation.

Mode d'emploi. — *Enfants* jusqu'à 5 ans : III à X gouttes, 8 à 4 fois par jour.

Adultes : VIII à XX gouttes 3 à 4 fois par jour ou 1 ou 2 granules, matin, midi et soir.

A prendre toujours après les repas.

1 granule = X gouttes.

Prix de vente au public : 16 francs.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris,

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e).

Téléph. : Auteuil 35-25.

NÉOPHAGE

Traitement médical des cancers et des états précancéreux.

Néophage n° 1. — Levure injectable travaillant à 37°.

Néophage n° 2. — Extraits glandulaires : Thymus, Thyroïde, Hypophyse, Pancréas. Métaux colloïdaux : Cu, Fe, Se, Mn, Mg.

Injections intramusculaires tous les 2 jours du contenu total d'une ampoule n° 1 et de 1/3 d'une ampoule n° 2 ; augmenter progressivement les doses de n° 2.

Prix public : 100 fr. la boîte de 12 ampoules.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

Admise dans les Hôpitaux de Paris

NÉO-PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections de moyenne intensité.

Indications thérapeutiques. — Grippe, Angine, Broncho-Pneumonie, Fièvre typhoïde, Fièvre puerpérale et toutes les infections.

Forme. — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Injections intramusculaires, région rétro-trochantérienne au point de Barthélemy ; l'injection est indolore. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc, Toxicité nulle.

Prix : 22 francs.

PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections graves.

Formes. — Boîtes *Adultes* : 4 ampoules 20 cc.

Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 cc.

Prix : 40 francs.

Laboratoires **DROUET et PLET**
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

NÉOPLALYSINES

(Complexes colloïdaux du D^r Riquoir.)

Propriétés. — Arrêt rapid. des hémorragies dans le Cancer et le Fibrome. Renforcement de l'action du Radium et des Rayons X. Cicatrisation de l'Ucère d'estomac.

Avantages. — L'injection porte directement sur les lésions par l'adjonction d'un colloïde aux éléments organiques et minéraux.

Indications. — Fibromes, Hémorragies utérines, diverses formes du cancer (y correspondant : 4 formules).

Emploi. — Une injection intramusculaire ou hypodermique, quotidiennement, 3 jours consécutifs par semaine. Pour éviter d'indisposer les malades sensibles, il est recommandé d'utiliser simultanément le contenu d'une ampoule désensibilisante.

Prix :

Néoplalysines : 30 fr. la boîte de 12 ampoules ou de 18 cachets.

Désensibilisantes (12 ampoules) : 12 fr.

Laboratoires MERMINOD

49, rue de Paradis — PARIS (X^e).

Tél. : Provence 30-32.

NÉOPULMINE

Affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.

Composition :

Sulfogaiacolate de potasse	1,00
Benzoate de sodium.	1,50
Extrait thébaïque	0,02
Dionine	0,02
Teinture de belladone.....	0,65
— de drosera.....	0,65
— de grindelia	0,65
Sirop de baume de tolu.	15,00
Excipient aromatique Q. s. p. 100 cc.	

Indication. — Trachéite, laryngite, bronchite aiguë et chronique, asthme, grippe, catarrhe, etc.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes et 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants au-dessus de 6 ans.

Prix : 13 fr.

Laboratoires RICHER

7, avenue Marceau — PARIS.

NÉO-RHOMNOL

Rhomnol Strychno-Arsénié (Nucéinate de Strychnine défini et Cacodylate de Soude).

Injectons hypodermiques et comprimés.

Indications thérapeutiques. — Hypotension artérielle, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, Etats cachectiques, Suites d'infections, etc. (Spécificité). Hypotension artérielle, Amyosthénie. Corps nouveau défini, à effets réguliers et constants.

Mode d'emploi. — *Ampoules* : Tous les jours une ampoule (en injections intramusculaires de préférence), deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine, suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire.

Comprimés : Un comprimé à chaque repas, avaler sans croquer.

Prix de vente au public : 18 francs.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

NÉO-RIODINE

$C^3 H^6 O^4 I S Na$

Composition. — Dérivé sodique à 40 % d'iode organique en solution aqueuse.

Formes. — Ampoules de 2, 3, 5 cc.

Boîtes de 10 et de 50 ampoules.

Propriétés thérapeutiques. — *Action immédiate et intensive.*

Aucune intolérance.

Par voie buccale : voir **Riodine** ; mêmes applications, *action lente et prolongée.*

Indications. — Artério-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme. Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — En injections intraveineuses ou intramusculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas ou par voie buccale.

Prix : 18 francs.

LABORATOIRES du Dr P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche. PARIS (XVI^e).

NÉOSPASMODYL " VELY "

Anciennement : **NÉOSPASMINE " Vély "**

Composition. — Dragées glutinées à base de : Salicyl. Amidopyrine, Phénylethylmalonylurée, Camphre brom., Extrait Crataegus, Extrait de Belladone, Extrait de Valériane.

Indications. — Régulateur neuro-végétatif : instabilité nerveuse, angoisse, éréthisme cardiaque, Nervosisme prémenstruel, Angor pectoris, spasmes vasculaires, Menstruations douloureuses. Déséquilibre du vague et du sympathique.

Posologie. — 1 à 3 dragées avec chacun des deux principaux repas, pendant 12 à 15 jours, et après un repos de 8 jours, nouvelle cure.

Laboratoire des Produits Vely

132, avenue Victor-Hugo — PARIS.

Tél. : Passy 87-85.

NÉOSULINE

Hormonothérapie anticancéreuse par voie buccale.

Principe actif. — Insuline-Fornet (Cf. Pommade-Fornet, page 841) plus hormone régulatrice de la croissance, extraite de la moelle d'os longs d'animaux jeunes.

Indications. — Affections cancéreuses de toutes natures et de toutes localisations.

Posologie. — 3 pilules 3 fois par jour une demi-heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Amélioration presque instantanée de l'état général, disparition de l'anorexie, rétablissement des forces, soulagement des douleurs, ralentissement, arrêt du développement, et même décroissance de la tumeur.

Prix : 49 francs.

Vente et échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie.

23, rue du Caire — PARIS (II^e).

Service d'Etude et de Fabrication :

Institut de Microbiologie.

SARREBRUCK (Sarre).

NÉOTHORIUM MILLOT

Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium, etc.) possèdent, en applications externes, de remarquables qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes.

Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs (A. FROUIN, L. HUDELO, GUENOT, GRENET, DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies atones, et principalement dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus, et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale de ces affections, en effet :

Energiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en quelques jours les phénomènes douloureux et fluxionnaires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cicatrisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils sont absolument inoffensifs.

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médication, les LABORATOIRES MILLOT mettent à la disposition du Corps Médical les quatre préparations suivantes :

Ovules Néothorium Millot.

Métrites : un tous les jours, puis tous les deux jours.

Prix médical : la boîte de 6 ovules : 9 francs.

Crayons Néothorium Millot.

Endométrites : 2 à 3 par semaine.

Prix médical : la boîte de 8 crayons : 12 francs.

Comprimés Néothorium Millot.

Leucorrhée et Hygiène quotidienne : 1 ou 2 dans de l'eau chaude en irrigation.

Prix médical : la boîte de 36 comprimés : 8 francs.

Tampons Néothorium Millot.

Ulcérations du col : un tous les jours, puis tous les deux jours. Prix médical : la boîte de 6 tampons : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 0-69.

NÉO-TRÉPOL

Traitement de la syphilis par le bismuth métalloïdique pur.

Médication spirillicide intramusculaire dosée à environ 96 p. 100 de Bi élément en milieu aqueux isotonique. (Ampoules de 2 centimètres cubes.)

Adopté par le Ministère de l'Hygiène, l'Assistance et tous les services publics.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 fr.
— 12 — : 36 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. Q,

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut
et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

NÉOTROPHÈNE

Tablettes au Chlorure de Magnésium d'un goût agréable.

Composition. — 0 gr. 20 de Chlorure de Magnésium cristallisé par tablette. Excipient : Q. S.

Posologie. — 6 tablettes en moyenne par jour, après les repas de préférence. Action laxative à jeun.

Indications. — Dermatoses, Eczéma en particulier, Prurits, Acné, Reconstituant très efficace dans les asthénies nerveuses. Facilite le travail. Convalescence. Cholagogue, régularise les fonctions digestives. Laxatif. Prophylactique du cancer. Nourriture de la cellule.

Prix : La boîte de 44 tablettes, 12 fr. 50.

**« Laboratoire de CHIMIE APPLIQUÉE DE
NANTERRE »**

22, boulevard du Couchant — NANTERRE (Seine).

NEPTAL

Hydroxy - mercuri - propanolamide de l'acide ortho-carboxy-phénoxy-acétique.

Diurétique mercuriel peu toxique et d'action rapide. Teneur en Hg: 0 gr. 035 par cc.

Indications :

Oligurie des affections cardio-rénales, Œdèmes, Anasarque, Ascites, Épanchements pleuraux.

Présentation : Boîte de 3 ampoules de 1 cc. 5 (sol. à 9,2 p. 100).

Posologie et mode d'emploi. — Injection intramusculaire du contenu d'une ampoule à renouveler éventuellement après 6 à 10 jours. En cas d'épanchement, ponction préalable. S'abstenir chez les cachectiques, les fébricitants et les azotémiques à partir de 1 gr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

NERGINE HEUDEBERT

Composition. — La Nergine apporte le phosphore organique, les éléments minéraux combinés et les vitamines du germe de blé naturel et constitue un reminéralisant précieux et un stimulant des sécrétions glandulaires.

Indications. — A recommander aux enfants en voie de croissance et dans tous les troubles de la nutrition accompagnant les affections aiguës ou chroniques: neurasthénie, anémie, tuberculose, typhoïde, surmenage et convalescence.

Excellent complément des farines lactées préparées à l'eau.

Mode d'emploi. — Pour le nourrisson, délayer dans un peu de lait, à la dose de 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Pour les adultes, à prendre en plusieurs fois 4 à 6 fortes cuillerées à café par jour, dans une infusion tiède ou mélangée aux aliments habituels.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

NERVOCITHINE (HÉPATISÉE)

du Docteur TISSOT.

HEPATO CITHINE

Ampoules. Dragées. Sirop.

(Hémoglobine et extrait de foie.)

Méthode de Whipple complétée et activée par sels organiques.

Composition et formes. — Ampoules de 2 cc.

Fluorure de sodium.....	0,001
Nucléinate de fer	0,02
Méthylarsinate de soude	0,03
Glycophosphate de soude	0,07
Sulfate de strychnine	0,001/2

Sirop et Dragées.

Hémoglobine et Extrait de Foie frais activés par sels organiques.

Puissance effective supérieure à la somme de celle des produits. Tout mauvais goût supprimé.

Indications thérapeutiques. — Toutes les fatigues, anémies, faiblesses, diminution de résistance, anorexie, pertes de forces, convalescences, épuisements, etc., etc. (Paludisme, maladies du foie, etc.).

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour ; 1 à 2 dragées à chaque repas ou 1 à 2 cuillerées de sirop (très agréable).

Enfants : Au-dessus de 7 ans, moitié dose.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, boulevard de Clichy — PARIS.

NESTOSYL

Association anesthésique par contact.

Caractéristiques. — Association d'éthers des séries phtalique et paraaminobenzoïque. Aucun produit des tableaux A et B. Antiseptique.

Indications. — Suppression infaillible et immédiate de la douleur ou démangeaison provoquée par les plaies, inflammations, irritations, éruptions, et, d'une façon générale, par toute affection qui a modifié l'intégrité de la peau, ou qui a son siège sur une muqueuse.

Présentations. — *Pommade au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

Solution huileuse au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Suppositoires au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Laboratoires du NESTOSYL

P. BAUDE, Pharmacien,

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl 27 PARIS.

NEUBRYNE

Uricolytique, cholagogue, antithermique, analgésique.

Acide phénylquinolique carbonique : 0 gr. 50 par cachet. Toxicité nulle sur le foie, le cœur et les reins.

Dose :

6 à 8 cachets par jour *au milieu des repas.*

Indications. — Toutes manifestations de la Goutte (Arthrites inflammatoires, Rhinites, Entérite gouteuse), Tophi, Arthrites déformantes, Mialgies, Rhumatisme aigu et chronique de toute origine (infectieux, blennorragique, a frigore, etc.), Lumbago, Névralgies, Myalgies, Sciatique, Coliques néphrétiques et hépatiques, Insuffisance hépatique, Uricémie, Glycémie, Glycosurie, Erythème nouveau, Urémie, Dermatoses avec prurit, Infection puerpérale, Grippe, Hyperthermies, Néphrites, Cystites, Syndrome entéro-rénal.

Dr BRUNERYE, Docteur en médecine.

10, rue Saint-Antoine — PARIS (IV^e).

NEURÈNE

Solution et Comprimés.

Bornéol soluble, principe actif inodore de la valériane associé au principe actif antispasmodique du serpolet.

Doses et mode d'emploi.

L. Neurène, Valériane + Serpolet, se présente sous deux formes :

1^o La *solution*, aromatisée au parfum de pêche, agréable à prendre.

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café, prises en 3 fois, entre les repas, dans un peu d'eau sucrée froide.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

2^o Les *comprimés* : 3 à 6 comprimés par jour. Avaler chaque comprimé avec une gorgée de liquide. Ni sucrer, ni croquer.

Chaque comprimé représente la valeur exacte, en principes actifs, d'une cuillerée à café de la solution.

Propriétés thérapeutiques :

Toutes les affections nerveuses.

Le Neurène est admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

PARIS-OUEST

Précédemment : 8, rue de la Source — PARIS (XVI^e).

Tél. Auteuil 11-86.

NEURÉOL

Présentation et composition. — Association soluble de Véronal, Pyramidon, Valériane, Cratægus, Extrait de Coca.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antispasmodique, sédatif et hypnotique.

Avantages. — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

Posologie et mode d'emploi. — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant le dîner ou de se coucher.

Prix : 14 francs.

Laboratoires LAFARGE
6, boulevard Arago — PARIS.

NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée soluble. Renferme 0 gr. 15 de Diéthylmalonylurée pure par comprimé ou cuillerée à café de solution.

A. Dose et mode d'emploi. — 1° Sédatif : 1 cuill. à café, ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée. — 2° Hypnotique : de 1 à 4 cuill. à café ou de 1 à 4 comprimés le soir au coucher. Enfants : 1/2 dose.

B. Propriétés thérapeutiques. — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladies de Basedow, Tics, Délires toxiques, Palpitations, Surmenage, Prurit, etc.
Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 16 fr. — Comprimés : 10 fr.

Laboratoire A. GENEVRIER
45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS.

NEUROBORE

PUR. — *Solution.*

Composition. — Solution inaltérable de tartrate borico-potassique pur. — 1 gr. par cuill. à café.

Prop. therap. — Spécifique des affections nerveuses. Calmant antispasmodique.

Indications thérapeutiques. — Agitation, Insomnies, Convulsions, Troubles névropathiques, Epilepsie, etc.

G. ASSOCIÉ. — *Cachets.*

Composition. — Tartrate borico-potassique, 1 gr. Phényléthyl-malonylurée, 0,05 ; correctif, par cachets.

Médication d'Attaque.

Après effet obtenu, substituer le *Neurobore pur*.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

NEUROCALCIUM

Présentation. — Sirop aromatisé agréable au goût.

Composition. — Associe aux vertus sédatives connues depuis longtemps du Bromure de Calcium les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du Chlorure de Calcium.

Indications. — Toutes les excitations nerveuses, spasmophilie, troubles de la dentition, convulsions, insomnies.

Formule { Chlorure de Calcium. 0,10 } par cuille-
 { Bromure de Calcium. 0,05 } rée à café.

Posologie. — Nourrissons : 2 cuillerées à café par jour.

Après 1 an : 2 à 5 cuillerées à café par jour.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France
 3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise),

NEUROFLORINE

Sédatif Nervin.

Antispasmodique, Cardiotonique.

Présentation. — Solution et Comprimés.

Composition. — Synergie phytothérapique non toxique de : Passiflore, Valériane stabilisée, Saule, Cypripedium, Crataegus.

Avantages. — Sédatif puissant inoffensif et sans accoutumance ; véritable régulateur du système nerveux : *Il redonne la stabilité.*

Inodore.

Tolérance parfaite des voies digestives, du foie et des reins.

Sans dépression secondaire. Aucune contre-indication.

Indications. — Nervosisme, Etats spasmodiques et anxieux, Insomnies.

Posologie. — *Dose sédatrice* : 1 à 2 cuillerées à café ou 2 à 4 comprimés à chaque repas dans un peu d'eau.

Dose hypnotique : 2 à 3 cuillerées à café ou 4 à 6 comprimés en une seule fois dans une infusion chaude, une heure avant le coucher.

Laboratoires CROSNIER

6, rue Chanoinesse — PARIS (IV^e).

NEUROLIPASE

Formes. — Dragées, Granulés, Ampoules.

Composition. — Ensemble des lipoïdes cérébraux.

Mode d'action. — Médication antitoxique et réparatrice du système nerveux.

Indications. — Neurasthénie, épilepsie, mélancolie, convalescence des maladies infectieuses, rachitisme, prébacillose, croissance et développement de l'enfance, etc...

Mode d'emploi. — 2 à 6 dragées, 2 cuillerées à café de granulés, 1 à 2 ampoules par jour en injections.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne — PARIS

NEUROPLASMA

Composition. — *Ampoules de 1 cc.*

Cacodylate de soude	} aa 0.0025
— de magnésie	
Glycérophos. de soude	
Caféine	0.01
Cacodylate de strychnine	0.0005

Indications. — Neurasthénie. Dépression physique. Convalescences. Asthénie. Faiblesse circulatoire.

Avantages. — Piqûre indolore. Synergie pharmacologique.

Doses. — Une ampoule tous les deux jours.

Emploi. — Injection sous-cutanée ou, de préférence, intramusculaire.

Prix : 15 fr.

Peut être prescrit aux Assurances sociales

MICHEL DELALANDE

16, rue Henri-Regnault, COURBEVOIE (Seine).

NEUROPLASMA MASSIF

Composition. — *Ampoules de 5 cc. contenant* cacodylate de soude, 0,25 ; cacodylate de magnésie, 0,05 ; glycérophosphate de soude, 0,10 ; caféine, 0,01 ; cacodylate de strychnine, 1/2 milligr.

Indications. — Etats cachectiques, convalescences, tuberculose et pré-tuberculose, anémie, etc.

Avantages. — Piqûre indolore. Tonique immédiat, relèvement rapide du malade.

Doses. — Une ampoule tous les 2 jours ; après un repos de huit jours une nouvelle série de 12 ampoules.

Emploi. — Injection intramusculaire.

Prix : 20 fr.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

MICHEL DELALANDE

16, rue Henri-Regnault
COURBEVOIE (Seine).

NEUROPOL

Composition. — Glycérophosphate de Calcium, Fer et Magnésie associés au Nucléinate de Manganèse et à des extraits opothérapiques nécessaires pour assurer la fixation des éléments minéraux et rétablir le jeu normal des fonctions endocriniennes.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant protecteur de la cellule nerveuse. Mordance du tissu nerveux, lors des traitements hydrargyriques, bismuthiques et arsenicaux.

Présentation. — Comprimés solubles

Deux formes :

Sexe masculin (testicule), — Sexe féminin (ovaire).

Indications — Toutes les dépressions, déminéralisation, maladies nerveuses, impuissance, amenorrhée, rachitisme, pré tuberculose, frigidité, tétanie.

Doses. — 3 à 9 comprimés par jour.

Laboratoire R. FAURE

80, rue du Rocher — PARIS.

NEUROSINE PRUNIER

(Phospho-Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier).

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant du Système nerveux.

Mode de présentation. — La « Neurosine Prunier » est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

Indications. — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, etc.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour de granulé ; 2 à 3 cachets par jour ; 2 à 3 cuillerées à bouche par jour de sirop. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet et chaque cuillerée à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NEUROTROL

(Sérum neurotrophique).

Médication strychno-cacodylique.

Composition. — Cacodylate soude : 0,05 ; glycérophosphate soude : 0,10 ; cacodylate strychnine : 0,001 ; sérum isotonique : Q. S. p. 1 cc.

Indications. — Asthénie, Neurasthénie, Dépression nerveuse, Diabète, Prétuberculose, Paludisme, Convalescence.

Doses. — *Deux formes.*

1° En ampoules de 1 cc. ; 1 à 3 injections sous-cutanées par jour et progressivement. Les injections sont *absolument indolores*. — 18 francs la boîte de 12 ampoules.

2° En gouttes : de XX à LX gouttes par jour et progressivement. — 15 francs le flacon.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3. Place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE
(Haute-Garonne). — Tél. : 1306.

NEUROTROPHOL BYLA

Elixir, Granulé, Dragées

A base de nucléorquine Byla, d'acide nucléinique, de glycérophosphate de soude et de méthylarsinate disodique.

Doses et mode d'emploi. — *Elixir* : 1 verre à liqueur *après* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants.

Granulé : 1 cuillerée à bouche *avant* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à café pour les enfants.

Dragées : Adultes : 4 à 8. Enfants : 2 à 4 par jour,

Propriétés thérapeutiques. — Tonique neuromusculaire. Excitant de la nutrition.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Epuisement, Psychoses génitales, Chlorose.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

NEUROVAROL

Traitement de l'Insuffisance ovarienne et de ses troubles secondaires (excitabilité nerveuse, états congestifs, etc.).

Chaque cachet contient :

1 comprimé de...	{	Thyroïde.....	0 gr. 0025
		Ovaire.	0 gr. 10
		Ext. valériane stâ- bilisée Dausse ..	0 gr. 10
Poudres végétales à propriétés va- so-constrictives..	{	Hydrastis.	0 gr. 10
		Gossypium.	0 gr. 10
		Viburnum.....	0 gr. 10
		Hamamélis.	0 gr. 30

Posologie. — 1^o Troubles par hypo-fonction ovâ-
rienne, 1 à 2 cachets par jour.

2^o Ménopause physiologique ou opératoire, 1 à 2
cachets par jour pendant 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle
des Médicaments sous le n^o 233-1.

Laboratoires DOUETTEAU frères

20, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (8^e).

NEUTRALCAOL

Composition.

15 0/0 de carbonate de bismuth chimiquement pur.

10 0/0 de Magnésie hydratée chimiquement pure.

10 0/0 de Talc flotté électrolytique.

65 0/0 de Kaolin colloïdal.

Avantages. — *Le plus efficace des pansements gastriques bismuthés.*

Le plus facile à prescrire parce que meilleur marché qu'une prescription.

Indications. — Traitement type du syndrome hyperchlorhydrique (régurgitations acides, brûlures, douleurs, vomissements, sialorrhée, flatulences, etc.).

Aérophagie, Ulcus de l'estomac, du pylore et du duodénum.

Prix : la boîte : 15 fr., contient 100 gr. de poudre, soit 12 à 15 jours de traitement.

Laboratoires BENDERITTER et C^{le}
VENDOME (Loir-et-Cher).

NEVORAL RAFEY

Le NÉVORAL est parfaitement toléré par les estomacs délicats ; c'est en même temps un fortifiant, un tonique et un fébrifuge. Il ne contient aucun composé ou dérivé de l'opium, ni aucun hypnotique. Les actions des divers produits pharmaceutiques qui le composent se multipliant l'une par l'autre lui donnent un pouvoir thérapeutique considérable, quelles que soient l'origine et la cause de la douleur.

Indications thérapeutiques. — Névralgies, Rhumatismes, Migraines, Maux de tête et de dents, Courbatures, Fièvre grippale, Sciatique, Lumbago, Zona.

Le **NEVORAL** supprime la douleur, tandis que d'autres médicaments ne font que l'endormir

Dose et mode d'emploi. — Adultes, 1, 2 ou 3 cachets par jour. Si 1 cachet n'a pas suffi, en prendre un second 1 heure après le premier. Enfants, le $\frac{1}{4}$, le $\frac{1}{3}$ ou la moitié du contenu d'un cachet à prendre dans un liquide sucré, de la confiture ou du miel.

La boîte de 12 cachets : 9 francs.

Dépôt général :

Laboratoires RAFEY

Raoul FEIGNOUX, pharm. 1^{re} classe
95, rue de Turenne — PARIS (III^e)

NÉVRALGOL BROSSARD

(Cachets).

Analgésiques — Antithermiques — Fébrifuges.

Indications. — Grippe. Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques. Rhumatismes. Migraines.

Doses et mode d'emploi. — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes.

Prix : 9 fr. la boîte de 12 cachets.

4 fr. 70 la boîte de 6 cachets.

0 fr. 80 le cachet.

Laboratoire CORNAUD et BROSSARD

1, rue des Cordouans — LA ROCHELLE.

Echantillons sur demande des Docteurs.

NEVROSAN

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système *neuro-végétatif*.

Composition. — Teinture de Cratœgus, Passiflore, Alcoolature de ballote.

Action. — L'action bien connue du Cratœgus et de la Passiflore est renforcée par la Ballote (antispasmodique à action principalement sur l'irritabilité neuro-végétative).

Indications. — Insomnies nerveuses, Troubles nerveux de la vie génitale, Etats spasmodiques, Troubles fonctionnels du cœur, Psychoses fonctionnelles, etc.

Doses. — Action sédatif : LX gouttes le soir au coucher. Action antispasmodique : XX gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates cérébraux alcalins.

Forme. — Gouttes concentrées, sans sucre, chaux, alcool, arsenic, ni strychnine; 20 gouttes = 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie.

Dose. — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson, sans interruption nécessaire jusqu'à effet obtenu.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle même des Tissus nerveux. Aucune contre-indication.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage. Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

NIGÉRINE VINCENT

Charbon médicinal de haut pouvoir adsorbant.

Fixateur par excellence des toxines
et alcaloïdes.

Forme. — Poudre noire sans odeur ni saveur.

Indications. — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

Doses. — 3 cuillerées à café par jour entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillerées à soupe en une ou plusieurs fois.

VINCENT, pharmacien,

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

NISAMELINE de TROUETTE-PERRET

Préparation à base d'extrait de Guaco ; doit être employée « INTUS et EXTRA » — action physiologique, à l'intérieur sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale ; à l'extérieur sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

Indications. — Prurits, Dermatoses, Névralgies.

Traitement interne :

Pilules Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 10 extrait de Guaco). 2 à 5 pilules à chacun des deux repas. Prix : 16 fr.

Sirop Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 20 extrait de Guaco). 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas. Prix au public : 20 fr.

Traitement externe :

Poudre Nisaméline TROUETTE-PERRET. 1/2 flacons ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc. Prix : 16 fr.

Pommade Nisaméline TROUETTE-PERRET. Prix : 10 fr.

En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

Savon Nisaméline TROUETTE-PERRET. Prix : 5 fr.

Pour lavages et soins hygiéniques,

Bien spécifier : **NISAMÉLINE**
« **TROUETTE-PERRET** » pour avoir le véritable Guaco.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, rue des Immeubles-Industriels — PARIS
(XI^e).

NITIUM BUISSON

Bromure de radium suractivé enrichi
en rayonnement alpha.

Crayon.

Traitement des métrites chroniques et hémorragiques.
Curettage médical.

Ovules.

Vaginites, Ulcérations du col.

Pommades.

Pommade A : Dermatoses, Bartholinites, Chancres mous,
Lupus érythémateux, ulcérations diverses, ulcères
variqueux, herpès génital, ulcères de la cornée.

Pommade B : Ulcérations étendues et infectées, ulcères
variqueux rebelles.

Bougie : Urétrites chroniques.

Chaque crayon, ovule, bougie ou tube de pommade
contient 6 microgrammes de bromure de radium
suractivé.

Prix de vente au public : 33 fr

Prix médical : 22 fr. 30

Sous quelque forme que ce soit.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e)

NOCTISEDYL

**Spécifique de l'insomnie relevant de la
douleur ou d'un état nerveux.**

Composition. — Pyramidon, Valériane,
Anémone, Diéthylmalonylurée (0 gr. 25)
Théobromine.

(Procédé spécial de conservation)

Avantages. — Combinaison atoxique très
active. La théobromine assure l'élimi-
nation naturelle de l'hypnogène et res-
pecte le rein.

Posologie. — 1 à 2 cachets au coucher, avec
une infusion.

P. AUGIER, pharmacien.

2, rue des Lombards — PARIS (IV^e).

NOPIRINE VICARIO

Aspirine Phénédine caféinée.

Action antinévralgique plus rapide et plus durable que l'Aspirine.

Mode d'emploi. — Comprimés : 2 à 3 par jour. Granulés : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Indications. — Névralgies rhumatismales. Migraines arthritiques. Céphalées des neurasthéniques. Grippe, etc.

Le tube : 4 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e)

NORMACOL

Mucilage Évacuant
puissant, facile à ingérer, actif.

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermentescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

Action. — Laxatif mécanique.

Augmente le volume du contenu intestinal.

S'oppose à sa dessiccation excessive.

Rend sa surface onctueuse et glissante.

Forme. — Granulé dragéifié très menu.

Dose (moyenne). — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Différentes préparations :

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels).

Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).

Normacol sans sucre : avec bourdaine (diabétiques).

Normacol atropiné : Voir SPASMACOL.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). Tél. Laborde 08-00.

NORMALARINE

Traitement Phytothérapique de la constipation.

Composition :

Sons torréfiés et déshydratés traités selon la technique du professeur H. Salomon, de Buenos-Ayres.

Action :

Augmente le bol fécal, et favorise le péristaltisme intestinal.

Indications :

Constipation — Atonie du tube digestif — Ictères catarrhaux.

Avantages :

Sans aucun laxatif.

Sans accoutumance.

Ne fait pas engraisser.

N'irrite pas l'intestin.

Deux formes :

Paillettes : dose journalière : 2 à 4 cuillérées à soupe par jour, aux repas.

Longuets : dose journalière, 2 à 6 longuets par jour.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

NORMATENSOL BOURET

Composition

Tartrate borico-potassique	1 gramme.
Lactose.....	3 grammes.
Mélange sucro-édulcorant	Q. S.
pour un paquet.	

Effets physiologiques. — Par le *Bore* agit sur la thyroïde (Loeper) et libère la sécrétion interne de cette glande hypotensive (De Cyon), est diurétique et débarrasse l'organisme des produits de déchet. Par le *Potassium* il a des effets modérateurs sur le myocarde et les fibres lisses des vaisseaux (Claude Bernard).

Indications. — Hypertension artérielle, Néphrites chroniques, Céphalées persistantes, Dermatoses dues à une insuffisance de l'épuration urinaire.

Avantages. — Pas de toxicité, pas de contre-indication, parfaitement toléré par le tube digestif.

Mode d'emploi. — 1 paquet le matin à jeun et 1 le soir en se couchant, dans 1/2 verre d'eau froide ou tiède, 12 jours par mois ou 2 périodes de 6 jours.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

NOVACÈTINE PRUNIER

(Saccharure à base de Sulfosalicylate de Pipérazine, Lithine et Soude).

**Antiarthritique énergique
agréable à prendre.**

Indiqué contre les manifestations rhumatismales et gouteuses de l'arthritisme.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à café par jour (suivant les cas et l'avis du médecin), à prendre au moment des repas, dissoutes dans un peu d'eau.

Chaque cuillerée à café contient 0 gr. 30 de sulfosalicylate composé.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

(Ancienne maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin

à l'oxycyanure d'hydrargyre indolore.

Composition. — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 centigr. ; Stovaine : 1 centigr. ; Eau distillée : 1 cm. cube.

Propriétés. — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

Indications. — Accidents syphilitiques.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires tous les 2 jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire 8 à 12 injections et laisser reposer le malade pendant 1 ou 2 semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Prix : 15 francs.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

NOVARSENOBENZOL BILLON

Dioxydiaminoarsénobenzol méthylène
sulfoxylate de soude.

Teneur en arsenic : 20 p. 100.

Donne avec l'eau distillée des solutions *neutres* injectables exclusivement par voie veineuse.

Indications :

Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Posologie et mode d'emploi : — Séries d'injections intraveineuses graduées : 0 gr. 15 à 0 gr. 90. Applications en poudre ou collutoire comme topique local.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

NOVATROPIN

Méthylhomatropine bromide.

Tandis que son action thérapeutique est égale à celle de l'atropine, sa toxicité est 50 fois plus faible.

Indications :

Dyspepsie hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux. Entérite muco-membraneuse.

Forme :

Comprimés : 0,0025 gr.

Mode d'emploi :

Comprimés : 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

Echantillons et Littérature :

31, avenue de St-Mandé à PARIS (XII^e)

P. BASUYAUX, Pharmacien

94, rue Pasteur

FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

NOVIODE

Comprimés dégageant *en solution aqueuse*
0 gr. 025 d'Iode naissant, entièrement
dissous.

Indications thérapeutiques. — Tous usages
de l'iode, Antisepsie générale, Accélération
des cicatrisations, traitement curatif des
plaies infectées, Préparation des champs
opératoires, Chirurgie stomatologique, In-
jections vaginales, Révulsions, Garga-
rismes etc. Stérilisation des eaux et tous
usages internes de l'iode.

Posologie et Mode d'emploi. — Voir notice.
La boîte de 2 tubes de chacun 20 comprimés,
soit 40 comprimés : 12 francs.

Laboratoire SALVOXYL

237, rue Lafayette — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 78-07.

NOVO-BROL

Bouillon bromuré en tablettes, avec addition de lupulin et de phosphates.
(Bromure non spécifié.)

Préparation et marque absolument françaises.

Le Novo-Brol est le *seul produit utilisant* les remarquables *vertus* cal-
mantes du lupulin (extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guil-
laumé et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du
noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications. — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses
et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose. — Verser la valeur d'une tasse d'eau bouil-
lante sur les tablettes de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que
l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habi-
tuelle.

Na Br chim, pur 1 gr. par tablette.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour.

Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour.

Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes (suivant l'âge).

(Enveloppement spécial des tablettes Novo-Brol dans aluminium ou étain
paraffiné — dépôt de garantie.)

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès. — BOULOGNE-SUR-SEINE — PARIS-OUEST
Précédemment : 3, r. de la Source — PARIS (XVI^e). Tél. : Auteuil 11-86

NOVOLACTOL DAGUIN

Forme. — Granulé agréable pour les enfants.

Composition. — Papaïne extractive, Benzo-naphtol, Ferments lactiques, Magnésie hydratée.

Dose. — *Nourrissons* : 3 demi-cuillerées à café délayées dans un peu d'eau dans l'intervalle des tétées.

Enfants de 2 à 3 ans : 3 cuillerées à café dans l'intervalle des repas.

Enfants de 5 à 12 ans : 3 cuillerées à dessert.

Indications. — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons. Intoxication alimentaire.

Etablissements DAGUIN
SAINT-MAUR (Seine).

NOVOLUG

Elixir.

Composition :

Arrhéнал 0,01

Hydraroglyphenoldisulfonate
de soude (hermophényl) 0,20

Sirop aromatisé à la groseille
framboisée Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Syphilis et hérédosyphilis.

Dose :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

3 à 6 ans : 2 cuillerées à café par jour.

6 à 14 ans : 2 cuillerées à café par jour.

14 à 20 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Observation importante. — Produit au goût très agréable. Etiquette discrète présentant le produit comme tonique, dépuratif et reconstituant.

Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

NUCLÉARSITOL ROBIN

Association de la combinaison nucléo-phosphatée avec le méthylarsinate de soude. méthylarsiné.

Comprimés. Ampoules injectables.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 4 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

Indications. — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

NUCLÉASINE

Composition. — Iode, Phosphore, Arsenic organique directement assimilables. Extrait hépatique, Vitamine.

Propriétés. — Excitant du métabolisme général. Reconstituant puissant.

Indications. — Croissance, Amaigrissement, Anémie, Dépression nerveuse, Surmenage, Fatigabilité.

Doses. — Une cuillerée à café à la fin des repas.

Le flacon de granulé : 16 francs.

Laboratoire E. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de glycérophosphates
et d'acide nucléinique.

Granulé : glycérophosphate de chaux et de soude
et acide nucléinique.

Injectable : glycérophosphate de soude pur et
acide nucléinique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 4 à 6 cuil-
lerées-mesures de granulé aux repas ou 1 ou
2 ampoules en injection par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Exaltant de la
Phagocytose, abaisse la température en quelques
heures. Effets analogues à ceux des ferments
métalliques ou des colloïdes.

Indications. — S'emploie dans les convalescences,
les débilités, les cachexies ; provoque la défer-
vescence dans les fièvres infectieuses, puerpé-
rales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi
préventivement dans les opérations chirurgicales.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

NUCLÉIGÈNE

Chevillon

Puissant reconstituant général.

Deux formes :

1° Granulé irradié. — Ergostérine irra-
diée, Vitamine D, Nucléinates Soude et
Manganèse, Glycéro de chaux, Arrhénal,
Ext. de Kola et vanille ; 2 à 4 cuillerées à
café par jour.

Prix : 18 fr.

Prescrire : Nucléigène irradié granulé.

2° Elixir. — Acide nucléinique, Arrhénal,
Glycéros, Muscat, Vanilline.

Prix : 15 fr.

Indications. — Prétuberculose, Tubercu-
lose, Rachitisme, Anémies.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

NUCLÉOPHORINE

Reconstituant, Accélérateur de la Nutrition.

Composition. — Nucléinate de soude, phosphate disodique, Méthylarsinate Na, Maté, Kola, Essence spéciale.

Indications. — Neurasthénie, Lymphatisme, Bronchites chroniques, Convalescence de Grippe et de Maladies infectieuses.

Formes. — Elixir.

Doses :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

NUCLHÉMOSE

Ampoules et granulé au
Nucléinate de Manganèse.

Action. — Hyperleucocytose, Accélération des échanges, Reprise de poids, Augmentation de la résistance organique, Reminéralisation.

Indications. — Anémie, Prétuberculose, Puberté, Paludisme, Chlorose, Déchéances organiques, Leucorrhée, Suite d'hémorragie, Convalescences.

Posologie :

Injectable : une ampoule par jour.

Granulée : trois mesures par jour.

Prix au public : 12 fr. Granulé ou Amp.

LABORATOIRE
DE LA NUCLHÉMOSE

REMY et LECOQ

6, place Clichy — PARIS (IX^e).

NUJOL

Huile de paraffine.

Description. — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

Indications. — Le NUJOL est spécialement indiqué pour le traitement de la constipation. Il est particulièrement recommandé pendant la grossesse et la période d'allaitement. Le NUJOL peut être administré en toute confiance à tous les âges et dans toutes conditions de santé.

Doses. — Pour les adultes : Une cuillerée à bouche soir et matin, à jeun.

Pour les enfants : Une demi-cuillerée à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Dépôt Général :

Société Générale

d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

NUTRO

Lait en poudre Nutricia.

Composition. — Lait en poudre Nutricia, partiellement écrémé, entièrement soluble, préparé spécialement pour l'alimentation infantile, garanti rigoureusement pur.

Avantages. — Contient toutes ses vitamines, digestion facile, préparation instantanée.

Indications. — Gastro-entérites des nourrissons.

Mode d'emploi. — Variable suivant l'âge de l'enfant. Consulter la notice.

Léon CLAEYS

1, Boulevard St-Martin — PARIS (III^e).

Téléphone : Turbigo 92-60.

NUTROBIASE, RAISIN VIVANT

Composition. — Extrait intégral de raisin rouge, concentré, conservé VIVANT : *levures, diastases, vitamines*, etc.

Forme. — Sirupeuse. Fige par refroidissement ; réchauffer légèrement pour ramener la fluidité (+ 30°).

Indications. — Cure de raisin *vivant* :

Enfants : Nutrition (Estomac, Foie, Intestin), Constipation, Entérite, Reins, Débilité post-opératoire, Grossesse, Allaitement, Désintoxication.

Doses. — Toujours dans 4 parties d'eau. Après les repas : *Enfants* (dep. 1 mois) : 1/2 à 2 cuill. à café.

Adultes : 1 à 2 cuillers à dessert.

Constipation : 2 à 4 cuillers à soupe.

(*Se conserve entamé.*)

Prix : Flacon 200 gr., 12 fr. ; litre, 38 fr.

A. KOEHLER, Docteur ès sciences

10, rue Cimarosa — PARIS (XVI^e).

OCRÉINE GRÉMY

Traitement des insuffisances ovariennes
de la puberté à la ménopause.

Formule : Chaque pilule correspond à
0^{gr}, 20 de corps jaune frais.

Existe sous 3 formes pharmaceutiques.

Pilules : 4 à 6 par jour.

Gouttes : 30 à 50 par jour dans un peu
d'eau.

Ampoules : 1 injection intramusculaire
tous les 2 jours pendant la période du
traitement.

Indications :

Permet de réaliser, en association avec
la **Follestrine Grémy** (Voir à ce nom)
le cycle ovarien normal chez les ménopausiques.

Règles rares, peu abondantes, douloureuses, bouffées de chaleur, migraine, obésité, rhumatisme de la ménopause, acrocyanose et toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

CENOPHOS

*Acides hydro-éthylène-phosphoriques.
Reminéralisation phospho-dolomitique.*

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET
de Dijon.

Formes. — Elixir, granulé, gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Neurotonique, reconstituant énergétique : *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux (voir fiche DOLOMA). Médication phosphorique rationnelle.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, *cancers, tuberculose.*

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'Elixir ou 2 cuill. à café de Granulé ou LX gouttes dans un demi-verre d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants* : réduire les doses suivant l'âge. Pour la cure reminéralisante, voir « DOLOMA ».

Prix : La boîte granulé Cenophos. 15 fr.

Le flacon gouttes — 12 fr.

— élixir — 18 fr.

Laboratoire général d'Etudes Biologiques

S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

Téléphone : 16-42.

OËRÉLIODE

Iode de l'Otorhinolaryngologiste.

La plus active et la mieux tolérée des préparations iodées.

Solution huileuse d'Iode d'absolue pureté, *non combiné*, entièrement diffusible à froid.

Huile *violette*, neutre, indolore, non irritante.

Indications. — Rhinites, Affections catarrhales et inflammatoires du nez, Infections et congestions des muqueuses naso-pharyngées, du larynx, des amygdales, otites, otites mycosiques.

Echantillons gratuits sur demande.

Laboratoire BOUVOT

AUVERS-SUR-OISE (S.-et-O.).

OLBIA

Spécifique de la Syphilis.

Solution huileuse de Bismuth.
(Dicamphocarbonate de Bismuth.)

Indications. — Syphilis et parasymphilis.

Formes :

- 1) Ampoules de 2 cc. pour injections intra-musculaires indolores.
- 2) Ampoules de 1 cc., pour injections intra-musculaires indolores.

Posologie :

Adultes : Injecter dans la région fessière une ampoule de 2 cc. tous les 4 jours.

Enfants : Injecter dans la région fessière 1 ampoule de 1 cc. tous les 4 jours.

Etablissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert,
VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis
(Seine).

OLÉOCIDASE

ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAUT

Capsules dosées à 0 gr. 50 d'Acide Oléique pur, extrait de l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Sous un volume très restreint l'*Acide Oléique Paul Thibault* réalise, avec cet rapide et constant, l'action toujours très lente et souvent incertaine attribuée à l'huile d'olive dans la désagrégation des calculs de cholestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholécystites lithiasiques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de Coliques hépatiques, Evacuation des calculs de Cholestérine par désagrégation.

Posologie. — 3 capsules le matin à jeun, 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 3 capsules le soir dans un peu d'eau minérale bicarbonatée ou chlorurée sodique tiède (Vichy, Châtel-Guyon, Vals, etc.).

Nota. — Pour éviter l'emploi d'acides oléiques impurs, prescrire toujours : capsules d'*Oléocidase Paul Thibault*.

Laboratoire R.-J. SOUDAN

Pharmacien de 1^{re} classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,
48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

OLÉOFORMINE CORBIÈRE

Comprimés glutinifiés et dragéifiés.

Composition :

Acide cholique.....	0,05
Oléate de soude anhydre.....	0,20
Hexaméthylènetétramine	0,25

Indications. — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cholécystite, Ictères, Cirrhoses, Insuffisance hépatique, Cholémie familiale.

Mode d'emploi. — Deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours.

Présentation. — En boîtes aluminium de 40 comprimés. Prix : 12 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques
CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).
Téléphone : Carnot 78-11.

OLÉO-MEL

« LE LAXATIF DE RÉGIME »

Gelée de miel à l'huile de paraffine.

Formule. — Huile de paraffine extra neutre à viscosité maxima et spéc. raffinée pour l'usage interne. } P. E.
— Miel surfin premier choix.

Indications. — L'association de ces deux substances réalise une synergie parfaite qui relève, pour le traitement de la **Constipation et des Affections gastro-intestinales**, de toutes les indications et de la posologie même de l'huile de paraffine. **Action mécanique. Innocuité absolue.**

Préparation. — L'Oléo-Mel, préparé par un procédé spécial, se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable; il conserve tout l'arome et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

Laxatif idéal des nourrissons et des personnes délicates.

Prix : 10 francs.

**Laboratoire DELFOUR
à POUILLON (Landes).**

OLÉOVULES

Ovules gynécologiques spécifiques des inflammations du vagin, du col et de l'utérus.

Composition :

Acide picrique : Les Oléovules sont les seuls ovules ayant pu, grâce à leur excipient particulier, utiliser ce puissant agent kératoplastique et microbicide (Travaux de MM. Thiéry, J.-L. Faure, Douay, Donet, etc.).

Sulfostérol : composé organique à la fois décongestionnant et microbicide.

Excipient huileux spécial : Ne coagulant pas sous l'influence de l'acide picrique comme la gélatine et portant par *endosmose* les principes thérapeutiques dans la profondeur des tissus alors que la glycérine, avide d'eau, détermine l'*exosmose*.

Indications :

Infections de toutes natures des voies génitales inférieures. (Blennorragie après la phase aiguë, infections streptococciques post-puerpérales, etc.).

Principalement : Métrites, cervicites, ulcérations et érosions du col, vaginites.

Vaginites ulcérées des femmes âgées, leucorrhée.

Posologie.

2 ou 3 ovules par semaine.

Mode d'emploi. — Mettre l'Oléovule le soir au coucher, si possible après une injection vaginale chaude, le fixer avec un tampon de coton.

La solution de borate de soude enlève facilement la coloration jaune de l'acide picrique si la garniture a été insuffisante.

15 fr. la boîte de 6 Oléovules.

Echantillons et littérature :

Laboratoires S. F. E. A. T.

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

OLIRICIN-HARDY

Huile de ricin
concentrée et solidifiée
sous forme de comprimés dragéifiés.

Associe à l'huile de ricin les propriétés cholagogues et antilithiasiques de l'huile d'olive et de la bile.

Par dragée :

Huile de ricin concentrée et solidifiée.....	0,06
— d'olive	0,18
Bile décholestérinée.....	0,06

Laxatif cholagogue parfait : doux, régulier, sans accoutumance : ne contient aucun drastique dissimulé (scammonée, jalap) et *surtout pas* de phtaléine du phénol ni d'huile de croton.

Posologie. — 1 à 5 comprimés par jour avant ou après le repas, ou le soir avant de se coucher.

Prix : Le tube de 40 dragées : 12 francs
pour 15 à 20 jours de traitement normal.

Laboratoires PAUL HARDY
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V°).
Téléphone : Gobelins 36-96.

OLIVÉOL

Olivéol pilules, 6 par jour.

Olivéol globules, 1 à 2 par jour.

Olivéol gouttes (pour enfants) X à XL
gouttes suivant l'âge.

SPÉCIFIQUE HÉPATIQUE

augmente la sécrétion biliaire,
se retrouve dans la bile hypersecrétée,
dissout le calcul de cholestérine.

Laboratoire de l'OLIVÉOL

Ed. BRUN, Pharmacien de 1^{re} classe
Ancien interne des Hôpitaux de Lyon
TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône).

OLKALAN

Composition :

Borate de soude, Huile d'Olive stérilisée,
Eau de chaux, Lanoline.

Trois présentations : OLKALAN SIMPLE,
OLKALAN SALICYLIQUE, OLKALAN
RESORCINE.

Tubes de pommade.

A employer dans toutes les irritations de l'épiderme : Eczémas, Brûlures, Rougeurs des Nouveau-Nés, Prurit, etc...

Le tube : 6 fr.

Laboratoires SERRE

7, place Pey Berland.

BORDEAUX (Gironde).

ONCTION ANGELINI

Guérison de la Gale

Sans bains.

Sans frotte — En une seule application.

Adoptée par la Marine nationale.

Traitement des maladies rebelles de la peau.

L'Onction Angelini est en usage permanent dans les hôpitaux maritimes de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Sainte-Anne à Toulon.

Se trouve dans les pharmacies
de Hanoï et Saïgon.

Prix au public : 10 francs.

Angelini, pharmacien

61, rue de Seine, PARIS.

Tél. : Danton 92-73.

OPHTALMINE

Indic. therap. — Antisepsie oculaire. Arrêt de la cataracte, par deshydratation du milieu oculaire. Conjonctivites, Blépharites, Presbytie prématurée, etc..., etc.

Doses et Mode d'emploi. — Pomade, deux applications par jour.

Prix de vente au public : 10 francs.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE

62, rue de la Tour
PARIS (XVI^e).

OPOBYL

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n^o 363-3.

Forme. — Dragées.

Composition. — Extrait hépatique, Sels biliaires, Boldo et Combretum.

Propriétés pharmacodynamiques. — Cholagogue, Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques, Décongestif du foie et des intestins.

Indications. — Hépatites. — Ictères. — Cholécystites. — Lithiase biliaire. — Entérocolites, Constipation chronique. — Dyspepsie gastro-intestinale.

Mode d'emploi. — 1 à 2 dragées au début ou à la fin des repas, 2 ou 3 fois par jour.

■ L'étui : 12 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

OPOCALCIUM du Dr GUERSANT

Reminéralisation — Polyopothérapie.

Composition. — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde, surrénale, thymus, hypophyse, (ce dernier dans le granulé seulement), associés au fluorure, phosphate, glycéro-phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

Formes. — Cachets, comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

Propriétés thérapeutiques. — La décalcification et d'une façon générale la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour recalcifier et reminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormo-stimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés, 3 cuillerées à dessert de granulé, 2 à 3 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre.

OPOCALCIUM ARSÉNIÉ (avec un centigramme de méthylarsinate disodique), une seule forme : cachets.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

OPOCALCIUM GAIACOLÉ (avec sulfo-gaiacolate de potasse), antiseptisme pulmonaire et reminéralisation associées.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

OPOCALCIUM IRRADIÉ (voir plus loin).

OPOFERRINE (avec fer organique et extraits organiques).

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 4 comprimés par jour.

Laboratoires de L'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie
121, avenue Gambetta — PARIS (XX^e).

Tél. : Ménilmontant 62-80, 62-81 et 62-82.

OPOCALCIUM IRRADIÉ **du D^r GUERSANT**

Composition :

Ergostérine activée par les rayons ultraviolets (Vitamine D), associée au Complexe endocrino-minéral de l'Opocalcium.

Formes :

Cachets, Comprimés, Granulé.

Propriétés thérapeutiques :

L'*Opocalcium irradié* ajoute aux principes de *Reminéralisation intégrale* les propriétés centuplées de l'huile de foie de morue.

Indications :

Rachitisme, Croissance, Carence, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

Doses journalières et mode d'emploi :

Cachets : *Adultes* : 3.

Comprimés : *Adultes* : 6.

Granulé : *Adultes* : 3 cuillerées à dessert.

Enfants jusqu'à 10 ans : 3 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de l'OPOLCACIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie,
121, avenue Gambetta — PARIS (XX^e).
Tél. : Ménilmontant 62-80, 62-81 et 62-82.

OPOCHLORINE

Composition. — Complexe de chloramine, de sels biliaires purifiés, de secrétine et de charbon végétal.

Mode d'action. — Désinfectant intestinal.

Indications. — Dyspepsies intestinales, tympanisme, entérocolite muco-membraneuse, lithiase intestinale, coliques hépatiques, ictère, cholémie, constipation, entérite des enfants avec selles fétides.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne. — PARIS

OPOCHOL

Composition :

Oléate de soude, Bile dépigmentée et décholestérinée, Extrait hépatique, Extrait de Boldo, Extrait de Kinkélibah.

Forme pharmaceutique :

Comprimés dragéifiés glutinisés.

Indications thérapeutiques majeures :

Affections hépatico-biliaires. — Hépatites, Cirrhoses, Petite insuffisance hépatique, Cholémie simple familiale de Gilbert et Lereboullet, Lithiase biliaire, Angiocholite, Coliques vésiculaires, Cholécystites médicales, Ictères.

Affections intestinales. — Constipation par insuffisance de chasse biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.

Indications thérapeutiques secondaires :

Maladies de la nutrition. — Diabète par hypohépatie, Goutte, Obésité, Arthritisme, Hépatisme de Roger Glénard, Etats hypercholestérinémiques.

Affections de l'appareil circulatoire avec participation du foie. — Foie cardiaque, Syndrome d'hypertension portale, Varices et Hémorroïdes des hépatiques, hémophilie, certaines Anémies.

Infections. Intoxications.

Neuro-psychiatrie. — Psychasthénie avec signes hépatiques, Mélancolie anxieuse présénile, dépression avec troubles hépatiques.

Mode d'emploi :

A. *En période de crise.* — 4 comprimés par 24 heures, 2 comprimés au moment des repas de midi et du soir.

B. *Dans l'intervalle des crises.* — 2 comprimés par 24 heures, 1 comprimé à midi et un autre le soir aux repas.

Incompatibilités :

Aucune incompatibilité.

Prescrire :

Opochol : comprimés, 1 flacon.

Prix, le flacon de 50 comprimés : 15 francs.

Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe BEAUVAIS (Oise). Tél. : 4-84.

Echantillons et littérature à la disposition
de MM. les Docteurs.

OPOCOBALT

(Granulé)

Composition. — Phosphate, glycérophosphate et fluorure de calcium, glycérophosphate de magnésie, méthylarsinate de sodium, protoxalate de fer, nucléinate de manganèse, extraits endocriniens (parathyroïdine, surrénine, thymusine, médulline, orchitine) vitamine B (levure de bière) catalyseurs (sels de Cobalt, zinc, nickel) suivant travaux de G. Bertrand et Machebœuf.

Indications. — Anémies, surmenage, bronchites chroniques, pré tuberculose, affections dentaires, osseuses ou ganglionnaires; neurasthénie et affections nerveuses, phosphaturie, maladies infectieuses, convalescences, grossesse, allaitement, croissance difficile, etc., etc.,

Mode d'emploi. — *Enfants* : de 1/4 à 1 cuillerée à café; *adultes* : de 2 à 3 cuillerées à café avant chacun des 2 principaux repas.

D'un goût très agréable, peut être croqué. La non toxicité absolue d'Opocobalt permet de l'utiliser chez les jeunes enfants et même chez les nourrissons, sans crainte d'intolérance ou de contre-indication.

Laboratoires du Docteur E. GAUCHON

Pharmacien de 1^{re} classe.

83, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

OPODERMYL

Onguent cutané opothérapique.

Composition. — Extraits embryonnaires, albumoses et sérum hémopoïétique — tous principes actifs de la régénération cutanée.

Mode d'emploi. — Application permanente en couche épaisse renouvelée aussi souvent que possible.

Propriétés thérapeutiques. — Agent spécifique de l'épidermisation en toutes circonstances.

Indications. — Toutes dermatoses, même aiguës, eczéma, prurigos excoriés, érythème fessier, crevasses du sein. Toutes plaies par brûlures caustiques, pertes de substance chirurgicales ou diathésiques.

Prix au public : 12 francs.

J. BENSIMON

36, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

OPOFERRINE VITAMINÉE

Composition. — Association des Peptonates de fer et de manganèse, à l'extrait hépatique (Méthode de Whipple) et à l'extrait splénique, en présence des Vitamines A (Carotène) et C (Chlorophylle), qui commandent le métabolisme du fer.

Action. — Le plus complet et le plus puissant agent de régénération sanguine.

Indications. — Anémies pernicieuses, anémies de toutes natures (post-hémorragiques, infectieuses, parasitaires, toxiques, cancéreuses, de l'enfance, etc...), la chlorose, les altérations et les affections sanguines les malades hémorragipares, les déficiences spléno-hépatiques, les états post-opératoires, la convalescence, la puberté, le surmenage, les intoxications (saturnisme, oxyde de carbone, alimentaires, etc...), l'hypotension, l'amaigrissement.

Forme. — Granulé.

Doses journalières. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café. A prendre au début des repas.

Aucune action toxique. Peut être prescrit aux jeunes enfants.

Laboratoires de l'Opocalcium.

A. RANSON, Docteur en Pharmacie

121, avenue Gambetta — PARIS

Tél. : Ménilmontant 62-80, 62-81, 62-82.

OPONUCLYL IRRADIÉ TROUETTE-PERRET

Catalyseur fixant le Phosphore et le Calcium.
Vitamine D.

Médication synergique organo-minérale.

Composition. — Lipoïdes médullaires et spléniques, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de manganèse et de fer, Algostérine irradiée.

Indications. — Anémie, Chlorose, Convalescence, Croissance, Surmenage, Neurasthénie, Lymphatisme, Tuberculose.

Doses. — *Adultes* : 2 sphérules à chaque repas.

Enfants : 1 sphérule à chaque repas.

Prix au public : 16 francs.

Littérature et Echantillons :

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, rue des Immeubles-Industriels,
PARIS (XI^e).

OPOPHYTOL

Opothérapie, Phytothérapie et Chimiothérapie associées.

Forme. — Granulé irradié.

Composition. — Extraits hémopoéthériques (hémocristalline, ovarine, orchitine, thyroïdine, surrénine, hypophysine). Phytosphosphine (phosphate de magnésium et de calcium directement assimilables-vitamines B et E), sels minéraux catalyseurs (iode, arsénal, manganèse), ergostérol irradié (vitamine D).

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant de la nutrition polyvitaminée. Reminéralisateur.

Indications. — Rachitisme, Lymphatisme, Fractures, Caries dentaires, Grossesse, Allaitement, Suites de couches, Anémies, Neurasthénie, Convalescences, Phosphaturie et tous états de déminéralisation.

Posologie. — *Doses journalières :*

De 1 à 3 ans : une demi-cuillerée à café.

De 3 à 7 ans : une cuillerée à café.

De 7 à 15 ans : une cuillerée à dessert.

Adultes : une cuillerée à soupe.

L'OPOPHYTOL se prend à croquer de préférence au repas de midi.

Laboratoire du D^r TESTART
CHALAIS (Charente).

OPOSÉRUM

Opothérapie, Sérothérapie et Chimiothérapie associées.

Forme. — Sirop.

Composition. — Extraits opothériques (orchitine, ovarine, thyroïdine), sérum d'équidés en régénération globulaire, sels minéraux (iode assimilable, manganèse, magnésium, phosphore, arsénal, calcium).

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant cellulaire. Agent d'hémopoïèse.

Indications. — Anorexies, Anémies, Amaigrissement, Asthénie, Sénilité précoce, Troubles de la puberté et de la ménopause, Convalescences.

Posologie. — *Doses journalières :*

De 1 à 3 ans, une demi-cuillerée à café.

De 3 à 7 ans : une cuillerée à café.

De 7 à 15 ans : une cuillerée à dessert.

Adultes : une cuillerée à soupe.

L'OPOSERUM se prend de préférence au repas de midi.

Laboratoire du D^r TESTART
CHALAIS (Charente).

OPOSYNERGINES

Formes. — Comprimés, Gouttes, Granulés.

Formule F. et M.

Composition. — Synergie endocrino-minérale.

Indications. — Troubles de la croissance, dystrophie infantile, enfants retardés dès la naissance, soit au point de vue du poids, de la taille, de l'état mental, de la parole, etc... Rachitisme, chlorose de la puberté, atrophie polyglandulaire précoce, tous les états d'asthénie, impuissance, migraines par insuffisance thyroïdienne, maladie de Der-cum et du système endocrinien, séquelles de la vieillesse, frilosité, ostéomalacie, cancer.

Mode d'emploi. — 1 à 8 comprimés par jour.
V à XL gouttes, 1/2 à 4 cuillerées à café de granulés par jour.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne — PARIS

OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés sous un vide profond vers 0° et présentés en comprimés dragéifiés à froid permettant une conservation indéfinie.

Thyroidine Bouty	{ 0 gr. 10 de corps thyroïde desséché par dragée. }	Obésité. Myxœdème.
Oviginine Bouty	{ 0 gr. 12 d'ovaires desséchés par dragée. }	Ménopause naturelle ou artificielle.
Séquardine Bouty	{ 0 gr. 10 de testicule desséché par dragée. }	Insuffisance gonique.
Hépatine Bouty	{ 0 gr. 30 de foie desséché par dragée. }	Cirrhose, Ictère, Diabète.
Surrénaline Bouty	{ 0 gr. 10 de capsules surré- nales desséchées par dragée. }	Basedowisme, Addisonisme.
Néphrine Bouty	{ 0 gr. 15 de rein desséché par dragée. }	Néphrite.
Biliol Bouty	{ Extrait concentré de bile de porc en dragées kératini- sées. }	Ictère, lithiase biliaire, etc.
Gastrozymase Bouty	{ Comprimés effervescents de suc gastrique de porc. }	Dyspepsie, em- baras gastrique.
Liqueur à la thyroïdine	{ Indication infantile, 1 cuillerée à café — 0 gr. 02 de thy- roïde desséchée }	Myxœdème.

ASSOCIATIONS PLURIGLANDULAIRES

Triglandine Bouty	{ Chaque dragée contient Corps thyroïde desséché..... 0 gr. 08 Hypophyse..... 0 gr. 05 Ovaire 0 gr. 10 }	Sexe féminin.
Triglandol Bouty	{ Chaque dragée contient Corps thyroïde desséché..... 0 gr. 08 Hypophyse desséchée 0 gr. 05 Testicule desséché. 0 gr. 10 }	Sexe masculin.

Tous les produits opothérapiques ci-dessus sont également présentés en ampoules de 1 centimètre cube et de 3 centimètres cubes.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél.: Nord 32-52 (2 lignes).

OPOTHÉRAPIE BYLA

Cachets OPO - Glandules - Exolysés - Ampoules ISO

Formule

MÉDICATION ASSOCIÉE

1	Hypophysine. 0.10 Orchitine. . . 0.60	Myxœdème. Troubles endocriniens.
2	Hypophysine. 0.10 Ovarine. . . . 0.20	Troubles de la ménopause et insuffisances glandulaires.
3	Orchitine. . . 0.60 Thyroidine. . 0.025	Myxœdème. Insuffisances glandulaires.
4	Ovarine. . . . 0.20 Thyroidine. . 0.025	Insuffisances thyroïdienne et ovarienne.
5	Surrénine. . . 0.10 Hypophysine. 0.10	Asthme essentiel. Myasthénies, Insuffisances surrénales, Basedowisme.
6	Surrénine. . . 0.10 Thyroidine. . 0.025	Retards de croissance.
7	Hypophysine. 0.10 Thyroidine. . 0.025	Syndromes pluri-glandulaires, Sclérose, Obésité.
8	Surrénine. . . 0.15 Hypophysine. 0.05 Thyroidine. . 0.025	Asthme essentiel. Myasthénies. Insuffisances surrénales, Maladie d'Addison.
8 bis	Ovarine. . . . 0.15 Surrénine. . . 0.05 Hypophysine. 0.05	Insuffisances glandulaires. Troubles de la puberté et de la ménopause. Syndromes adiposo-génitaux.
9	Hypophysine. 0.05 Ovarine. . . . 0.20 Thyroidine. . 0.025	Troubles de la ménopause Syndromes adiposo-génitaux.
9 bis	Ovarine. . . . 0.20 Surrénine. . . 0.05 Thyroidine. . 0.025	Troubles de la puberté et de la ménopause. Syndromes adiposo-génitaux.
10	Hypophysine. 0.05 Orchitine. . . 0.60 Thyroidine. . 0.025	Développement tardif. Myxœdème. Insuffisances glandulaires.
11	Hypophysine. 0.05 Thyroidine. . 0.025 Surrénine. . . 0.05 Orchitine. . . 0.10	Infantilisme masculin. Insuffisances glandulaires.
12	Hypophysine. 0.05 Thyroidine. . 0.025 Surrénine. . . 0.05 Ovarine. . . . 0.10	Troubles de la puberté et de la ménopause.

MÉDICATION PANGLANDULAIRE

contenant toutes les glandes en proportion normale.

PANGLANDULAIRES BYLA: Masculins, Féminins, Infantiles.

Exécution de toute formule sur ordonnance médicale.

Échantillons et Littérature:

Les Établissements BYLA, 26, avenue de l'Observatoire, Paris.

OPOTHÉRAPIE BYLA

Nouvelles présentations brevetées.

SANS ODEUR, CONSERVATION INDÉFINIE,
CONSTANCE D'ACTIVITÉ

1° **Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyme, deux comprimés concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipide correspondant (procédé breveté).

Posologie. — Uniforme pour tous les Opos : 2 à 4 par jour.

Prescrire OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° Les **« EXO » BYLA**, sucs totaux inaltérables, préparés par exolyse des organes frais, et aromatisés (procédé breveté).

Prescrire : EXO-THYROIDINE BYLA, etc.

Posologie. — Uniforme pour tous les Exos : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

3° Les **GLANDULES BYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter toute odeur.
Conservation indéfinie.

Prescrire : GLANDULES DE SURRENINE BYLA.

Posologie. — (4 à 8 par jour).

4° Les **AMPOULES BYLA** : préparées à partir des ORGANES FRAIS ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 1 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire : AMPOULES D'HEPATINE BYLA, etc.

Pour les doses massives : AMPOULES « ISO » BYLA de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire : AMPOULES ISO REIN BYLA, etc.,

Posologie. — 1 ampoule tous les 2 jours.

*Opothérapie simple, pluriglandulaire et
panglandulaire.*

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e)

OPOTHÉRAPIE CARRION

1° POUDRES OPOTHERAPIQUES

Les poudres opothérapiques CARRION renferment inaltérées chimiquement les substances spécifiques contenues dans les organes frais.

Formes. — Elles se présentent, soit sous la forme de cachets, soit sous la forme de comprimés. Mais nous recommandons plus spécialement la forme comprimés, car elle préserve mieux la poudre contre les altérations possibles.

Doses. — La posologie se trouve très simplifiée, car nos *cachets* ou *comprimés* sont dosés de telle manière que le médecin peut prescrire 2 à 3 *cachets* ou *comprimés* par jour (un par repas).

Liste des principales *poudres opothérapiques* :

Corps jaune, Fiel de Bœuf, Foie, Glande mammaire, Hypophyse, Moelle osseuse, Orchitique, Ovaire, Parathyroïde, Rate, Substance grise

2° DRAGÉES PLURIGLANDULAIRES

Forme — Nous présentons dix formules de mélanges pluriglandulaires sous forme de dragées, mais nous pouvons, pour répondre à certaines indications opothérapiques complexes, préparer sur demande des cachets de toutes compositions.

Liste des 10 préparations

T. O. S. H. — *T. A. S. H.* — *T. O. H.* — *T. O. S.* — *O. S. H.* — *S. H.* — *T. A.* — *T. O.* — *O. M.*

T. (Thyroïde). — *A.* (Testicule). — *O.* (Ovaire). — *H.* (Hypophyse). — *S.* (Surrénale). — *M.* (Mammaire).

Les formules les plus courantes sont *T.O.S.H.* ou *T.O.* (sexe féminin). *T. A. S. H.* ou *T. A.* (sexe masculin).

3° EXTRAITS INJECTABLES

Les *extraits injectables* sont en solution aqueuse et désalbuminés.

Forme. — Ampoules de 2 cc. Chaque ampoule correspondant à 0 gr. 10 de poudre opothérapique (sauf pour la Parathyroïde et le lobe postérieur d'Hypophyse).

Posologie. — Une ampoule de 2 cc. tous les jours ou tous les deux jours. La liste de ces extraits injectables est la même que celle des poudres.

4° PER-EXTRAITS INJECTABLES

Nos préparations de *Per-Extraits* sont faites d'après une technique nouvelle en opérant sur les organes frais prélevés au moment de l'abattage; ils sont totalement désalbuminés.

Forme. — Ampoules de 2 cc. Chaque ampoule correspond à 1 gr. de produit frais.

Posologie. — La posologie des *Per-Extraits* est exactement semblable à celle des extraits injectables.

5° EXTRAIT INJECTABLE DE LOBE POSTÉRIEUR d'HYPOPHYSE

Nous avons deux dosages en unités internationales, pour cet extrait spécial :

Rétropituine N° 2 (deux unités internationales) pour accouchements.

Rétropituine N° 10 (dix unités internationales) pour autres usages.

Laboratoire de Biologie Appliquée.

H. CARRION et Cie, V. BORRIEN, docteur en Pharmacie.

54, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

OPOTHÉRAPIE CHOAY

I. LES EXTRAITS TOTAUX CHOAY sont des poudres d'organes (Codex) préparées à froid (0°) et dans le vide profond, de propriétés pharmacodynamiques équivalentes à celles des pulpes fraîches correspondantes.

Formes pharmaceutiques. — *Cachets* et *Comprimés* présentés en tubes hermétiques.

Posologie moyenne. — 4 à 6 jour.

Nomenclature et dosage des produits les plus couramment utilisés.

Cachets et comprimés : Hépatiques	25 et 50 cgr.
Hypophysaires.....	5 et 10 —
Mammaires.....	25 et 50 —
Orchitiques (ou androïques)...	25 et 50 —
Ovariens.....	10, 20 et 50 —
Pancréatiques	25 et 50 —
Spléniques.....	25 et 50 —
Surrénaux.....	10 et 20 —
Thyroïdiens..	1 et 5 mgr., 1, 2, 5 et 10 —

Prix : De 12 à 20 fr. la boîte de 24 à 40 cachets ou comprimés suivant dosage.

II. LES EXTRAITS INJECTABLES CHOAY sont des solutions aqueuses, désalbuminées, stérilisées et sensiblement isotoniques.

Formes pharmaceutiques. — Ampoules de 1 à 10 cc.

Nomenclature et posologie des solutions les plus utilisées :

Ampoules hépatiques.....	1, 2 et 5 cc.,	1 tous les jours.
— hypophysaires (glande totale).....	2 cc.,.....	1 tous les 2 jours
Ampoules hypophysaires (lobe antérieur).....	2 cc.....	—
Ampoules hypophysaires (lobe postérieur).....	Voir « Post-Hypophyse Choay ».	
Ampoules mammaires.....	2 cc.....	1 tous les 2 jours.
— orchitiques.....	2 cc.....	—
— ovariennes	2 cc.....	—
— spléniques.....	2 et 5 cc.....	—
— surrénales.....	1 c.,.....	—
— thyroïdiennes.....	1 c.....	—

Prix :

Boîtes de 6 ampoules : de 12 à 30 fr.

Boîtes de 12 ampoules : de 25 à 35 fr.

OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE : Sincrines Choay (Voir ce mot).

Laboratoire CHOAY

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI°).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

OPOTHÉRAPIE du D^r FRAYSSE

(Associations)

THYRODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant : ovaire 0,10, thyroïde 0,025.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 pastilles par jour.

Indications. — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc.

Prix : 20 francs.

NEURODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant, orchitine 0,20, substance grise, 0, 10.

Doses. — *Adultes* : 4 pastilles par jour.

Indications. — Épuisement nerveux sous toutes ses formes. — Impuissance sexuelle, surmenage. — Infantilisme, etc.

Prix : 20 francs.

PLACENTODOSE. — Granulés chocolatés de Placenta et de mammaire.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Flaccidité utérine. — Métrorragies. — Insuffisance lactée. — Flaccidité et atrophie des seins. — Métrite. — Tumeurs. — Fibromes, etc.

Prix : 20 francs.

SPLENODOSE. — Granulés chocolatés de Rate. — Foie. — Thyroïde. — Hémoglobine osséine.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Déminéralisation. — Maladies du Foie et de la Rate. — Chlorose. — Anémie. — Maladies infectieuses. — Paludisme, etc.

Prix : 20 francs.

Laboratoire du D^r FRAYSSE

47, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél : 1288.

Notices et échantillons sur demande.

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux préparés à froid dans le vide.

Endocrisines.

Forme. — 1^o *Cachets et comprimés* :

Doses usuelles toutes préparées. — Thyroïde, 0,025 mgr., 0,10 cgr. ; ovaire, 0,10 cgr. ; orchitine, 0,20 cgr. ; surrénale, 0,10 cgr. ; hypophyse, 0,10 cgr. ; foie, 0,50 cgr. ; reins, 0, 25 cgr.

Cachets pluri-glandulaires.

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Troubles de croissance, infantilisme, arriération.

2^o *Ampoules* :

Thyroïde, Ovaire, Surrénale, Hypophyse, Orchitine, Rate. — Association hyposurrénale, Asthme. — Hypophyse lobe postérieur, usage obstétrical (dite **Physocrisine**).

Formuler : **Endocrisines-glande Fournier.**

Solution de foie (en ampoules buvables), amp. de 10 cc. correspondant à 150 gr. de foie par ampoule (méthode de Whipple)

Solution de Rate (ampoules injectables) de 3 cc. Méthode Thomas Paul. Affections eczémateuses et prurigineuses.

Formuler : **Splenocrisine.**

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS.

« OPOTHÉRAPIE MONCOUR »

En sphérulines, pilules inaltérables et toujours solubles grâce à leur enrobage spécial. A tous extraits totaux d'organes desséchés à froid, dans le vide profond.

Dosages :

(suivant extraits) 10 centigr. et 20 centigr.

Posologie :

1 à 6 par jour, sauf hépatiques et rénales,
1 à 16.

SPHÉRULINES SYNERGIQUES

(associations opothérapiques.)

Thyro-ovariennes, Thyro-orchitiques,
Thyro-surrénales, Hypophyso-ovariennes,
Surréno-ovariennes, Surréno-orchitiques,
Surréno-hypophysaires, Entéro-pancréa-
tiques, Thyro-surréno-ovariennes, Hypo-
physo-surréno-Thyroïdiennes, - Hypophy-
so-surréno-ovariennes, - Hypophyso-ovaro-
thyroïdiennes, - Hypophyso-thyro-surré-
no-ovariennes, - Hypophyso-thyro-surré-
no-orchitiques.

Posologie. — 1 à 6 par jour.

NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Préparées de suite après demande médi-
cale. Préparations datées. Tous organes,
dosages et associations. Renseignements
sur demande.

Laboratoire « MONCOUR »

49, avenue Victor-Hugo
BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine).

Téléphone : Molitor 08-47.

OPOTHÉRAPIQUES PELLISSIER

Leur doctrine : Clarté, Simplicité, Loyauté.

Le procédé Pellissier utilisé pour la fabrication des produits opothérapiques est breveté. Il a fait l'objet de communications à l'Académie des Sciences le 21 mars 1921, à l'Académie de Médecine le 15 mai 1923, à la Société de Pathologie Comparée le 11 novembre 1924.

Les appareils de fabrication sont les plus puissants qui existent dans le monde et les poudres d'organes qu'ils permettent d'obtenir, sans aucun dégraissage, sont d'une activité incomparable, d'ailleurs reconnue et de conservation indéfinie.

Deux formes pharmaceutiques :

Pour les *adultes*, le cachet et le suppositoire (Opositoire).

Pour les *jeunes enfants*, le suppositoire (Opositoire).

Exemple de prescription pour les adultes :

Ovaire Pellissier, cachets à 0,25 cgr., 1 boîte.

Glande mammaire Pellissier, cachets à 0,50 cgr., 1 boîte.

Pancréas Pellissier, cachets à 0,25 cgr., 1 boîte, etc...

Opositoires Pellissier de Prostate, à 0,25 cgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'ovaire, à 0,25 cgr., 1 boîte, etc...

Exemple de prescription pour les enfants :

Opositoires Pellissier de thyroïde, 1 milligr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'hypophyse, à 0,05 cgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier de surrénale, à 0,05 cgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier de thymus, à 0,25 cgr., 1 boîte, etc...

Organe scientifique bi-mensuel, les *Consultations opothérapiques*.

Les demander, par simple carte, pour en obtenir le service régulier.

Les **Laboratoires PELLISSIER** ont introduit également dans la thérapeutique :

Les Comprimés de Silicate de soude Pellissier, à 0,25 cgr.

Les Ampoules de Silicate de soude Pellissier, pour l'injection intraveineuse, pour le traitement de l'artériosclérose. Communication à l'Académie des Sciences (17 août 1920).

Laboratoires PELLISSIER

33, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Wagram 14-59.

Usine, 18, Grande-Rue — ASNIÈRES (Seine).

OPO-VACUOLINE et VACUOLINE-EMULSION

Traitement de la Constipation.

L'association de ces deux préparations constitue une médication rationnelle de la constipation et s'adresse à tous les cas.

1° L'une est active : **Opo-Vacuoline** (suc intestinal associé à une émulsion d'huile de paraffine et d'agar-agar).

Indications. — Constipation chronique ou aiguë, Insuffisance duodénale.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café au milieu des repas.

Prix du flacon : 18 francs.

2° L'autre, émolliente : **Vacuoline-Emulsion** (huile de paraffine émulsionnée à des algues marines, sans laxatif, sans drastique).

Action purement mécanique.

Rééducation intestinale rapide sans irriter.

Indications. — Constipation, Entérite, etc. Préparation excellente pour enfants et nourrissons, recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à soupe au milieu des repas.

Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoires DECHOSAL

39, rue de la Gare — BONDY (Seine).

OPOZONES LUMIÈRE

Organothérapie moderne.

Médication des Troubles endocriniens.

Constitution. — Totalité des principes actifs des organes glandulaires frais, éléments chimiques, ferments organiques, albuminoïdes.

Propriétés. — Les dragées d'OPOZONES LUMIÈRE sont obtenues :
1° Sans déshydratation vraie, par un procédé de pseudo-dessiccation qui dissimule l'eau et tous les liquides de constitution en des complexes cristallins. De ce fait les OPOZONES LUMIÈRE sont les plus actifs des médicaments opothérapiques s'administrant par voie buccale. Il est, en effet, avéré qu'un organe qui a perdu 60 p. 100 de son eau de constitution est devenu inactif.

2° Avec rapidité (inégalisée par tout autre procédé), d'où il résulte que les pollutions et les phénomènes d'autolyse n'ont pas le temps de se produire.

3° La mise immédiate sous forme de dragées glutinisées et vernies protège les OPOZONES LUMIÈRE contre toute désintégration spontanée, toute oxydation, toute hydrolyse ultérieures et contre l'action destructive d'une attaque brutale par les sucs digestifs.

Les OPOZONES LUMIÈRE, même préparées depuis fort longtemps, demeurent inodores. *Ouvrez une dragée, son contenu n'a pas d'odeur.*

Doses courantes. — Commencer avec une dragée par jour en augmentant graduellement.

Formuler. — Une boîte de 54 dragées d'OPOZONES LUMIÈRE, en spécifiant l'extrait désiré.

LABORATOIRES LUMIÈRE.

23, Cours de la Liberté — LYON.

OPSOMYL

Sérum osmolytique.

Pour le drainage physiologique du corps vitré et des cavités lymphatiques de l'œil.

Constitution. — Solution chlorurée hypertonique dioninée.

Mode d'action.

a. Action osmotique par solution hypertonique de NaCl.

b. Action dialytique par la dionine.

Présentations. — OPSOMYL A. Pour l'usage courant.

OPSOMYL B. Solution plus concentrée pour les décollements rétinien.

Indications. — Drainage de la cavité de l'œil, quelle que soit la nature de l'exsudat : hémorragies, choroïdites, hyalites, traitement du décollement rétinien (préventif ou curatif). Compressions, névrites optiques, myopie progressive etc...

Mode d'emploi. — Injections sous-conjonctivales, intraténoniennes, rétrobulbaires.

Une à deux injections par semaine, pendant trois semaines (6 injections) avec intervalle de repos d'un mois entre les séries.

Myopie maligne, 24 injections par an en 4 séries.

Laboratoires **ROBERT et CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

OPTALIDON « SANDOZ »

Forme et composition. — Comprimés dragéifiés renfermant : Isobutylallylmalonylurée, 0 gr. 050 ; Diméthylaminophénazone, 0 gr. 125 ; Caféine, 0 gr. 025.

Propriétés. — Association *antinévralgique*, sédative et hypnagogue. Apaise la douleur sans stupéfier. Aucun danger d'accoutumance. Bien toléré par les estomacs les plus délicats. Laisse et restitue au malade toute faculté de s'occuper, de travailler ou de se distraire.

Indications. — Toutes douleurs, insomnies douloureuses.

Posologie. — Dose antinévralgique : commencer par 2 dragées prises à la fois et continuer, s'il y a lieu, par 1 dragée, de 1/2 heure en 1/2 heure. Au maximum 8 dragées par jour. Dose hypnagogue dans l'insomnie douloureuse : 2 à 4 dragées 1/2 heure avant le coucher.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour, à partir de 5 ans.

Présentation. — Tubes en aluminium de 10 dragées. Flacons de 25, de 100 et de 250 dragées.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e).

Dépôt général et Vente :

Usine des Pharmaciens de France
129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

Bain oculaire

OPTRAEX (Famel)

Nouvelle formule médicale pour le traitement des états inflammatoires des yeux et de leurs annexes.

Composition : pour 100 grammes.

Extrait de <i>Potentilla Tormentilla</i>	0 gr. 50
Extrait de <i>Polygonum Bistorta</i>	0 gr. 50
Extrait d' <i>Erigeron canadensis</i>	0 gr. 50
Extrait d' <i>Euphrasia officinalis</i>	0 gr. 50
Extrait d' <i>Hamamelis Virginica</i>	0 gr. 50
Acide borique 1 gr.	Salicylate de soude.. 0 gr. 08
Borate de soude 2 gr.	Sulfate de zinc..... 0 gr. 10
Eau distillée d' <i>Hamamelis Virginica</i>	25 gr.

Propriétés. — Décongestif, hémostatique, bactéricide oculaire, inoffensif, sans aucun toxique ni contre-indications.

Indications. — Tous les cas de congestion ou inflammation de la conjonctive et des paupières, des voies lacrymales ; blépharites, orgelets, conjonctivites rebelles, etc...

Préventif pendant les maladies infectieuses.

Recommandé aux porteurs de verres, yeux faibles ou fatigués.

Mode d'emploi. — Deux à trois bains d'yeux par jour.

Prix du flacon : 12 fr. 75. Prix du double flacon : 21 fr. 20

Laboratoire P. FAMEL

16-22, rue des Orteaux — PARIS (XX^e)

ORARGOL AMICROS

Anti-Infectieux Général.

ORARGOL INJECTABLE (0,05 %). AMPOULES

Boîte de 6 amp. 5 cc. : 22 fr. Tube de 1 amp.
10 cc. : 7 fr. 50.

Septicémies, Grippe, Fièvres, Traitement pré et post-opératoire.

Posologie. — 5 à 20 cc. intramusculaire ou intraveineux tous les jours ou tous les deux jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. En injection dès le début d'une infection seul ou combiné à la vaccinothérapie ou à la sérothérapie.

ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 %).

GOUTTES: — Flacon de 60 gr. : 22 francs.

Grippes, Fièvres, Thérapeutique infantile.

Posologie. — XX à C gouttes par jour en plusieurs fois dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire sans inconvénient.

Rhino-Orargol. — Fl. 20 gr. : 15 francs.
(Compte-gouttes et instillateur nasal.)

IV à V gouttes en instillations nasales.

X à XV gouttes en gargarismes.

Orargol-Collyre (solution isotonique 0,2 %).

Boîte de 4 ampoules 1 cc. 5 : 15 francs.

Toutes les indications de l'Argent colloïdal comme collyre.

Laboratoire des Produits AMICROS

9, boulevard Edgar-Quinet — PARIS (XIV^e).

ORCHIDINE OPTIMA

(Comprimés correspondant chacun à 0 gr. 60 de testicules frais de bélier.)

Indications :

Puberté insuffisante, débilité en général, insuffisance testiculaire endocrinienne, affections nerveuses, sénilité précoce.

Doses :

4 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires « **OPTIMA** » S. A.

78-80, Grande-Rue-au-Bois

BRUXELLES.

ORTHO-GASTRINE

Formule :

Sulfate de Soude anhydre	0 gr. 25
Phosphate de Soude anhydre	0 gr. 25
Bicarbonate de Soude.....	0 gr. 10
CITRATE de Soude	0 gr. 20

Pour 1 paquet; N° 30.

Avantages. — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

Indications. — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire, Dyspepsie, Gastralgie, Hyperchlorhydrie, Entérite, Intoxication alcoolique, etc.

Posologie. — Adultes : 2 à 4 paquets par jour.

Enfants (sucrer légèrement) de 6 mois à 1 an 1/2 : 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.

De 1 an à 3 ans : 1 paquet par jour.

Prix : 9 francs.

Laboratoire A. LEBLOND

Pharm. de 1^{re} Classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

51, rue Gay-Lussac — PARIS (V°).

R. C. Seine 56049.

ORTHOGENOL

Polythérapie préventive et correctrice des
Déficiences organiques et fonctionnelles de
l'AGE MUR et du GRAND AGE.

Formule du **Redressement Biologique** intégral
du D^r A. VERNIER.

Réalise l'association désirable des Eléments de
Reconstitution Cellulaire, des Modificateurs
fonctionnels et des Catalyseurs endocrino-miné-
raux nécessaires au Maintien ou au Rétablisse-
ment de l'ordre Histo-physiologique et dont la
Carence domine toute la Pathologie de l'Age.

*Réactivation physiologique, Invigoration, Désintoxi-
cation, Dépuration urique, Déficiences séniles,
Prophylaxie du Cancer et des Scléroses.*

Les Cures de Redressement Biologique par l'**Or-
thogénol** sont toujours utiles après 40 ans.

Elles préparent et consolident les heureux résultats
des Cures Créno-Hydrothérapiques. Elles pré-
parent et complètent l'Acte Chirurgical.

Composition. — Bases Magnésiennes génératrices
de Chlorure de Magnésium, Phosphore, Silice
végétale (Prêle), Lithine, Bioxyde de Manganèse,
Acide Thyminique (solvant Urique physiol.),
Théobromine, Scille, Diastases de régénération
du Foie, Hypophyse (lobe ant.), Glande Inters-
titielle. Thyro-Parathyroïdes.

Indications. — Artériosclérose, Arthritisme, Rhu-
matismes chroniques, Hypertension, Néphroses,
Uricémie, Hépatisme, Infections biliaires, Troubles
digestifs, Troubles neuro-cardio-musculaires, Dé-
pression nerveuse, Tremblements, Vertiges,
Œdèmes, Crampes, Diabète, Dermatoses, Pru-
rits, Age critique des deux sexes, Sénilité précoce,
Hypertrophie prostatique, Tumeurs, Lésions de
type pré-cancéreux.

Posologie. — 2 ou 3 cachets par jour, aux repas.

Laboratoires **BÉLIÈRES**

Pharmacie Normale, 19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

ORTHOZOMINE

Principe actif du plasma musculaire total.

Zomine désalbuminée selon la technique du Professeur Richet.

L'Orthozomine présente les propriétés stimulantes de la **Zomine** sous une forme concentrée et très agréable à prendre (sirop).

ANÉMIES. CROISSANCE. CONVALESCENCES.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

A prendre pure ou dans un peu d'eau froide.

Le flacon : 20 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

OSTELINE

Composition :

La première préparation standardisée de vitamine D concentrée, fabriquée par le procédé Steenbock, Br. Fr. 606984, en comprimés et en gouttes, dissoute dans l'huile d'olive.

Quatre gouttes ou un comprimé correspond à une cuillerée à café d'huile de foie de morue de première qualité.

Chaque flacon d'Osteline est l'objet d'un contrôle physiologique rigoureux qui confère au produit une efficacité constante.

Toujours parfaitement tolérée, dépourvue d'odeur ou de saveur désagréables, extrêmement active à faibles doses.

Indications :

Déminéralisations de toutes natures (décalcification des tuberculeux, des femmes enceintes, de l'allaitement, décalcifications dentaires), *Troubles de la croissance*, *Etats* liés à un *métabolisme calcique défectueux* (spasmophilie, laryngospasme, hyperexcitabilité nerveuse), *Asthénies*, *Rachitisme*, *Acidose*, *Putréfactions intestinales*. (L'Osteline rend aux fèces, lorsqu'elles sont alcalines ou hypoacides, leur acidité normale et s'oppose à la *constipation* en stimulant sans irritation ni accoutumance le péristaltisme intestinal.)

Mode d'emploi :

Nourrissons, jeunes enfants : IV gouttes 2 à 3 fois par jour ou plus, dans du lait ou du jus d'orange.

Adultes et grands enfants : 3 à 6 comprimés par jour (avalés sans croquer).

Aucune contre-indication.

Laboratoires RISSA

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.

OSTÉOGLANDULOL

Granulé — Comprimé
Opothérapie glandulaire

Par l'emploi de glandes fraîches à sécrétion interne conservant toutes leurs propriétés par un procédé spécial de fabrication.

Traitement rationnel des insuffisances glandulaires et de la décalcification.

Indications. — Anémie, Rachitisme, Déminéralisation, Chlorose, Croissance tardive, Décalcification, Sénilité précoce, Neurasthénie, Hypochondrie, Troubles nerveux.

Granulé : Une cuillerée à café contient :

Poudre d'os..... 0,10 Moelle osseuse..... 0,02
Surrénale..... 0,01 Orchitine.... 0,10 Excipients accharolé q. s.

Doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à café matin midi, et soir, directement ou dans un 1/2 verre d'eau. *Enfants* : 1/2 cuillerée à café, 2 ou 3 fois par jour suivant les indications du médecin.

Comprimés. — Même composition que le granulé.

Deux comprimés représentent 1 cuillerée à café.

Les comprimés peuvent être prescrits aux diabétiques.

Doses. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour, en 3 fois, matin, midi et soir. *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

Peut être prescrit aux assurés sociaux.

Laboratoire BERGER, 14, rue des Pyramides — PARIS.

Envoi gratuit d'un flacon d'Ostéoglandulol (granulé ou comprimé) au choix du Docteur.

OSTRÉINE BUISSON

Chaux organique silico-fluorée
(partie centrale de l'écaille d'huître)
et phosphates assimilables.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur type, totalement et directement assimilable.

Indications. — Tuberculose et prétuberculose, Dentition, Croissance, Grossesse, Lactation, Phosphaturie, Ostéomalacie, Diabète, Dénutritons organiques diverses, consolidation des fractures.

Forme. — 1° cachet ; 2° poudre ; 3° granulé.

Posologie. — Au milieu de chaque repas : 1 cachet, une mesure d'Ostréine en poudre, ou une cuillerée à café d'Ostréine granulée délayée dans un peu d'eau sucrée.

Prix de vente au public : 16 fr. 50.

Prix médical : 11 fr. 15.

Sous quelque forme que ce soit.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

OTALGOL

Tube instillateur de soluté neutre glycérimé rendu adhésif au tympan par un procédé spécial.

Composition. — Sol. d'adrénaline, stovaïne, eau de laurier-cerise, borate de soude, glycérolé d'amidon, glycérine chimiquement pure.

Propriétés. — Analgésique des affections auriculaires, antiseptique et décongestionnant.

Indications. — Otites catarrhales, otites aiguës et subaiguës, otalgies, myringites.

Mode d'emploi. — Plonger le tube bien fermé dans un bol d'eau tiède pendant 2 minutes, puis instiller 3 fois par jour dans le conduit auditif IV à V gouttes en maintenant la tête inclinée vers l'épaule opposée pendant 5 minutes.

Prix du tube : 10 francs.

Dépôt général pour la France :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue Feydeau — PARIS (II^e).

Téléphone : Central 83-15

OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif du *Strophantus Gratus* isolé par le procédé particulier du Pr Arnaud.
Désignée comme Etalon International.

**Cardio-tonique énergique,
Diurétique puissant.**

Formes :

Comprimés à 1 mgr. — Solution à 4 pour 1000. — Ampoules de 1 cc. au 1/4 de mgr. pour injections intraveineuses. — Ampoules de 2 cc. au 1/2 mgr. pour injections intramusculaires.

Indications :

Insuffisances cardiaques, Asthénie du myocarde, Arythmies, Néphrite, Bradycardie.

Doses :

Per os. Doses fortes : 10 gouttes de solution ou 4 comprimés à 1 mgr. par 24 heures.
Doses moyennes : XXV à XXXV gouttes de solution ou 2 à 3 comprimés à 1 mgr. par 24 heures.

En injections intraveineuses : 1 à 2 ampoules de 1 cc. au 1/4 de mgr. par 24 heures

En injections intramusculaires : 1 à 2 ampoules de 2 cc. au 1/2 mgr. par 24 heures

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (15^e).

OUATAPLASME

du D^r Ed. LANGLEBERT.

Pansement humide, complet.

Instantané, aseptique émollient.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Abscess, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies contuses.

Mode d'emploi. — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquueur de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se **sinapiser** en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide ; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

L'enveloppe entière, avec imperméable : 9 fr. 25.

L'enveloppe entière, sans imperméable : 6 fr. 60.

Établissements SABATIER

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVI^e).

OVAIRE

Préparations ovariennes
des **Endocrisines Fournier.**

1^o Ovaire total :

Cachets : 10, 20, 25, 30, 50 cgr.

Comprimés : 0,10.

Ampoules : correspondant à 0,50 de
glande. En boîtes de 6.

2^o Folliculine de l'ovaire, en ampoules.
Solution huileuse : 200 U. souris par
ampoule.

3^o Lipoïde de l'Ovaire dit « **Minova-
rium** ». En pilules correspondant à
0 gr. 15 d'Ovaire (40 pilules).

4^o Association : Ovaire - Vitamine E,
dite " **Vit-E-lutéine** ".

(Vitamine E de la génération et
Hormone du corps jaune.)

En pilules. Boîte de 40.

Notice spéciale sur demande aux

Laboratoires FOURNIER frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

OVARINE OPTIMA

(Comprimés correspondant chacun à
50 cgr. d'ovaire frais.)

Indications :

Insuffisances ovariennes, troubles de
la ménopause, naturels ou post-
opératoires.

Posologie :

4 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires « OPTIMA » S. A.

78-80, Grande-Rue-au-Bois

BRUXELLES.

OVARINE TISY

En cachets de 20 centigrammes.

Pharmacie TISY

R. et A. FEIGNOUX, Successeurs
95, rue de Turenne — PARIS (III^e).

OVARO-THYROIDINE OPTIMA

(Comprimés pluriglandulaires dosés à raison de 20 cgr. glande ovarienne fraîche et 10 cgr. glande thyroïde fraîche par comprimé.)

Indications. — Insuffisances endocrines, troubles de la ménopause naturels ou post-opératoires, obésité, rhumatisme chronique et déformant, troubles circulatoires relevant de la ménopause.

Doses. — 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires « OPTIMA » S. A.

78-80, Grande-Rue-au-Bois
BRUXELLES.

OVO-LÉCITHINE BILLON

Stimulant des fonctions de la nutrition et d'assimilation ; s'oppose à la déminéralisation phosphorée.

Indications :

Dénutrition, Fatigue cérébrale, Surmenage, Neurasthénie, Grossesse.

Posologie et mode d'emploi :

Dragées : Six par jour.

Granulés : Trois cuillerées à café par jour.

Ampoules : Une injection tous les deux jours.

Chez les enfants, réduire la dose selon l'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

OVULES CHAUMEL

Les Ovules à la Glycérine solidifiée, et aux principaux médicaments, constituent le mode de pansements vaginaux le plus commode.

Indications :

Aménorrhée. — Ovules Chaumel emménagogues (apiol, cannelle).

Antisepsie. — Ovules Chaumel acide borique.

Congestions. — Ovules Chaumel simples et ichtyol.

Douleurs. — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

Inflammations. — Ovules Chaumel résolutifs (iodure-belladone).

Leucorrhée. — Ovules Chaumel astringents (tannin-sulfate de zinc).

Métrites. — Ovules Chaumel ichthyol.

Vaginites. — Ovules Chaumel ichthyol.

Établissements FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS!

OVULES RHEMDA RADIOACTIFS

(Radiovules.)

Composition. — A base de terres radioactives et de Terpinéol; d'une radioactivité égale à une unité uranique.

Action. — Par émission de radiations amenant une action bactéricide et leucocytogène.

Indications thérapeutiques. — Vaginites, Métrites, Leucorrhée, etc.

Laboratoires RHEMDA

57, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wag. 58-89.

OVULES « ROCHE »

au Thigénol.

(Voir également page « Thigénol »)

Propriétés thérapeutiques. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les *Ovules « Roche »* la sédation parfaite des douleurs, et, après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocedent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

Indications thérapeutiques. — Vaginites, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métrorrhée, etc., etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Composition. — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint. Obésité. Fibrome. Goître et tous les états dus à l'insuffisance thyroïdienne.

Forme. — Pilules renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. — 1 à 2 par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

Forme. — Pilules dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

Posologie. — 2 à 6 par 24 heures aux repas.

Indications. — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

OXY-INJECTEUR DU D^r FIALIP

Appareil pour injections sous-cutanées d'oxygène naissant.

Indications. — Toutes les insuffisances respiratoires : Asthme, Emphysème, en diminuant la dyspnée ; Tuberculose, Bronchopneumonie, *Asphyxies accidentelles et cyanose des nouveau-nés*, septicémies et intoxications en oxydant et détruisant les toxines ou poisons organiques.

Avantages de l'appareil. — Portatif, peut se mettre dans une poche de manteau. — Fabrique son oxygène au moment de l'emploi. — Pas d'obus à recharger. — Toujours prêt à fonctionner.

Complet avec tous ses accessoires : 125 francs.

Laboratoires du D^r FIALIP

23, av. de la Motte-Picquet, PARIS (VII^e).

OXYLÉINE

Forme. — Comprimés. Flacons de 50.

Principe actif. — Sulfate neutre d'oxyquinoléine, et kaolin.

Indications thérapeutiques :

Troubles intestinaux : Colites, ulcérations, diarrhées, fermentations, dysenterie, flatulences, ptoses, névroses digestives, intoxications intestinales, diarrhées estivales des enfants, parasites intestinaux, excepté le ténia.

Troubles des voies urinaires : Toutes les infections, pyérites, cholécystites et colibacilloses.

Mode d'emploi :

Adultes au-dessus de 15 ans : De 3 à 4 comprimés à chaque repas du midi et du soir.

Enfants de 8 à 15 ans : De 2 à 3 comprimés à chaque repas du midi et du soir.

Enfants de 4 à 8 ans : 1 comprimé à chaque repas du midi et du soir.

Avaler, ne pas croquer pour éviter le goût désagréable.

Prix : 14 francs. Durée : 8 jours.

Laboratoires DROUET & PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

OXYMETHOL PERRAUDIN

(Tablettes et pâtes)

A base d'oxygène naissant, menthol, cocastovaine, benzoate de soude, etc.

Tablettes et pâtes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — Adultes, 6 à 10 par jour à sucer ; Enfants, 3 à 6 par jour à sucer.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

Indications. — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Prix au public : Tablettes, 6 fr. ; Pâtes, 4 fr. 50.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien
21, rue Chaptal — PARIS.

OXYMUTH SACA

Composition. — Hydrate d'oxyde de bismuth en suspension dans l'huile d'olive pure.

Forme. — Ampoules de 2 cc. renfermant 0 gr. 15 d'hydrate d'oxyde de bismuth (= 0 gr. 125 de bi-métal actif).

Indications. — Syphilis à toutes les périodes.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.
Prix de la boîte de 12 ampoules : 18 fr.

Usines Chimiques

des Laboratoires Français

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 58-43.

OZOBIASE

Principe actif. — Catalyseur oxydant (Facteur O de R. Monceaux. Prix Meige 1929). Communication Société de biologie, 27 février 1926 ; Société de Thérapeutique, 10 février 1926 ; Dr Moricet, Thèse de Paris 1926.

Indications thérapeutiques. — Nutrition du tuberculeux, Amaigrissements, Hypotrophie.

Forme. — *Comprimés* : Boîte de 60 et 1/2 boîte de 30.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 comprimés avant chaque repas du midi et du soir.

Enfants de 10 à 15 ans : 1 à 2 comprimés midi et soir.

Au-dessous de 10 ans : 1 comprimé midi et soir.

Pour les petits : 1/2 comprimé écrasé dans du lait ou des confitures.

Pour l'adulte : avoir soin de casser les comprimés avant de les avaler.

Prix : 20 francs la boîte, 12 francs la demi-boîte.

Durée : 10 à 12 jours.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

OZOBIASE OPOTHÉRAPIQUE

Principe actif : catalyseur oxydant (Facteur O de R. Monceaux — Prix Meige 1929 — et 0,03 Ext. total de glandes surrénales). Communication Société de biologie, 27 février 1926 ; Société de thérapeutique, 10 février 1926 ; D^r Moricet, Thèse Paris 1926.

Indications thérapeutiques. — Nutrition du tuberculeux, Amaigrissements, Hypotrophie.

Forme. — Comprimés. Boîte de 50.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 comprimés avant chaque repas du midi et du soir.

Enfants de 10 à 15 ans : 1 à 2 comprimés midi et soir ;
au-dessous de 10 ans : 1 comprimé midi et soir. *Avoir soin de casser les comprimés avant de les avaler.*

Prix : 16 fr. la boîte.

Durée : 8 à 10 jours.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

PAIN ESSENTIEL

avec ou sans chlorure.

Composition. — Le Pain Essentiel est préparé avec des gruaux de blé dur, riches en gluten, additionnés de protéines du lait solubilisées.

Présentation. — Chaque baguette de 10 gr. représente la valeur nutritive de 16 gr. de pain ordinaire, et renferme 6 gr. d'hydrocarbures.

Avantages. — A été étudié pour convenir à tous les régimes. Très friable, mais oblige le malade à mastiquer ses aliments.

Indications thérapeutiques. — Produit de haute valeur nutritive. A recommander dans tous les cas de convalescences, surmenage et alimentation difficile ; aux dyspeptiques, entéritiques et diabétiques légers. Aux obèses : maximum 3 et 4 baguettes par repas.

Dans d'excellentes panades galactagogues.

Sans chlorure pour arthritiques et albuminuriques.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

PAIN MASSÉ « SANA »

(Formule du Professeur Rémond.)

Composition. — Le Pain Massé « Sana » est à base de gluten frais, combiné avec le Boldo et bicarbonate.

Présentation. — Sous forme de flûtes, chacun des pains représente environ 80 gr. de pain ordinaire et renferme une faible proportion d'hydrocarbures.

Indications thérapeutiques. — Le Pain Massé « Sana » est spécialement recommandé pour les Diabétiques et insuffisances du foie, la suralimentation sous un faible volume et les obèses. Remplace la biscotte pour le café au lait du matin.

Il se fabrique sans chlorure pour albuminuriques et arthritiques.

Pâtes spéciales pour Diabétiques, Arthritiques.

Société des Produits « Sana »

GAILLAC (Tarn).

PAINS SPÉCIAUX

HEUDEBERT

Les **Pains spéciaux Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain est interdit.

Pour tous régimes.

Pain Essentiel avec ou sans chlorure (voir article spécial).

Dyspepsie, entérite.

Pains grillés, Longuets et Gressins.

Constipation.

Pain complet.

Obésité.

Gressins, Pain Essentiel.

Diabète.

Pain de gluten (régime très sévère, 5 à 10 p. 100 d'hydrocarbonés). Pain d'aleurone (régime sévère, 15 à 20 p. 100). Spécial diabétique (régime normal, 30 à 35 p. 100 d'hydrocarbonés).

Albuminurie, arthritisme.

Pain hypoazoté, Biscottes, Longuets et Gressins sans sel.

Pain des villes d'eaux.

Pain de Royat (cœur, vaisseaux), **Pain de Contrexéville** (reins, voies biliaires), **Pain de Châtel-Guyon** (constipation), **Pain de St-Nectaire** (albuminurie), **Tranches de Plombières** (estomac, intestins), **Pain de Brides** (obésité), **Pain de Vittel** (arthritisme), **Pain d'Evian** (néphrites, artériosclérose).

La haute valeur nutritive de ces pains permet de régler médicalement leur consommation.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue St-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

PANBILINE

Formes. — Pilules et Solution.

Définition. — La Panbiline, spécifique total des *Maladies du Foie* et des affections qui en dérivent, agit simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(Voir *Rectopanbiline*.)

Composition. — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glyciné : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémié familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace; Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

Doses moyennes. — 6 pilules de Panbiline ou 6 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas. Demi-dose pour les enfants.

Prix au public :

12 francs la boîte de pilules de Panbiline.

17 francs le flacon de Panbiline liquide.

Laboratoire du Docteur PLANTIER

ANNONAY (Ardèche).

PANCARBO HARDY

Comprimés de charbon total polyvalent.

Association des trois charbons actuellement employés en thérapeutique animal, végétal, végétal activé (*acti-carbone*).

Charbon végétal	0,125
— végétal activé	0,125
— animal.	0,20
Urotropine.....	0,05
Carbonate de chaux.....	0,05
Teinture de belladone.....	1 goutte
Sucre, Q. S.....	0,05

Forme pratique et deux fois plus économique que les préparations habituelles (poudres ou granulés).

Indications. — Toutes les infections et intoxications gastro-intestinales. Anti-acide. Sédatif des algies gastriques et intestinales.

Posologie. — Croquer 2 à 3 comprimés après les repas.

Prix : 12 fr. la boîte de 45 comprimés assurant 8 jours de traitement normal.

Laboratoires PAUL HARDY

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V°).

Tél. : Gobelins 36-96.

PANCRÉANNE

Composition. — Association de poudre de pancréas, pancréatine, tanin, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique. — Assure la digestion totale des différentes sortes d'aliments, régularise la sécrétion intestinale, excite la sécrétion interne des Ilots de Langerhans.

Indications. — Dyspepsie. — Entérites. — Insuffisances digestives. — Diabète (cure d'entretien et de remplacement de l'insuline injectable).

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés à la fin des repas.

Prix au public : 15 fr. 80.

Laboratoire des VALÉROMENTHOL

10, rue Poncelet — PARIS.

Tél. : Wagram 37-58.

PANCRÉASTASE DEFRESNE GRANULÉE

Caractéristiques. — Suc duodéno-pancréatique total activé maltasé à 5 p. 100. Ne contenant ni pulpe, ni déchet et présenté sous forme de granulés protégés par un enrobage spécial.

Indications. — Digestions difficiles et prolongées. Troubles de l'assimilation : croissance insuffisante, amaigrissement, accidents anaphylactiques, urticaire, eczéma, réactions sériques.

Chez le nourrisson. — Traitement de l'intolérance au lait de vache, de l'athrepsie, du rachitisme, par la technique de prédigestion du lait au moyen de la Pancréastase.

Aucune contre-indication.

Doses. — Enfants jusqu'à 6 ans : 2 à 6 cuillères-mesures par jour. Grands enfants ou adultes : 6 à 12 cuillères-mesures par jour.

Littérature et échantillons :

Laboratoires DEFRESNE

19, rue Jacob — PARIS.

PANCRÉATOSE IDON

C17 H19 AzO ³ HCl	0 50
Na Cl	30
Carb. Ca	50
Lactose	30
Pancréatine	25
Mg	15
Na H CO ³	850

Poudre, cachets et granulé cacaoté à base de pancréatine, lactose, magnésie, chlorure de sodium, essence d'anis et un calmant.

Indications. — Maladies d'estomac, du foie, et des intestins.

Gastrite, gastralgie, urticaire, fermentations intestinales, dermatose, aérophagie, auto-intoxication, insuffisance hépatique.

Prix : Poudre et cachets : 10 fr. au public.

Granulé : 14 fr. au public

Laboratoire Idon BLOCH

Docteur en Pharmacie

89, rue Saint-Georges — NANCY

PANCRÉBILE

Bile dépigmentée, décholestérinée	0,20
Ext. total de Pancréas.....	0,10
Ext. tot. des glandes de l'intestin	0,05
Podophyllin (<i>Peltatum</i>).....	0,004
Carbonate de chaux préparé....	0,05

Indications. — Foie, Intestin, Constipations.

Posologie. — 2 à 3 dragées avant ou après les repas.

Constipation : 3 à 4 dragées au coucher.

Avaler sans croquer.

Dragées glutenisées. Prix : 14 francs.

Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e).

Approvisionnement pharmaceutique :

O. C. P., Paris.

PANCRÉPATINE LALEUF

Capsules glutenisées.

Composition. — Extrait spécial de *Pancréas* activé par addition de *Suc hépatique* et analgésine. Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Opothérapie du *Diabète* par médication interne. Sous l'influence de la Pancrépatine, on remarque :

- 1° Abaissement de la Glycémie ;
- 2° Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie ;
- 3° Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal ;
- 4° Disparition des troubles secondaires : soif, polyurie, prurit, etc. ;
- 5° Amélioration rapide de l'état général.

Mode d'emploi et doses. — Les capsules de Pancrépatine Laleuf doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures suivant prescription médicale.

Etui de 100 capsules : 24 francs.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).

PANCRINOL

Anémies, convalescences, surmenages, hémorragies, toutes déficiences.

Inogyl

Troubles de la puberté, de la menstruation, de la ménopause.

Inorénol

Néphrites, albuminurie, azotémie.

Provitol

Avitaminoses, dentition, croissance.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Prony — PARIS (XVII^e).

PANFÉBRINE

Médicament de la fièvre et de toutes les fièvres.

Stimulant les fonctions hépatique, biligène et splénique, sans action déprimante sur le cœur.

Traitement du paludisme : Panfébrine AB.

Spécifique de toutes les pyrexies : Panfébrine B.

1° Panfébrine B (toutes fièvres).

Composition. — Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Son rôle. — Antithermique dans toutes les pyrexies.

Action. — 1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants ;

2° Maladies infectieuses (grippe, dothiéntérie, scarlatine, etc., et phlegmasies de toutes sortes).

Posologie. — Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au-dessus (peut être renouvelée 2 à 4 fois en 24 heures).

2° Panfébrine AB (paludisme).

Composition. — Panfébrine A : Acide méthylarsénique $As = O-CH^3 (OH)^2$. Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Panfébrine B : Composition indiquée ci-dessus.

Son rôle. — Action spécifique dans le paludisme (n'occasionne jamais d'accidents quiniques).

Avantage. — Innocuité absolue.

Posologie. — Préventif : 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique : 3 cachets-comprimés A et 3 cachets-comprimés B par jour. — *Enfants* : 12 ans, 2 cachets-comprimés A et 2 cachets-comprimés B par jour ; de 7 à 8 ans, 1 cachet-comprimé B par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n^{os} 586-11 et 586-12.

Echantillons et littérature.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e)

Tél. : Roquette 14-12.

PANGADUINE

Bloc total de Vitamines et Principes actifs des Foies de Morue.

Composition. — La *Pangaduine* contient tous les alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, vitamines et principes actifs des foies de morue.

Elle permet d'absorber, sous un petit volume et sous une forme de goût très agréable, la valeur d'une grande quantité d'huile de foie de morue.

Indications (Fatigue générale). — Les indications de la *Pangaduine* sont celles de l'huile de foie de morue que peu d'enfants et de grandes personnes tolèrent.

C'est le médicament par excellence des enfants et des jeunes gens déprimés par une croissance difficile ou trop rapide, des neurasthéniques, des convalescents et de toutes les personnes fatiguées par un travail excessif ou pour toute autre cause.

C'est le médicament à prescrire dans l'insuffisance hépatique.

Action. — La *Pangaduine* agit :

1^o Comme stimulant de la nutrition et de la circulation ;

2^e Comme diurétique.

Au bout de quelques jours de traitement on remarque toujours le retour de l'appétit et la reprise des forces.

Deux formes agréables et actives :

Adultes : Pangaduine Elixir : 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Enfants : Pangaduine granulée. 1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas selon l'âge.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

PANGASTROL

Pansement de l'Estomac.

Composition. — Kaolin, Bismuth, Belladone, Codéine, Carbonate de Chaux, Magnésie.

Forme. — Sachets de 10 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait, et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

Indications. — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsies, Diarrhées, Fermentations.

Prix : 14 fr.

Laboratoire STOULS

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.

Téléphone : Passy 68-14.

PANGESTYL NARTY

Nature et action. — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif ; 2° par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL (*qui digère tout*).

Indications. — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhées. Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion ; Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse, Angiocholites, Cholécystites, etc.

Formes et Mode d'emploi. — *Granulés ou Cachets*. Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des maux dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

Granulés : 15 francs.

Cachets : 12 francs.

Laboratoires Georges TINARD

134, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

PANGLANDINE

Description. — Capsules kératinisées de 0 gr. 25 (50 par flacon) contenant une synthèse opothérapique : thymus, ovaires, rate, duodénum, hypophyse, capsules surrénales, thyroïde, pancréas, testicules, foie, prostate, en proportions physiologiques.

Action thérapeutique. — L'insuffisance fonctionnelle d'une glande à sécrétion interne, entraînant un surcroît de travail pour les autres, la médication opothérapique doit renforcer l'action des principales glandes en suppléant celle qui est déficiente et, par conséquent, comporter un mélange synthétique.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans la sénilité, l'obésité, la neurasthénie, les retards de croissance, les troubles de la puberté, le myxoedème, l'infantilisme.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

PANOSTYL

Régénérateur total

à base de sang pur de pur-sang boulonnais.

Renferme l'hémoglobine totale et les hormones en solution dans le plasma sanguin dilué-fluoruré.

Anémie, Tuberculose, Dénutrition, Croissance, Surmenage, Convalescences, Paludisme, Déchéances organiques.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules. Voie buccale, réalisant l'opothérapie sanguine intégrale.

Posologie. — 2 ampoules par jour aux repas.

Aucune contre-indication.

Prix de vente au public : 18 francs.

Littérature et échantillons :

Pharmacie biologique

G. COMBASTEL, pharmacien,

F. RICHSHOFFER, successeur.

Fournisseur des hôpitaux.

57, rue Mathurin-Régnier — PARIS (XV^e).

PANTHÉSINE « SANDOZ »

Para-aminobenzoate de N. diéthyl-leucinol

Anesthésique local pour l'anesthésie par infiltration, par badigeonnage, régionale, rachidienne. Utilisé en chirurgie générale, oto-rhino-laryngologie, art dentaire, urologie, ophtalmologie.

Propriétés. — Rapidité, intensité et longue durée de l'anesthésie. Tolérance parfaite. Suites opératoires indolores. Anesthésie par contact aussi bien que par infiltration. Trois fois moins toxique que la cocaïne ; toxicité relative inférieure à celle de la novocaïne.

Présentation. *Ampoules* de 1 cc. et de 2 cc. d'une solution à 0,5 p. 100 additionnée d'une demi-goutte d'adrénaline à 1 p. 1000 par cc. (art dentaire). — *Ampoules* de 2 cc. et 5 cc. à 0,5 p. 100, sans adrénaline (petite chirurgie, rachianesthésie). — *Ampoules* de 50 cc. à 0,25 p. 100 avec et sans adrénaline (grande chirurgie). *Poudre cristallisée* de Panthésine pour la préparation des solutions. — *Solution* à 10 p. 100 pour l'anesthésie par badigeonnage. — *Collyre* à 2 p. 100 de Panthésine.

Produits SANDOZ, 3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e).

Dépôt Général et Vente :

Usine des Pharmaciens de France,
129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

PANTOPON « ROCHE »

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 gr. 01 de Pantopon « Roche »
= 0 gr. 50 ctgr. de teinture d'opium,
= 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,
= 0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et modes d'emploi.

Voie buccale :

PANTOPON « ROCHE » SIROP

(dosé à 0,01 ctgr. de Pantopon « Roche » par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.

Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

PANTOPON « ROCHE » COMPRIMÉS

(1 comprimé = 0,01 ctgr. de Pantopon « Roche »).

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.

Enfants : 1/3 à 1 par jour, selon l'âge

Voie Hypodermique :

PANTOPON « ROCHE » AMPOULES

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche »).

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules.

Adultes : 1 à 2 par jour et plus.

Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS (III^e).

PANXYLON

En injections sous-cutanées, alternées, indolores.
Immunisation de l'organisme contre les infections
aiguës, subaiguës ou chroniques.

Ampoules A. — Cinnaméine totale du Miroxylon Pereirae, 0 gr. 10 ; Oleum Olivæ neutr. deshydraté, 5 cc.

Ampoules B. — Campholine, camphorate de choline, 0 gr. 02 ; Soluté physiologique hypertonique, 5 cc.

Forme. — Le PANXYLON existe en boîtes de :

8 ampoules de 2 cc.	5. : 4 ampoules A ; 4 ampoules B.
8 — de 5 cc.	: 4 — A ; 4 — B.
12 — de 5 cc.	: 6 — A ; 6 — B.

La *Campholine* existe en boîte séparée de 6 ampoules de 5 cc. et 6 ampoules de 2 cc. 5.

Pharmacodynamie. — Notre Cinnaméine totale contient tous les principes actifs *naturels* du Baume du Pérou : éthers benzyl-benzoïque, benzyl cinnamique, acides benzoïque et cinnamique libres et résinotannols.

Elle est donc plus active que le seul cinnamate de benzyle *synthétique*.

L'action de la Cinnaméine est plus stable et plus intense quand elle est précédée d'une injection préparatoire de *campholine* (camphorate de choline) qui sensibilise ainsi l'organisme dévié de son équilibre glycémie-cholestérolémie.

En résumé, l'injection de *campholine* (ampoules B) avec son pouvoir cholestérinogène complète l'injection de la Cinnaméine (ampoules A), avec son pouvoir immunogène.

Indications. — Tous les états de déficience organique et d'infections aiguës ou chroniques :

Etats de dépression nerveuse physique et morale.

Convalescences, anémies, asthénies, amaigrissements, cachexies, lymphatisme.

Adénites aiguës et chroniques, fistules.

Immunisation indirecte de l'organisme contre toutes les infections pulmonaires, spécifiques ou non.

Mode d'emploi. — Une ampoule B *campholine* le matin, suivie le lendemain d'une ampoule A *cinnaméine*, que l'on aura fait tiédir légèrement au préalable.

Conditions spéciales au Corps médical.

Echantillons et littératures :

Laboratoires français des Spécialités scientifiques.

M. Emile LOGEAI, Pharmacien

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

PAPAÏNE

de TROUETTE-PERRET.

Ferment digestif, énergique, extrait du suc du *Carica Papaya*, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

Indications. — Toutes les fois que l'on digère mal.

Pour les Adultes :

Elixir « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 18 fr.

Un verre à liqueur après chaque repas.

Cachets « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 fr.

Un à deux cachets à chaque repas.

Comprimés « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 fr.

Deux à huit comprimés à chaque repas.

Pour les Enfants :

SIROP DE PAPAÏNE **de TROUETTE-PERRET**

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

A souvent réussi après échec de toute autre médication. Prix au public : 18 fr.

Bien formuler : *Elixir, Sirop, Cachets, Comprimés de TROUETTE-PERRET, à la Papaïne.*

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, rue des Immeubles-Industriels. 15
PARIS (XI^e).

PAPAVERYL

Comprimés de Chlorhydrate de Papaverine chimiquement pur dosés à 4 centigrammes.

Toxicité très minime (le moins toxique des alcaloïdes de l'opium). Contrôle physiologique. Ne fait plus partie du tableau B.

Indications. — *Tous les spasmes musculaires lisses.* Résultats particulièrement remarquables dans : l'hypertension, l'angine de poitrine, les spasmes digestifs, l'entérocolite muco-membraneuse, les coliques hépatiques, néphrétiques, la constipation spasmodique, l'asthme, les toux spasmodiques (Coqueluche), le hoquet, la dysménorrhée, etc...

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour et plus (la toxicité chez l'homme est extrêmement faible) ; chez l'enfant, 1/4 de comprimé par année d'âge (1 centigramme). Mieux supporté et plus actif que la belladone.

Présentation. — Tube de 20 comprimés dosés à 4 centigr. par comprimé.

Boîtes de 6 et 12 ampoules de 2 cc. dosées à 2 centigrammes par cc.

Littérature sur demande, Thèse Baconnet 1927, Paris ; Rosenberg Mendel Wolf 1929, Paris.

Laboratoires ORRILLARD

245, rue de Vaugirard — PARIS.

Tél. ; Ségur 41-59.

PAPIER IODOGÈNE EYMONNET à l'Iode naissant

Toute la révulsion.

Depuis la rubéfaction jusqu'à la vésication.

Remplace : Vésicatoires, Sinapismes, Ventouses, Coton iodé.

Aucune contre-indication. Non toxique pour le rein.

Mode d'emploi. — Tremper une feuille dans un peu d'eau. L'Iode naissant apparaît. Appliquer à l'endroit voulu et recouvrir de la feuille imperméable incluse dans la pochette.

Durée d'application. — 2 à 5 minutes : Rubéfaction. — 5 à 10 minutes : Révulsion simple. — 10 à 20 minutes : Révulsion moyenne. — 30 à 40 minutes : Révulsion forte (légère vésication); au delà : vésication.

Indications. — Toutes affections pulmonaires et pleurales. Tous rhumatismes. Toutes névralgies, lumbago, sciatiques.

La pochette, 2 feuilles. Prix : 6 fr.

Laboratoire du Papier Eymonnet

139, Cours Tolstoï, Villeurbanne — LYON (Rhône).

PARADOLINE

Solution calmante sans Morphine ni aucun dérivé de l'Opium, Diurétique puissant.

Composition. — Boldo, Buchu, Uva-Ursi, Kawa-Kawa, Pichi, Piscidia, Salicylate et Bicarbonate de Soude, Glycérine, Eau distillée de Menthe.

Indications. — Disparition rapide de la douleur dans Coliques hépatiques, néphrétiques, Rhumatismes, Affections génitales, Spasmes des accouchées. En même temps traitement causal de ces affections.

Posologie :

Adultes : 1 à 4 verres à madère par 24 heures entre les repas.

Enfants : 1 à 3 verres à liqueur.

Prix du flacon de 500 cc. : 16 fr.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

PARALACTINE BYLA

Deux formes actives :

Comprimés sur lactose.

Culture pure sur lait.

Composition. — La *Paralactine Byla* est constituée par une culture de ferments lactiques, d'activité et de stabilité contrôlées.

Indications. — Entérites aiguës et chroniques des enfants et des adultes, eczéma, urticaire, acné, herpès, toutes affections de la peau, et tous phénomènes consécutifs à l'auto-intoxication d'origine intestinale.

Mode d'emploi. — *Comprimés* : 1 à 3 comprimés dissous dans un peu d'eau sucrée, froide ou tiède, trois fois par jour.

Culture sur lait. — Quatre cuillerées à café par jour, délayées dans un peu d'eau lactosée.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).

PARALAXOL TULIVET

Paraffine liquide. Marque Française.

Composition. — Huile de Paraffine extra-pure entièrement exempte de dérivés phénoliques et benzéniques, de densité élevée, neutre, de goût agréable.

Forme. — 1° *Liquide* aux divers arômes (Anis, Menthe, Citron) ou sans arôme.

2° *Capsules*.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie et rééduque l'intestin ; aucune action sur les muqueuses. Rendue intégralement dans les selles. Action laxative mécanique.

Doses ;

1° **Capsules** : 3 à 6 par jour ; 1 ou 2 au début de chaque repas.

2° **Liquide** : au début du repas (1 à 3 fois par jour).

Adultes : par cuillerée à soupe.

Enfants : par cuillerée à café.

Nourrissons : par 1/2 cuillerée à café.

Se vend en flacons, demi-flacons et litres.

Laboratoires TULIVET

G. de Saint-Stéban, docteur en pharmacie

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

PARATHYROCALCINE

« MONCOUR »

REMINÉRALISATION

Fixation des SELS de CALCIUM
par l'utilisation, comme *MORDANT*,
de l'EXTRAIT TOTAL PARATHYROÏDIEN

Indications. — Prébacillose, bacillose, scrofule, convalescence, croissance, fractures, affections osseuses, décalcification dentaire, et, en général, toutes affections avec déminéralisation.

Notre Extrait total Parathyroïdien, élément essentiel de la médication, est préparé avec des glandes soumises à un contrôle histologique régulier.

Cachets : 1 à 3 par jour.

Comprimés : 2 à 6 —

Laboratoire MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.

Tél. : Molitor 08-47.

PARLAX

Huile de Paraffine pure de haute viscosité.

Description. — *Parlax* est la reine des huiles de Paraffine. Inodore et insipide, limpide comme le cristal de Roche, sa pureté est absolue.

Indications. — Son onctuosité et sa viscosité remarquables lui permettent d'assurer le rythme de l'évacuation intestinale. *Parlax* doit être prescrit : Dans tous les cas de constipation, entérites, appendicite, hémorroïdes ; aux opérés, aux femmes enceintes, aux nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à potage deux fois par jour.

Enfants : 1 cuillerée à café deux fois par jour. De préférence pendant les repas, dans les purées de pommes de terre, de légumes secs, avec les épinards, endives et salades cuites, etc. Dans la salade assaisonnée au jus de citron. Dans les confitures, compotes de fruits.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Delcupe
MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine).

PAROLAGAR

(Marque déposée.)

Le Parolagar est une émulsion perfectionnée de 65 % d'huile de paraffine et d'agar-agar.

Formes thérapeutiques et indications :

N° 1. *Parolagar simple* (étiquette bleue).

Huile de paraffine.....	65 %
Agar-agar, eau distillée.....	35 %
	<hr/> 100 %

Traitement de choix de la constipation habituelle, doit être employé à la suite du Parolagar phtaléiné, lorsque l'habitude de l'évacuation à heure fixe aura été provoquée.

N° 2. *Parolagar phtaléiné* (étiquette rouge).

Huile de paraffine	65,00 %
Phénolphtaléine.....	0,32 %
Agar-agar, eau distillée ...	34,68 %
	<hr/> 100,00 %

Renferme la dose prudente de 5 centigrammes de phénolphtaléine par cuiller à potage.

Indiqué comme traitement d'attaque de la stase chronique et surtout pour les malades ayant abusé de purgatifs. On lui substituera la forme simple dès que l'habitude de l'évacuation régulière aura été obtenue.

Posologie.

Adultes : Une cuillerée à soupe le soir, ou matin et soir, après le repas si nécessaire. Peut être pris dans de l'eau ou du lait.

Enfants : Une cuillerée à café ou une cuillerée à soupe. Peut être mélangé aux aliments ou au biberon.

Pas de suintement. Pas d'accoutumance.

LABORATOIRES DU PAROLAGAR

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche.)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

Propriétés thérapeutiques. — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant, mais curatif.*

Indications. — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

Dosologie. — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour :

Enfants de moins de 1 an	X à XXX gouttes.
— de 1 à 5 ans.....	XX à LX gouttes.
— de 5 ans et au-dessus..	XX à C gouttes.
Adultes	XXX à C gout.

Prix : 11 francs.

THIRIET et C^{ie}

26 et 28, rue des Ponts — NANCY.

PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états
névropathiques.

Composition. — Une cuill. à café contient
0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incar-*
nata ; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba* ;
XX gouttes alcoolé de *Cratægus oxya-*
cantha.

Action. — La *Passiflore* diminue la tension
artérielle, régularise l'influx nerveux dans
le domaine du grand sympathique et est un
sédatif et un antispasmodique de premier
ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la
Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin
que les auteurs américains ont comparé
au bromure, et par le *Cratægus* dont l'ac-
tion tonocardiaque et équilibrante du sys-
tème nerveux est bien connue (Huchard,
Renon, H. Leclerc, etc.).

Indications. — Tous états névropathiques :
angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. In-
somnie nerveuse, troubles fonctionnels du
cœur d'origine nerveuse (palpitations,
tachycardie, etc.), troubles nerveux de la
vie génitale, etc.

Posologie. — Comme médicament équi-
brant du système nerveux : une cuillerée à
café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse : une à trois
cuillerées à café le soir.

G. RÉAUBOURG, docteur en pharmacie,
2, rue Boucicaut — PARIS (XV^e)
Bureaux : 31, rue St-Georges — PARIS (IX^e)

PASSIVAL

Antispasmodique nouveau

(Procédé Elzévir.)

Action *synergique* de la Passiflore et de la Valériane désodorisée. (La Passiflore renforce l'effet de la Valériane.)

Goût agréable.

Effet presque immédiat, et toujours constant.

Expérimenté et adopté dans les hôpitaux et cliniques de Paris.

Posologie :

2 à 4 cuillerées à café par jour.

Echantillon et littérature au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

PASTA PALM

(le laxatif appétissant.)

Forme. — Tablettes à mâcher.

Composition. — Essentiellement végétale : Figs, raisins, séné.

Propriétés pharmacodynamiques. — Purgatif, Laxatif, Dépuratif.

Indications. — Rééducation de l'intestin. Traitement physiologique de la constipation sous toutes ses formes, paresse intestinale.

Mode d'emploi. — *Dose laxative.* — *Adultes* : 1 à 1 tablette 1/2
Enfants : 1/4 à 1/2 tablette.

Dose purgative. — *Adultes* : 1 1/2 à 2 tablettes. *Enfants* : 1/2 à 1 tablette

On croquera la tablette, ou, si l'on veut, on la délaiera dans un peu d'eau ou de lait.

N. B. — A prendre de préférence avant de se coucher, l'effet se produisant de 8 à 10 heures après l'ingestion.

A conserver dans un endroit sec et frais.

L'étui de 15 tablettes : 12 francs (en France).

Dépôt général :

Pharmacie A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

PASTILLES M. B. C.

Chaque pastille correspond à la formule suivante :

Composition :

Chlorhydrate de cocaïne.....	0,0002
Stovaïne.....	0,0003
Menthol.....	0,005
Borate de soude.....	0,02
Chlorate de potasse.....	0,06
Sucre et gomme Q. S. pour une pastille de 1 gr,	

Mode d'action. — Antiseptique, Anesthésique, Cicatrisant.

Indications. — Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, stomatites, etc...). — Désinfection de la bouche (fumeurs, haleine fétide, etc...). — Hygiène de la voix (chanteurs, professeurs, conférenciers, etc...)

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

Etablissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

PATE MIREILLE

A l'extrait concentré de Sirop Mireille.

(Voir à *Sirop Mireille*.)

Mêmes propriétés : même composition (avec en plus : cocaïne et chlorate de potasse).

Même saveur plaisante.

Prix au public : 4 fr. 50 (exempt d'impôt).

LABORATOIRES LEGENDRE et C^{ie}.

Section D. S. — Houilles (S.-et-O.).

DÉPOT GÉNÉRAL :

France, Colonies et Protectorats.

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut,
à Bruxelles-Maritime.

PATE SPECIA

Granulés antidysentériques
selon la formule du **D^r Ravaut**.

Indications. — Formes subaiguës et chroniques de la dysenterie amibienne.

Présentation. — Boîte de 150 grammes.

Posologie et mode d'emploi. — Cure de 20 jours : un jour sur deux 1 à 4 cuillerées à café de granulés aux deux principaux repas ; le jour intermédiaire, un sel arsenical : **Sanluol** (voir p. 934) ou **Stovarsol** (voir p. 1027).

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

PATHOLYSINE

(Traitement interne des néoplasmes.)

Deux formes : Ampoules et Pilules.

Composition. — Salicyl-arséni-oxybenzénol-magnésien.

Indications. — S'emploie dans tous les cas où le tissu conjonctif sous-cutané est intéressé, c'est-à-dire dans tous les cas de cancer, sauf le cancroïde.

Mode d'emploi. — 1^o Ampoules : Injecter quotidiennement une ou deux ampoules de 1 centimètre cube. En injections sous la peau de l'abdomen ou des membres ou en injections intramusculaires dans les muscles fessiers ou dans ceux de l'épaule.

2^o Pilules : Quatre pilules par jour, au moment des repas.

Prix : Ampoules, 20 fr.; Pilules, 15 fr.

LABORATOIRES A. LEJEUNE
142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

PAVÉRINOL LALEUF

(Dragées glutinisées).

Composition. — Chaque dragée contient très exactement :

Papavérine Chlorhydrate.....	0,015
Camphre monobromé.....	0,15

Propriétés et Indications thérapeutiques. — Puissant stimulant respiratoire cardiaque et circulatoire. Le PAVÉRINOL dilate les vaisseaux coronaires, amplifie les contractions cardiaques, diminue l'excitation des fibres musculaires et en empêche la paralysie passagère.

Son emploi est recommandé dans les états infectieux et spasmodiques entraînant une insuffisance cardiaque.

Doses et mode d'emploi. — De 4 à 6 dragées par jour, suivant les indications du médecin traitant. Maximum : 10 à 12 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).

PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium)

Hypnotique, sédatif, analgésique.

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlorhydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium.

0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine. Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

Indications. — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

Formes et posologie. — Ampoules de Pavéron dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc. Dose : 1 ampoule à la fois.

Dragées de Pavéron dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. — Dose : 1 ou 2 dragées à la fois.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

PAXENE

Trois synergies phytothérapiques.

Sédatif Nervin : Valériane et Cypripedium.

Antispasmodique : Chaton de saule et Passiflore.

Cardiotonique : Cereus grand. et Aubépine.

Indications : Névropathies, Cardiopathies, Insomnies nerveuses.

Doses. — *Insomnies nerveuses :* 2 à 3 cuillerées à café le soir, pur ou dans un peu de tisane.

Nervosisme en général : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas.

Médication très active, agréable, non toxique et sans accoutumance.

Prix au public : 16 fr.

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS.

PÉLOSPANINES

Sulfates de terres rares.

Traitement des Bacilloses subaiguës ou chroniques et des « Déficiences organiques ».

Injectons intraveineuses :

Pélospanines A, ampoules de 2 cc.

Pélospanines B, ampoules de 4 cc.

Injectons intramusculaires :

Pélospanines C, ampoules de 2 cc.
(associat. lipoidique).

Pélospanines G. (gouttes) dites : Pelo G.
(Didyme, Calcium, Manganèse, Magnésium.)

Prix : A : 12 fr. — B : 18 fr. — C : 12 fr.

G : 15 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

PENNÈS (Produits).

Sel de J.-A. Pennès :

« **Véritables bains de mer chauds.** »

Hygiénique, reconstituant, stimulant. Remplace les bains alcalins et ferrugineux et surtout les bains de mer.

Nouveau conditionnement en étui léger, souple, facile à vider, imperméable, assurant la conservation indéfinie.

Gynécologie. — Préventif des vergetures par assouplissement des fibres élastiques du derme :
« Stimule les nouveau-nés chétifs ».

Vinaigre de J.-A. Pennès.

« **Le seul vinaigre antiseptique salicylé.** »

Hygiénique, désinfectant, rapport favorable de l'Académie de Médecine.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque. — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

PEPSODIA

Comprimé saturant magnésien anti-acide
anti-dyspeptique et anti-gastralgique
Régulateur de la digestion.

Présentation et Composition. — Comprimé friable d'un emploi très pratique, utilisant à la fois l'action neutralisante des sels alcalins et alcalino-terreux et les propriétés absorbantes des sels neutres. Ne contient aucun toxique.

Indications. — Pyrosis, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Spasmes pyloriques, Aérophagie, Troubles nerveux d'origine gastrique (Migraine, insomnie, vertige, nervosisme), Gastrites inflammatoires et toxiques. Ulcérations de l'estomac.

Mode d'emploi et Doses. — Dans les cas légers, 1 à 2 comprimés délayés dans un demi-verre d'eau froide ou tiède dès le début des sensations pénibles. Peut être croqué comme une dragée.

En cas de gastrites ou d'ulcérations 2 à 4 comprimés et plus (pansement calmant).

Aucune contre-indication.

Prix au public : 40 comprimés : 9 francs.

LABORATOIRE CHIMICO-THÉRAPIQUE DE PARIS

24, rue Paul Bert — PARIS (XI^e).

Téléphone : Marcadet 20-28.

PEPTALAC

Le nouvel aliment digestif.

Analyse :

Graisse.....	22, 5 p. 100
Protéine.....	19. —
Protéine digestible.....	8. —
Lactose.....	31. —
Amidon. Hydrates de carbone ...	10. —
Matières minérales.....	6. 5 —
Eau.....	3. —
	<hr/> 100. 0 %

Les difficultés et les inconvénients attachés à la préparation de lait pré-digéré et peptonisé à l'usage des malades et de tous ceux qui souffrent de faiblesse gastrique ont été enfin surmontés par ce produit hautement scientifique.

Peptalac est un aliment contenant du lait non écrémé et de l'amidon dextrinisé. Il est pré-digéré par un procédé nouveau et séché sur les rouleaux, dont une poudre crémeuse et floconneuse, dans laquelle une proportion de 22 p. 100 de protéine a été peptonisée et de 25 p. 100 d'amidon converti en une forme soluble et d'assimilation facile. Puisqu'il contient une proportion de farine de froment, pré-digérée, il constitue un aliment idéal pour le sevrage des bébés de 8 à 9 mois prenant une nourriture plus solide. Le Peptalac se prépare instantanément par la simple addition d'eau chaude, et le patient peut le prendre sans attendre, puisque la pré-digestion a été faite au cours de la fabrication.

Société de Spécialités Diététiques et Pharmaceutiques,

22, rue des Belles-Feuilles — PARIS (16^e.)

et W. P. Wrathall.

204, rue Royale — BRUXELLES.

PEPTALMINE

Peptones de Viande et de Poisson

Extraits d'Œuf et de Lait

Farine de blé dans l'enrobage.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique polyvalente.

Indications. — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulés, *une heure avant chacun des trois repas.*

Enfants : Moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 15 fr. ; granulés : 15 fr.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

PEPTALMINE MAGNÉSIÉE

Peptones de viande et de poisson.

Extraits d'œuf et de lait.

Farine de blé dans l'enrobage.

Sulfate de Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholécystites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillérées à café de granulés ou 4 dragées 1 heure avant chacun des 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 15 fr. ; granulés : 15 fr.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

LABORATOIRE

DES PRODUITS SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

PEPTICOL

Forme. — Elixir de goût aromatique *très agréable*, absorbé sans répugnance, même par les tout jeunes enfants.

Sa forme liquide en permet une *assimilation parfaite* et une *action rapide*.

Composition. — Peptones de viande, de poisson, d'œuf, de lait, intégralement solubilisées.

Glycérine.

Alcool faible (titre 4°).

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-choc complète ; spécifique des intoxications d'origine alimentaire ; excite l'appétit et facilite la digestion en augmentant et régularisant les sécrétions des glandes salivaires, des muqueuses gastriques et intestinales ; favorise les sécrétions et le péristaltisme du gros intestin.

Indications. — Urticaire, Manque d'appétit, Mauvaises digestions ; Intolérances stomacales ; Prurits ; Somnolences après les repas ; Flatulences ; Asthme.

Posologie. — *Enfants* : 1/2 cuillère à café.
Adultes : 1 à 2 cuillères à café, 10 minutes avant les repas.

Prix au public :
grand modèle : 15 francs.
petit modèle : 7 francs.

Laboratoire du Pepticol
13, avenue du Maréchal-Foch
DAMMARIE-LES-LYS (S.-et-M.).

PEPTODIASE

Stimulant gastrique

Forme. — Gouttes.

Composition. — 1^o Association de :

Chlorure de calcium.

— magnésium.

— sodium.

sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2^o **Principes amers de la gentiane**, renforçant l'action des chlorures.

Propriétés thérapeutiques :

Réveille l'appétit.

Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs.

Accélère la digestion.

Favorise l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Atonie gastrique.

Hypoacidité.

Hyposécrétion.

Digestion lente.

Aérogastrie.

Anorexie.

Posologie. — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

Enfants : IV gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-Interne en Pharmacie —
Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Fac. de
Méd. de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 28-96.

PEPTO-FER JAILLET

Composition. — Combinaison organique chlorée de peptonate de fer.

Avantages. — Le fer dans le PEPTO-FER du Dr JAILLET est *animalisé* par la peptone, ainsi l'organisme l'assimile-t-il avec une grande facilité ; le taux d'hémoglobine dans le torrent circulatoire est rapidement augmenté, sans aucune fatigue, ni pour l'estomac, ni pour l'intestin. La peptone facilite la digestion et y apporte son rôle antianaphylactique.

Le PEPTO-FER du Dr JAILLET n'a pas la saveur styptique de la plupart des préparations ferrugineuses, mais son goût agréable le fait accepter favorablement par le malade ; de plus, il ne noircit pas les dents et y ne constipe pas.

Indications. — *Anémies.*

Forme pharmaceutique. — Elixir.

Doses. — *Grandes personnes* : 1 verre à liqueur après chaque repas.

Enfants : 1 à 2 cuill. à café après les repas dans un peu d'eau.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : 14 francs au public.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS.

PEPTOGIL

Peptones gastriques et pancréatiques.

Propriétés thérapeutiques. — Médication antianaphylactique polyvalente spécifique de tous les albuminoïdes.

Indications. — Urticaire, migraines, phénomènes congestifs qui suivent les repas, troubles du foie et de l'intestin et toutes manifestations anaphylactiques des enfants et adultes.

Conditions d'emploi. — 3 fois par jour 1/2 heure avant les repas, 2 à 4 comprimés.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

PEPTO KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment.

Liqueur très agréable contenant des glycéro et de la Kola.

Dose et mode d'emploi. — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Indications. — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, etc.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

PEPTONAL

Composition. — PEPTONE de viande totale rendue inaltérable par dragéification spéciale.

Action. — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

Indications. — Migraine, somnolence, frissons, lourdeur après les repas (crise émo-clasique atténuée). Urticaire.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés dragéifiés. — Granulé.

Dose. — Deux comprimés 1 heure avant chaque repas, ou une cuiller à café de granulé.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires DURET et REMY
et du Docteur Pierre ROLLAND
ASNIÈRES (Seine).**

PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone, de glycérine et de fer.

Gouttes concentrées. Elixir. Vin.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :*

X à XXX gouttes ou 1 verre à liqueur d'Elixir ou de vin à chaque repas. *Enfants :*

I goutte par année d'âge 2 fois par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstitution du globule rouge du sang.

Indications. — Tous les états anémiques et chlorotiques.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

PEPTONE VASSAL

SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf. Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.

Dose. — 3 cuillerées à soupe par jour dans le potage ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente 600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Echantillon gratuit sur demande.

Établissements Léon DANJOU — LILLE.

PEPTOSTHÉNINE CHOAY

Composition. — Association opothérapique digestive suivant formule :

Poudre gastrique	15 cgr.
— entéro-pancréatique ...	15 —
— hépatique	15 —
— biliaire	5 —

Pour 1 cachet ou 1 comprimé de 50 cgr.

Indications. — Troubles dyspeptiques par insuffisance des glandes digestives.

Mode d'emploi. — Un cachet ou comprimé à la fin de chacun des principaux repas.

Prix : 15 francs la boîte de 24 cachets ou 30 comprimés.

Laboratoire CHOAY

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 44-09 et 44-10.

PERCAINE CIBA

Anesthésique local

Chlorhydrate de la diéthylène-diamide de l'acide a-butyloxyinchoninique.

Anesthésique local à l'action très intense (10 fois celle de la cocaïne) et d'une très longue durée. Utilisable par injections et en surface. Médicalement son action analgésique est précieuse dans le traitement des états douloureux les plus divers.

Doses. — *Anesthésie par infiltration.* — Solution : de 1 à 2 p. 1 000, additionnée ou non d'adrénaline : de 2 à 150 centimètres cubes.

Anesthésie rachidienne. — Ampoules de 20 cc. à 1/1500 (JONES), et de 2 cc. à 5 p. 1 000 (QUARELLA).

Anesthésie des muqueuses, de l'urètre, de la vessie. — Solutions de 1/1000 à 2 p. 100 (oto-rhino-laryngologie).

Présentation :

Comprimés de 5 centigrammes pour la préparation extemporanée des solutions. Tube de 20 comprimés : 18 francs.

Ampoules : Boîte de 5 à 2 cc. : 7 francs. Autres ampoules pour infiltration et rachi (demander notice).

PERCAÏNAL CIBA

Onguent analgésique et antiprurigineux. —

Produit une analgésie sûre et prolongée de toutes les lésions ou éruptions douloureuses, muqueuses ou cutanées. Sa formule associe à la puissante action analgésique de la Percaïne les effets calmants et antiphlogistiques de ses autres composants.

Indications principales. — Eczémas, prurigo, crevasses, gerçures, ulcères, zona, prurit anal et vulvaire, fissure anale, hémorroïdes, etc.

Le tube : 12 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

PÉRICOLS DU D^r LEGROS

Présentation. — Conglomérés à base de glycérine pouvant contenir tous médicaments, de forme discoïde d'élasticité parfaite.

Avantages. — Entre en contact parfait avec la muqueuse du col utérin, épousant la forme des culs-de-sac. Fonte parfaite.

Composition. — Péricols bellado-iodurés ; au thigénol ; à l'ichtyol ; au collargol ; belladostovainés ; à l'adrénaline ; ichtyol-belladonnés, etc...

Et toute formule spéciale désirée par le médecin.

Indications. — Toutes les affections gynécologiques.

16 fr. la boîte de 6. — 38 fr. la boîte de 20.

Laboratoire des Péricols du D^r LEGROS

G. LESOURD, Pharmacien,

18, rue Ferdinand-Flocon — PARIS (XVIII^e).

PÉRISTALTINE CIBA

Glucoside pur du *Rhamnus Purshiana* (Cascara), agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cc. 1/2).

Ne produit pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation chronique : formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention.

Comprimés — Cachets — Ampoules.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 cachets, 2 à 4 comprimés, 1 à 2 ampoules. — *Enfants* : 1/2 à 1 1/2 comprimé, 1 cachet. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

La boîte de 20 cachets : 8 fr. 50.

Le flacon de 20 comprimés : 7 fr. 50.

La boîte de 5 ampoules : 18 francs.

La boîte de 20 ampoules : 65 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

PERLES JEKA

Antiseptique des voies respiratoires.

Composition. — Méthyl-pyrocatéchine, 0,10 ; Sulfoléal, 0,10 ; Terpine oxydée, 0,05 ; Di-iodothymol, 0,02 ; Viniebla et Lactucar ext., 0,02.

Indications. — Toutes affections, aiguës ou chroniques, des voies respiratoires : rhumes, bronchites, grippe, coqueluche, emphyseme, asthme, catarrhe, pleurésie, pneumonie, tuberculose, etc...

Mode d'emploi. — 2 perles au début de chacun des deux principaux repas.

Enfants au-dessus de 10 ans : 1/2 dose.

Prix du flacon : 12 francs.

Laboratoire J. DELORME

13, rue St-Agricol — AVIGNON (Vaucluse).

PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, pré-tuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PERSODINE LUMIÈRE

Traitement de l'Hypo-nutrition et de l'Anorexie.

Constitution. — Préparation stable à base de Persulfate alcalin pur, établie par nos procédés spéciaux, sous forme de comprimés.

Propriétés. — Active le métabolisme général et crée le besoin de s'alimenter.

La PERSODINE LUMIÈRE réalise l'oxygénothérapie interne par la production d'oxygène naissant qui active dans une très large mesure les échanges nutritifs, accroît très notablement l'assimilation.

Les aliments ingérés avec faim sous son influence sont assimilés parce qu'ils répondent à une sollicitation organique profonde.

Indications. — Toutes les fois que pour une cause quelconque l'appétit fait défaut chez une personne malade, ou simplement déprimée : tuberculose, rachitisme, convalescents de maladies aiguës, opérés. chlorotiques, neurasthéniques, hypochlorhydriques, etc.

Éviter l'usage de la PERSODINE LUMIÈRE chez les malades présentant une hyperchlorhydrie accentuée.

Doses courantes. — 2 fois par jour, un quart d'heure avant les repas, dans un quart de verre d'eau pure, non sucrée.

Adultes : 3 comprimés.

Enfants de 8 à 14 ans : 2 comprimés.

Enfants de 2 à 7 ans : 1 comprimé.

Formuler. — Flacon de comprimés de PERSODINE LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE.

23, Cours de la Liberté — LYON.

PERUBORE (Comprimés)

Désinfectant rationnel des voies respiratoires.

Inhalations — Gargarismes.

Composition et forme. — Association d'essences balsamiques et de principes actifs de plantes, présentée sous forme de comprimés progressivement solubles.

Chaque comprimé contient	{	Baume du Pérou.....	0 03
		Essences aromatiques.....	0 025
		Borate de soude.....	0 60
		Bicarbonate de soude.....	0 30

Propriétés thérapeutiques. — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

Indications thérapeutiques. — Rhumes, angines, toux, affection de la gorge, enrrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza.

Posologie et mode d'emploi. — 1° *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2° *Gargarisme* : à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Pulvérisation : dissoudre 2 à 3 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 273, r. Victor-Rauter.,

PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoïétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

Formule :

Cacodylate de soude pur.....	20 centigr.
— de magnésie pur.....	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Soluté chloruré isotonique.....	5 cc.

Indications :

Tuberculose, Prétuberculose, Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Paludisme, Dermatose, Tertiariisme, Etats cancéreux, Cachexies.

Emploi :

Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

PHAGOSTHYL MANGANÉ

(Exempt de strychnine.)

Formule :

Cacodylate de manganèse	2 centigr.
— de soude.....	10 —
— de magnésie	8 —
— de calcium	10 —
Eau distillée.....	5 cc.

Indications. — Carences, Dénutrition, Décalcification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

Emploi. — Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions aseptiques d'usage.

L'injection des Phagosthyl est absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

PHAGURYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-5.

Forme. — Dragées.

Composition. — Santalol β , Essence de Cèdre, Térébenthine, Salicylate de Phényle, Lupulin, Formine.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiseptique des voies urinaires, Décongestif, Balsamique et Diurétique.

Indications. — Blennorrhagie, Rétrécissements, Urétrites, Cystites, Prostatites.

Mode d'emploi. — Six, huit à douze dragées par 24 heures.

L'étui : 15 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

PHARYNGASEPTYL

Composition. — Résorcine, Méthylpyrocatechine, Acides borique, salicylique, tartrique, benzoïque, Terpinéol, Cinéol, Myrthol, Pinènes et Polyterpènes purifiés.

Forme. — Poudre.

Indications. — Laryngites, Trachéites, Sinusites, Chordites, Fatigue vocale, Enrouement, Catarrhe tubaire, Stomatites, Pharyngites, Amygdalites, Angines diverses.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à café dans un verre d'eau chaude, 2 à 4 fois par jour en gargarismes, bains de gorge, fumigations, inhalations, vaporisations, lavages et bain nasal.

Enfants : 1/2 cuillerée à café.

Laboratoire des Vaso-Rhinol

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

PHÉNACODINE

Composition. — Diéthylmalonylurée, Lactophénétidine, Codéine phosphaté.

Forme. — Comprimés.

Mode d'action. — Hypnotique doux et inoffensif.

Indications. — Toutes les Insomnies : Insomnies nerveuses banales, Insomnies dues au surmenage, Insomnies de la neurasthénie, des diverses névroses, Insomnies causées par la douleur ainsi que dans les cures de désintoxication.

Mode d'emploi. — Avaler 1 à 4 comprimés avec de l'eau, 1 ou 2 heures avant de se coucher.

Laboratoires des Produits VELY
132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

PHILOGASTRINE

(Comprimés.)

Traitement dialytique des dyspepsies. Réalise la concentration optima du contenu gastrique. Assure l'évacuation pylorique.

Forme. — Comprimés de 2 gr. 50.

Composition p. 100 :

Lactobiose	90
Citrate de soude.....	2
Bicarbonate de soude.....	8

Emploi. — 2 comprimés dans 125 cc. d'eau tiède 2 heures après le repas, en une fois. Même dose, par gorgées, en cas de douleurs.

Indications. — Toutes dyspepsies.

Action rapide sur douleurs, aigreurs, brûlures, pesanteur, etc... Usage prolongé fait disparaître les troubles sécrétoires.

Laboratoires REVEL
34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

PHLÉBOGUIL

Thérapeutique nouvelle des *affections veineuses* (hémorroïdes, varices, troubles de la ménopause, etc.).

Composition. — 1° *Aesculus hippocastanum* et *hamamelis virginica* ; toni-veineux puissants ; 2° *Gui de pommier* : hémostatique veineux remarquable. Hypotenseur artériel (dans la diathèse veineuse est souvent associée l'hypertension artérielle).

Vaso-dilatateur des capillaires et, de ce fait, *lutte énergiquement contre les troubles trophiques qui accompagnent l'état veineux* (trophœdème, prurit, ulcère variqueux, etc.).

Posologie. — X à XXX gouttes (à dose progressive) par jour.

Expérimenté dans les hôpitaux parisiens.

Echantillons et littérature au Corps médical.

Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III^e).

PHLEBOTONINE

Solution d'extraits fluides ou stabilisés agissant sur le cœur (gui, genêt, aubépine) et les vaisseaux (*hamamelis*, *viburnum*, *cupressus*; etc...).

Avantages. — Aucun trouble digestif et aucune toxicité.

Indications. — Troubles circulatoires, varices, phlébites, hémorroïdes, etc.

Forme. — Liquide, flacon de 125 cc. pour un traitement de 10 à 12 jours.

Dose. — 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 16 francs.

G. MARTINIE, Pharmacien

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e),
et 37, av. de l'Echo — SAINT-MAUR (Seine).

R. C. Seine 440-107.

Tél. : Roquette 86-84 ; Gravelle 04-32.

PHOSOFORME

Formes. — Solution, Solution arsénée, Gouttes.

Principe actif. — Acide éther éthylorthophosphorique.
Bibliographie : Professeur Cavalié, Bordeaux. — Prof. Escat, Toulouse. — Professeur Gérard, Lille. — Professeur Rémond, Toulouse. — Professeur Spillmann, doyen Faculté de Nancy, etc.

Indications thérapeutiques. — Etats dyspeptiques. — Neurasthénies. — Rhumatisme chronique. — Lithiases. — Convalescences : Grippe, etc. — Phosphaturie. — Asthénie. — Azotémies. — Nutrition des tuberculeux et prédisposés. — Dermatoses. — Alcaloses.

Mode d'emploi. — *Solution et solution arsénée :* 2 cuillerées à soupe par jour, chaque cuillerée dans un grand verre d'eau, de boisson, de vin blanc ou rouge sucré, à absorber au cours des repas.

Gouttes. — C gouttes midi et soir, prises comme ci-dessus.

Prix : 20 fr. le flacon ; 12 fr. le 1/2 flacon.

Durée : 12 à 15 jours.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise.)

PHOSORINE

(Pommade nasale)

Forme pharmaceutique et composition.

— Pommade à base d'oxyde de Terpilène, camphre, alcool mentholique, essences végétales.

Propriétés. — Décongestionnante, antiseptique, calmante.

Avantages. — Très active et nullement irritante pour la muqueuse nasale.

Indications. — Toutes les inflammations du nez et du pharynx. Traitement préventif de toutes les épidémies.

Présentation. — En tube.

Laboratoires C. VIDAL
46, rue de Grenelle — PARIS (VII^e).

PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

Indications. — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours, ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos ; 2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5 : 2 par jour.

S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PHOSPHARSOL

Composition. — Préparation phosphoarsénée organique combinée à la strychnine.

Indications thérapeutiques. — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

Doses et mode d'emploi. — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser ces doses.*

Prix en France : 12 fr. 50 la boîte.

Dépôt général pour le gros :

Laboratoires RICARDOU

Docteur en pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

Tél. : Elysées 76-48.

PHOSPHATES DU D^r PINARD

EXTRAITS DIRECTEMENT DES OS

Phosphate de chaux du D^r Pinard.

Dose par jour. — 2 à 4 cuillerées à potage (*adultes*) ;
2 à 4 cuillerées à dessert (*nourrissons et enfants*).

Phosphate de chaux insoluble, en molécules infinitésimales, dans un liquide isotonique, le seul obtenu en partant directement des os. 13 fr. le flacon pour un traitement de 8 à 10 jours (*adultes*) ; 15 à 20 jours (*enfants*).

Prétuberculose, Grossesse, Fractures, Phosphaturie, Névrose.

Phosphate Pinard irradié.

Doses par jour. — 2 cuillerées à potage (*adultes*) ;
2 cuillerées à dessert (*enfants*) ; 2 cuillerées à café (*nourrissons et enfants jusqu'à 3 ans*).

Emulsion d'ergostérine irradiée (Vitamine D) dans le « Phosphate de chaux du D^r Pinard », 1 milligramme et demi de Vitamine D par cuillerée à potage, soit l'équivalent de 250 grammes d'huile de foie de morue.

17 fr. 50 le flacon pour un traitement de 10 jours (*adultes*) ; 20 jours (*enfants*).

Rachitisme, Troubles de croissance, Tuberculose, Allaitement, Fractures.

Phospharsyl.

Doses par jour. — 2 cuillerées à potage (*adultes* :
8 jours sur 12 ; 2 cuillerées à dessert (*enfants*
au-dessus de 4 ans), 8 jours sur 12.

Phosphate Pinard méthylarsiné (3 centigr. de méthylarsinate de soude par cuillerée à potage).

14 fr. le flacon pour un traitement de 15 jours (*adultes*), 25 jours (*enfants*).

Inappétence, Amaigrissement, Débilité générale, Cachexies.

Sous leurs trois formes les « Phosphates Pinard » se mélangent au lait sans le décomposer, avantage capital pour la thérapeutique infantile.

N.-B. — Il y aura toujours intérêt à prescrire le « Phosphate Pinard simple » en alternance soit avec le « Phosphate Pinard irradié », soit avec le Phospharsyl (8 jours l'un, 8 jours l'autre).

88, boulevard Saint-Denis — COURBEVOIE,

PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Glycérophosphates très purs qui ont servi aux expériences de M. le Professeur Albert Robin (Communication à l'Académie de Médecine du 24 avril 1894).

Formes et doses. — *Solution gazeuse* (de glycérophosphate de chaux): 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Granulé (de chaux, ou composé): 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Propriétés et indications. — Double action reconstituante :

1° *Action reminéralisatrice* par l'apport du phosphore uni aux bases qui lui sont normalement associées dans l'organisme, sous la forme même — directement assimilable — adoptée par celui-ci ;

2° *Puissante action stimulante sur la nutrition*, par l'intermédiaire du système nerveux et de tout le système glandulaire.

M. MIGUET, *, Doyeur en Pharmacie

Établissements **JACQUEMAIRE**

VILLEFRANCHE (Rhône).

PHOSPHATOL VITAMINÉ IRRADIÉ

Vitamine D, Calcium et Phosphore, Fer.
Granulé recalcifant, Antianémique, Anti-rachitique.

Composition. — Poudre d'os frais, phosphate et polyglycérophosphates, sels de Fer, de Calcium, de Magnésium, de Manganèse, traces de Méthylarsinate disodique.

Chaque cuillerée à café contient 1 milligramme d'ergostérine irradiée et correspond à 500 *unités physiologiques-rat* (contrôles biologique et spectrophotographique).

Chaque boîte porte la date-limite d'utilisation.

Indications. — 1° Anémie infantile, lymphatisme. Etats ganglionnaires, rachitisme du nourrisson et de l'enfant. Troubles de la croissance, de l'ossification et de la dentition. Débilité. Inappétence.

2° Déminéralisation de la grossesse et de l'allaitement. Douleurs dorso-lombaires. Carie dentaire.

3° Tous les cas d'anémie, asthénie, convalescence, surmenage, ostéomalacie, phosphaturie, prétuberculose, troubles du métabolisme du calcium.

Posologie. — Jusqu'à 6 mois : 1/2 cuill. à café par jour.

De 6 mois à 5 ans : 1/2 à 1 cuill. à café par jour.

Au-dessus de 5 ans : 2 cuill. à café par jour.

Adultes : 2 à 4 cuill. à café par jour.

1 semaine d'interruption après 3 semaines de traitement.

Présentation. — En boîte métallique hermétiquement close.

La boîte de 200 gr. environ : 14 fr. 85

Laboratoires AXAREL

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

PHOSPHOBROM

Composition. — Bromure, Phosphate, Citrate alcalins.

Forme. — Granulé fondant soluble de goût agréable.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie. — Menstrues douloureuses. — Vomissements incoercibles de la grossesse.

Laboratoire SERINDAT

22, rue Poncelet — PARIS (XVII^e).

PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés contenant aussi de la magnésie, du fer, de la silice dans les proportions où on les trouve dans l'économie.

Forme. — Granulé, cachets, comprimés.

Indications. — Différentes tuberculoses, rachitisme, ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement, anémie, convalescence, surmenage nerveux, phosphaturie.

Dose et mode d'emploi. — Granulé : *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide.

Enfants de 3 à 10 ans : 1/2 dose.

Nourrissons : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés : 2 à 4 par jour ; enfants 1/2 dose.

Chaque cuillerée à café de granulé de chaque cachet ou comprimé contient 0 gr. 50 de principe actif.

Prix actuel : 12 francs.

Envoi d'échantillons sur demande adressée à la

Pharmacie SEQUIN

165, rue Saint-Honoré — PARIS.

PHOSPHOGAÏACOL MARY

Nature. — A base de sels calciques assimilables, avec addition de sulfogaïacolate de potasse et de nucléinate de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

Forme. — S'emploie sous la forme de granulé très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillerées à café.

Laboratoire

du reconstituant MARY

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

PHOSPHOGÈNE FAVRICHON

Aliment de croissance pour les enfants, le plus riche en phosphates assimilables.

Composition. — Froment de faible densité, trié, préparé, moulu sur meules et bluté modérément. On conserve ainsi la plus grosse partie des éléments minéraux. 7 p. 100 de légumineuses amènent le taux d'azote à son optimum et donnent un peu de sels métalliques (fer).

Indications. — Alimentation des enfants. Plus spécialement : rachitisme, retard à l'ossification, Femmes enceintes et nourrices (contre la déphosphatation), Surmenés et convalescents.

Emploi. — 1 ou 2 potages par jour.

Littérature et échantillon sur demande.

Produits diététiques FAVRICHON

Pharmacien-chimiste

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).

PHOSPHOLÉOSE DEMASLES

Succédané de l'huile de foie de morue.

Reconstituant physiologique de goût agréable.

Composition :

Phospholéose A : Iode organique, tannin, phosphore, glycéro-arséniate de soude (nouveau sel d'arsenic organique).

Phospholéose B : Même composition, mais sans arsenic.

Indications. — Lymphatisme, pré-tuberculose, anémie, croissance, adénopathies, convalescences.

Présentation. — Une seule forme : liquide.

Posologie :

De 3 ans à 6 ans : une cuillerée à café avant les 2 principaux repas.

Au-dessus de cet âge : une cuillerée à soupe avant les 2 principaux repas.

Phospholéose Σ. — Traitement arséno-mercuriel dissimulé associé à l'iodure.

Composition :

Une cuillerée à soupe de PHOSPHOLÉOSE Σ contient : 0,01 de Hg + 0,001 de As + 0,10 d'iodure + 0,10 de phosphate.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe.

Enfants : par cuillerées à café.

Prix : 14 fr.

Laboratoires DEMASLES
à VIENNE (Isère).

PHOSPHOMAGNÉSIUM

Composition. — Hypophosphite, glycérophosphate, carbonate, citrate de magnésium.

Mode d'emploi. — 3 comprimés par jour.

Indications thérapeutiques. — Le *Phosphomagnésium* protège et fortifie la cellule. Toutes les insuffisances physiologiques dues à la carence magnésienne.

Laboratoire SERINDAT

22, rue Poncelet — PARIS (XVII^e).

PHOSPHOPINAL-JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique.

Indications. — *Réminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

Fixateur des sels de chaux. — *Aliment de la cellule nerveuse* : Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Pas de contre-indication.

Formes et doses moyennes.

Capsules : adultes : 4 à 6 par jour.

 enfants : 2 à 3 par jour.

Elixir : adultes : 2 cuillerées à café par jour.

 enfants : 1 cuillerée à café par jour.

Gouttes : adultes : 40 à 60 par jour.

 enfants : 20 à 30 par jour.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

LE PHOSPHOPINAL-JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

Prix : 14 fr.

Laboratoire du PHOSPHOPINAL-JUIN

10, impasse Milord — PARIS.

Tél. : Marcadet 37-98.

PHOSTYL PY

Composition. — Acide orthophosphorique, Méthylarsinate de strychnine, Manganèse.

Propriétés. — Augmente le nombre des globules rouges et les enrichit par fixation de Fer. Donne le coup de fouet nécessaire à la remise en route et agit comme un tonique d'effet rapide et cependant durable. Puissant réminéralisateur, il arrête la Phosphaturie et permet la fixation de Ca-Na-K-Mg.

Indications. — Anémie générale et cérébrale, Neurasthénie, Dépression, Surmenage, Convalescence, Suites de grippe, Phosphaturie, Asthénie, Anorexie, Dénutrition des tuberculeux, Migraines

Posologie :

Adultes	XXV	gouttes	midi	et	soir.
12 à 18 ans.....	XV	—	—	—	—
6 à 12 ans.....	VI	—	—	—	—

Prescrire : **PHOSTYL PY** : 1 Flacon.

Laboratoire PY

58, bd Richard-Wallace — PUTEAUX (Seine).

PHYLACTONE BYLA

Cachets et Granulé.

Peptone spéciale à polyvalence protidique :
viande, poisson, lait, œufs.

Dose et mode d'emploi. — Un cachet ou une dose, une heure avant les repas, dans un peu d'eau froide.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique.

Indications. — Migraines, Céphalées, Urticaires et tous états morbides relevant d'une intoxication alimentaire d'origine anaphylactique.

Phylactone magnésinée

(dragées, granulé.)

Drainage des voies biliaires.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

PHYLLA

DYN

Chlorophylle Pure solubilisée, assimilable.

Propriétés physiologiques :

1° Seul le pigment chlorophyllien pur, isolé, est actif et assimilable contrairement à la chlorophylle des légumes verts crus ou cuits.

2° La chlorophylle relève la tension artérielle et la tonicité neuro-musculaire; elle renforce l'action de l'adrénaline.

3° La chlorophylle, dont la constitution chimique est proche de celle de l'hémoglobine, excite la moelle osseuse et fixe le fer sur l'hématie.

Indications :

Hypotensions artérielles (idiopathique, permanente, symptomatique).

Acrocyanoses (adynamie circulatoire). *Anémies* (la chlorophylle active les effets de l'opothérapie hépatique et apporte les matériaux de la rénovation sanguine).

Asthénies, Surmenage, Convalescences (la chlorophylle n'est pas toxique pour le foie et le rein).

Anorexie du nourrisson, Hypotrophies, Rachitisme (la chlorophylle sensibilise l'organisme à l'action des préparations irradiées).



Posologie :

XX à XXX gouttes avant les trois repas, une quinzaine sur deux.

Le flacon compte-gouttes = 18 francs.

Société d'Applications Pharmacodynamiques

5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII^e).

Diderot 37-93.

PHYSIOSTHÉNINE

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Toutes infections graves.

Indications thérapeutiques. — Grippe, Angine, Broncho-Pneumonie, Fièvre Typhoïde, Fièvre Puerpérale et toutes les infections.

Injections intramusculaires, région rétro-trochanterienne au point de Barthélemy ; l'injection est indolore. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Formes. — Boîtes *Adultes* : 4 ampoules 20 cc.

Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 cc.

Prix : 40 francs.

NÉO-PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections de moyenne intensité.

Forme. — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Prix : 22 francs.

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

PHYSOCRISINE

Solutions de lobe post. d'hypophyse.
(Opothérapie Fournier : Endocrisines.)

1° *Ampoules de 1 cc.* (boîte de 5), usage obstétrical seul.

2° *Ampoules de 10 cc.* (boîte de 3).
Injections intraveineuses toutes préparées. Trait. des Hémoptysies.

Lab^{res} FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

PHYTERGOL

Dragée vitaminée activée par les rayons ultra-violet.

Reconstituant complet, d'action sûre et rapide, utilisant de façon synergique les propriétés reminéralisatrices du Calcium et du Phosphore rendus assimilables par l'Ergostérine irradiée (vitamine D) et, d'autre part, l'action hémopoïétique de la Chlorophylle et du Carotène (vitamine A).

Composition. — Ergostérine irradiée, 0 gr. 00375 = 225 unités U. B. A. Chlorophylle, 0 gr. 01 ; Carotène 77 unités Javilliers ; Oxalate de fer, 0 gr. 05 ; Méthylarsinate disodique, 0 gr. 005 ; Chlorure de Manganèse, 0 gr. 05 ; Poudre d'arêtes de Poisson (phosphates marins) 0 gr. 25.

Formule pour 1 dragée.

Indications. — Toutes les déficiences organiques : Asthénies, Surmenage, Convalescence, Prétuberculose, Anémies de toutes natures, Chlorose, Lymphatisme, Rachitisme, Tétanie, Anorexie, Hypotrophie, Troubles de la croissance et de la puberté.

Dose et mode d'emploi. — Chez l'adulte et l'adolescent : 2 à 4 dragées par jour (1 à 2 à chaque repas).

Prix au public : 48 dragées, 18 fr.

Laboratoire Chimico-Thérapique de Paris.

24, rue Paul-Bert — PARIS (XI^e).

Tél. ; Marcadet 20-28.

PHYTINATE DE QUININE CIBA

Phosphate organique de quinine.

Contenant 57 p. 100 de quinine à 11 p. 100 de phosphore.

Réunit l'action spécifique de la quinine à l'action tonique et reconstituante de la Phytine. Très bien toléré. Très soluble.

Indications. — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

Doses. — Les mêmes que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine.

Le tube de 20 comprimés : 10 francs.

Le flacon de 50 comprimés : 20 francs.

On trouve aussi le Phytinate de quinine en vrac, et on peut le formuler comme les autres sels de quinine.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

PHYTYNE CIBA

inositohexaphosphate double de chaux et magnésie. Produit naturel extrait des graines végétales, contenant 22 p. 100 de phosphore en combinaison organique. Le plus assimilable des médicaments phosphorés. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritifs et de l'hématopoïèse.

Indications. — Débilité constitutionnelle, Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie, Convalescences difficiles, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 gr. par jour (2 cachets, 4 comprimés, 2 cuillerées à café de granulé).

Enfants : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

La boîte de 20 cachets, le flacon de 40 comprimés : 14 francs.

Le flacon de granulé : 16 francs.

On peut aussi formuler la Phytine magistralement.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

PHYTOGÉNINE BYLA

Composition. — Complexe bio-minéral et opothérapique, intégralement assimilable : Phytosphine, fluorure de sodium, nucléinate de manganèse associés aux : thymus, rate, surrénales, parathyroïdes, foie, moelle osseuse et os épiphyseaire.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur intensif, modificateur puissant des échanges nutritifs.

Indications. — Troubles de la croissance, tuberculose, rachitisme, dépression nerveuse, convalescences, phosphaturies, anémies et tous états de déchéance organique.

Dose et mode d'emploi. — *Granulé* : 3 cuillerées à dessert par jour, à croquer. — *Cachets* : 2 à 4 par jour. — *Comprimés* : 4 à 8 par jour. (Enfants demi-dose.)

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

PHYTO-LÉCITHINE

Médication phosphorée organique de l'anémie, la fatigue, les troubles nerveux, les croissances lentes, etc...

Propriétés thérapeutiques. — A toutes les propriétés de la Lécithine de l'œuf dont elle possède une composition globale identique, mais, d'origine végétale, extraite de graines oléagineuses, elle ne contient aucune substance capable de provoquer des phénomènes toxiques ou anaphylactiques.

Indications. — Particulièrement indiquée dans la convalescence d'affections aiguës ayant provoqué de l'amaigrissement et laissant derrière elles de la fatigue; dans les surmenages de tous ordres, physiques ou intellectuels, dans les périodes de puberté et de grossesse.

Conditions d'emploi :

Pour enfants : 3 comprimés par jour.

Pour adultes : 6 comprimés par jour.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

Laboratoires PROGIL

77, rue de Miromesnil — PARIS (VIII^e).

PHYTOMARINE

Formes. — Elixir, Gouttes.

Composition. — Extrait cytoplasmique et complexes organo-minéraux de l'algue marine. (*Laminaria flexicaulis*.) (Chaux, iode organique, phosphore, manganèse, glycérine, eau de mer isotonique.)

Indications. — Anémie, rachitisme, scrofule, bacillose, prébacillose, neurasthénie, affections pulmonaires, troubles de croissance, goître, diarrhées chroniques, dyspepsies gastriques, ulcères gastro-duodénaux.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées et II à XXX gouttes par jour.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne — PARIS

PHYTOSPLÉNOL PLÉ

Lipoïdes spléniques, Moelle osseuse, Poudre d'os, Polyopothérapie, Phosphore végétal, Nucléinates de fer et manganèse, Vitamine A.

Propriétés biologiques. :

Récalcifie (sans stéroïls irradiés), donne poids et appétit. Active les oxydations et échanges cellulaires. Désintoxique, Tolérance certaine même des nourrissons (à partir de 10 mois) ou des femmes enceintes. Le granulé de Phytosphénol est très agréable au goût.

Présentation : Posologie :

Dragées et granulés aromatisés. Inaltérables.

Nourrissons : 1 ou 2 cuillers à café granulés par jour.

Enfants : 4 dragées ou 4 cuillers à café. *Adolescents*

et Adultes : 6 dragées ou 6 cuillers à café granulés par 24 heures, aux repas.

Prix au Public : 18 francs (toutes Pharmacies).

Echantillons, Littératures : J. PLÉ, Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III^e).

PILULES BRONCHOTONIQUES ARCO

Composition. — Sulfate de Strychnine, arrhénal, codéine, extraits de valériane et de datura, terpène, baume de tolu.

Indications. — Bronchites, toux spasmodiques, toux persistantes surtout chez les malades déprimés, suite de grippe, laryngites, catarrhes tabagiques ou professionnels, asthme, emphyseme.

Doses. — 6 par jour. *Enfants* : 7 à 15 ans : 3 à 5 par jour.

M. GLORY, Pharmacien

38 bis, boulevard Beaumarchais — PARIS.

PILULES du D^r DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Pilules de 0 gr. 30, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée.

Affections hépatiques. Lithiasse biliaire. Insuffisance hépatique. Entéro-colite.

Dose. — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Le flacon de 100 pilules : 15 francs.

— 50 — : 8 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

PILULES du D^r SEJOURNET

Antidiabétiques.

Indications thérapeutiques. — Traitement du DIABETE sans régime trop rigoureux, le guérit souvent, l'améliore toujours sans crainte d'inconvénients. Evite les complications.

Doses et mode d'emploi. — Complexe sous forme de pilules dosées à 0 gr. 01 de Santonine, avec excipient balsamo-résineux.

Reconstituant de premier ordre, etc.

1 Pilule à chaque repas.

Prix de vente au public : 18 fr.

Laboratoires du D^r M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

PILULES HÉLÉNIENNES NAUD

Composition. — A base d'Hélénine cristallisée. Protoxalate ferreux et quassine.

Indications. — D'après les essais cliniques les plus récents (thèse du Dr E. PARIZOT) l'*Hélénine* constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

Mode d'emploi. — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pilules par jour aux repas.

Echantillon et littérature sur demande

Laboratoires LACROIX

MEROBIAN et FILS, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

PILULES LÉMARY

Traitement mercuriel discret

Dans le traitement de la syphilis acquise ou héréditaire, il y a très souvent un grand intérêt pour le médecin et même pour le malade à ce que ce dernier ignore quelle est la nature du médicament prescrit, soit que le médecin traitant, mal fixé encore sur le diagnostic veuille, le fixer définitivement par un essai de médication spécifique, soit qu'il tienne à ne pas troubler la paix d'un ménage, d'une famille, par la révélation de la nature du mal, soit enfin qu'il s'attache pour une raison quelconque à une discrétion absolue. Il trouvera dans les **Pilules Lémary**, nom banal quelconque, mais **NOM DÉPOSÉ**, ce qu'il désire : le **traitement mercuriel dissimulé** ou **traitement discret**.

L'étiquette du flacon porte seulement cette inscription :

PILULES LÉMARY

(formule A ou formule B ou formule C)
fortifiantes, dépuratives, reconstituantes.

Le prospectus placé autour du flacon n'est pas plus explicite et ne peut donner lieu à aucune indication. Le médecin a donc ainsi toute sécurité.

Pour les pilules Dupuytren Codex, dont la composition est : bichlorure de mercure 0,01 centigr. par pilule prescrire **PILULES LEMARY**, formule A.
— Dose habituelle, 1 à 3 pilules par jour, aux repas.

Pour les pilules Ricord Codex qui contiennent iodure mercurieux, 0,05 centigr. par pilule, prescrire **PILULES LEMARY** formule B. — Dose habituelle, 2 par jour, 1 à chaque principal repas.

Pour les pilules au biiodure de mercure prescrire : **PILULES LEMARY** formule C.

dont la composition { biiodure de mercure 0,005 millig.
est pour une pilule { iodure de potassium 0,25 centig.
Dose habituelle : 2 à 4 pilules par jour, selon le cas.
2 Pilules Lémary C = 1 cuill. à bouche de Sirop de Gibert.

Prix au public : 15 francs.

Littérature — Echantillons

Laboratoire du Dr H. PHILIPPE

14, rue Palais-Grillet — LYON.

PILULES LITHURANÉES

du Docteur BOVEIL
Traitement du diabète

Composition. — *Uranium* : Radio-actif, active la sécrétion des glandes.

Helonin : Décongestif du foie et du pancréas.

Benzoate de lithine : Dissolvant de l'acide urique, en excès chez les diabétiques.

Arséniate de soude : Tonique général. Stimulant des glandes endocrines.

Géranium Robertianum : Tonique et astringent.

Indications. — Le diabète sous toutes ses formes.

Doses et mode d'emploi. — 6 pilules par jour ; 2 avant chaque repas avec un demi-verre d'eau de Vichy ou de Vals.

Traitement normal : 2 mois environ.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 fr. l'étui de 60 pilules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 346-2.

Marc PARIS, Pharmacien de 1^{re} classe

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV^e).

PILULES MYOSOTIS

Molles

Composition :

Bichlorure de Hg.	0,005
Poudre d'opium	0,005
Poudre fraîche de coca.....	0,15
Extrait de gentiane.	0,04

Indications. — Traitement mercuriel *per os* suivant technique du D^r Vernes.

Emploi :

1^{re} semaine : 1 pilule par jour au repas de midi.

2^e semaine : 2 pilules par jour aux repas : midi et soir.

3^e semaine : 3 pilules par jour aux repas : matin, midi et soir.

4^e et 5^e semaines : 4 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 1 soir.

6^e et 7^e semaines : 5 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 2 soir.

8^e et 9^e semaines : 6 pilules aux repas : 2 matin, 2 midi, 2 soir.

En cas d'intolérance, redescendre à la dose immédiatement inférieure.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e)

Tél. : Laborde 08-00.

PILULES PHILIPPE

Potassium — Sodium

Forme. — En *pilules kératinisées* ; elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Prière de prescrire :

Pilules Philippe à l'iodure de potassium { à 0,50
à 0,20
à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les **Pilules Philippe** à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium... à 0,20

Indications. — Artériosclérose. Adénopathies, Tension artérielle, Goitre, Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour en deux ou trois fois.

Prix au public : 14 fr.

Littérature et Echantillons

Laboratoire du Docteur PHILIPPE

14, rue du Palais-Grillet — LYON.

PILULES V. E. DOUMER

Formule :

Chaque pilule contient 5 centigr. de bleu de méthylène *chimiquement pur.*

Doses :

De 4 à 10 pilules par jour, suivant les cas, espacées dans la journée.

Indications :

Affections des voies urinaires, entérite bacillaire, paludisme, fièvre de Malte, grippe, angine de poitrine, sciatique, rhumatismes, etc.

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $\text{NH} \begin{array}{c} \text{CH}^2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{CH}^2 \end{array} \text{NH}$, alcalin organique du groupe des Pyridines. (Inscrit au Codex Français 1908.)

Granulé effervescent, dosé à 0,20 cgr. de Pipérazine pure par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif. 4 à 6 cuillerées à café par jour dans les crises aiguës, dissoutes dans un demi-verre d'eau à distance des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Dissout 92 p. 100 des composés de l'acide urique ; réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique ; antiseptise les urines.

Indications. — Le plus actif des remèdes à prescrire dans toutes les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie : Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciaticque, Artério-sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue, cœur, estomac, vaisseaux.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).

PITULOBINE BYLA

(en ampoules).

Composition. — Extrait épuré de lobes postérieurs d'hypophyses, *titré physiologiquement* sur utérus de cobaye. Cinq dosages en *unités internationales* : AMPOULES : O = 10 u. i., A = 25 u. i. (1/8 lobe) ; B = 50 u. i. (1/4 lobe) ; D = 100 u. i. (1/2 lobe) ; E (intraveineuses) = 50 u. i. (1/4 lobes).

Indications. — Inertie utérine, hémorragie de la délivrance, salpingites chroniques, métrites, etc. Hémoptysies des tuberculeux, défaillances du myocarde, constipation.

Mode d'emploi. — Injections hypodermiques dans tous les cas, sauf pour les hémoptysies, où l'on emploie la voie intraveineuse (ampoules E).

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

PLAGÉINE SOULAS

(Ampoules, pansements)

Ni toxique, ni caustique.

Traitement de toutes les plaies.

Composition. — Solution aqueuse de Goudron Végétal désodorisé et décoloré, Essence de cèdre, Essence de lavande.

Propriétés physiologiques. — Antiseptiques, résolutives, épidermisantes, analgésiques, désodorisantes.

Indications thérapeutiques. — Plaies de toutes natures : Plaies aseptiques, Plaies opératoires, Traumatismes, Brûlures à tous les degrés.

Ulcères variqueux, Plaies atones : Escarres sacrées, Ulcères gangréneux diabétiques, Néoplasmes ulcérés. Plaies septiques ou souillées. Abscesses, Furoncles, Anthrax, Chirurgie conservatrice et esthétique.

Mode d'emploi. — Une ampoule dans un verre d'eau stérilisée ou bouillie. La solution obtenue s'emploie en pansements humides fréquents.

Echantillons et littérature sur demande :

Laboratoire SOULAS

119, rue de Sèvres — PARIS (VI^e).

PLASMA DE QUINTON

Nom déposé en 1937

Composition. — Eau de mer puisée dans l'Atlantique, avec des précautions spéciales, en des lieux et à des moments où la pureté de l'eau est parfaite, transportée à Paris sans délai, ramenée à un degré de concentration saline qui la rend comparable à ce point de vue au sérum du sang, stérilisée sans emploi de l'ébullition ni des agents chimiques, mise en ampoules de verre neutre et inattaquable.

Le Plasma de Quinton (toutes manipulations selon la méthode authentique de R. Quinton) *est l'unique préparation marine du monde entier soumise à un contrôle biologique quotidien qui en garantit l'efficacité et la régularité d'action.*

Bibliographie. — Pour les idées générales relatives à la Méthode marine, 23 p. de références *in* R. QUINTON. *L'eau de mer, milieu organique*, MASSON, Paris, 1912, 2^e éd. Pour les applications thérapeutiques de l'eau de mer, une centaine de références *in* JARRICOT, *Le Dispensaire marin*, MASSON, Paris, 1921.

Indications :

Traitement prénatal. Application la plus féconde en beaux résultats et celle qui possède les applications les plus nombreuses. L'Eugénique n'a pas d'armes plus puissantes. On sait qu'il a été fondé (D^r ARNULPHY, 1922) une *Ligue du Traitement prénatal*.

Ce traitement a pour objet (et l'expérience montre qu'il a pour résultat) : 1° de conduire à terme le produit conçu ; 2° de s'opposer à l'athrepsie et aux états de dénutrition si fréquents chez les héréditaires (tuberculose, syphilis, paludisme) ; 3° d'améliorer la nutrition de la femme enceinte (disparition constante et rapide des vomissements, même dans les cas les plus sévères).

Entérites des adultes et des grands enfants. Le traitement marin est efficace, quelle que soit la forme affectée par la maladie : colite muco-membraneuse, diarrhée, constipation pure, constipation avec débâcles.

Gastro-entérites des nourrissons. Qu'il s'agisse des formes vulgaires ou de l'entérite aiguë (entérite cholériforme) la guérison est la règle. Le traitement doit être institué sans hésitation, même dans les cas les plus redoutables. Plus le cas est grave, plus l'indication d'agir sans délai est formelle. Il n'existe aucune raison, en aucun cas, de différer le traitement.

Intolérance lactée, Athrepsie. L'amélioration se manifeste dès les premières heures qui suivent la première injection. Quel que soit le retard, l'athrepsique s'accroît immédiatement avec l'intensité maxima, l'accroissement normal du premier mois de la vie, s'il est d'ailleurs nourri et réchauffé comme il se doit.

Maladies de la peau (Psoriasis, Eczéma, Tuberculoses cutanées); *Maladies du Système nerveux* (Névralgies, Enuresis, Algies diverses, Gynalgie, Neurasthénie); *Tuberculoses osseuses et ganglionnaires.* Les succès sont habituels; impressionnants parfois de rapidité.

Régimes, doses d'injections. — Pour tous ces points essentiels au succès de la cure marine au Plasma de Quinton, se reporter aux notices envoyées gracieusement, par retour, à toute demande.

Présentation. — Ampoules de 5, 10, 30, 50, 100, 200, 300 et 500 cc.

Renseignements et littérature (Renseignements oraux à Paris et renseignements par correspondance; envois de notices sur les applications et la posologie du Plasma de Quinton : DISPENSAIRE RENÉ QUINTON, 4, rue de l'Arrivée, Paris (Gare Montparnasse).

Commandes et ordres d'expéditions :

LABORATOIRES DE BIOLOGIE APPLIQUÉE.

H. CARRION et C^{ie},

54, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

Tél.: Elysées 36-64 et Elysées 36-45.

Adresse télégr. Rioncar-Paris-123.

PLEXORINE VÉLY

(Médication bromée discrète).

Dragées glutinisées à base de :

Tri-bromure de sodium, ammonium, strontium,
Codéine, Levurine extractive, Paullnia sorbillis.

Action thérapeutique. — Calmant du système nerveux, antispasmodique.

Avantages. — Elimination rapide. Pas d'action secondaire sur la tension sanguine ni sur le myocarde ; pas de dépression intellectuelle.

Indications. — Sédatif de l'excitabilité motrice et vasculaire. Puissant analgésique non toxique chorée, tics, hystérie, crises nerveuses. Etats sympathicotoniques.

Mode d'emploi. — 1° Action sédatif (émotifs anxieux), doses légères réfractées : 2 à 4 dragées par jour ; 2° Action hypnotique, doses relativement massives : 4 à 8 dragées le soir, une heure avant le sommeil.

Laboratoires des Produits VÉLY
132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e)
Tél. : Passy 87-85.

PLOMBYL

Principe actif. — Diéthyl phosphate de plomb non toxique aux doses thérapeutiques.

Indications thérapeutiques. — Cancers et toutes tumeurs malignes vascularisées,

Forme. — Ampoules de 5 cc. en boîte de 10.

Dose. — Une ampoule tous les 4 à 5 jours, injections intra-musculaires.

Prix : 70 fr.

(Deux boîtes assurent la durée du traitement.)

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

PLURIBIASE

Indications. — Dyspepsies hyposthéniques.

Composition. — Comprimés à 2 noyaux.

Le 1^{er} externe, pepsine T. 500 ; Ext. Belladone ; Ext. Jusquiame, Sucre.

Le 2^e interne, Boldo, Bile dépigmentée, Pancréatine (T. 200), Kinase, Erepsine, Ferments lactiques.

Doses. — 2 comprimés avant chaque repas.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires Gastro - Entérologiques
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 69-13.

PLURION COUTURIEUX

(Procédé A. Lancien)

Description. — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le PLURION augmente l'activité des organes hématopoiétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

Indications. — 2 à 4 ampoules par jour dans les ANEMIES GRAVES. 1 ampoule par jour dans les anémies des CONVALESCENTS, PALUDEENS, SYPHILITQUES, CANCEREUX. 1 ampoule tous les deux jours dans les cas plus bénins.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

PNEUMOGÉINE RENARD

Composition. — Iodure double de caféine et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine combiné de l'iode et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

Propriétés thérapeutiques. — L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant, le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE, par son action

régulatrice respiratoire, assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel;

cardio-tonique, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle;

éliminatrice, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés, augmente la diurèse.

Indications. — I. Tous les états dyspnéiques: asthme, emphysème, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

II. Syndrome cardio-rénal.

Posologie. — Pendant les crises paroxysmiques, 4 à 8 cuillerées à café par jour dans de l'eau bien sucrée. Entre les crises, 2 à 5 cuillerées.

S'il est possible, verser le matin la dose prescrite dans un verre d'eau sucrée qu'on absorbe par petites gorgées dans le courant de la journée.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY.

PNEUMOGÉNOL

Deux formes : Sirop. — Dragées.

Deux formules : S. (sans digitale). — D (avec digitale).

Codéine, 0,01 ; Morphine chl., 0,000625 ; Extrait Ipéca, 0,005 ; Extrait Belladone, 0,005 ; *Extrait Digitale*, 0,002 ; Extrait Aconit, 0,025 ; Extrait Drosera, 0,0025 ; Eau de Laurier-Cerise, 0,50 par cuillerée à café et par dragée.

Indications principales. — Toux rebelle, Bronchites chroniques, Catarrhe, Asthme, Emphyseme, Tuberculose.

Doses et mode d'emploi. — 4 cuillerées à café ou 4 dragées dans la journée, 1 cuillerée à soupe ou 2 dragées le soir au coucher.

Prix : 12 fr.

Echantillons et littérature.

Laboratoire du PNEUMOGENOL

EPINAL (Vosges).

PNEUMO-LIPASE

Ampoules injectables.

Médication leucogène nutritive, antituberculeuse surtout.

Formule et technique du Docteur Victor Simon.

Composition. — Cholestérol, Ether benzyl-cinnamique, Huile d'olives camphrée débarrassée de ses acides. Trois concentrations (doses progressives) n^{os} 1, 2, 3.

Mode d'emploi et indications.

A. INJECTIONS EXTRA-PLEURALES, INTRA-PLEURALES, INTRA-PULMONAIRES : Pleurésies séro-fibrineuses, purulentes. Tuberculoses chroniques, évolutives, fébriles ou non. Asthme, Emphyseme.

B. INJECTIONS INTRA-LARYNGO-TRACHÉALES : Tuberculoses laryngées.

C. INJECTIONS INTRA-MÉNINGÉES : Tuberculoses méningées.

D. INJECTIONS INTRA-PÉRITONÉALES : Tuberculoses péritonéales.

E. INJECTIONSSOUS-CUTANÉES ET INTRA-MUSCULAIRES : Pré-tuberculoses, anémies, convalescences post-opératoires, surmenage, infections grippales, bronchites chroniques, infections urinaires (prostatites, etc.).

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoires H. YVRARD, 17, rue Soufflot — PARIS (V°).

Tél. : Odéon 56-67.

PNEUMOSTYL DAGUIN

Forme. — Ampoules de 2 cc. et ampoules de 6 cc.

Composition. — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyle, camphre, goménol, eucalytol, essences de labiées et huile d'olives neutre.

Mode d'emploi. — 1° Pneumostyl hypodermique (2 cc.). Boîte de 12 ampoules : 18 fr.
2° Pneumostyl intratrachéal (6 cc.). Boîte de 7 ampoules : 24 fr.

Indications. — Tuberculose, prétuberculose et toutes les affections des voies respiratoires.

Echantillons sur demande aux

Etablissements DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose.)
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Association du *phosphore* avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 milligr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complètement assimilable. Reminéralisant de choix.

Indications. — Neurasthénie, surmenage intellectuel et physique, convalescence, déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

Siróp. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Siróp. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.
3 formes : siróp, comprimés, ampoules. — Prix : 15 francs.

Laboratoire CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (I^{er}).

POLYBROMURE GONNON

Bromures de Sodium, potassium, ammonium et strontium.

Forme et Posologie.

Sirop : 1 cuillerée à soupe avant le coucher dans une infusion aromatique (2 gr. de polybromure).

Poudre : 1 mesure : 1 gr. de polybromure.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique, sans bromisme et sans fatigue d'estomac grâce à la présence du bromure d'ammonium et du bromure de strontium qui est un excellent cupeptique.

Indications. — Toutes maladies nerveuses, toutes affections du cerveau et de la moelle épinière, états convulsifs et troubles de l'intelligence.

Prix : Sirop, 12 fr. Poudre, 9 fr.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

POLYFERMENTS LALEUF

Granulé et Tablettes.

Composition. — Ferments digestifs totaux, associés aux Sels de Sodium et de MAGNESIUM.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Stimulant de la sécrétion glandulaire. Médicament de choix des dyspepsies de toute nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

Mode d'emploi et doses. — Une ou deux cuillerées à café ou 2 à 4 tablettes, à croquer ou à délayer dans 1/2 verre d'eau légèrement tiède, à la fin des principaux repas, ou au moment des troubles digestifs.

L'étui de granulé ou la boîte de 48 tablettes :
16 francs.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).

POLYIODURE GONNON

(*Iodures de Sodium, Ammonium, Strontium*).

Forme. — Sirop comprenant 1 gr. par cuil. à soupe d'iodures alcalins, associés aux écorces d'oranges amères et au vin de Bordeaux.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique dépuratif, non toxique, action rapide, tolérance parfaite.

Indications. — Engorgements, tumeurs, abcès, asthme, rhumatisme, goutte.

Dosologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour au milieu des repas.

Prix : 15 francs.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

POLYMINÉRAL FORT

GRANULÉ

Composition. — Adrénaline, fluorure de sodium, phosphate de manganèse, hydrate de magnésie, formiate de chaux, phosphate de potasse, lactate de chaux, glycéro-phosphate de chaux.

Indications. — Reminéralisateur pouvant être utilisé pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes de croissance, etc.

Formes et doses. — Existe sous formes de :

Polyminéral adultes (Adrénaline, 0,001 ; Fluorure de sodium 0,02 par mesure).

Doses : 2 à 6 mesures par jour.

Polyminéral enfants : Adrénaline, 0,005 ; Fluorure de sodium 0,01 par mesure).

Doses : Bébés de 1 à 3 ans : 1/2 à 1 mesure ; enfants de 3 à 8 ans : 2 à 3 mesures ; enfants de 8 à 15 ans : 4 à 5 mesures.

Polyminéral irradié (ergostérine irradiée, vitamine D).

Doses : Enfants jusqu'à 5 ans : 1 à 2 cuill. à café par jour ; enfants 5 à 15 ans : 2 à 3 cuill. à café par jour ; adultes : 4 à 6 cuill. à café par jour.

Prix : 12 francs ; irradié : 16 francs.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

MICHEL DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE.

POLYPEPTONAL

Composition. — Peptonates polyvalents de magnésie associés à des digestats chlorhydropeptiques de foie total et d'albumines des principaux légumes.

Forme pharmaceutiques. — Comprimés dragéifiés.

Action. — Draine la vésicule et les voies biliaires. Préviend la crise hémoclasique. Stimule les fonctions hépatiques.

Indications. — Migraines, urticaires, asthme eczémas, prurits, congestion du foie, atonie vésiculaire, troubles anaphylactiques et digestifs.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 comprimés 1/2 heure avant les principaux repas, dissous dans un peu d'eau.

Enfants : 1 comprimé une demi-heure avant les repas dissous dans un peu d'eau pure ou sucrée.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DURET et REMY
et du Docteur Pierre ROLLAND réunis
ASNIÈRES (Seine).

POMMADE AU NESTOSYL

Anesthésique par contact.

Caractéristiques. — Association d'éthers des séries phtalique et para-aminobenzoïque, puissamment anesthésique par contact.

Aucun produit des tableaux A et B.

Antiseptique.

Indications. — *Suppression infaillible et immédiate de la douleur* ou démangeaison provoquée par les plaies, inflammations, irritations, éruptions, et, d'une façon générale, *par toute affection qui a modifié l'intégrité de la peau* : Eczémas, Ulcères variqueux, Prurit vulvaire, Prurit anal, Prurit sénile, Prurit diabétique, Brûlures, Hémorroïdes, Engelures, Prurigo, Intertrigo, Escarres, Radiodermites, Fractures compliquées, Pansements douloureux, Urticaire, Herpès, Zona, Gale, Furoncles, Impétigo, Anthrax, Coups de soleil, Piqûres, etc...

Dans les cas aigus, *guérison locale.*

Conditions d'efficacité. — Nécessité d'une modification de l'intégrité de la peau, soit accidentelle (érosion, ablation ou distension), soit naturelle (muqueuse) ; un épiderme absolument intact est un obstacle à l'action de la pommade.

Nécessité, pour obtenir une action prolongée, de maintenir la pommade en permanence sur la lésion sous forme de pansement.

Posologie. — Aucune limite ni dans les doses, ni dans la durée du traitement.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires du NESTOSYL

P. BAUDE, pharmacien

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 96-46.

Adresse télégr. : Nestosyl 27 PARIS.

POMMADE BERTOL-VICHY

Composition. — Benzénol chim. pur. Résine fluide, Benjoin. Acide orthoxybenzoïque, sol. d'Adrénaline, Peroxyde de zinc chim. pur, Sérum hémopoiétique, Acide nitrique de Bismuth neutre de Benzoate.

La Pommade « Bertol-Vichy » est un médicament de premier ordre calmant les douleurs, désodorisant et facilitant une rapide *cicatrisation esthétique* ; une désensibilisation et un régime appropriés plus la Pommade « Bertol-Vichy » feront un traitement qui ne sera plus décevant.

Indications. — *Ulcères variqueux*, Eczéma variqueux, Eczéma des nouveau-nés, Eczéma chronique, Démangeaisons, rougeurs, boutons, brûlures, et toutes les lésions de la Peau.

Mode d'emploi. — En pansements renouvelés tous les jours.

M. HY, Pharmacien

61, avenue de Choisy — PARIS (XIII^e)

POMMADE FORNET

A l'Insuline Fornet.

Principe actif. — L'Insuline Fornet véhiculée dans un excipient de choix à pouvoir transdermique, remarquable. Titrage régulier. Aucun adjuvant.

Indications. — *Ulcères variqueux*. Plaies de toutes natures. Affections peaussières. *Cancers* ulcérés de la peau (communications récentes). Rhumatisme diabétique, etc...

Bien spécifier le nom : FORNET.

Prix : 15 francs le tube.

Vente et Echantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie

23, rue du Caire — PARIS (II^e).

Service d'Etude et de Fabrication :

Institut de Microbiologie

SARREBRUCK (Sarre).

POMMADE KLÉOS

Pommade Kléos Douce.

Indications. — Feux, rougeurs, eczéma, éruptions dues à la dentition des bébés

Composition. — Silicate de magnésie hydraté, Baume du Pérou, oxyde de zinc, Dermarone, excipient glycéro-aqueux.

Forme. — Pommades non grasses renfermées en tube étain.

Pommade Kléos Forte.

Indications. — Maladies de peau anciennes, gourme, acné, intertrigo.

Composition. — Essences naturelles, Baume du Pérou, Ichtyol, Acide borique. Soufre, Oxyde de zinc, excipient.

Forme. — Pommades renfermées en tube étain.

Ces pommades étudiées spécialement pour les enfants sont tout indiquées pour les épidermes particulièrement délicats.

Prix du tube ; 5 fr. 50.

Le double tube : 10 fr.

Littérature et échantillons :

Laboratoires GUERET,

2, rue des Cordeliers — MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret)

POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine.

Traitement spécifique des *dartres chroniques* ; s'adresse exclusivement à ces eczémas à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux dont la tenacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en décrapant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enrayer la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sebum-bacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verruques plates séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *sycosis*, la *teigne*, le *favus*.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir sur la partie malade.

Prix : 12 francs.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

POMMADE LOGEAIS

(Rectaméline)

Composition :

Extrait d'Hamamélis.....	6 gr.
Sulfoichtyolate de Soude....	6 gr.
Lanoline	9 gr. 50
B. Cacao.....	9 gr. 50
Ongent populeum Q. S. pour 100 gr.	

Ni cocaïne, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques.

Propriétés. — Atoxique, analgésique, décongestionnante et doucement vaso-constrictive. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite. Ne tache pas le linge d'une manière indélébile.

Indications. — Hémorroïdes externes. Prurits anal et vulvaire. Gerçures des seins.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir après lavage avec le doigt enduit d'une forte couche de Pommade Logeais et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes). Nous joignons une canule à chaque tube, ce qui permet de traiter les hémorroïdes internes par la Pommade Logeais.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoires Émile LOGEAIS

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

POMMADE MIDY

(Adréo-Styptique.)

Adrénaline	0 gr. 0066
Stovaïne	1 gr.
Anesthésine.....	1 gr.
Extrait de marron d'Inde frais stérilisé.....	2 gr. 50

Pour 100 grammes de pommade.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir, et après les garde-robes.

Propriétés thérapeutiques. — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction-antisepsie.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes haut placées.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).

POMMADE NOELLINE

Composition. — Pommade à base d'acide benzoïque et de tanin incorporés à un excipient à la fois gras et alcool.

Action. — Traitement préventif et curatif des gerçures des seins, et des rougeurs des bébés.

Mode d'emploi :

a. Gerçure des seins. *A titre préventif* : en massage des mamelons dans les derniers mois de la grossesse.

A titre curatif : En pansements, après lavage antiseptique.

b. Rougeurs des bébés. Application locale recouverte de poudre Noëlline.

Prix : le tube, 6 fr.

Laboratoire de la NOELLINE

GUINGAMP (Côtes-du-Nord).

POMMADE RAIMOA

Principes actifs. — Aristol. Éther. Cicatrisants très actifs. Analgésiques.

Indications. — Brûlures à tous degrés. Plaies de tous genres, infectées ou non. Eczémas. Ulcères.

Mode d'emploi. — Avec ou sans lavage d'éther préalable, une application matin et soir.

Laboratoire des Produits RAIMOA

Collignon-Savers,

264, boulevard Voltaire — PARIS (XI^e).

Téléphone : Diderot 54-96.

POMMADES OPHTALMIQUES CHIBRET Optima

Pommades en tubes à canule dévissable et stérilisable, faites par des procédés spéciaux de fabrication à : l'Oxyde Jaune, Violet de Méthylène, Bleu de Méthylène, Aristol, Vioforme, Iodoforme, Rouge Ecarlate, Cuivre (hémocuivre), Oxyde de Zinc, Zinc Cadmium, Zinc Tuménol, Zinc Ichtyol, Calomel, Fondante ($Ki + CaCl^2$), Ichtyol, Soufre, Tannin, Précipité Blanc, Bismuth Hydroxyde, Dermatol, Extrait thyroïdien, Ektogan, Collargol, Argyrol, Azotate d'argent, Protargol, Cocaïne, Stovaine, Ethylhydrocupréine (Optochine), Rose de Bengale, Xéroforme, Orthoforme, Essence du Niaouli (Goménol), Airol, Bismuth Violet, Bismuth Rose, Optochine Rose, Violet rose, Colorant Composé, Eserine, Euphtalmine, Scopolamine, Atropine, Pilocarpine, Adrénaline, Dionine, Homatropine, Bétuline Hg, Bétuline Ag, Bétuline Cu.

Radio Blou (Radio Active au bromure de Ra associé au bleu de Méthylène) à employer lorsque l'on veut obtenir une cicatrisation rapide des tissus cornéens et conjonctivaux.

Ampoules fondantes chloro-iodo-calcique (Bains d'yeux pour cataracte).

Œillères Chibret a rebord caoutchouté.

Pommade pour le nez : Baume du Pérou, Adrénaline.
(Voir à *Collyres* la suite des Produits Chibret).

LABORATOIRES CHIBRET,

5, rue Saint-Herem — CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

POMMADE V. E. DOUMER

Formule :

Bleu de Méthylène	1 gr.
Essence de Thym	0 gr. 50
Essence de Romarin	0 gr. 50
Essence d'Eucalyptus...	0 gr. 50
Essence de Serpolet.....	0 gr. 50
Glycérolé d'Amidon	30 gr.
Lanoline.....	70 gr.
Huile de Cade.....	0 gr. 25

La Pommade V. E. Doumer s'emploie en applications quotidiennes dans les brûlures, l'eczéma, les ulcères variqueux, etc... Toutefois son emploi, en raison de sa coloration, semble contre-indiqué dans les affections de la face.

Laboratoires BOMEL
ANNONAY (Ardèche) — France.

POST-HYPOPHYSE CHOAY

Nature. — Extrait purifié injectable, désalbuminé, stérilisé de lobe postérieur d'hypophyse.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi :

Post-hypophyse n° 2. — Solution *obstétricale*.

Ampoules de 1 cc., titrées à 4 unités internationales.

Indication. — Inertie utérine secondaire, en l'absence de toute dystocie. Injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc., à dilatation complète (tête fixée).

Prix : 15 fr. la boîte de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 4. — Solution *chirurgicale*.

Ampoules de 1 cc., titrées à 10 unités internationales.

Indications. — Prévention des hémorragies opératoires : 1/2 à 1 cc. avant l'intervention.

Parésie intestinale : 1/2 à 1 cc. Diabète insipide : 1 cc. par jour.

Prix : 20 fr. la boîte de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 5. — Solution *hémostatique* diluée dans du sérum.

Ampoules de 10 cc. titrées à 4 unités internationales.

Indication. — Hémoptysies des tuberculeux. Injection intraveineuse à pousser *très lentement*.

Prix : 15 fr. la boîte de 3 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

POTION ADOL

Composition. — Préparation à base de : Bromure d'ammonium, Amidopyrine, Iodure d'ammonium, Sulfate de Sparteïne, Stovaine, Citrate de Caféine, Intrait de Valériane.

Action thérapeutique. — Analgésique et antalgique extrêmement puissant.

Avantages. — Pas de toxicité, goût agréable, action constante. Pas de contre-indications.

Indications. — Douleurs aiguës, quelle qu'en soit l'origine. Céphalées, migraines, rachialgies, lombago, sciaticques, névrites, coliques néphrétiques et hépatiques, douleurs rhumatismales, grippe.

Mode d'emploi. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour, loin ou avant les repas.

Prix : 16 francs

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe

78, cours de la Liberté — LYON.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE CASSARINI

En Comprimés.

Nouvelle combinaison antitoxique bromée aux extraits végétaux.

Spécifique héroïque, des épilepsies et des affections nerveuses avec hyper-excitation du système nerveux.

Prix au public: 22 fr. 50 la boîte (un mois de traitement environ).

Posologie :

Adultes : 6 comprimés par jour. 2 avant chacun des trois principaux repas. Dissous dans un demi-verre d'eau.

Adolescents : 10 à 15 ans : 3 jusqu'à 4 comprimés par jour. Un ou deux avant les trois principaux repas, dissous dans un demi-verre d'eau ou dans le potage.

Enfants de 6 à 10 ans : 2 jusqu'à 3 comprimés par jour, un avant le petit déjeuner, un avant le repas du soir, dissous dans n'importe quel liquide.

Enfants au dessous de 5 ans : Demander doses spéciales.

Littérature sur demande :

Raoul COLUMEAU, Pharmacien spécialiste
19, rue Saint-Bazile — MARSEILLE.

POUDRE BELLADA

Composition. — Poudre de belladone, Poudre de badiane, Magnésie lourde, Poudres alcalines.

Indications. — Dyspepsies, Aérophagie, Affections du foie, Rougeurs après les repas, Entérites, Spasmes, Constipation.

Posologie. — Une cuillerée à café 1/2 heure après les repas de midi et du soir, dans un peu d'eau.

Prix : 12 fr.

Pour environ 15 jours de traitement.

Laboratoires BOULOMMIER

24, rue Keller — PARIS (XI^e).

POUDRE CHAUMEL

Hygiène de la Femme.

Borate de soude et Essence de Lavande
entièrement soluble dans l'eau, Odeur
agréable et discrète.

Indications. — Décongestionnante, Anti-
septique, Adoucissante.

Hygiène intime de la femme ;

Hygiène des yeux (blépharites, conjoncti-
vites). Traitement des plaies.

Mode d'emploi. — Un sachet pour un à
deux litres d'eau chaude.

Boîte de 20 sachets.

Etablissements FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

POUDRE CUTIREXINE

Maladies de la Peau
Thérapeutique spéciale.

Érythèmes et intertrigo.

Poudre aux stéaro-palmitates terreux purifiés. Isolante et curative. Ne se mouille pas au contact des liquides (eau, urine, sueur, etc.) qui roulent ainsi sur les téguments saupoudrés.

Non toxique. Conservation indéfinie.

Par ses propriétés curatives, dispense de l'emploi des pommades qui tachent les tissus.

Indications — Érythèmes et Intertrigo, Bourbouilles, Sudamina, Miliaries...

Toilette des nourrissons et des enfants, des femmes obèses, des cystostomisés, des prostatectomisés, etc.

En vente dans toutes les pharmacies

Laboratoire de Biologie

3, rue de l'Arbre — MARSEILLE

POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmatiques.

Composition. — A base de nitre et des solanées les mieux triées (récoltes de 1^{er} choix).

Indications thérapeutiques et formes. — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foin, fins de coqueluche, etc.

Mode d'emploi. — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise : la prévenir par une fumigation anticipée et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

Prix de vente : 9 fr. (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

Laborat. ESCOUFLAIRE — Baisieux (Nord).
(Echantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs.)

POUDRE ET CIGARETTES ZANI

Anti-asthmatiques.

Composition. — Datura Stramonium, Belladone atropa, Digitalis purpurea, Croton Eluteria, Styra benzoin.

Propriétés thérapeutiques. — Oppression, Catarrhes, Coqueluche, Suffocation, Bronchites chroniques, Toux nerveuses, Asthme des foin.

Mode d'emploi. — Respirer largement la fumée. Faire brûler une cuillerée à café de poudre ou en plein air fumer les cigarettes.

4 fr. 50 la boîte.

G. DE SAINT-STEBAN

Docteur en Pharmacie

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE

Forme et composition. — Insuline purifiée de fabrication française en poudre et en pommade.

Mode d'action. — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

Indication. — Ulcères variqueux, plaies atones, fermeture rapide de la plaie.

Mode d'emploi. — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de l'ulcère, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot.)

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 26-87

POUDRE LAXATIVE DE VICHY

du docteur Léonce Souligoux.

Composée de principes végétaux et aromatiques et d'un soufre spécialement traité, la Poudre laxative de Vichy s'emploie à la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, le soir en se couchant. Très agréable, facile à prendre. De résultat constant.

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

1, Quai Aulagnier
ASNIÈRES (Seine).

POUDRE NOELLINE

Composition.

Poudre à base de Dermatol et Acide Borique.

Indications.

Rougeurs des bébés, Intertrigo, Escarres.

Mode d'emploi.

En application locale tant à titre préventif qu'à titre curatif.

Prix. La boîte poudreuse : 6 fr.

Boîte décorée de luxe, pour table de toilette : 18 fr.

Laboratoire de la NOELLINE
GUINGAMP (Côtes-du-Nord).

POUDRE PATERSON

Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, *léger* (ancien Codex). Magnésie calcinée.
Sucre pur.

Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais. *Agit à faibles doses.*
Le seul saturant gastrique neutre présenté en *pastilles*, obligeant à la salivation. Action inoffensive. Très supérieur au carbonate de bismuth et aux produits de substitution (kaolin).

Indications :

Poudre en paquets : Pansement gastrique, Saturation, Gastropathies douloureuses. Dyspepsies. Hyperchlorhydrie. Acidités anormales. Ulcus gastrique et duodéal. Entérites et infections intestinales. Dyspepsies gravidiques. Troubles digestifs du nourrisson.

Pastilles : Traitement d'entretien. Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles. Etats nauséux de la grossesse.

Formes et posologie :

Paquets : (2 gr.) 2 à 5 par jour, et plus, au moment des crises douloureuses.

Pastilles : 15 à 20 par jour. Laisser fondre en bouche.

Prix au public : Poudre, la boîte (40 paquets), 15 francs ; la demi-boîte (20 paquets), 8 fr. Pastilles : La boîte, 7 fr. 50 ; la demi-boîte, 4 fr.

Laboratoires des Produits PATERSON. G. et M. Armingeat.
46, rue de Saintonge — PARIS (III^e).

POUDRE PELÉVINE

Minérale, antiseptique, isolante, en saupoudration.

Composition. — Acide orthoxybenzoïque, Acidum boricum, Zincum oxydatum, Calcium carbonicum, Silicates d'Aluminium et de Magnésium hydratés, Parfum.

Indications. — Acné, Eczémas, Herpès, Zona, etc. Toutes les dermatoses. Toilette journalière des bébés, des dames, des obèses, des malades, des vieillards. Erythème des nourrissons, escarres. Désodorisation et suppression de la transpiration des pieds. Toutes les inflammations de la peau en général.

Laboratoires EVINE

16, rue Barbette — PARIS (III^e).

Tél. : Turbigo 90-47.

POUDRE ROCHER LAXATIVE

Traitement de la constipation.

Laxatif doux et agréable, agissant sûrement et sans coliques.

Composition. — Association en proportions convenables de substances émollientes et aromatiques.

Posologie. — Une ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le soir, au coucher.

Echantillon franco à Messieurs les Docteurs.

Laboratoires E. FERRÉ

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI^e).

POUDRE SATINE

Composition :

Stéarates	24 gr.
Acide borique.....	6 gr.
Talc	4 gr.
Carbonate de chaux.....	6 gr.
par boîte.	

Propriétés thérapeutiques. — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés. Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

Indications. — Toilette des bébés. Irritations cutanées, escharès des malades alités, feux du rasoir.

Prix : la boîte, 7 fr.

Laboratoires NOGUÈS

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS.

Anciennement : 11, rue Joseph-Bara, PARIS

POUDRE STOM

Mélange en proportions étudiées de Carbonate de chaux, Bicarbonate de Soude, Benzonaphtol, Ferment Lactique, Belladone. Aromatisé à la Menthe.

Indications. — Digestions pénibles, pirosis, Renvois, Fermentations.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café (après les repas) délayée dans 1/2 verre d'eau.

Laboratoire des Produits Français

L. HERIN, Ex-Interne des Hôpitaux

98, rue Jeanne-Maillotte

LA MADELEINE (Nord).

PRAGMOLINE

Solution stable de bromure d'Acétylcholine.

Hypotenseur et excito-moteur des fibres lisses.

Indications. — Accidents de l'hypertension en général. Affections spasmodiques d'origine artérielle (artérites sténosantes des membres, maladie de Raynaud, localisations cérébrales, rétiennes, auriculaires, etc.). Hypovagotonie. *Sueurs des Tuberculeux.*

Présentation et Posologie. — Boîte de 10 ampoules.

Solution A : Dosée à 6 p. 100 de bromure d'acétylcholine (ampoule de 1/2 cc.).

Solution B : Dosée à 12,5 p. 100 (ampoule de 1 cc.).
Injection sous-cutanée ou intra musculaire : 0 gr.03 à 0 gr. 06 pour les sueurs des tuberculeux ; 0gr.25 pour les angiospasmodiques. Débuter par de petites doses.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

PRÉVALIDINE

Forme. — Pommade résorbable en tube gradué.

Composition :

- 1° Camphre et huiles essentielles aromatiques ;
- 2° Baume du Pérou, Acide cinamique ;
- 3° Extrait opothérapique de peau animale.

Indications. — Grippe, Bronchite, Broncho-pneumonie, Emphysème, Coqueluche, Tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — Une onction par jour, le premier jour le dos, le second jour la poitrine, troisième jour l'un des bras, quatrième jour l'autre bras, le cinquième les cuisses.

Présentation. — Tube gradué par onction.

Prix : 9 francs.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE.

Dépôt à PARIS : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

PRÉVARSYL

Composition. — Acide métacétylamino-para-oxyphénylarsinique.

Forme. — Présenté en comprimés de 0 gr. 25 de substance active. Doses spéciales de 1 et 5 cgr. pour enfants.

Indications. — Indiqué dans le traitement arsénical par la voie buccale de la syphilis, des trypanosomiasés, de l'amibiase et du paludisme.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour.

Usines Chimiques

des Laboratoires Français

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET

3, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 58-43.

PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie
antivénérienne.

Le premier créé en France sous le contrôle et d'après les conseils des Maîtres de la vénéréologie française.

Composition. — En trois tubes d'étain de couleur différente :

1^o Pommade de Metchnikoff (calomel 33 p. 100) ;

2^o Gelée au protargol à 3 p. 100 ;

3^o Poudre de savon ;

4^o Une cartouche de ouate hydrophile.

Présentation. — Grand modèle (15 fr.), pour 8 à 10 applications.

Petit modèle (8 fr.), aspect et format d'une boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires MARCHAND et LEROY,

40, rue d'Enghien — PARIS (X^e).

Téléph. : Provence 37-13.

PREZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition. — Peptone de poisson, peptone de viande, extrait sec de quinquina.

Mode d'action. — Prémunit l'organisme contre les accidents de la sensibilisation (Théorie de Widal, Méthode de Pagniez, et Pasteur-Vallery-Radot).

Posologie. — Une à deux dragées une demi-heure avant chaque repas.

Laboratoires **LEBOIME**

3. rue Fernand-Widal — PARIS (XIII^e)



PROBIOS

Thérapeutique mixte Antivirus. Bactériophage.

La supériorité de nos produits sur les produits similaires est obtenue grâce à l'association du bactériophage aux antivirus des bactéries devenues résistantes au principe lytique (C. R. *Société de biologie*, t. CII, p. du 21 mai 1930).

PROBIOS ANTIPYOGÈNE EN POMMADE

Présentation. — En tubes d'étain.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages. Anti-Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques.

Indications. — Acné, Sycosis, Furonculose, Anthrax et toutes les staphylococcies. Abscesses, plaies suppurées, brûlures infectées, etc.

PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Présentation :

4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.

4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophage. Anti-Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques.

Indications. — Infections pyogènes : Abscesses, Phlegmons, Panaris, Plaies suppurées, Brûlures infectées, Pyodermites et toutes les suppurations. A titre préventif sur les plaies en chirurgie, avant, pendant et après les interventions septiques.

PROBIOS ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

Présentation :

4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.

4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophage Anti-Staphylococciques.

Indications. — Acné, Sycosis, Furoncles, Anthrax et toutes les infections à Staphylocoques.

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

Présentation :

5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophage.

5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

De plus, chaque boîte contient un instillateur nasal.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophage, Anti-Pneumococciques, Streptococciques, Staphylococciques, Friedländer, Proteus, Antivirus Pfeiffer.

Indications. — Coryza, Sinusites, Rhinites, Ozène, Otites, Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Grippe, certaines formes d'Asthme. Préventif dans la Grippe et le Coryza.

PROBIOS ANTI B. COLI

Présentation :

4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.

4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophage Anti-B. Coli, B. Para-Coli, Friedländer et Proteus.

Indications. — Toutes infections se rapportant à B. Coli, Para-Coli, Friedlander et Proteus, notamment, Bactériuries, Cystites, Pyélites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Vulvo-Vaginites, etc.

PROBIOS INTESTINAL

Présentation :

5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophage.

5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophage Anti-B. Coli, Dysentériques, Typhiques et Para, Friedlander, Proteus, Staphylococciques, Streptococciques, Entérococciques, Pyocyaniques, Antivirus *Perfringens* et *Sporogenes*.

Indications. — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal ; Stases et tous états toxi-infectieux : Diarrhées des nourrissons ; Diarrhées des enfants ; Diarrhées saisonnières ; Dysenterie bacillaire.

PROBIOS INTESTINAL EN COMPRIMÉS

Présentation. — Une boîte de 5 tubes de 10 comprimés chaque.

Principes actifs. — Voir Intestinal Ampoules.

Indications. — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases et tous états toxi-infectieux, Dysenterie bacillaire.

PROBIOS BUCCO-DENTAIRE

Présentation :

5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophage.

5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophage Anti-Streptococciques, Staphylococciques, Pyocyaniques, Pneumococciques, Friedlander.

Indications. — Préventif et curatif de toutes les manifestations suppuratives au cours du traitement des dents infectées, des Abscesses, Phlegmons, Ostéites, Infections périapicales, Gingivites, Stomatites, Pyorrhées, Alvéolites post-opératoires, etc.

PROBIOS BUCCO-ADHÉSIF

En extrait concentré pour pansements vaccinaux adhérents aux tissus mous.

Principes actifs. — Voir Bucco-Dentaire.

PÂTE DENTIFRICE PROBIOS

La Pâte Dentifrice des Pyorrhéiques.

Principes actifs. — Voir Bucco-Dentaire.

Laboratoires PROBIOS

1, avenue Pasteur — PARIS (XV°).

Tél.: Invalides 25-73.

PRODYNASE

Médication Phosphorée, Calcique, Magnésinée.

Composition. — Comprimés comprenant :

Méthyl phosphate de Chaux..... 0 gr. 20

Méthyl phosphate de Magnésie..... 0 gr. 05

Propriétés. — Produit introduit nouvellement en thérapeutique par les auteurs. Médication spécifique du système nerveux. Puissant facteur de croissance. Contribue à la formation du squelette. Régulateur de la Nutrition.

Indications. — Surmenage, Croissance, Dystrophie phosphocalcique, Rachitisme, Fractures, Altérations dentaires, Grossesse, Allaitement, Tuberculose, Diabète, Asthénie, Cancer.

Mode d'emploi :

Adolescents : 1 comprimé au début des repas, midi et soir.

Adultes : 2 comprimés au début des repas midi et soir.

Laboratoires A. GUILLAUMIN et A. GERARD

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS.

PROGASTER

(Nom déposé.)

Sous forme de comprimés.

Composition. — Per-oxyde de magnésium préparé par une méthode spéciale (procédé Hély), permettant la décomposition en présence du suc gastrique en oxygène et en chlorure de magnésium naissant.

Propriétés. — Désinfectant remarquable du tube digestif, amélioration surprenante de l'état général. Action combinée de l'oxygène et du chlorure de magnésium.

Indications. — Troubles digestifs, hépatiques, arthritisme, artério sclérose, diabète, toutes asthénies, carries dentaires, convalescences, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par 24 heures, pas de contre-indications, pas d'accoutumances du nourrisson au vieillard.

Usines NOVALIS

OULLINS (Rhône).

PROMÉTHINE

Cholagogue et Décongestionnant physiologique.

Forme. — Granulé de saveur agréable.

Composition. — Peptone sèche pure, Sulfate de magnésie anhydre, Salicylate de soude, Excipient spécial.

Indications. — Insuffisances hépato-biliaires, Lithiase biliaire, Congestion hépatique et vésiculaire, Ictère, et tous troubles d'origine hépatique.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, le matin dans 1/2 verre d'eau tiède.

Laisser passer la phase aiguë des Cholécystites. Tâter la susceptibilité des Lithiasiques en commençant par des doses faibles.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS

Tél. Danton 81-53.

PROPEPTASE

Formes. — Poudre et Cachets.

Composition. — Carbonate de bismuth, carbonate acide de soude, carbonate de chaux associé à un complexe de ferments organiques ; papaine, pepsine, pancréatine et d'hormones des muqueuses gastriques et intestinales du porc.

Indications. — Gastrites, atonie, ptose, dilatation gastrique avec pesanteurs, digestions lentes, renvois, ballonnements crises de bâillement accompagnées ou non de troubles cardiaques, respiratoires ou cutanés.

Mode d'emploi. — 1 cuiller à café ou 2 cachets par repas.

Laboratoires PROTHERAPIA

132, rue de Turenne — PARIS

PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.
(voir ci-dessous).

Vaccination cutanée.

Indications :

Furoncles, Plaies, Brûlures, Ulcérations, Engelures, Excoriations, etc.

Mode d'emploi :

Applications deux fois par jour ;
recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean - Goujon, PARIS (VIII^e).

PROPIDON

Bouillon stock-vaccin du professeur Pierre Delbet,
L'association de cultures de streptocoques, de staphylocoques et de B. pyocyaniques, atténuées à la fois par la chaleur et par le vieillissement, confère à ce vaccin une action très efficace dans les affections à pyogènes.

Indications ;

Staphylococcies fébriles, Anthrax, Phlegmons, Lymphangites, Érysipèles, Affections gynécologiques, Vaccination pré-opératoire,

Posologie et mode d'emploi ;

Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule (4 cc.). A renouveler, s'il est nécessaire, après 24 ou 36 heures, jusqu'à trois ampoules.

L'injection donne lieu à une forte réaction fébrile d'ailleurs bien supportée.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

PROPIDON PANSEMENT

De cinq centimètres cubes.

Application du Propidon Delbet, voir page 862

Indications. — Plaies, Abscesses chauds, Phlegmons, Panaris, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Adénites suppurées, Gerçures du sein, etc...

Présentation et mode d'emploi. — Une boîte contenant 1 ampoule de Propidon de 5 cc., 1 compresse de gaze stérilisée, 1 plaquette de coton stérilisée, 1 imperméable stérilisé. Pour l'application du pansement, suivre les instructions de la notice contenue dans la boîte.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

PROSTATOLS BEAUXIS LAGRAVE

Suppositoires calmants, fondants, décongestifs, anti-infectieux, résolutifs de toutes affections prostatiques, aiguës ou chroniques.

Composition. — Ion Hg + (petite dose), extrait de solanées et de papavéracées, Hamamélis, Hormones prostatiques totales.

Indications thérapeutiques. — Toutes douleurs, Inflammations (prostatites aiguës ou chroniques) Blennorrhagie et ses complications génito-urinaires, Tenesmes, Contractures, Spasmes divers, Pollakiurie nocturne, Pesanteurs et irradiations périméales.

Hypertrophie (adénomes-tumeurs) et toutes affections de la prostate, opérables ou non.

Mode d'emploi. — Le plus habituel, un le soir au coucher.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

74, quai de Jemmapes — PARIS.

Tél. : Botzaris 38-78.

PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergétique.

Anémie, Chlorose, Débilité, Convalescence.

XX gouttes de Prosthénase contiennent 1 centigr. de fer et 5 milligr. de manganèse.

V à XX gouttes pour les enfants,

X à L gouttes pour les adultes.

Prix de vente au public : 14 fr. 50.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

PROSTIGMINE « ROCHE »

Médicament synthétique destiné au traitement de la parésie intestinale post-chirurgicale.

Composition. — Ether-sel de l'acide diméthyl-carbamique et du m-oxyphényltriméthylammonium-méthylsulfate en solution de 0,5 p. 1 000 pour injections sous-cutanées ou intramusculaires.

Propriétés. — Action nettement supérieure à celle de la Physostigmine (Esérine) et sans aucun effet sur l'activité cardiaque et sur la pression sanguine.

Posologie et mode d'emploi. — 1^o *Pour provoquer l'évacuation des gaz* : 1 ampoule de 1 cc. le lendemain de l'opération.

2^o *Pour provoquer l'évacuation alvine* : 1 ampoule de 1 cc. suivie d'un lavement de 200 cc. environ d'une solution glycinée à 10 p. 100 une demi-heure après l'injection.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

PROTENSÈNE LEJEUNE

Composition. — Cinq gouttes contiennent :

Iode bisublimé.....	1 cgr.
Peptone de cœur.....	4 cgr.
Extrait fluide stabilisé de gui.....	5 cgr.
Extrait fluide stabilisé de genêt.....	1 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — Propriétés de l'iode et des iodures sans *iodisme*.

La *Peptone de cœur* est un agent thérapeutique précieux de la débilité myocardique constitutionnelle et de la dégénérescence myocardique acquise.

L'*extrait de gui* est un hypotenseur éprouvé, il régularise les battements du cœur.

Le *genêt* est en même temps un toni-cardiaque et un diurétique.

Indications. — Hypertension, artériosclérose, affections cardiaques.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes à chacun des 2 principaux repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

PROTIODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Composition. — Sélection de noyaux aminés de Péptones et d'Albumoses iodées, et chlorure de calcium.

Formes. — Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs (*Enfants*).

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs (*Adultes*).

Injectons hypodermiques indolores.

Jamais de choc, ni de réactions anaphylactiques.

Propriétés. — Par ses effets préventifs et curatifs des infections fébriles et des intoxications, la **Protiodyne** est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

Indications. — Infections fébriles en général. Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, **puerpérales**, etc. Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires, Furunculose; désensibilisation de tout syndrome anaphylactique: Asthme vrai, Asthme des foin, Migraines, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

Enfants : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

La Protiodyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.

Prix : La boîte 4 ampoules Protiodyne, 18 fr.

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de médecine et de chirurgie pratique, 1919 ; La Clinique et le Scalpel, 1923.

Littérature et Echantillons sur demande au

Laboratoire général d'Études Biologiques
S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

PROTIODYNE DRAGÉES

Composition. — Albumoses et Peptones iodées, Sulfate de magnésie.

Propriété. — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

Indications. — Manifestations anaphylactiques, en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entéocolites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse ; rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

Forme. — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

Doses et mode d'emploi. — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes* : deux dragées. *Enfants* : une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau. Prix : la boîte de 50 dragées Protiodyne ; 15 fr.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire général d'Études Biologiques.

S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

PROTONIC

Composition. — Nucléinate de manganèse, oxalate ferreux, glycérophosphate de chaux, sulfate de strychnine, arséniate de soude, oxyhémoglobine.

Indications. — Anémies, débilité générale, faiblesse osseuse, lymphatisme, neurasthénie, grippe, maladies nerveuses, consomption, inappétence, convalescences, troubles de la nutrition, formation de la jeune fille.

Mode d'emploi. — 3 à 4 cuillerées à café par jour aux repas ; enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Pas au-dessous de 7 ans.

La grande boîte : 20 fr.

Laboratoire du PROTONIC

88, rue Duhesme — PARIS

PROVEINASE MIDY

(Comprimés).

Composition :

- 1° Extraits secs (desséchés dans le vide) de plantes stabilisées : Cupressus Viburnum, Marron d'Inde, Hamamélis et Genêt.
- 2° Poudres d'organes à sécrétion interne : Thyroïde, Surrénale et Hypophyse.

Propriétés thérapeutiques. — Synergie régulatrice de l'insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapiques des glandes endocrines et les vertus vasoconstrictrices de plantes soigneusement sélectionnées.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles consécutifs de la Ménopause et de la Puberté.

Mode d'emploi :

Etats chroniques : 2 à 3 comprimés par jour.
Etats aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS.

PROXYTOL

Association des Proxýtases des organes de la digestion (Foie, Estomac, Intestin, Pancréas).
Spécifique des affections gastro-intestinales.

Mode d'action. — Assure le fonctionnement cellulaire normal par l'apport des ferments de synthèse ; active la nutrition de l'organe, rétablit les sécrétions.

Indications. — 1° Les dyspepsies ; 2° les entérites ; 3° l'insuffisance hépatique ; 4° les gastro-entérites des nourrissons.

Forme. — Boîte de 36 comprimés.

Doses. — *Adultes* : Croquer de 4 à 6 comprimés par jour le matin à jeun ou loin des repas.

Enfants : Demi-doses.

Nourrissons : 2 à 4 comprimés dissous dans l'eau, à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

PROXYTASES

Diastases tissulaires spécifiques à chaque organe. Catalyseurs biologiques réglant l'assimilation intime, permettant à l'organe déficient de restaurer ses lésions et de recouvrer son activité physiologique.

Action rigoureusement spécifique.

Indications. — Les insuffisances fonctionnelles de chaque organe.

Prescrire. — Proxýtase ovaire, Proxýtase rein, Proxýtase thyroïde, Proxýtase foie, Proxýtase testicule, Proxýtase ovaire-thyroïde, Proxýtase foie-thyroïde.

Doses. — *Adultes* : Croquer 4 à 6 comprimés par jour, le matin à jeun ou loin des repas.

Enfants : Demi-doses.

Laboratoire des PROXYTASES

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

R. C. 18.000. ~~BOULEVARD~~ Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

PRUNINE SENTINI

aux Prunes d'Ente d'Agen.

Principes actifs. — Pruneaux d'Agen, Phtaléine, Cephaelis Ipécacuanha.

Indications. — Laxatif et Purgatif doux.

Présentation. — Délicieux bonbons d'extrait de Pruneaux d'Agen, enrobés de chocolat. Goût exquis, efficacité parfaite. Pas d'accoutumance, pas de coliques.

Laxatif : Un bonbon le soir au souper.

Purgatif : 2 à 3 bonbons le soir au souper.

Enfants au-dessus de cinq ans : Mêmes doses.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires DOMERGUE

AGEN (Lot-et-Garonne).

PSORÉON

Spécifique du Psoriasis.

Pommade au chryshydrargyre (association de l'acide chrysophanique avec un dérivé mercuriel).

Spécialité type. — Seul produit préparé uniquement contre une dermatose déterminée, le PSORÉON constitue un traitement nouveau et rationnel du Psoriasis.

Exclusif comme emploi ;

Unique en son genre ;

Unique en son but ;

Unique comme efficacité.

Seul spécifique du Psoriasis, le PSORÉON guérit à lui seul cette dermatose, redoutable, rebelle et tenace et ne connaît pas d'insuccès.

S'emploie en application pendant la nuit.

Toutes Pharmacies.

Renseignements au Laboratoire EON
à DINAN (Côtes-du-Nord).

PSOTHANOL

Composé arséno-bismuthique soluble.

Indications thérapeutiques. — Psoriasis et toutes affections psoriasiformes.

Présentation. — Ampoules de 3 cc. 1/2 avec anesthésique pour injections intramusculaires.

Ampoules de 3 cc. 1/2 sans anesthésique pour injections intraveineuses.

Posologie. — Une ampoule tous les 2 jours en commençant par 1/4 d'ampoule au maximum, et en augmentant la dose suivant la tolérance du malade. Série de 30 injections.

Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire : Psöthanol en amp. de 1 cc. pour injections intramusculaires.

Boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

PULMOCARDINE

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Angine de poitrine, maladies du cœur et des vaisseaux, etc.

Présentation. — Dragées faciles à prendre.

Composition :

Iodure de Caféine : fluidifie les sécrétions bronchiques, régularise le cœur et restitue l'énergie à la systole.

Grindelia : Expectorant et antispasmodique puissant, diminue la tachycardie et la dyspnée.

Lobelia : détend la contracture et supprime l'angoisse.

Quebraco : eupnéique, augmente l'amplitude des mouvements respiratoires.

Doses. — 2 dragées au début des 2 repas.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires J. PERROCHON

57, rue Origet — TOURS.

PULMODION

Comprimés à base de Dionine.

Composition :

Chaque comprimé représente :

Dionine (chlorhydrate d'éthylmorphine).....	0,004
Extrait d'Aconit.....	0,003
Extrait de Belladone.....	0,003
Extrait de Marrube.....	0,10
Extrait de Drosera	0,01
Terpine.....	0,05

Indications. — Affections respiratoires.

Traitement énergique de la Toux et de l'oppression, dans les cas de Bronchite, Trachéite, Laryngite, Toux nerveuses.

Grâce à la Dionine, activité remarquable *sans accoutumance* et tolérance parfaite par l'estomac.

Posologie. — Doses par 24 heures :

Enfants à partir de 10 ans : 2 à 4 comprimés suivant l'âge.

Adultes : 4 à 6 comprimés à prendre en dehors des repas.

Avaler sans sucer ni croquer.

Le tube de 30 comprimés. Prix : 14 francs.

Laboratoire JUIN.

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

Tél. : Marcadet 37-98.

PULMOSERUM

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des Médicaments sous le n° 363-7.

Forme. — Solution.

Composition. — Infusion de Pulmonaire. — Infusion de Carragahen. — Phospho-Gaïacolate de Codéine. — Acide phosphorique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Modificateur de l'expectoration. Sédatif de la toux. Antiseptique des voies respiratoires. Reconstituant de l'état général.

Indications. — Grippe. — Toux catarrhale. Laryngites. — Bronchites. — Congestions pulmonaires. — Séquelles de Coqueluche et de Rougeole. — Bacillose.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à soupe, matin et soir, ou au milieu des repas, dans un peu d'eau.

Le flacon : 14 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

PULMOVERNE

Antiseptie des voies respiratoires.

Composition. — Solution neutre, sans sucre, ni stupéfiants, contenant par cuillerée à dessert Gaïacol cristallisé 0,075 et Bromoforme 0,033.

Propriétés. — Modificateur des sécrétions bronchiques. Antiseptique, antispasmodique, sédatif de la toux. Sans action sur l'estomac, ne constipant pas.

Indications. — Rhumes, toux rebelles, catarrhes, bronchites aiguës ou chroniques, toutes affections de l'appareil respiratoire. Grippe, sequelles de rougeole et de coqueluche.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à dessert, dans une boisson (lait, tisane, eau sucrée). Enfants par cuillerées à café.

Le flacon : 12 fr.

Laboratoire VERNE

GRENOBLE.

PULSAMONE

Phytothérapie antispasmodique.

Médication exclusivement végétale associant pour la première fois la **Pulsatille** (*Anemone Pulsatilla*), excellent modérateur de l'excitabilité nerveuse et douloureuse, à trois autres plantes également douées de propriétés antinerveuses : **gui**, **saule blanc** (châtons) et **passiflore**.

C'est donc le prototype de l'*anti-spasmodique végétal, sans stupéfiant, ni toxique* dont l'action n'est jamais suivie de dépression.

La **Pulsamone** ne comporte pas de contre-indication et n'offre aucun danger d'accoutumance. C'est pourquoi elle peut être conseillée aux moins résistants : vieillards, enfants, etc., ainsi qu'aux malades particulièrement susceptibles : cardiaques, hépatiques, etc.

Indications. — Véritable médication équilibrante du système nerveux, la **Pulsamone** sera prescrite dans : Neurasthénie, Irritabilité, Angoisse, Anxiété, Psychonévroses, Insomnies, Troubles nerveux de la menstruation et de la ménopause, Troubles cardiaques d'origine nerveuse, Insomnie des biliaires, Excitation nerveuse des hépatiques, Aérophagie.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café, dans un peu d'eau, avant chaque repas ; et, dans les *insomnies*, deux à trois cuillerées à café, dans une infusion chaude, au coucher.

Laboratoires de la PULSAMONE

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

PULVÉOL

(Poudre et pastilles.)

réalisant l'antisepsie du catéteur aéro-digestif.

Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol, eucalyptol, terpinol, essences volatiles, acide borique et borate de soude.

INDICATIONS. — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologie courantes.*

— Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites, affections du cavum, angines, stomatites, gingivites. Calme toutes les dysphagies.

Affections respiratoires. — Trachéo-bronchites, grippes à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

Hygiène du nez, de la gorge, et de la bouche dans les pyrexies; dentifrice en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques mercuriels ou bismuthiques.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix.

MODE D'EMPLOI. — **Poudre :** inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante.

Les éléments volatils disparus, il reste une excellente solution tiède, antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche.

PASTILLES. — 8 à 10 par jour.

Prix : Poudre : 12 fr.

— Pastilles : 4 fr. 75.

Laboratoire du PULVÉOL

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

Téléph. : Marcadet 37-98.

PULVITA

Poudre des 4 Gluconates (Mn, Mg, Ca, AzH⁴).

Licence exclusive Sandoz.

Pulvita est employée en pansement local dans les affections pulmonaires en particulier.

Traitement appliqué en pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur électrique ou à alcool, dit pulvérisateur « Pulvita » (pulvérisateur genre Lucas-Championnière perfectionné). Appareil indispensable pour pouvoir suivre un traitement par Pulvita dans de bonnes conditions.

« Pulvita » est admis aux Assurances sociales.

Pour toute documentation écrire aux Laboratoires

A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
PARIS-OUEST

Précédemment : 8, r. de la Source — PARIS (XVI^e)

Téléphone : Auteuil 11-86.

PURAGAR

) **Cachets.**

Laxatif rééducatif de l'intestin.

Composition. — Agar-Agar pulvérisé et stérile. 1 gramme pour un cachet.

Indications. — Toutes constipations avec matières fécales, durcies et desséchées.

Posologie. — 3 à 10 cachets par 24 heures.

Laboratoire de Thérapeutique Normale

CH. LAVIRE, pharmacien de 1^{re} classe

46, rue de Rome

MARSEILLE (B.-du-R.).

PURGANOL DAGUIN

(C²⁰H²⁴O⁴)

Forme. — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0 gr. 25 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

Enfants : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucrer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage, Laxatif préféré des nourrices.

Echantillons sur demande aux

Etablissements DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

PURGOS

Eau Minérale purgative, Sulfatée sodique et magnésienne. Contient tous les principes de l'Eau Minérale Naturelle de Vichy alliés aux Sels purgatifs MgO — NaO ; 60 grammes de Sulfates par bouteille 1/2 litre.

Dose purgative : 1 à 2 grands verres.

Dose laxative : 1 verre à bordeaux le matin à jeun.

Dans le cours des voyages, dans les localités où l'Eau de Purgos viendrait à manquer, on peut lui substituer les

COMPRIMÉS PURGOS

qui, dissous dans une Eau Minérale de Vichy, offrent, sous une présentation pratique, toutes les qualités de l'Eau Purgative.

Dose purgative : 4 à 6 comprimés.

Dose laxative : 2 à 3 comprimés.

Le matin à jeun.

En tubes de : 24 comprimés.

Prix spéciaux pour le Corps Médical

Société PURGOS

Administration :

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS.

Anciennement : 11, rue Joseph-Bara — PARIS

Exploitation :

111, rue du Maréchal-Pétain — VICHY (Allier).

PYO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'*Ampho-vaccin* pansement antipyogène.

Composition. — Le *Pyo-amphogel* n'est pas une pommade ni un pansement gélosé. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une très forte proportion (75 p. 100) de bouillon-vaccin polyvalent, antipyogène (*staphylocoques*, *streptocoques*, *B. coli*, *entérocoques*, *B. pyocyaniques*).

Avantages. — Ne nécessite pas de fusion préalable. Eminemment absorbable par la peau. Favorise la cicatrisation. Son emploi n'offre aucun danger, il n'a aucune contre-indication.

Indications. — Abscesses, Furoncles, Anthrax, Acné, Impétigo, Intertrigo, Eczémas suintants, Ulcères, Sycosis, Mastites, Orgelets, Plaies infectées, Brûlures, etc...

Mode d'emploi. — Déposer la gelée sur la région à traiter en se servant d'un coton ou d'une gaze stérile qui sera laissée si un pansement à demeure est possible. Dans le cas contraire, la gelée adhère suffisamment par elle-même.

Prix 15 francs.

Laboratoires des AMPHO-VACCINS.

A. D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie, 6, rue Rothschild — NICE.

PYODERMASE

Forme. — Pommade sous tube.

Composition. — Eléments actifs de l'eau d'Alibour associés à l'oxyde jaune d'hydrargyre, ichtyol, baume du Pérou, etc.

Indications. — Toutes PYODERMITES ou affections de la peau secondairement infectées ou impétiginées : Ecthymas pustuleux, Impétigos, Streptococcie sèche du visage, Herpès circinné, Sycosis de la barbe, et toutes folliculites, Dermatomycoses.

Emploi. — Avant l'application de la PYODERMASE, faire disparaître les croûtes au moyen de pansements humides ou rendre nettes les régions purulentes par l'évacuation des phlyctènes.

Prix : 8 fr. 75 le tube.

Laboratoire de la Pyodermase,
Max. PAVY, Pharmacien de 1^{re} classe.
Place du Marché — LA ROCHELLE (Ch.-Inf.).

PYOFORMINE

Ampoules de 2 cc.

Pus aseptique obtenu par ponction de l'abcès térébenthiné du cheval en suspension dans une solution physiologique d'*Uroformine Gobey*.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 amp. p. jour en injection sous-cutanée intramusculaire ou intraveineuse dans les cas graves.

Propriétés thérapeutiques. — Leucocytothérapie des infections, toutes les pyrexies, toutes les septicémies. Remplace l'abcès de fixation.

Indications. — Méningites aiguës et encéphalites, pneumonies et complications, typhoïde, paratyphoïde et infections colibacillaires, pyélites, pyélonéphrites, cholécystites aiguës, états puerpéraux, péritonites aiguës, états septicémiques, grippe et complications.

Prix au public :

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

Laboratoires GObey
89, rue du Cherche-Midi — PARIS.

PYO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchan.

Composition. — Lysat de Streptocoques et de Staphylocoques.

Indications. — Suppurations : phlegmons, abcès, panaris, adéno-phlegmons, plaies infectées, fractures ouvertes, pyodermites du nourrisson : pemphigus, etc...

Posologie. — Ampoules de 1 cc. Une première injection de 1/2 de cc les suivantes un centicube tous les jours, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 25 francs.

PYO - VACLYDUN PANSEMENTS

Vaccination locale ampoules de 5 cc.

Mode d'emploi. — Imbiber de vaccin une compresse stérilisée. Mettre sur la plaie et recouvrir d'un imperméable. Pour les cavités, introduire une mèche imbibée de Pyo-Vaclydun pansement.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 5 cc.

Prix : 18 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

PYRÉLAINE COLLAS

Composition. — Fixation à chaud du soufre sur les acides gras non saturés d'une huile végétale.

Chaque cc. contient 0 gr. 04 de soufre organique combiné non oxydé doué de son pouvoir catalytique. Excipient balsamique.

Propriétés. — Permet d'administrer du soufre actif par voie digestive. Contrairement aux formes habituelles du soufre « per os », la Pyrélaine n'est pas oxydée dans l'estomac et possède une action nette.

Indications. — Toutes celles du soufre. *Carences sulfurées.* Résulfuration thérapeutique. Toutes affections tributaires de la Diathèse lithiasique, notamment *Lithiase biliaire*, Cholécystite, Rhumatisme chronique, Goutte, Dermopathies, Parasites intestinaux.

Pas de contre-indications.

Forme et posologie. — Capsules gélatineuses dosées à 0 gr. 25 (Soufre : 0 gr. 01 par capsule). Affections chroniques et doses d'entretien : 2 à 3 capsules par jour avant les repas, dans une gorgée d'eau. Crises aiguës : 3 à 6 capsules par jour.

Enfants : moitié de ces doses.

Le tube de 50 capsules : Prix au public : 12 fr.

Société des Produits COLLAS et BOUDAULT

MOUGNAUD et C^{ie}, pharmaciens

15, 17, 19, rue Augustin-Thierry — PARIS (XIX^e).

Tél. : Nord 28-65.

PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide ; Gouttes ; Ampoules.

Composition. — Diméthylaminopyrazoline phenazone carbamate d'éthyle (uréthane.)

Emploi et doses. — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée, 60 cc. avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

Gouttes. — *Adultes* : XXV-L à répéter à intervalles de 20 minutes. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives LXXX-C, si nécessaire. Maximum : CCC *pro die*.

Enfants : I à II gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques : Donner à doses réfractées.

Ampoules A. — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules avec ou sans médication intercalaire.

Ampoules B. — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : CC gouttes.

Injectons intramusculaires.

Indications. — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaire ; (XXV-L à répéter), chercher la dose-leviers, Dysménorrhées (XXV-L) ; Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables) ; Algies syphilitiques Tabes, Cancer (LX-LXXX-C gouttes, *permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine, de la diminuer ou de l'espacer*) ; Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (XXV-L, 2 fois par jour) ; phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques ; Pansements douloureux (Post-opératoire en petite chirurgie). — Echantillons et Littérature.

Gouttes : 18 fr. — **Ampoules A-B** : 16 francs.

Dépôt à Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
61, boulevard Malesherbes — PARIS.

Laboratoires CAMUSET
18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

PYRI-PYRIDIUM

(Phenyl-azo- α - α' -diamino-pyridine hydrochlorate.)

Un corps chimique *nouveau* pour la désinfection génito-urinaire par voie buccale; rend antiseptiques les *urines même alcalines*, pénètre et se fixe dans l'épithélium de l'*appareil génito-urinaire*; possède une remarquable *action analgésique*; a été adopté aux Etats-Unis par le *Congrès des Médecins*.

Indications. — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, puissant adjuvant du traitement local de la blennorrhagie.

Divisions et prix :

Tubes de 12 comprimés à 0 gr. 10.	14 fr.
Flacon de 25 comprimés à 0 gr. 10.	28 fr.
Flacon de 100 comprimés à 0 gr. 10.	105 fr.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

PYROLÉOL EDET

Composition. — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.) solution huileuse.

Propriétés. — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

Indications. — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermites, ulcères variqueux, engelures, escarres, eczéma, zona.

Présentation. — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

Résultats. — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées lisses, souples, non adhérentes.

Prix au public : 13, 20 et 35 fr.

Pharmacie Centrale de France

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV^e).

QUASSIA-KINA RABOT

Aux écorces d'oranges amères.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant énergique. Le meilleur stimulant de l'appétit.

Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.

VIN : Un verre à madère aux 2 principaux repas.

Véhicule idéal de la médication iodée, même intensive. — Prix ; 25 fr.

DRAGÉES : Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué. *Adultes :* 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants :* 1/2 dose. — Prix ; 12 fr. 50.

GRANULE : Convient particulièrement aux enfants. *Adultes :* 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants :* 1/2 dose. Prix ; 12 fr. 50.

Les Établissements C. DAVID-RABOT

C. DAVID & ses Fils, pharmaciens

49, rue de Bitché — COURBEVOIE (Seine).

QUASSINE HOUDÉ

Granulés titrés à 1 milligramme.

Quassine Houdé

Principe actif *cristallisé* du quassia amara.

Propriétés thérapeutiques :

Amer, excitant énergique de l'appétit, prescrit dans dyspepsies atoniques, embarras gastrique, contre les borborygmes, l'inappétence, etc.

Doses et mode d'emploi :

4 à 6 granules par jour, pris 5 ou 10 minutes avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

QUERGÉMOL

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des
Médicaments sous le n° 363-8.

Forme. — Dragées.

Composition. — Extrait Cérébrique. Extrait
Splénique, bromhydrate de Quinine, Méthylar-
sinate disodique, Nucléinate de Manganèse.

Propriétés pharmacodynamiques. — Récons-
tituant opothérapique du cerveau et de la rate,
Antitoxique, Antihémolytique, Régénérateur des
globules sanguins, antiasthénique.

Indications. — Paludisme chronique. — Anémie
palustre. — Fièvres intermittentes, Asthénie
post-grippale.

Mode d'emploi — 2 à 6 dragées par jour au début
des repas.

L'étui : 20 fr. (en France).

Laboratoire A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

QUINA BARON

à l'extrait sec complet de quina.

Solution sans alcool, correspondant à 0 gr. 50
d'extrait par cuillerée à soupe.

Mode d'emploi :

Deux à trois cuillerées à soupe par jour,
avant chaque repas.

Propriétés :

Anémies, convalescents, tuberculeux, opérés,
femmes enceintes, nourrices et dans tous
les cas où l'organisme doit être tonifié.

P. FOURNIE

Pharmacien de 1^{re} classe

3, place de la Miséricorde — LYON.

QUINARSOL ANTIANÉMIQUE

Extrait de quinquina Grandval
associé aux Strychno-Phospharsinates.

Propriétés thérapeutiques :

Tonique. — Stimulant général. — Apéritif.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval.....	0 gr. 30
Glycérophosphates composés.....	0 gr. 30
Strychnine combinée.....	1 mgr. 60
Arsenic combiné	0 mgr. 18

Indications. — Anémie, Surmenage intellectuel et physique, Faiblesse générale, toutes convalescences, Grippe. — Diabète et ses complications, Séquelles du Paludisme.

Permet l'absorption facile du Quinquina et de la Strychnine.

Dose :

2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.

La boîte de 32 comprimés : 12 fr.

(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS.

QUINARSOL FÉBRIFUGE

Extrait de quinquina à haut titre alcaloïdique
avec fer et arsenic assimilable.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval (à haut titre) ..	0 gr. 60
Fer combiné	0 gr. 015
Arsenic combiné	0 mgr. 90

Propriétés thérapeutiques :

Antipaludique. — Permet, suivant la dose, soit de juguler l'accès, soit de combattre l'état chronique et de faciliter la résistance de l'organisme. — Régénérateur du Globule et des Eléments protoplasmiques.

Indications :

Paludisme et ses conséquences, Fièvre de Malte, Affections produites par le séjour dans les pays chauds.

Dose :

Pendant la crise, 4 à 8 comprimés par jour, suivant la violence de l'accès. — **Etat chronique**, 4 comprimés par jour.

La boîte de 30 comprimés : 14 fr. (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS.

QUINBY ET QUINBY SOLUBLE

Quinio-Bismuth, formule Aubry.

Adoptés par les hôpitaux de Paris, les Ministères de la Santé publique et des Colonies. — Produits originaux à base d'iodo-bismuthate de quinine chimiquement pur :

- a. En suspension huileuse 10 p. 100 (QUINBY) ;
- b. En solution aqueuse incolore (QUINBY SOLUBLE).

Propriétés thérapeutiques. — *Syphilis* : A toutes ses périodes et sous toutes ses formes. — *Pian.* — *Fièvre typhoïde.* — *Fièvre de Malte.* Injections intramusculaires indolores. Pas de stomatite, ni abcès, ni indurations. Aucune toxicité.

Présentation. — *Quinby* : 1° Ampoules normales de 3 cc. correspondant à 0 gr. 075 de bi-métal (boîtes de 12 et 6 ampoules).

2° Ampoules double dose (étiquette bleue) de 3 cc. correspondant à 0 gr. 15 bi-métal (boîtes de 12 et 6 ampoules) ;

3° Ampoules infantiles de 1 cc. 5 correspondant à 0 gr. 0375 de bi-métal (boîtes de 12 ampoules seulement).

Quinby soluble : 1° Ampoules de 5 cc. (*adultes*) correspondant à 0 gr. 05 de bi-métal (boîtes de 6 ampoules) ;

2° Ampoules de 2 cc. (*enfants*) correspondant à 0 gr. 02 de bi-métal (boîtes de 6 ampoules).

Posologie. — *Adultes* : 12 injections de 3 cc. (*Quinby*) ou 18 injections de 5 cc. (QUINBY SOLUBLE), 2 injections par semaine.

Enfants : idem, mais à raison de 2/10 de cc. par année d'âge.

Fièvre typhoïde. — Une injection tous les 2 jours et dans les cas graves tous les jours, jusqu'à concurrence de 5 à 6 injections après lesquelles la défervescence totale est obtenue.

Fièvre de Malte. — Douze injections environ (1 tous les 2 jours) pour obtenir la disparition de la fièvre.

N. B. — Dans la syphilis, les ampoules QUINBY SOLUBLE sont plus spécialement réservées au traitement d'attaque de la maladie ou de ses manifestations morbides, les ampoules QUINBY (étiquette bleue) lorsque l'on désire faire des piqûres moins fréquentes.

Toutes ces ampoules peuvent être livrées directement, en vrac, par boîtes de 25, 50 ou 100, à des prix très avantageux, à MM. les docteurs qui en font la demande directe au Laboratoire ou aux agents.

Prix au public :

<i>Quinby</i> (normal ou étiq. bleue), la boîte de 12 ampoules.....	36 fr.
<i>Quinby</i> (normal ou étiq. bleue), la boîte de 6 ampoules.....	20 fr.
<i>Quinby</i> infantile, la boîte de 12 ampoules.....	25 fr.
<i>Quinby soluble</i> , adultes, la boîte de 6 ampoules.....	20 fr.
<i>Quinby soluble</i> enfants, la boîte de 6 ampoules.....	15 fr.

N. B. — En France, tous les médecins peuvent se procurer gratuitement nos ampoules, pour leurs malades pauvres, en adressant leurs demandes à l'organisme départemental créé à cet effet par le Ministère de la Santé publique.

En Belgique, nos ampoules peuvent être prescrites aux frais de l'État, par MM. les médecins autorisés.

Laboratoires AUBRY

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII^e). — Tél. : Laborde 15-26.

Belgique et Congo :

Agence pharmaceutique française
51, rue Jean-Robie — BRUXELLES.

QUINÉINE

Extrait intégral des principes actifs
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour comme tonique. Dose fébrifuge : par 1/2 cuillerée à café. En solution non alcoolique.

Indications. — Paludisme, gripes, asthénie, convalescences, anémies.

Prix au public : 15 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits Scientia

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS.

QUINICARDINE

Forme :

Comprimés glutinisés de Sulfate de quinine pur à 0 gr. 20.

Indications :

Arythmie permanente par fibrillation auriculaire, Tachycardies paroxystiques, Tachycardie permanente régulière ou Flutter permanent, Arythmie extra-systolique.

Doses :

Consulter la notice qui sera adressée sur demande.

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (15^e).

QUINIMUTHOL SACA

Composition. — Iodobismuthate de quinine en suspension dans l'huile d'olive pure.

Forme. — Ampoules de 3 cc. renfermant 0 gr. 30 d'iodo-bismuthate de quinine (= 0 gr. 071 de bi-métal actif).

Indications. — Syphilis à toutes les périodes.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 18 francs.

Usines Chimiques des Laboratoires Français
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 58-43.

QUINIO-STOVAR SOL

4-oxy-3-acétylamino-phényl-
1-arsinate de quinine.

Combinaison chimique définie, renfermant des proportions égales de Quinine et de Stovarsol ; le pouvoir curatif des composants est exalté par cette association.

Indications :

Paludisme (prophylaxie et traitement).

Posologie et mode d'emploi :

Traitement curatif : 4 comprimés à 0 gr. 25 par 24 heures (3 ou 4 séries de 10 jours, séparées par 5 jours de repos).

Prophylaxie : 1 comprimé le matin à jeun

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

QUINOFORME LACROIX

Composition. — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1925).

Avantages. — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine.

Le plus riche en quinine (87,56 p. 100. de sels basique ou neutre).

Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

Indications. — Paludisme, Fièvres malariques, Fièvres intermittentes.

Formes pharmaceutiques :

Ampoules : 6 à 12 ampoules de 0,25, 0,50, 0,75, 1 gr. 1,25 et 1,50.

Cachets : 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

Comprimés : 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Pilules à 0,10.

Laboratoires H. LACROIX

V. Merobian et fils, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

QUINOÏDINE DURIEZ

(Alcaloïde de Sertuerner).

Dérivé du quinquina.

10 cgr. Quinoïdine pure par pilule.

Antiseptique du sang, tonique général et tonique cardiaque, antinévralgique.

GRIPPE, Paludisme et leurs séquelles : Prévention et traitement. Névralgies, surtout d'origine grippale ou palustre. Petites défaillances, nervosité ou irrégularités du cœur, avec ou sans lésions.

Aucun des inconvénients de la quinine, même après usage prolongé (Voir *Bull. Académie de médecine* : Communication du D^r Burdel ; communications des D^{rs} Le Moine, Dardenne, Dujardin-Beaumont, etc.).

2 à 8 pilules par jour, au début des repas, pendant plusieurs semaines au besoin.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS.

QUINO-THORIUM

Préparation radio-active de chloroformiate de Quinine et de bromure de Mésothorium.

Indications.

Paludisme et indications thérapeutiques de la quinine.

Formes.

1^o Ampoules à 25-50 centigrammes et 1 gr. pour injections intramusculaires profondes.

2^o Dragées dosées à 25 centigrammes.

Posologie. — Habituelle de la quinine.

					Prix vente au public.	Prix médi- cal.
Boîte de	6 amp.	1 cc..	0,25		13,20	8,90
—	12	—	—	—	16,50	11,15
—	6	—	2 cc..	0,50	16,50	11,15
—	12	—	—	—	22 »	14,85
—	6	—	—	1 gr.	22 »	14,85
—	12	—	—	—	33 »	22,30
—	6	—	5 cc..	—	28 »	18,90
Dragées.....					20 »	13,50

**Société Générale
d'Applications Thérapeutiques**

THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien
Docteur ès sciences physiques
98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

QUINOVARINE OPTIMA

(Sous forme de dragées et sous forme d'ampoules.)

Composition. — Chaque dragée ou ampoule correspond à 2 cgr. chlorh. de quinine et 50 cgr. d'ovaire frais.

Indications. — Aménorrhée, chloroanémie des jeunes filles, dysménorrhée, règles insuffisantes, troubles psychiques d'origine ovarienne et en général toutes les indications de l'Ovarine.

Posologie :

Dragées : 6 par jour, 2 à la fois 1 heure avant le repas.

Ampoules : Série de 10 ampoules en injections intramusculaires, à raison de 2 ou 3 par semaine. Repos de 15 jours, puis nouvelle série avec nouveau repos.

Laboratoires « OPTIMA » S. A.

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

QUINQUINA GMET

Composition. — Extrait *total* obtenu directement et exclusivement à l'aide du quinquina succirubra. Coloration et amertume parfaitement naturelles.

Propriétés. — Stimulant apéritif fébrifuge. *Active remarquablement la phagocytose.*

Indications. — Anémie, anorexie, grippe, tuberculose, épidémies, paludisme, tous les états fébriles ou non où l'activité leucocytaire doit être stimulée. Aménorrhée.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de vin *immédiatement avant un repas* ou l'absorption d'une tisane, d'un peu de lait, d'un biscuit.

Le grand pouvoir apéritif du Quinquina GMET occasionne (si le malade ne mange pas aussitôt après) la sensation nauséuse consécutive à la faim non apaisée.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

QUINSAL

l'Éther Salicylique de Quinine et lithine acétylsalicylée en tablettes glutinisées.

ACTION THÉRAPEUTIQUE POLYVALENTE

Calmant immédiat de la Douleur par le groupement acétylsalicylique et la Quinine.

Antithermique par la Quinine.

Diurétique et Uricolytique par le Sel de Lithine et la Quinine.

Spécifique antirhumatismal par les Salicylates. Tolérance parfaite (tablettes glutinisées).

Indications : Rhumatismes, Sciatique, Lumbago, Névralgies, Douleurs grip-pales et en général toutes les Algies.

Posologie. — *Cas aigus.* — De 7 à 12 tablettes en trois fois par 24 heures, de préférence loin des repas afin que l'action sédative soit plus rapide.

Cas chroniques. — Dans l'intervalle des accès : 3 par 24 heures.

Enfants. — De 1 à 3 par 24 heures.

Prix de la boîte : 15 francs.

Laboratoire du QUINSAL

M. LEULIER, docteur en pharmacie

F. BOLLA,

Pharmacien licencié ès sciences

Successeur

Lauréat de l'Université et de la Faculté.

GRAY (Haute-Saône).

Échantillon et Littérature sur demande.

QUINTHÉRYL

Composition. — Ether anesthésique, essence de serpolet, oléo-camphre.

Applications. — Traitement *curatif* de la coqueluche, de la trachéite, de la laryngite ; *correctif* de toutes les toux quinteuses émétisantes, de l'asthme et de l'emphysème. Peut être employé dans les affections des voies pulmonaires. Utilisé en chirurgie et en stomatologie avant les opérations.

Présentation :

1° ampoules de 1cc. (série A) pour les enfants de moins de 2 ans.

2° ampoules de 2 cc. (série B) pour les enfants plus âgés et les adultes.

Posologie. — Une injection *intramusculaire* (pratiquement *indolore*), hebdomadaire pour les enfants, tous les quatre jours pour les adultes.

Prix : Série A : 12 fr.

Série B : 15 fr.

DÉPOT GÉNÉRAL,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :

M. LÉONARDON, Docteur en pharmacie.

Licencié ès sciences. Ancien Élève de l'Institut Pasteur
ARCACHON (Gironde).

QUINURYL

Spécifique de l'*Azotémie*, adjuvant du régime hypoazoté. Cachets à base d'acide quinique.

Indications. — Symptômes de la petite azotémie. Céphalées, vertiges, éblouissements, bourdonnements d'oreilles, etc...

2 à 4 cachets par jour à prendre avec une infusion de fleurs de sureau ou de feuilles de bouleau.

La boîte : 16 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

RADIOBAUME ADRIAN

Préparation kératoplastique et kératogénique à base de Tannins assimilables, de balsamiques et d'anesthésiques.

Traitement préventif et curatif des accidents *dus aux radiations.*

Spécifique des brûlures, des coups de soleil et de toutes lésions ou irritations de la peau.

ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

RADIOLYSINE

Complexe colloïdal radio-actif
en solution isotonique injectable.

Composition. — Mésothorium, Cu, Mg, Si, Fe, Mn.
Ph. Ca.

Propriétés. — La Radiolysine réalise la chimiothérapie totale du Cancer. Elle permet au médecin d'administrer simultanément à son malade tous les éléments qui ont donné des résultats dans le traitement du cancer.

Indications. — Tous les cancers, soit comme médication adjuvante du traitement chirurgical (prévient les récédives) ou des traitements radium et radiothérapiques dont elle prolonge l'action. Cancers inopérables.

Présentation. — En boîtes unitaires, chaque boîte contenant les 2 ampoules jumelles nécessaires pour une seule injection de 5 cc.

Mode de prescription. — Prescrire 10 Radiolysine, pour une série de 10 injections intramusculaires, une tous les 3 jours.

N.-B. — Aucune indication ne révèle au malade la nature de l'affection pour laquelle il est traité.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-00.

RADIOPAQUE HEUDEBERT

Composition. — Le RADIOPAQUE Heudebert est un repas d'épreuve pour examen radiologique du tube digestif; son opacité est obtenue par le sulfate de baryum gélatineux en suspension dans un support alimentaire composé d'hydrates de carbone, de graisses et de matières azotées représentant une valeur nutritive de 750 calories pour la dose de l'examen.

Avantages. — En raison de sa réelle valeur alimentaire, le RADIOPAQUE ne modifie en rien le rythme des contractions et permet l'examen du tube digestif dans son état de fonctionnement normal; de plus, son goût très agréable de crème au chocolat le fait accepter sans répulsion par les malades les plus difficiles.

Présentation. — Il est présenté en flacons de 400 cc. pour examens complets et en 1/2 flacons pour examens partiels et examens des enfants. Il est prêt à l'emploi sans aucune préparation supplémentaire et son bouchage dans le vide suivi de 2 stérilisations lui assure une conservation indéfinie.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

RADIOTÉTRENE GÉRARD

Composition. — Tétra-iodo-phénol-phtaléine disodique.

Mode d'action. — Opacifie la vésicule biliaire aux rayons X.

Avantages. — Stable, de composition constante, non toxique.

1° *Forme dragées* : grâce à son enrobage spécial, la dissolution intestinale et la visibilité vésiculaire sont assurées.

2° *Forme colloïdale* : préparation liquide faite pour les malades ne pouvant absorber les dragées.

Indications. — Examens radiologiques de la vésicule biliaire.

Forme et mode d'emploi :

1° *Dragées* : 15 à 20 au cours du repas. Visibilité maximale entre la 14^e et la 18^e heure.

2° *Forme colloïdale* : mélanger le contenu des deux flacons, immédiatement avant l'absorption. Absorber la totalité du liquide (environ 60 cc.).

Prix au public : 25 francs.

Laboratoires du Docteur LAURENT-GERARD

Docteur ès sciences.

Ancien chef de Laboratoire

à la Faculté de Médecine de Paris

40, rue de Bellechasse — PARIS (VII^e).

RADIOTROPINE

Complexe à radioactivité stabilisée.

Association des deux plus puissants antiseptiques internes et des deux meilleurs dissolvants de l'acide urique et des urates : **Bromure de Radium** et **Urotropine**.

Forme. — Granulé effervescent chimiquement pur, rigoureusement dosé et **immédiatement soluble**.

Indications. — **Toute la Diathèse arthritique** (goutte, rhumatisme, gravelle, etc.), les **affections vésico-rénales** (néphrites, pyélo-néphrites, cystites, etc.), **affections biliaires** (cholécystites aiguës, angiocholites, ictères), et **tous les états infectieux** où la formine est indiquée (grippe, etc.).

Pôsiologie. — 2 à 6 cuillerées à café par jour ; au commencement des repas, dans un demi-verre d'eau. Une cuillerée correspond à 0 gr. 25 d'hexaméthylènetétramine.

Établissements LABORADIUM

33, rue Saint-Jacques — PARIS.

LE RAISIN QUOTIDIEN

Composition. — Pur jus de raisin frais sans alcool.

Préparé avec les meilleurs raisins de l'Anjou, pasteurisé à température modérée, renferme intégralement toutes les vitamines, albumines, corps azotés. Maintenu dans le vide dans sa bouteille, ce qui évite toute oxydation. Ni antiseptique, ni acide sulfureux.

Indications. — Auto-intoxication, Arthritisme, Maladies de l'estomac, du foie, de l'intestin, des reins, Boisson de table pour estomacs délicats.

Mode d'emploi. — Pur ou mélangé d'eau à table, ou un verre à bordeaux avant chaque repas.

Prix : 10 francs la bouteille.

Henri CHARTIER
SAUMUR

RÉALPHÈNE BUISSON

Ether phosphorique du glucose
et Stovarsol calcique.

Augmentation rapide et durable
de l'appétit, du poids et des forces.

Indications :

Asthénie, Anorexie, Amaigrissement, Convalescences, Anémies, Surmenage, Entérites chroniques. Troubles généraux de la nutrition.

Formes :

1° Comprimés ; 2° cachets ; 3° granulé ; 4° élixir.

Posologie :

Adultes. Comprimés et cachets (10 centigr. de Stovarsol calcique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par comprimé ou cachet) : 1 à 2 par jour, pendant 6 jours, et repos d'une semaine.

Granulé (5 centigr. de Stovarsol calcique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par mesure) : 2 à 4 mesures par jour, pendant 6 jours et repos d'une semaine.

Elixir (5 centigr. de Stovarsol sodique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par cuillerée à potage) : 2 à 4 cuillerées à potage, par jour, pendant 6 jours, et repos d'une semaine.

Enfants : Jusqu'à 12 ans. *Granulé* : 1 à 2 mesures par jour pendant 6 jours et repos d'une semaine.

Nourrissons. Granulé : 1 à 3 demi-mesures par jour pendant 4 jours et 4 jours de repos (1 centigr. 1/2 à 2 centigr. de Stovarsol calcique par kilogr. de poids et par jour).

Prix de vente au public : 20 francs.

Prix médical : 12 fr. 60

(sous quelque forme que ce soit.)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

RECONSTITUANT MARY

Propriétés thérapeutiques. — Tonique de premier ordre ; grande richesse thérapeutique.

Nature à base de Noix vomique, Arhénal, Kina, Coca, Kola, Colombo, Gentiane, etc.

Traitement curatif des anémies, lymphatisme, anorexie, convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. Demi-dose pour enfants.

Laboratoire

du reconstituant MARY

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

RECTAGINE

(Suppositoires radifères).

Composition. — Organate d'argent à 17 p. 100 d'argent pur, Hydrargyre, sulfo-oléo sulfonate de sodium camphré, et bromure de radium.

Indications. — 1° *Chez l'homme* : Agit sur les complications de la blennorrhagie, sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

2° *Chez la femme* : Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades ; médication de tous les états congestifs ou infectieux de l'utérus, des trompes et des ovaires.

3° *Cas particuliers* : Action résolutive très nette sur : le prurit anal, les érosions de l'anus, les hémorroïdes internes et les oxyures.

Posologie. — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

La boîte de 10 suppositoires : 15 fr.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. *, O. I. Q.

Docteur en pharmacie. Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

RECTANOL

Anesthésique de base par voie rectale.

Constitution. — Solution de Tribromoéthanol, dans l'Hydrate d'Amylène. 1 cc. \equiv 1 gr. de Tribromoéthanol.

Avantages. — 1° Narcose douce, suppression du choc psychique, de l'excitation pré et post-anesthésiques.

2° Réveil calme. SANS VOMISSEMENTS.

3° Simplification des suites opératoires. L'anesthésique complémentaire par inhalation est administré, quand cela est nécessaire, à doses infinites : Aucune irritation des voies aériennes, donc moindre danger de complications pulmonaires.

Indications. — Toutes interventions, et en particulier, la chirurgie gastrique ou intestinale, la chirurgie des membres, de la face et du cou, du thorax, gynécologique, etc...

Contre-indications. — *Locales* : Interventions sur le rectum et l'anse sigmoïde.

Générales : Dégénérescences hépatique et rénale.

Mode d'emploi. — De 7 à 10 cgr. de RECTANOL par kilo, selon l'âge et le sexe, administrés en lavement à 2 ½ ou 3 p. 100, dans de l'eau distillée au moyen de la canule Erce, à champignon d'arrêt.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS (VII^e).

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Œsculine adréalinée et d'Ortho-cocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

Prop. thér. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Prix : 14 francs complète.

Tube de rechange : 12 francs.

Laboratoire de la Varilaxine

164, rue Saint-Honoré — PARIS.

RECTOPANBILINE

Formes. — Solution pour lavement et suppositoires.

Définition. — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du Dr Bensau de amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique, une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

Composition. — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* additionnée dans les suppositoires de glycérine solidifiée.

Indications. — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose* dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts, Hernies, Grossesse, Accouchements.

Posologie. — Un ou 2 suppositoires par jour ou 1 à 3 cuillerées à café de solution dans 160 gr. d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — Demi-dose pour les enfants.

Prix au public : 12 francs le pot de Rectopanbiline.
10 francs la boîte de suppositoires.

Laboratoire du Docteur PLANTIER
ANNONAY (Ardèche).

RÉGYL

« Régulateur de l'estomac ».

(A base de peroxyde de magnésium hydraté, de fluorure de sodium et de ferments digestifs).

Présentation :

Sous forme de comprimés pesant chacun 0 gr. 60.

Propriétés :

Régulateur de l'estomac, gastralgie, dyspepsie, flatulences, fermentation, pesanteur, renvois, crises stomacales tenaces.

Dose et mode d'emploi :

Un ou même deux comprimés après chaque repas et de préférence dans une infusion. Doubler la dose dans les états aigus.

Prix au public (en cours de variation).

Echantillons et notices sur demande.

Laboratoire du RÉGYL

8, rue Richer — PARIS (IX^e).

Téléphone : Central 16-85.

RÉNALEPTINE

3 - 4 - di - oxyphenyl - 1 - méthyl - amino - ethanol.
(Adrénaline pure lévogyre.)

Indications :

Toutes les affections où l'on recherche des effets vaso-constricteurs.

Prévention et traitement des crises nitritoïdes.

Posologie et mode d'emploi. — Solution de Réna leptine à 1/1000. Doses par 24 heures :

Voie buccale : X à XXX gouttes de la solution à 1/1 000.

Voie sous-cutanée ou intramusculaire : 1 ampoule de 1 cc. de la solution au 1/1 000 ou de la solution au 2/1 000.

Voie hypodermique : 1/4 de cc. à 1 cc.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RENION VINCARDI

Diurétique rénal.

Principes actifs. — Théobromine pure recristallisée
Extrait Scille stabilisée, Scammonée.

Forme. — Comprimés se délitant rapidement dans les liquides aqueux, tisanes, infusions, eaux minérales. Ne provoque ni nausées, ni céphalées.

Indications. — Régulateur de la fonction rénale, Diurétique énergique et inoffensif, Affections cardio-rénales, Asthénies, Hypertension, Néphrosclérose, albuminuries.

Doses. — 3 à 4 comprimés par 24 heures dans infusions ou eaux minérales au milieu des repas principaux.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire VINCARDI

Ph. VIGUIER, pharmacien.

42, avenue Borriglionne — NICE (A.-M.)

R. C. Nice : 9046.

RÉNOCARDINE

Diurétique Végétal, cardio-rénal.

Indications. — Asthénies et Arythmies cardiaques; Néphrites et Cirrhoses, Œdèmes et Ascites, Artério-Sclérose, Hypertension, Mal de Bright, Urémie, et toutes Insuffisances Cardio-Rénales.

Composition. — Dragées d'extraits spéciaux, physiologiquement titrés, des plantes fraîches et stabilisées suivantes :

Pyrola umbellata. Diurétique rénal aussi actif que la Théobromine, mais ne provoquant ni céphalée ni intoxication urique.

Adonis vernalis. Diurétique toni-cardiaque non hypertenseur, succédané de la Digitale mais sans effets accumulatifs ni accoutumance.

Fleur de genêt. Tonicardiaque non hypertenseur (Sparteïne), diurétique puissant légèrement laxatif (Scoparine).

Doses. — Deux à trois dragées au début des deux repas.

Prix, la boîte : 15 francs.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires J. PERROCHON

57, rue Origet — TOURS.

RÉNOVOL

Composition. — Hamamélis, Hydrastis, Marron d'Inde, Viburnum, Seneçon, Piscidia, Crataegus, Passiflora, Condurango, Caseara.

Indications. — Tous les accidents de la puberté, de la menstruation et du retour d'âge, douleurs des règles, maux de tête, constipation, varices, hémorroïdes, ulcères variqueux, États congestifs. Préviend la métrite. Sédatif du système nerveux.

Mode d'emploi. — 2 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau pendant les repas.

Peut être pris pendant les règles.

Laboratoire du Rénovol

A. DEBROCK

Pharmacien de 1^{re} classe

22, rue de Paris — HOUILLES (Seine-et-Oise).

RÉSYL

Antiseptique pulmonaire, anticatarrhal.

Éther glycéro-gaïacolique soluble. Non caustique, libère du gaïacol à l'état naissant. Modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

Indications. — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.

Sirop, Comprimés, Ampoules.

Doses. — 2 à 6 cuillerées à café de sirop, 2 à 6 comprimés par 24 heures. Voie hypodermique : une ampoule tous les 2 jours.

Le petit flacon Sirop.....	8 fr. 50
Le grand — —	15 fr. »
Le tube de 20 comprimés.....	7 fr. »
La boîte de 12 ampoules.....	15 fr. »

Laboratoires O. ROLLAND

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

RETHRAGINE

Médication bactéricide et radio-active des affections urétrales aiguës et chroniques chez l'homme et chez la femme.

Nature du produit :

La *Réthragine* est une composition médicamenteuse présentée sous forme de bougies renfermant, en milieu indolore, de l'argent, du cuivre, de l'acide urique et du bromure de radium à l'équilibre radio-actif et répondant à des constantes physiques nettement déterminées.

Présentation :

Les bougies *Réthragine* sont vendues sous le nom de « Bougies *Réthragine H* » pour les hommes et de « Bougies *Réthragine F* » pour les femmes.

Il existe deux concentrations radifères : 1 et 2 micros (2 micros pour les hommes seulement).

Prescrire : *hommes* : Bougies *Réthragine H*. à 1 ou 2 micros ; *femmes* : Bougies *Réthragine F*.

Mode d'emploi :

En présence d'une urétrite confirmée par l'examen microscopique, commencer les grands lavages uréthro-vésicaux au permanganate de potasse, solution à 0,25 p. 1000. Introduire ensuite une bougie et la maintenir en place en recouvrant le méat urinaire d'un tampon de coton stérile et, par-dessus, un préservatif.

Il est indispensable que la bougie reste en contact le plus longtemps possible ; aussi faut-il recommander aux malades de n'uriner que cinq heures environ après l'application. Continuer les grands lavages qui seront faits tous les jours, ainsi que les applications de bougies.

Durée du traitement :

L'application de 8 à 10 bougies est généralement suffisante, même dans les cas d'urétrite les plus rebelles.

Prix :

La bougie Réthragine H. (1 micro).....	12	»
La boîte de 5 bougies Réthragine H. (1 micro).. <td>55</td> <td>»</td>	55	»
La bougie Réthragine H. (2 micros).....	15	»
La boîte de 5 bougies Réthragine H. (2 micros).	70	»
La bougie Réthragine F. (1 micro).....	12	»
La boîte de 5 bougies Réthragine F. (1 micro).. <td>55</td> <td>»</td>	55	»

Laboratoires pharmaceutiques :
L. G. TORAUDE O. * O. I. ®

Docteur en pharmacie de la Faculté de Paris,
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de médecine,
Membre de la Société de pharmacie de Paris,
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

RÉVULSIF LIQUIDE BOUDIN

Propriétés thérapeutiques :

- 1° Il produit en une minute une révulsion intensive ;
- 2° Etant liquide, il peut être appliqué très rapidement sur une très large surface ;
- 3° Après le badigeonnage, le malade ne pouvant l'arracher, est forcé d'en subir les effets ;
- 4° Il ne colore pas et n'abîme pas la peau, peut être renouvelé et appliqué plusieurs fois par jour ;
- 5° absorbé par la peau, il agit efficacement sur les régions profondes qu'il décongestionne très vite ;
- 6° il ne contient aucun produit nuisible pour les reins et se conserve indéfiniment ;
- 7° il n'entre dans sa composition, ni cantharide, ni produit caustique ou acide.

Indications thérapeuthiques :

- 1° Maladies aiguës des voies respiratoires : Rhume, Laryngite, Bronchite, Congestion pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleurésie, Pneumonie, Broncho-Pneumonie ; —
- 2° Maladies chroniques des voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Catharrhe, Bronchite chronique, Tuberculose pulmonaire ; —
- 3° Douleurs, Rhumatismes, Névralgies, Torticolis, Lumbago, Points de côté, Rhumatismes aigu et chronique, Arthrites, Névralgies de toutes sortes.

Mode d'emploi :

- 1° Dans les maladies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif le dos et la poitrine du malade. Laisser sécher et appliquer flanelle ou ouate ;
- 2° Dans les douleurs, rhumatismes, névralgies, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif toute la région douloureuse ou malade et la recouvrir ensuite de flanelle ou d'ouate. Pour les enfants dont l'épiderme est plus sensible que chez les grandes personnes, on peut additionner le Révulsif d'eau de Cologne ou d'alcool par partie égale.

Laboratoire BOUDIN

9, avenue Jean-Jaurès

JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

RÉVULSIF MILKO

Innovation thérapeutique.

Composition. — Essences naturelles. Terpènes. Alcool.
(Ne renferme pas de produits phénoliques, d'essences de moutarde ou de capsicum, prurigineux.)

Présentation. — 3 concentrations différentes ;

N° 1. *Pour bébés* (nourrissons et jeunes enfants) : 5 fr. 50.

N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ) : 6 fr. 50.

N° 3. *Pour adultes* : 8 francs.

Le **Révulsif Milko** détermine une vaso-dilatation intense sans provoquer de phlyctènes. Ne tache ni n'allère les téguments, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène, ni sternutatoire. Odeur agréable.

Action secondaire : Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

Indications. — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or : Strasbourg 1927.

RÉVULSIF PROCIPHA

Forme. — Liquide.

Mode d'emploi. — Badigeonnage deux fois par jour.

Composition. — Mélange d'essences, Terpène, Pinène, Carvacrol, qui irritent légèrement l'épiderme, d'odeur très agréable.

Indications. — Maladies des voies respiratoires, affections rhumatismales et névralgies.

Prix : 7 fr.

Laboratoires FISH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE.

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

REVULSOPLASME

Aduites, BB (Enfants).

Cataplasme sinapisé prêt à poser, de conservation indéfinie, à farines séparées.

Composition. — Farines de lin et de moutarde sélectionnées complètement déshuilées au solvant.

Avantages. — Activité certaine et constante, longue durée d'efficacité.

Indications. — Tous les cas où une révulsion rapide et efficace est indiquée.

Mode d'emploi. — Faire tremper une minute dans de l'eau à 40°; appliquer directement sur la partie malade.

N.B. — Le Révulsoplasme BB, moins actif, est spécialement préparé pour les enfants.

Prix : 1 fr. 75

Société des Révulsifs

4, rue Levert — PARIS (XX°).

RHAGADINE BRACQUEMOND

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Forme. — Pommade en tubes.

Propriétés thérapeutiques. — La *Rhagadine*, à base d'un mélange de Kératine, d'une innocuité absolue, possède des propriétés durcissantes assez grandes pour raffermir l'épiderme le plus délicat; mélangée à des corps gras, maintient à l'épiderme toute sa souplesse sans atténuer en rien les propriétés spécifiques de la substance médicamenteuse agissante.

Indications thérapeutiques. — Gerçures des seins, Erythèmes des nouveau-nés, Fissures anales chez les hémorroïdaires, Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies déchiquetées ou par arrachement.

Echantillons sur demande adressée au :

Laboratoire BRACQUEMOND

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie polyvalente Antigonococcique.

Constitution. — Stock vaccin polyvalent, formé de 24 souches différentes de gonocoques, rigoureusement stérilisées et desséchées à froid par des procédés spéciaux, divisées ensuite en sphérules kératinisées.

Propriétés. — La RHÉANTINE LUMIÈRE est un vaccin antigonococcique dont l'absorption, par voie buccale, constitue l'originalité propre. Elle est toujours parfaitement tolérée, même par les malades les plus délicats et n'entraîne aucune réaction générale.

Indications. — Affections gonococciques locales et métastatiques chez l'homme et chez la femme. Rhumatisme et arthrite blennorragiques, orchites, cystites, pyélites, épидidymites, ophtalmies, d'origine gonococcique, etc.

Traitement le plus simple, le plus anodin et le plus efficace.

Dose courante. — 4 sphérules par jour, 2 le matin et 2 le soir, une heure avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Formuler. — Boîte de RHÉANTINE LUMIÈRE.

AUTO-VACCINS. — Pour provoquer chez les malades atteints de lésions complexes ou spéciales un processus humoral curatif, il faut se rapprocher des groupes infectants et le moyen de beaucoup le plus sûr réside dans l'emploi de vaccins autogènes auto-vaccins, préparés à partir du pus recueilli sur le sujet lui-même.

Les LABORATOIRES LUMIÈRE préparent des vaccins autogènes sur demande spéciale du médecin auquel ils fournissent gratuitement, le cas échéant, le matériel nécessaire pour le prélèvement et l'expédition du pus.

LABORATOIRES LUMIÈRE.

23, Cours de la Liberté — LYON.

RHÉSAL VICARIO

Succédané inodore du salicylate de méthyle.

Liquide rapidement absorbable par la peau, sans provoquer la moindre irritation cutanée.

Action prompte et durable.

Mode d'emploi. — En onctions, deux à trois fois par jour, en recouvrant de flanelle ou même de taffetas gommé.

Indications. — Rhumatismes. Goutte. Névralgies.

Le flacon : 8 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e)

RHINASPIR

Poudre soluble et non caustique en étui saupoudreur pour aspirations et pulvérisations nasales.

Composition. — Adrénaline au 1/100, Scuro-forme, Aristol, Benzonaphthol, Salicylate de soude, Lactose, Acide borique, Terpinéol, Essence de pin.

Propriétés. — Décongestionne et antiseptise la pituitaire, fluidifie, puis tarit les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, obstruction nasale par hypertrophie des cornets, ozène, sinusites.

Mode d'emploi. — 5 à 6 fois par jour, priser une pincée ou mieux la projeter dans chaque fosse nasale avec le lance-poudre Rhinaspir.

Prix de l'étui : 10 francs.

Dépôt général pour la France :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue Feydeau — PARIS (II^e).

Téléph. : Central 83-15.

RHINODROPS BÉRAL

Capsules nasales à l'Oléophédrine

(Huile d'Ephédra éphédrinée).

Propriétés. — *Balsamiques, Antiseptiques, Décongestifs.* Assurent la perméabilité des fosses nasales. Préservent des complications naso-pharyngées

Indications. — *Toutes inflammations, congestions et obstructions nasales. Insuffisances respiratoires des Adénoïdiens et des Déformés du naso-pharynx. Toutes affections aiguës susceptibles de se compliquer d'infection naso-pharyngée.*

Mode d'emploi. — Couper l'extrémité du Rhinodrops et en vider la moitié dans chaque narine. (Faire incliner la tête du côté injecté.)

Formuler : Rhinodrops Béral, une boîte.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

RHINOFLUINE

Solution isotonique et stérilisée d'extrait de Jabofandi.

Forme. — Ampoules.

Indications thérapeutiques. — Action élective sur les terminaisons sensibles des nerfs trijumeau et pneumogastrique, au niveau des muqueuses oculaire, nasale et laryngo-trachéale.

Rôle essentiel : Régulation de la sensibilité
et des troubles sécrétoires.

1° En Rhinologie. — La Rhinofluine doit être utilisée en instillations dans les cas suivants :

Congestions et Obstructions Nasales
(Vaso-motrices)

Rhino-Pharyngites

Rhinites Atrophiques — Ozène

Coryzas Spasmodiques

et Rhino-Bronchites Asthmatiques

Céphalées Rhinogènes

Il est nécessaire dans l'Ozène et dans les Coryzas spasmodiques (rhume des foins en particulier) de combiner ce traitement local avec le traitement général par les produits ingestibles de jaborandi (Neopan-carpine ou Vaso-Neurine) qui constituent le traitement de fond.

2° En Ophtalmologie. — La Rhinofluine est employée en instillations. Elle réalise une décongestion rapide de la muqueuse conjonctivale (disparition de la rougeur et de la tuméfaction) et atténue l'hyper-sécrétion lacrymale (larmolement). Par son action sur les terminaisons sensibles et la décongestion ainsi réalisée, les phénomènes douloureux orbitaux et périorbitaux sont rapidement atténués (picotements, cuisson, tension douloureuse, névralgies, migraine ophtalmique, céphalalgies).

Mode d'emploi :

Les instillations de Rhinofluine peuvent être pratiquées 2 ou 3 fois par jour si nécessaire.

Pour les yeux, il sera toujours préférable de faire l'instillation de 1 à 11 gouttes dans le coin de l'œil, le soir, avant de s'endormir, si l'on ne fait l'instillation qu'une fois par jour. L'action de la Rhinofluine provoque en effet une contraction de la pupille qui peut gêner momentanément l'accommodation. La solution est parfaitement tolérée par la muqueuse oculaire et n'a aucun effet toxique.

Pour le nez et la gorge, les instillations peuvent être renouvelées 2 à 3 fois par jour (III, IV, V gouttes chaque fois dans chaque narine).

(Instillateur spécial dans les boîtes)

Les gouttes instillées tombant dans la gorge peuvent être avalées.

Laboratoire
de pathologie générale de Paris
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI°).

Téléphone : Auteuil 35-25.

RHINO-LIPOSEPTINE

Solution concentrée de l'antitoxine du Professeur Lemoine pour pulvérisation dans le nez et la gorge.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycètes. — Possède toutes les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

Indications. — En pulvérisations ou instillations dans le nez et la gorge dans tous les cas de maladies infectieuses où ces cavités sont atteintes : Angines, Coryza, Rhinopharyngites, Ozène, Sinusites, Grippe, Bronchites, Diphtérie, Rougeole, Scarlatine.

Mais ne présente aucun des inconvénients du menthol, pas d'irritation des muqueuses.

Mode d'emploi. — La Rhino-Liposeptine se présente en solution huileuse et en capsulines Auto-Rhino-Injectables. Pulvériser ou instiller plusieurs fois par jour.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

RHINO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon,

Vaccination locale.

Composition. — Lysat des germes pathogènes du rhino-pharynx.

En application sur la muqueuse nasale et pharyngée détermine une immunité cellulaire locale.

Indications. — Coryza, rhino-pharyngites, adénoïdites Angines, Prophylaxie des complications des maladies contagieuses (Grippe, Rougeole, Coqueluche, Diphtérie, etc.).

Posologie. — En instillations ou mieux en pulvérisations locales, 3 à 4 fois par jour. (Le Rhino-Vaclydun n'est pas injectable.)

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Prix : 18 francs.

Nécessaire Rhino-Vaclydun contient 2 ampoules de lysat vaccin et un petit pulvérisateur spécial.

Prix : 18 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Téléphone : Carnot 78-11.

RHOCYA

DYN

Un progrès sur les médications iodées.

Rhodanate de potassium pur

(Solution titrée : une goutte = un centigramme.)

Même action pharmacodynamique que les iodures et dérivés iodés (iode organique, peptones iodées, lipoïdes iodés, iodotanniques), mieux toléré, évite les effets secondaires des produits iodés (iodisme, réactions congestives ou thyroïdiennes).

Ne contient pas d'iode.

Indications. — *Arthritisme, hypertension artérielle, rhumatisme chronique, emphysème, scléroses, lymphatisme, syphilis tertiaire, tuberculose fibreuse, etc.*

Posologie. — Cures régulières et prolongées : X à XX gouttes avant les trois repas.

Le flacon compte-gouttes : 18 francs.

Société d'Applications Pharmacodynamiques
5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII^e).

Diderot 37-93.

RHODARSAN

Dioxy-diamino-arsénobenzol méthylène-sulfoxyate de sodium.

Teneur en arsenic : 20 p. 100 environ. Donne, avec l'eau distillée, des solutions neutres, injectables par voie veineuse exclusivement.

Indications :

Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Posologie et mode d'emploi. — Séries d'injections graduées de 0 gr. 15 à 0 gr. 90. Applications locales de poudre, collutoires ou pommades.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RHODAZIL

Benzoate de Benzyle.

Antispasmodique, non toxique.

Indications :

Asthme vrai, Hypertension, Dysménorrhée.

Hoquet persistant, Spasmes divers, Mal de mer.

Posologie :

Adultes : Une demi-cuillerée à café de solution ou 2 capsules, à renouveler.

Enfants : IV gouttes de solution, par année d'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RHOFÉINE

Association d'acide acétylsalicylique (50 centigr.) et de caféine (5 centigr.) pour un comprimé ou un cachet.

La caféine dote la Rhoféine de ses propriétés toni-cardiaques.

Indications :

Grippe, États fébriles, Migraines, Névralgies.

Posologie. — 1 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RHOMNOL

A base d'acide nucléinique pur et de nucléophosphates naturels.

Indications thérapeutiques. — Puissant reconstituant du noyau cellulaire, anti-neurasthénique de choix, indiqué dans toutes les affections dyscrasiques consomptives.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,05 : 4 à 6 par jour aux repas. *Saccharure* (granulé) 0,10 par cuill. à dessert ; une cuill. à dessert aux repas, pour adultes ; moitié ou quart pour les enfants, suivant l'âge. *Ampoules* 1 cc. (0,05 de nucléinate de soude par cc.) pour injections intramusculaires de préférence (spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aiguës).

Prix de vente au public : 18 fr.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^e).

RICÉYL BILLAULT

Traitement efficace de la constipation.

Forme. — Poudre.

Composition :

Huile de Ricin	40 gr.	} pour 100 gr.
Magnésie	40 gr.	
Lactate de Magnésie	5 gr.	
Excipient : Sucre	15 gr.	

Le RICÉYL agit tout à fait différemment des autres laxatifs. A ces derniers, on demande de produire leur effet du soir au matin sans se préoccuper des suites qui se manifestent si l'on en prend chaque jour : entérite, constipation accrue. Tout au contraire, le RICÉYL implique un traitement à suivre et prétend au rétablissement normal des fonctions, grâce notamment à son action sur la sécrétion biliaire. Le plus souvent d'ailleurs, après 1, 2 ou 3 jours, on peut diminuer, puis espacer les doses. Une véritable rééducation de l'intestin est ainsi obtenue rapidement.

Faisons observer que le traitement par le RICÉYL n'est pas onéreux, par le fait que l'on espace les doses pour un résultat durable.

Mode d'emploi. — Le RICÉYL s'administre dans du lait, du café, ou du café au lait sucré, chaud, le matin à jeun ou le soir au coucher.

Adultes : Dose purgative : 3 à 4 cuillerées à café.

Dose laxative : 1 à 2 cuillerées à café.

Enfants : Bébé, à partir du sevrage, 1/2 cuillerée à café ; de 3 ans à 6 ans, 1/2 cuillerée à café ; de 6 ans à 12 ans, 1 à 2 cuillerées à café.

La boîte : 12 francs.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. O

Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut
et de l'Académie de Médecine,

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

RICIGEL

Huile de Ricin.

Sous une forme nouvelle et agréable.

Forme. — Gelée de fruits contenant 90 p. 100 d'huile de ricin fraîche, 2 p. 100 agar-agar, 8 p. 100 sirop de fruits.

Goût agréable, spécialement indiqué pour femmes et enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles de l'huile de ricin.

Indications. — Toutes celles de l'huile de ricin.

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café à jeun produisent trois ou quatre heures après des selles molles, sans coliques. Cette dose pour les enfants est moindre et, chez les adultes, peut être doublée pour obtenir une véritable purgation.


Prix : 8 fr. 50.

ROBERTS et C^{ie}, Pharmaciens,

5, rue de la Paix — PARIS.

Tél. : Central 69-86.

RIODINE



Composition. — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20 % d'iode.

Forme. — Flacon de 50 perles. Chacune représentant l'action de 0,20 cgr environ d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable. *Action prolongée et durable sans iodisme.*

Pour obtenir une *action rapide et intensive* prescrire la **Néo-Riodine** : mêmes applications.

Indications. — Artériosclérose, myocardites chroniques, hypertension, etc. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhumatisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 12 francs.

LABORATOIRES du D^r P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

ROB OBERLIN

(Pour adultes, adolescents et enfants au-dessus de 5 ans)

Par cuillerée à soupe (adultes).

Bi-iodure de mercure	un centigr.
Iodure de sodium	0,06 centigr.
Arséniate de soude.. .. .	un milligr. $\frac{1}{2}$

Une à 6 cuillerées à soupe par jour.

Par cuillerée à entremets (adolescents).

Bi-iodure de mercure	0,006 milligr.
Iodure de sodium	0,04 centigr.
Arséniate de soude.	un milligr.

2 à 4 cuillerées à entremets par jour.

Par cuillerée à café (enfants de 5 à 10 ans).

Bi-iodure de mercure	0,003 milligr.
Iodure de sodium	0,02 centigr.
Arséniate de soude.	0,00 $\frac{1}{2}$ milligr.

2, 3, et jusqu'à 4 cuillerées à café par jour.

Le **Rob Oberlin** se vend en flacons d'environ 420 cc.

Prix : 16 fr. 50.

ROB CABANÈS

(Pour nourrissons et enfants jusqu'à 5, 6 et 7 ans).

Par cuillerée à café :

Bi-iodure de mercure.. .. .	un milligr.
Iodure de sodium.. .. .	0 gr. 006

Par cuillerée à entremets :

Bi-iodure de mercure.. .. .	deux milligr.
Iodure de sodium.. .. .	0 gr. 012

Par cuillerée à soupe :

Bi-iodure de mercure.. .. .	trois milligr.
Iodure de sodium.. .. .	0 gr. 018

Le **Rob Cabanès** se vend en flacons d'environ 280 cc.

Prix : 14 fr. 50.

Leur présentation est discrète.

Laboratoire **OBERLIN**

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris
17, rue Cadet — PARIS

ROMARANTYL TROUETTE-PERRET

est le spécifique des Affections du Foie.

Elixir Aromatique à base de :

Romarin-Piscidia-Aphloïa-Ononis-Menthe.

L'Efficacité du *Romarantyl T. P.* est due à son action cholagogue, stimulante, diurétique, antispasmodique.

Mode d'emploi :

1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, rue des Immeubles-Industriels,

PARIS (XI^e).

ROMARENE

Composition. — Granulé soluble, de saveur agréable, composé de :
Ext. de ROMARIN, Pissenlit, Combretum, Eucalyptus, Agar-Agar,
Sél de Seignette, Citrate de Soude, Lactose.

Action thérapeutique. — *SÉCRÉTEUR BILIAIRE*, (cholérétique) et *DIURÉTIQUE*, régulateur de l'intestin: Assure le drainage des voies biliaires sans provoquer de réactions douloureuses.

Indications. — Toutes les **INSUFFISANCES BILIAIRES**. Convient à tous les *petits hépatiques* : congestifs du foie, sédentaires, atoniques, cholémiques, hémorroïdaires, coloniaux, etc... à tous ceux dont l'état gastro-hépatique est défectueux ou dont la vésicule est sensible. Abrège la durée des *ictères bénins*. Peut aussi s'associer au traitement des maladies hépatiques plus graves (cholécystite, coliques hépatiques, séquelles hépatiques des pays chauds, voire même ascites et cirrhoses, etc...). **TOUTES LES FOIS QU'IL CONVIENT D'AUGMENTER LE VOLUME DE LA SÉCRÉTION BILIAIRE, DE FLUIDIFIER LA BILE ET D'ASSURER SON DRAINAGE, SANS RÉACTIONS DOULOUREUSES.**

Améliore les états dyspeptiques, et aide à la sédation des douleurs.

Mode d'emploi. — Une ou deux cuillerées à café, *à jeun*, une ou plusieurs fois par jour, dissous dans un verre d'eau chaude ou mieux dans une infusion de romarin.

Laboratoire BEAUFOR

44, rue de la Manufacture-Nationale — BEAUVAIS (Oise).

ROSALYL

Composition

Ail.....	0 gr. 80
Thym.....	2 gr. 00
Marrube.....	1 gr. 00
Drosera.....	0 gr. 40
Grindelia.....	0 gr. 20
Bromure de sodium.....	0 gr. 60
Excipient liquide sucré et glycérimé	
Q. S. p.....	100 gr.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant, sans toxiques, des grandes toux quinteuses et spasmodiques. Puissant désinfectant des bronches. Vermifuge par l'ail et le thym.

Forme. — Liquide sucré et glycérimé, Une seule forme maintenant.

Indications. — *Coqueluche*. Toux nerveuses, Bronchites,

Posologie. — Indications très détaillées sur l'étiquette. Par cuillerées à café, à dessert ou à soupe, suivant l'âge.

Prix au public : 15 francs le flacon de 200 cc.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien, Docteur ès sciences

101, rue de Paris — RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise)

ROZODERME

Le *Rozoderme* est une pommade rose à base d'essences végétales antiseptiques (type Lucas-Championnière) et de substances chimiques (boro-zinciques) inoffensives destinées à créer et entretenir un milieu favorable à la régénération des tissus. Présentation en tubes.

Propriétés. — Le *Rozoderme* calme la douleur et l'irritation, aseptise les plaies en détruisant les germes nocifs, stimule la vitalité des tissus et active la cicatrisation. Convient parfaitement pour la toilette journalière des jeunes enfants.

Indications. — Erythème fessier, feux de dents des nourrissons, gerçures du sein, brûlures et diverses formes d'eczémas : aigu, chronique ou variqueux, dermites toxiques, zona intercostal, etc.

Mode d'emploi. — Appliquer une couche légère sur la partie malade, préalablement lavée et séchée, recouvrir de gaze et renouveler le pansement toutes les vingt-quatre heures.

Laboratoire du ROZODERME

11, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e),

RUBYL

Iodure double de quinine et de bismuth.
Suspension huileuse stérilisée, injectable
par la voie intramusculaire, bien tolérée.
Teneur en Bi = 20 mgr. environ par cc.

Indications :

Bismuthothérapie de la Syphilis.

Posologie et mode d'emploi :

Injection du contenu d'une ampoule (3 cc.)
tous les trois ou quatre jours ; série de
12 injections.

Chez les enfants : 1/20^e par année d'âge, de
la dose conseillée chez l'adulte.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RUTONAL

Phényl-méthyl-malonylurée.

Propriétés hypnotiques et anti-épileptiques
très voisines de celles du Gardénal, dont
il est le succédané pour les malades into-
lérants ou résistants à ce médicament.

Indications :

**Épilepsie, Chorée, Convulsions,
États anxieux.**

Posologie :

Deux à quatre comprimés à 20 centigr.
par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

RYLAL-NOYON

Pilules laxatives, cholagogues, antianaphylactiques.

Composition. — Extrait total de glandes intestinales, extrait biliaire, ferments lactiques sélectionnés, charbon poreux hyperactivé, extraits végétaux laxatifs.

Indications. — Constipation, Entérite, Embarras gastro-intestinal, Congestion hépatique et congestions viscérales diverses, Inappétence, Intoxications d'origine alimentaire.

Aucun produit toxique, pas de contre-indication.

Dose et mode d'emploi. — 1 ou 2 pilules, suivant le cas et l'effet obtenu, au repas du soir ou au coucher.

Prix au public : 40 pilules : 8 fr.

Laboratoire Chimico-Thérapique de Paris

24, rue Paul-Bert — PARIS (XI^e).

Tél. : Marcadet 20-28.

RYTHMOSYSTOL

Marrube blanc, 3/4 ; adonis vernalis, 1/4.

Formes : Dragées; Gouttes.

Propriétés. — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

Posologie. — *Dragées* : 10 par jour.

Gouttes : LX par jour. — Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n^{os} 103-1 et 2.

Prix : 14 francs.

COMTE, Pharmacien

60, rue Saint-Guilhem

MONTPELLIER.

SAINT-ARÉ

(Composition de l'eau de Carlsbad.)

Sulfatée sodique à 6 p. 1000.

Chlorurée, bicarbonatée, magnésienne, cal-
cique.

Propriétés thérapeutiques :

Syndromes vésiculaires et hépato-coliques.
— Alcalose. — Propriétés cholagogues,
régulatrices de l'intestin. — Hypoten-
sives, diurétiques.

Traitement à domicile.

Société des Eaux Minérales de Decize
(Nièvre).

Bureau à Paris, 49, boulevard de Port-Royal.

SALANTALE

Vaccins polyvalents antiseptiques (procédé breveté).

1^o VACCINOTHERAPIE

Pommade :

Vaccination par voie cutanée et application locale, traitement curatif et
préventif, aucune contre-indication. Sans réaction locale, ni générale.

Indications. — Furunculose aiguë et chronique, Panaris, Ostéomyélites.
Plaies post-opératoires purulentes, Phlegmons, Erysipèles, Impétigo
contagieux, Pyodermites superficielles ou profondes, Plaies infectées,
Mastites, Acné pustuleuse, Eczéma humide des seins et plis des aines
(Intertrigo), Blessures accidentelles, etc.

Mode d'emploi. — *a.* Application locale : faire sur l'emplacement
malade un pansement avec de la gaze enduite d'une légère couche de
SALANTALE ; renouveler le pansement matin et soir jusqu'à guéri-
son complète et simultanément ;

b. Vaccination cutanée. A cet effet, prendre un peu de **SALANTALE**,
environ la grosseur d'une demi-noisette et frictionner matin et soir une
partie du corps éloignée du mal. Par exemple, pour un furoncle au cou,
faire les frictions sur les cuisses ou sur les bras. Frotter très doucement
jusqu'à absorption complète de la pommade par la peau. Après la dispa-
rition des symptômes, continuer les frictions pendant un certain temps
afin de prévenir les récurrences.

Prix de vente : 15 francs le tube.

Ovules :

Vaccination par pansements gynécologiques.

Indications. — Toutes Leucorrhées et affections purulentes, Vulvo-vaginites, Urétrites, Métrites, Périmétrites, Salpingites, Annexites, Bartholinites et toutes affections gonococques.

Mode d'emploi. — Pansements gynécologiques. Ne tachant pas le linge, odeur agréable.

Prix de vente : 17 fr. 50 la boîte.

Ophtalmo :

(Sous forme de pommade). Vaccination par application locale.

Indications. — Orgelets, Blépharites, Conjonctivites purulentes et toutes autres suppurations.

Mode d'emploi. — Appliquer matin et soir la pommade sur les parties malades à l'aide de l'embout du tube. Répartir ensuite la pommade par un léger massage des paupières.

Prix de vente : 15 francs le tube.

Oto :

(Sous forme de pommade). Vaccination par application locale. Le tube muni d'une canule métallique interchangeable facilite l'application dans le conduit auditif et toujours sous le contrôle de la vue.

Indications. — Furunculose et affections douloureuses du conduit auditif : Eczéma impétigineux, Pansements post-opératoires, Otites moyennes et externes, aiguës et chroniques.

Prix de vente : 17 fr. 50 le tube avec canule.

Prix de vente : 15 fr. le tube sans canule.

2° VACCINOTHERAPIE ET THERAPEUTIQUE SYMPTOMATIQUE COMBINEES

Rhino :

Pommade nasale.

Indications. — Rhumes, Grippe, Sinusites aiguës, Mastoïdites et autres inflammations Rhino-Pharyngiennes.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir, plusieurs fois par jour, après s'être mouché, un peu de RHINO-SALANTALE, dans les narines, puis masser légèrement l'extérieur des narines pour bien répartir la pommade.

Prix de vente : 9 fr. 75 le petit tube.

Prix de vente : 15 fr. le grand tube.

Recto :

Sous forme de pommade rectale (en tube avec canule rectale).

Indications. — Affections du Rectum et de l'Anus, Hémorroïdes.

Prix de vente : 17 fr. 50 le tube.

Suppositoires :

Indications. — Hémorroïdes, Fistules et Fissures anales.

Prix de vente : 17 fr. 50 la boîte.

Tracho :

Sous forme de pommade ophtalmique, tube avec embout spécial.

Indications. — Trachome, Kératites, Conjonctivites purulentes et autres suppurations.

Mode d'emploi. — Appliquer matin et soir la pommade sur les parties malades à l'aide de l'embout du tube. Répartir ensuite la pommade par un léger massage des paupières.

Prix de vente : 10 francs le tube.

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoires SALANTALE

STRASBOURG

SALASENYL (Poudre)

Composition. — Antiseptique à base de chloramine T chimiquement pure.

Indications. — Angines, maux de gorge, affections des voies urinaires, de la vessie, brûlures, furonculose, eczéma, maladies inflammatoires de la peau, gynécologie, hygiène de la femme, métrites, infections puerpérales, désinfection des plaies récentes, profondes, infections, maladies de la bouche et des dents, stérilisation des eaux de boissons douteuses.

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuillerées doseuses par litre.

Laboratoires PROTHERAPIA
132, rue de Turenne — PARIS

SALÈNE CIBA **(et SALÉNAL CIBA)**

Analgésiques externes.

Ethers méthyl et éthyl-glyco-salicylique possédant, à un haut degré, les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais ayant sur ce dernier l'avantage de l'absence d'odeur et de toute action irritante.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

Doses. — Se formule magistralement, pur ou en liniment par 5 ou 10 gr.

Le SALÉNAL (pommade au Salène) est vendu en tubes de 30 gr. Prix : 10 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

SALSANOS

A base de sels de soude (sulfate, phosphate, tartrate, citrate)

Forme. — Sel granulé, effervescent, soluble et d'un goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Maintient l'alcalinité du sang, empêche celle de l'urine, diminue l'acide urique et participe à son élimination, aide à la dissolution des urates et des oxalates, active la combustion des graisses.

Indications. — Artério-sclérose, Pléthorisme, Gastralgie, Arthritisme, Rhumatisme, Goutte, Coliques hépatiques et néphrétiques, Maux de tête, Troubles digestifs, Obésité et en général toutes les affections du foie et des reins.

Doses. — Une à trois cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau le matin à jeun.

Prix : 16 fr. 50.

ROBERTS & C^{ie}, Pharmaciens

5, rue de la Paix — PARIS.

Tél. : Central : 69-86.

SALUBRINE PHÉNIX

Liquide et comprimés.

Composition. — Antiseptique puissant à base de formolsulfonate de soude et de thymol.

Formes pharmaceutiques. — Solution incolore miscible à l'eau ; d'odeur agréable, ne tachant pas le linge. (Comprimés.)

Indications. — Gynécologie, accouchements, pansements, hyperhydrose.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe ou 2 à 4 comprimés par litre d'eau. (Usage externe.)

Laboratoire P. MAUCHANT

14, rue de Birague — PARIS (IV^e).

SALVATYL

Adopté par les Ministères de la Marine et des Colonies.

Prophylaxie antivénérienne individuelle.

Pommade polyvalente agissant à la fois contre le tréponème et le gonocoque.

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Voir *Gambéol*).

Mode d'emploi. — En applications dans le canal de l'urètre sur la muqueuse balano-préputiale et les écorchures des parties génitales. A employer le plus tôt possible ; au plus tard dans les 12 heures consécutives à un contact suspect.

Présentations :

Salvatyl G. M.....	15	franes.
— Rech	10	—
— P. M.....	5	—

Laboratoire du SALVATYL

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

SALVÉ

A base de poudre grise (Hg cum creta), 1 centigramme par comprimé et 3 centigrammes par cachet et de carbonate de bismuth. Traitement bismutho-mercuriel. Médication dissimulée.

Indications. — Hérédo-syphilis, Traitement d'entretien, Insuffisance hépatique et ses manifestations, Constipation habituelle de l'enfant, acétonémie, Dermatoses (eczéma, prurigo, strophulus), Helminthiase et plus particulièrement oxyurase.

Comprimés : 6 mois à 1 an : 1/2 comprimé par jour.

1 an à 2 ans : 1 comprimé par jour.

2 ans à 4 ans : 1 comprimé 1/2 par jour.

4 ans à 15 ans : 3 comprimés par jour.

Adultes : 4 comprimés par jour.

Délayer les comprimés dans un peu d'eau ou de lait, avant les repas.

Cachets : Traitement arsénico-bismutho-mercuriel.

Adultes : 2 à 3 cachets par jour.

Comprimés : 13 fr.

Cachets : 15 fr.

Laboratoire RICHER

7, avenue Marceau. — PARIS.

SALVENASE LEGOUX

Composition :

Traitement interne.

A. Comprimés non enrobés se désagrégeant très rapide- ment ; consti- tués de :	Extraits secs	(Marron d'Inde (stabilisé) Cupressus Hamamelis Viburnum Boldo Surrénales Thyroïdes Ovaires
	Poudre de glandes	

B. Granulé aromatisé soluble dans l'eau, de citrate de soude pur.

Traitement externe.

Sels pour bains à base de :	{	Sulfate de potasse et d'alumine.
		Hydrochlorate de soude.
		Carbonate de soude acide.

Indications. — Traitement complémentaire de la cure à BAGNOLES-DE-L'ORNE, ou à défaut son meilleur succédané.

Mode d'emploi :

Traitement interne. (Prix : 15 fr.)	{	1 ^o matin à jeun, 1 cuillerée à café pleine de granulé, dissous dans un demi-verre d'eau.
		2 ^o A chaque repas de midi et du soir, prendre 2 à 3 comprimés.
Traitement externe. (Prix : 3 fr. 75).	{	1 bain ou 2 par semaine dans lequel on aura fait dissoudre le contenu d'une boîte Salvenase (sels pour bains).

Laboratoires LEGOUX, frères

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

Anciennement, 10, rue de Turenne,
PARIS (IV^e).

SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament héroïque, calmant énergique de la toux, anti-fébrifuge de premier ordre, médicament antigrippal et antibronchitique, par excellence.

Indications :

Laryngites, Trachéites, Rhumes vulgaires, Bronchites aiguës, Bronchites chroniques dites négligées, Affections pulmonaires, Gripes et ses formes. Coqueluche et toutes les toux de l'enfant.

Deux formes :

Elixir (adultes) : 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures. Prix : 18 francs.

Gouttes (enfants) : X gouttes par jour et par année d'âge. Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires Georges TINARD

134, boulevard Pereire — PARIS (XVII^e).

SALYSÉRUM

du Docteur Jules SÉJOURNET

Composé cosalicylé

(Communication à l'Académie de Médecine.)

Forme. — Ampoules de 5 cc. d'acide salicylique *indolore*.

Indic. thérap. — Rhumatisme aigu ou subaigu, Pleurodynies, Torticolis, Lombagos, Rhumatisme gonococcique, Sciatique, Goutte.

Doses. — 2 à 3 ampoules chaque jour injectées au point douloureux.

Prix : 22 fr. la boîte de 5 ampoules de 5 cc.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

SAMBUL

Médicament végétal, *sans colchique*.

Composition. — A base d'un suc extrait des baies du Sambucus Ebulus. Désodorisé.

Indications. — Goutte ; rhumatismes ; sciatique ; névralgies ; lumbago, migraines, etc. — Antidiabétique.

Posologie. — Une cuillerée à café matin et soir, avant et à distance des repas. *N'est pas toxique* ; pas de contre-indications. Traitement à prolonger dans les cas chroniques rebelles de prime abord. Cures ininterrompues de 1 à 3 flacons.

Le flacon pour dix jours de traitement : 18 fr.

*Littérature et spécimens médicaux
sur demande.*

**Société des Laboratoires du SAMBUL
EVREUX (Eure).**

SANAS

Composition :

Extrait glycéринé concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, facteurs A et D, sans trace d'huile, ne contient aucune substance irradiée artificiellement.

Préparation :

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du *Sanas*, à Saint-Pierre-Miquelon (Banc de Terre-Neuve).

Formes :

1° Gouttes ;

2° Ampoules pour boisson. Spécialement indiquées pour les colonies et pays chauds.

Avantages :

Sans odeur ou saveur désagréables.

Contient sous un faible volume les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

Indications :

Toutes celles de l'huile de foie de morue. Rachitisme, Prétuberculose, Anémie, Convalescence des maladies infectieuses, Adénopathies, Inappétence.

Posologie :

Enfants : Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

Adultes : Dose journalière : L à LX gouttes.

Mode d'emploi :

Une demi-dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

Prix du flacon : 15 francs.

A. WELCKER et C^{ie}

72, rue du Commerce — PARIS (XV^e).

SANDOPTAL

Acide isobutyl-allyl-barbiturique.

Forme. — Comprimés dragéifiés dosés à 20 centigr. d'isobutylallylmalonylurée.

Propriétés. — Assure un sommeil tranquille et naturel, suivi d'un réveil eusthénique. Index thérapeutique élevé. Tolérance parfaite.

Indications. — Toutes les insomnies.

Posologie. — Une dragée le soir avant de se coucher. Cas rebelles : 2 ou 3 dragées (maximum 4) à la fois.

Présentation. — Tubes de 10 dragées. Pour hôpitaux et cliniques : flacons de 100 et 500 dragées.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e).

M. CARILLON, pharmacien de 1^{re} classe.

Dépôt général et ventes :

Usine des Pharmaciens de France,
129, rue de Turenne — PARIS (III^e).

SANÉDRINE

Chlorhydrate d'Ephédrine lévogyre.

Indications :

Asthme bronchique, Fièvre des foins, Hypotension, Dysménorrhée, Accidents allergiques.

Posologie et mode d'emploi :

Deux à six comprimés à 25 milligr. par 24 heures, en prises espacées.

S'abstenir chez les hypertendus.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

SANEX-INHALANT

Composition. — Liquide volatil antiseptique, à base d'essences aromatiques de pin sylvestre, de thym, de menthe, de camphre, de melaleuca de Gomène, d'eucalyptus, etc. en solution dans de l'acétone pure. Présenté en tube stilli-gouttes aluminium.

Avantages. — Permet de faire de très fréquentes inhalations antiseptiques sans appareil spécial ; il suffit de verser sur un mouchoir quelques gouttes de SANEX-INHALANT et de respirer fréquemment les vapeurs qui se dégagent pendant plusieurs heures. Ne tache pas le linge. Odeur agréable.

Indications. — Affections du nez, de la gorge et des bronches ; en particulier Coryza, Sinusite, Rhume des foins, Coqueluche, Asthme.

Prix : 10 francs.

Sur demande, envoi d'un spécimen à MM. les Docteurs.

Laboratoires BOISSY

49, rue Hoche — COURBEVOIE, près Paris.

Dépôt : Ph^{ie} MANTOUT, 3, rue de Scribe, PARIS.

SANGUIL

Reconstituant complet.

Composition. — Association de glycérophosphate de soude, phosphate tricalcique, fluorure de calcium, nucléinate de manganèse, oxalate de fer, méthyl-arsinate de soude, kola totale, noix vomique totale, surrénale.

Action thérapeutique. — Stimule la cellule nerveuse. Excite la nutrition. Régénère les globules sanguins. Tonifie l'organisme. Assure la reminéralisation complète par ses fixateurs opothérapiques.

Formes :

Cachets, la boîte de 42 : 17 fr.

Granulé de goût agréable, la boîte : 14 fr.

Mode d'emploi :

Cachets : Un cachet avant chacun des trois repas.

Granulés :

Moins de 12 ans : deux cuillerées à café par jour.

De 12 à 18 ans : trois cuillerées à café.

Adultes : trois cuillerées à dessert.

A prendre au début des repas.

Laboratoires Ch. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e).

Téléphone : Archives 67-05.

SANGUINE IRRADIÉE

Vitamine D.

Elixir d'hémoglobine composé
activé aux R. U. V.

Traitement du rachitisme, Troubles de
la croissance, Combat la déminéralisation,
le surmenage, la fatigue,
l'anémie.

Prix : 20 fr.

Laboratoires RIETHE

40, rue des Abbesses — PARIS.

SANLUOL

Arsénobenzol en comprimés.

Le Sanluol permet, sous une forme commode
et bien tolérée, l'administration par la voie
buccale de l'arsénobenzol, méthode préconisée
par M. le Dr Ravaut.

Indications :

**Amibiase (prophylaxie et traitement).
Diarrhées, Entérites.**

Posologie et mode d'emploi :

Traitement : Deux à six comprimés à 10 centigr. par 24 heures, par séries de 8 à 10 jours.

Prophylaxie : Un ou deux comprimés par jour, une ou deux fois par semaine.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

SANOFORMINE

Composition. — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

Forme. — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

Indications thérapeutiques et posologiques. —

1° Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre ;
2° Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre ;

3° Désodorisant : 12 comprimés pour un bain de pieds quotidien. — 10 comprimés par litre en lavage (plis de l'aîne, creux de l'aisselle).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A BRUXELLES :

LE MARINEL, Pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.

SANOGLYL

Pâte antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites simples, mercurielles, bismuthiques, etc.

Prix : 6 fr., impôt compris.

SANORAM

Antiseptique puissant, en comprimés : ne coagule pas l'albumine. Recommandé en Chirurgie générale, traitement des brûlures, soins de la bouche, toilette intime, etc.

Prix : 5 fr.,

H. VILLETTE, Pharmacien

Marques de « La Biothérapie »

131, rue Cambronne — PARIS (XV^e).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

SANOQUINOL CIBA

Antiarthritique.

A base d'Atoquinol (Cf. ce mot), d'hexaméthylène-tétramine, de chlorure de magnésium, citrate de soude et benzoate de lithine.

Médicament spécialement préparé pour cures d'élimination uratique prolongées qui, grâce à ses composants, exerce sur l'organisme une action lixivianté caractérisée par la mobilisation lente et prolongée des dépôts uratiques, par une stimulation de la fonction hépato-biliaire et de la fonction rénale, par l'augmentation de la sécrétion de la bile, par une diurèse abondante et éliminatrice des déchets de l'organisme.

Indiqué dans les diverses manifestations de l'arthritisme, après les maladies infectieuses et, à titre préventif ou hygiénique, chez les sujets à complexion pléthorique, obèses herpétiques, rhumatisants, etc.

Doses : 1 à 4 cuill. à café de granulé par jour (aux repas).

Le flacon : 15 francs.

Laboratoires CIBA. — O. ROLLAND.

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON

SANTAL-MIDY

Composition. — Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Bombay, préférable au Copahu, au Cubèbe et à l'essence de térébenthine.

Forme. — Capsules.

Caractéristiques. — Pureté de l'essence et dosage élevé (0 gr. 25) par capsule.

Indications. — Blennorragie, Inflammation de la vessie, Néphrite suppurée, Catarrhe de la Vessie, Catarrhe vésical des vieillards, Maladie de Bright, Cystite aiguë, Coliques néphrétiques.

Doses. — Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties que l'on prend à distance égale et chaque fois un quart d'heure avant les repas.

Laboratoire de Pharmacologie Générale

D^r Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS.

SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène.

Forme. — Capsules.

Composition. — Chaque capsule contient :

Essences balsamiques : 0 gr. 16.

Bleu de Méthylène : 0 gr. 02.

Doses. — 4 à 10 capsules par jour.

Action. — Antigonococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique. Le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des Affections des Voies Urinaires.

Particularité. — Colore les urines en bleu.

Le flacon de 50 capsules : 20 fr.

Laboratoires MONAL et C^{ie}

6, rue Bridaine — PARIS.

SANTHÉOSE

A base d'une diméthylxantine irréprochablement pure, associée selon les cas au *phosphate de soude*, à la *caféine* ou au *benzoate de lithiné*.

Forme :

Se présente en cachets en forme de cœur (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

1° **Santhéose pure** : Affections cardio-rénales, albuminurie.

2° **Santhéose phosphatée** : Scléroses, convalescences.

3° **Santhéose caféinée** : asthénie, asystolie, infections.

4° **Santhéose lithinée**, artériosclérose, rhumatisme, goutte.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, anti-toxique.

Indications :

Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

Vente au public : la boîte de 24 cachets : 12 francs.

Dépôt général :

4, rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV^e).

SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial.
Spécifique des Prurits. — Eczémas.
Psoriasis. — Lichens.

Sapocrème. — Crème de SAPOLAN. Adoucissante, antiprurigineuse. Dermites aiguës.
Prix : 11 francs.

Sapocade. — (Sapolan et Huile de Cade.) Psoriasis. Séborrhée, Sycosis. Le tube : 11 fr.

Lait de Sapolan. — Erythèmes. Le flac. : 18 fr. 50.

Lait de Soufre Sapolan. — Acné. Le flac. : 18 fr. 50.

Lait de Cèdre Sapolan. — Pityriasis et Séborrhée du cuir chevelu. Le flac. : 18 fr. 50.

Poudre de Sapolan. — Dermites aiguës.
La boîte : 11 francs.

Savon de Sapolan. — Savon surgras au Sapolan : Peaux irritables. Prix : 5 fr.

Sapobarbe.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

Détail : Pharmacie 116, bd Haussmann et toutes pharmacies.

SARCOPTOL

Solution à base de soufre colloïdal.

Indications. — Séborrhée et états séborrhéiques, Epidermodermites microbiennes, Eczéma chronique et impétigineux, Prurit, Prophylaxie de la Furunculose, Parasiticide. Spécifique de la gale, qu'il guérit en une seule application sans frotte et sans bain.

Avantages. — Ne tache ni le linge ni la peau, d'une odeur agréable. Ni toxique, ni irritant, supprime les démangeaisons.

En flacons de 60 grammes : 15 fr.

— 120 — 28 fr.

Laboratoire du Sarcoptol

9, boulevard Edgar-Quinet — PARIS (XIV^e).

SAVONS A°. MOLLARD

SAVONS MOLLARD A TOUS MÉDICAMENTS

SAVONS SULFUREUX DE TOILETTE

A°. MOLLARD

SAVONS FLUIDES MOLLARD

pour les soins du cuir chevelu

(cèdre, eade, sulfureux, panama)

LOTION A° MOLLARD A. LA PILOCARPINE

SAVON DENTIFRICE MOLLARD

POMMADE ALCALINO-SULFUREUSE MOLLARD

CRÈME SULFUREUSE DE SAVON MOLLARD

(affections squameuses du cuir chevelu)

Émile LANG et C^{ie}

2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux

PARIS (IV^e)

Téléphone: Archives 20-71.

SCILLARÈNE « SANDOZ »

Composition. — Tous les principes actifs du bulbe de scille isolés sous forme de glucosides purs.

Forme. — Comprimés à 0 millig. 8 de substance active; solution à 1/2000; ampoules p. injections intramusculaires profondes à 1 cc. dosées à 0 gr. 0005; suppositoires dosés à 1 millig.

Propriétés. — Produit pur, cardiotonique et diurétique. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

Indications. — 1° Remplace la digitale quand elle n'agit pas ou n'agit plus; 2° Maintient la compensation; 3° Puissant diurétique dans les néphrites, le diurétique azoturique vrai.

Posologie. — 1/2 à 2 ampoules par jour, 1 à 2 suppositoires, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour à doses régulièrement ascendantes puis descendantes.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e)

Dépôt général et Vente:

Usine des Pharmaciens de France

120, rue de Turenne — PARIS (III^e).

SCILLITRINE

Composition. — Association de Trinitrine, Scille et Gardénal. Dragées à noyau mou contenant II gouttes de la solution alcoolique de Trinitrine à 1/100. 2 cgr d'Extrait de Scille stabilisé. 1 cgr. de Poudre de Scille stabilisée et 1 cgr. de Gardénal.

Propriétés. — Hypotenseur par la Trinitrine et le Gardénal. Diurétique et toni-cardiaque par la Scille.

Indications. — Traitement d'entretien des hypertendus. Traitement des accidents aigus de l'hypertension et des crises d'angor.

Présentation. — Boîte contenant 45 dragées.

Posologie. — Traitement d'entretien : 3 dragées par jour aux repas, pendant 15 jours *chaque mois*. Traitements des états aigus : *croquer* 3 à 4 dragées en 10 minutes.

Laboratoire PERRIER

17 bis, boulevard Rochechouart — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 03-01.

SCLÉROSÉROL

Hypotenseur, Diurétique
Spécifique de l'Artériosclérose.

Composition. — Acide thyminique, Théobromine, Lactose, Extrait de Gui, Silicate de Soude.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes, Rétention chlorurée, Athérome, Scléroses organiques et Préscléroses.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose :

3 à 6 par jour. Avaler les comprimés avec une gorgée de liquide et sans les écraser.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale**
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE

SCLÉROSÉRUM

Traitement des Varices, des Hémorroïdes, des Rhinites congestives et hypertrophiques, des Epistaxis et Laryngites tuberculeuses par les injections sclérosantes.

Formule. — Nouvelle formule à base de sels doubles de Quinine et d'Urée, en milieu hypersclérosant. (Employée dans les Hôpitaux.)

Indications, technique et posologie. — Demander à notre Laboratoire l'opuscule traitant ces questions et contenant quelques-unes des observations prises dans les hôpitaux de Paris.

Avantages sur les autres solutions. — 1° Le plus actif des sels employés; 2° absolument indolore pendant et après l'injection (jamais de crampe); 3° le moins réactionnel pour les tissus périvasculaires; 4° nullement escarrotique à des doses permettant des scléroses étendues et complètes; 5° sa présentation permet d'obtenir automatiquement tous les taux de solution désirables.

Produits du Laboratoire de Dermatologie de Paris.

HOURQUET et VIENNE, Pharmaciens-concessionnaires.

114, rue du Temple; 18, Avenue Daumesnil — PARIS

Téléph. : Dorian 52-12

SCUROCAÏNE

Chlorhydrate du para-aminobenzoyl-diéthylaminoéthanol.

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

Solutions : en ampoules stérilisées à divers titres, additionnées ou non d'Adrénaline (Renaleptine), pour usages anesthésiques.

Anesthésie par infiltration. Anesthésie dentaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e)

SCUROFORME

Para-aminobenzoate de Butyle normal.
Anesthésique insoluble, non irritant, non toxique.

Indications :

Plaies, Brûlures de la peau, Ulcérations des muqueuses, Dysphagie, Pharyngites, Ulcères gastriques, — Usages stomatologiques.

Présentations, mode d'emploi :

- 1° Poudre en nature : applications locales.
- 2° Poudre lactosée à 1/10^e : Insufflations laryngées.
- 3° Pastilles chocolatées à 2 milligrammes : Stomatites, Pharyngites.
- 4° Solution huileuse ou glycéro-alcoolique : Badigeonnages.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

SÉCACORNINE " ROCHE "

Tous les principes actifs de l'ergot de seigle sous une forme soluble et injectable.

Toutes les propriétés de l'ergot de seigle sans ses inconvénients.

Indications. — Hémorragies internes, utérines et autres
Myocardites infectieuses, Congestion pulmonaire,
Diarrhées, Leucorrhée, Spermatorrhée, Atonie utérine, Polypes du rectum.

Posologie et mode d'emploi. — Ampoules, solution, comprimés.

1 cc. ou 1 ampoule ou XL gouttes ou 4 comprimés agissent comme 4 gr. de seigle ergoté.

Doses d'urgence : 2 cc. ou LXXX gouttes ou 2 ampoules.

Doses moyennes : 1/2 à 1 ampoule, XX ou XL gouttes ou 1 à 2 cc. par jour.

Thérapeutique locale : 2 cc. ou 2 ampoules par jour en injections intra-utérines ou sous-muqueuses.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

SEDARSAN

(Sédatif du système nerveux.)

En solution à prendre par gouttes.

Composition. — Extraits fluides à parties égales : *Crataegus oxyacantha*, *Ballota foetida*, *Passiflora incarnata*, les plantes ayant été stabilisées avant l'extraction.

Indications. — Palpitations, névroses cardiaques, hyperexcitabilité cardiaque, spasmes, dyspepsies nerveuses, troubles de la ménopause, insomnies, troubles nerveux et psychonerveux, affections spasmodiques et psychopathiques.

Posologie. — XV à XXX gouttes trois fois par jour ou plus sur indications strictes du médecin. A prendre avant le repas ou au coucher dans un peu d'eau.

N. B. — Le Sédarsan ne contient aucune substance toxique ou soporifique ; c'est un extrait physiologique végétal. Son action n'est pas immédiate mais curative.

Laboratoires « OPTIMA » S. A.

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

SEDATINE CHRISTIAENS

Remplace la Morphine.

Formule. — Di-iodo-Salicylate de sodium, 2 gr. 10 ; Solution q. s. pour 100 cc.
En ampoules stérilisées de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Remplace la *Morphine* dans : Douleurs arthritiques, Sciatique, Lumbago, Névralgies cérébrale et intercostale, Vomissements incoercibles, Crises hépatiques.

Toxicité : Nulle. — Peut être laissée dans toutes les mains.

Forme. — Boîtes de 6 et boîtes de 12 ampoules de 2 cc.

A. CHRISTIAENS

2, rue du Champ-de-Mars — REIMS.

SÉDATOSE

Tartrate borico-potassique
du Docteur André Gigon

Composition. — Tartrate borico-potassique chimiquement pur.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Epilepsie.

Mode d'emploi et dose. — Cuillère-mesure dosant 50 centigr. : 6 à 10 par jour ; traitement prolongé suivant avis du médecin.

Flacon de 40 gr.

Laboratoires des Produits du D^r GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

SÉDATULINE

Aérophagie-Palpitations.

Composition. — A base de passiflore, balote, cratægus, valériane (plantes stabilisées).

Indications. — Insomnies, états nerveux et spasmodiques, affections du cœur et des vaisseaux de l'estomac et de l'intestin.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin et le soir et la nuit si besoin avec un peu d'eau pure ou sucrée.

Se fait également en pilules.

2 pilules le matin et le soir et dans la nuit si besoin.

Prix : 15 francs.

P. BOUSQUET et E. LEROUX

Anciens internes des Hôpitaux

46, rue de la Barrière — ELBEUF.

SÉDOBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré.

Tablettes et liquide. — 1 tablette ou
1 mesure = 1 gr. Na Br.

Modes d'emploi et doses. — Adultes :
1 à 5 tablettes ou mesures par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes ou mesures par
jour, selon l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on verse
une ou deux mesures de *Sédobrol « Roche »*
liquide où on fait dissoudre une ou deux
tablettes : on prépare ainsi instantané-
ment un bouillon particulièrement savou-
reux que l'on peut prendre à n'importe
quel moment de la journée.

Propriétés Thérapeutiques. — Médica-
ment sédatif, hypnotique et calmant
donnant des résultats certains et permet-
tant d'imposer un *traitement bromuré*
intensif *dissimulé*, tout en rendant agréa-
ble le régime déchloruré.

Indications Thérapeutiques. — Insom-
nies, névralgies, excitabilité, irritabilité,
gastralgies, dyspepsies, palpitations, car-
diopathies, migraines, spasmes, convul-
sions, chorée, névroses, épilepsie, etc

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

SEDOGASTRINE

Sédatif gastrique.

Formes. — Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

Composition. — 1° *Substances neutralisantes :*

Hydroxyde de magnésium. Carbonate de calcium léger, précipité à froid.

2° *Substances modératrices de la sécrétion :*
Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique :*
Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

Propriétés thérapeutiques :

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.

Réparation de la muqueuse de l'estomac.

Pas de constipation.

Pas d'accoutumance.

Indications. — Hypersécrétion.

Hyperacidité.

Dyspepsies douloureuses.

Spasmes.

Ulcères.

Posologie. — Après les repas et au moment des douleurs, prendre :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café.

Comprimés : quatre à six jusqu'à sédation.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie
Ex-interne en Pharmacie — Lauréat des
Hôpitaux. — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris
et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 28-96.

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine.

Mode d'emploi et dose. — 1° Ampoules : 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures ;

2° Suppositoires : 1 à 2 « supposédol » par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Beaucoup plus actif que la morphine à dose égale.

Indications. — Phénomènes douloureux, Insomnies douloureuses, Cancers, Spasmes, Crises tabétiques, Maladie de Parkinson, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, etc.

Prix de vente au public :

La boîte de 12 ampoules : 25 fr.

La boîte de 6 ampoules : 18 fr.

La boîte de 6 supposédol : 25 fr.

Prix médical :

La boîte de 12 ampoules : 16 fr. 90.

La boîte de 6 ampoules : 12 fr. 15.

La boîte de 6 supposédol : 16 fr. 90.

Le Supposédol ne fait pas partie du tableau B.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VI^e).

SEDONEUROL DEHAUSSY

« Calme sans déprimer ».

Composition.

Phényl-éthyl-malonylurée, Tartrate borico-potassique, Atropine et correctifs variant suivant les comprimés.

Comprimés jaunes : Caféine 0,015.

Comprimés roses : Strychnine, 0,0002.

Médication synergique permettant un effet thérapeutique équivalent avec une dose moindre de phényl-éthyl-malonylurée. Evite l'action dépressive de ce produit grâce aux correctifs.

Pour éviter l'accoutumance à ces derniers, administrer 8 jours les comprimés jaunes ; 8 jours les comprimés roses.

Formule, posologie et indications établies d'après les travaux de Pierre Marie, Crouzon, Bouttier, Carrière, Pagniez, Sezary, etc...

Indications.

États spasmodiques. — Traitement de choix de l'*Epilepsie* dans toutes ses formes. — *Maladie de Parkinson* et *Parkinsonisme*. — *Asthme rebelle*.

Etats d'instabilité nerveuse. — *Insomnies rebelles*, *Anxiété*, *Instabilité des basedowiens* et des *hypertendus*, *Prurit sénil*.

Algles paroxystiques. — *Migraine, Angine de poitrine.*

Enfants et nourrissons. — Toutes les manifestations spasmodiques de l'épilepsie, du croup, des *laryngites striduleuses et aiguës, toux persistante des broncho-pneumonies, coqueluche, tétanie, états convulsifs, chorees, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson*, etc.

Posologie.

Epilepsie. — Doses progressivement croissantes jusqu'à suppression des crises. Commencer par quatre comprimés chez l'adulte, deux comprimés à cinq ans.

Autres indications.

Adultes, dose moyenne entre 4 et 8 comprimés. — *Enfants*, 1/2 comprimé par année d'âge. — *Nourrissons* (tolérance parfaite), 1/2 comprimé jusqu'à six mois, un comprimé de six à douze mois en deux prises.

(Un comprimé = 2 centigrammes et demi de phényl-éthyl malonylurée.

Laboratoire DEHAUSSY

66, rue Nationale

LILLE.

SEDORHINOL

Médication décongestive et antiseptique des voies respiratoires supérieures.

Pommade nasale, Inhalation, Bains de gorge.

Indications. — Coryzas, rhinites, sinusites, adénoïdites, angines et amygdalites, laryngites, rhino-bronchites, otites.

Trois formes. — A) *Sedorhinol mixte*, comprend dans une même boîte :

1° Un tube de pommade nasale (canule) baume semi-liquide ; adrénaline huileuse, stovaine benzoate de soude, essences aromatiques.

2° Comprimés inhalants : association d'essences de plusieurs espèces aromatiques (thym, romarin, lavande, menthe), bicarbonate et perborate de soude.

Ces comprimés solubles entièrement et progressivement en 4/5 minutes dans de l'eau à 75° permettent une inhalation et un bain de gorge, à la demande.

B) *Pommade de Sedorhinol* : seul baume nasal pour antiseptie et décongestion des fosses nasales, pré et post-opératoire.

C) *Comprimés de Sedorhinol* : Séparément employés pour inhalations, bains de gorge et de bouche (toutes affections de la muqueuse bucco-pharyngée).

Laboratoires A. REGAGNON et Cie
276, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 26-30.

SÉDORMID « ROCHE »

Allylisopropylacétylcarbamide.

(Chaque comprimé est dosé à 0,25 gr.)

Propriétés :

Sédatif hypnogène doux et inoffensif,
très maniable ; ne s'accumule pas.

Indications :

Toutes les Insomnies légères de quelque nature qu'elles soient ; Anxiété, Mélancolie, Symptômes hypernerveux, etc.

Doses et mode d'emploi :

Dose sédatif : 2 à 3 comprimés dans la journée.

Dose hypnogène : 1 à 2 comprimés au coucher.

Boîte de 20 comprimés.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21, place des Vosges

PARIS (III^e).

SÉDOSINE

Solution

**Sédatif à action élective
sur le système neuro-végétatif.**

Association synergique hyperactive :

Dans la *Sédosine*, l'action antispasmodique bien connue de la Jusquiame se trouve considérablement renforcée par la présence de la Passiflore et du Cratægus, l'association de ces principes végétaux permettant d'obtenir un effet notable avec une dose réduite de Jusquiame (H. Leclerc).

Le mode d'association médicamenteux n'a, comme on sait, nulle part ailleurs, autant d'importance que lorsqu'il s'agit du Sympathique (Expériences de Danielopolu, de Garrelon, Santenoise et Tincl).

La *Sédosine*, à l'encontre des hypnotiques, agit par un véritable processus de détente et sans recourir à l'intoxication de la cellule nerveuse.

Indications :

Etats spasmodiques. Excitation nerveuse. Insomnie. Neurasthénie. Psychasthénie. Mélancolie.

Posologie :

Contre l'insomnie : 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

Sédatif nerveux : Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La *Sédosine* se prend en nature ou mieux dans un peu de tisane.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

SÉDOTENSYL

Composition. — Phényléthylmalonylurée, belladone cratægus, gui, peptone iodée, acide phosphorique + extrait orchitique (formule M) ou ovarien (formule F).

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, hypotenseur, neurotonique.

Indications. — Hypertension artérielle sous toutes ses formes, troubles de la ménopause (chez l'homme comme chez la femme).

Posologie. — 1 cuillerée à soupe, 20 minutes avant les repas de midi et du soir.

Laboratoires Médico-Pharmaceutiques de France

6 et 8, rue Lacretelle — PARIS (XV^e).

SELAMON

Composition et présentation. — Chlorure d'ammonium pur en comprimés à 50 centigrammes.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour au milieu des repas.

S'emploie avec succès dans tous les cas où il y a intérêt à modifier l'équilibre acide-base dans le sens de l'acidité

Prix : 15 francs.

Etablissements T. LECLERO

Dr P. Lemeland, pharmacien.

10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

SEL DE HUNT

Alcalin type.

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

Forme. — Granulé friable.

Posologie. — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 9 fr. 50 le flacon.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

Téléphone : Auteuil 20-21.

SEL D'EWALD

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Médication alcaline, sédative des douleurs d'estomac.

Le Sel d'Ewald se présente sous la forme d'un granulé assimilable, de saveur agréable, constitué par un mélange de : Citrate de soude, Kaolin, Carbonate de Bismuth, Carbonates de Chaux et Magnésie.

Le Sel d'Ewald trouve son application dans le traitement des : Gastralgies, Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Ulcères de l'Estomac, Spasmes, Pyrosis, Vomissements de la grossesse.

Mode d'emploi — Une cuillerée à café de granulé délayé dans un quart de verre d'eau ou de lait après les repas ou bien au moment des crises.

Le Sel d'Ewald ne contenant aucun toxique est absolument inoffensif et il ne constipe pas.

BRACQUEMOND et Cie, Docteurs en Pharmacie
105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

SEL DIGESTIF BÉ MÊ CÉ

Forme. — Poudre.

Composition. — Bicarbonate de soude, Magnésie, Carbonate de chaux léger, Lactose.

Indications. — Hyperacidose gastrique aiguë, Vomissements incoercibles.

Doses. — Une cuiller à café après chaque repas.

Prix : 7 fr. 50.

Laboratoires Gastro-Entérologiques
ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

Tél. : Ségur 69-13.

SELENIOL

(Procédé A. Lancien)

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc. (4 par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sélénol est une solution limpide de couleur brune ; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

Indications. — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections cancéreuses, soit seul, soit associé à la Cytuline Couturieux.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS.

SEL HÉPATIQUE U. N. ARQUEVAUX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 439-2, en vue de la possibilité de prescription aux assurés sociaux.

Composition. — Complexe alcalin hypersolvant de l'acide urique.

Composition Centésimale :

Carbonate de Lithine	0 5286
Sulfate de Potasse.	2.6431
Chlorure de Sodium	2.0264
Sulfate de Sodium.....	24.2290
Citrate de Sodium	11.0132
Bicarbonate de Sodium	48.5462
Sel de Seignette	11.0132

Forme. — Poudre blanche entièrement soluble.

Propriétés thérapeutiques. — Insuffisance hépatique. Lixiviation de l'organisme par osmose isotonique ; action désincrustante décuplée analogue à celle des stations thermales de Carlsbad, Contrexéville, Bagnoles. Dissolvant de l'acide urique, éliminateur de toxines. Laxatif. Stimulant des fonctions de l'estomac, du pancréas, du foie, des reins et de l'intestin. Régulateur du métabolisme physiologique.

Indications. — Arthritisme, Traitement des troubles dus à l'acide urique (Rhumatisme, Goutte, Gravelle, Névralgies, Lumbago, Sciatique, etc.), de l'Artério-sclérose, des Phlébites et troubles trophiques, de la Constipation. Anti-acide. Anti-rhumatismal. Lithiases hépatique et rénale.

Posologie. — Une cuillerée à café rase (5 grammes) dans 200 grammes d'eau, de préférence très chaude à prendre le matin à jeun 25 jours de suite.

Le flacon : 15 fr. (pour 25 jours de traitement).
Sans impôt.

Laboratoires L. ARQUEVAUX 
Pharmacien à ETAMPES (S.-et-O.).

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

Le Perdriel.

Nature. — Sels de Lithine.

Action. — Les sels de Lithine, en opérant sur le foie, tarissent à la source même la production de l'acide urique en modifiant la nutrition troublée.

Indications. — *Carbonate*, rhumatisme, goutte, *Benzoate*, coliques néphrétiques, gravelle, coliques hépatiques, albuminurie, diabète. *Salicylate*, rhumatisme articulaire, rhumatisme chronique. *Glycérophosphate*, diathèse arthritique goutteuse, accompagnée de neurasthénie, possède en même temps les propriétés reconstituantes de l'acide glycérophosphorique. *Bromhydrate*, sédatif par le brome. Par la lithine dissout l'acide urique et les urates alcalins. *Citrate*, diathèse rhumatismale.

Posologie et mode d'emploi. — Chaque flacon de sels de Lithine est surmonté d'un bouchon-mesure qui contient 20 centigrammes de principe actif. Faire prendre dans de l'eau sucrée ou non, ou dans de la bière ou du lait.

Laboratoires LE PERDRIEL
11, rue Milton — PARIS (IX^e)

SELS DU JURA

Produits thérapeutiques naturels pour le traitement à domicile :

EAUX MÈRES CRISTALLISÉES DU JURA

« Gynécomer ».

Forme : Cristaux.

Propriétés thérapeutiques. — Résorption des exsudats et engorgements, décongestion et mobilisation des organes, correction des déplacements viciés, élimination des produits pathologiques.

Indications. — Traitement des Métrites et Salpingites subaiguës et chroniques, Fibromes, Déviations utérines, Cellulites pelviennes, Troubles menstruels, suites de Couches.

Doses. — 1 à 4 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie, chauffée à 38-40° C, à prendre en irrigation vaginale, à faible pression, dans la position allongée à observer encore 1 heure après.

Prix : 15 francs la boîte.

SELS POUR BAINS « Jurbainsel ».

Forme : Cristaux.

Propriétés thérapeutiques. — Augmentation des échanges moléculaires, activation de la vie cellulaire, action modificatrice sur le milieu sanguin et lymphatique.

Indications. — Anémie, Débilité, Rachitisme, Lymphatisme, chez les enfants.

Asthénie, chez les adultes.

Doses. — 15 à 20 grammes par litre d'eau chauffée à 36° C au maximum, pour un bain de 10 à 20 minutes.

Prix : 12 francs le paquet.

Compresses.

Pour les compresses, reconstituer les eaux mères liquides en faisant dissoudre les sels « Gynécomer » dans 3 fois leur volume d'eau tiède.

Dépôt : 11, avenue de l'Opéra, Paris.

Sels du Jura

11, avenue de l'Opéra — PARIS.

Tél. : Gut. 34-43, Cent. 01-25.

SELUNIC

Sel de fruits, Sel de santé.

Composition. — Sels de soude, formant, à l'addition d'eau, un citro-tartrate de soude. Une cuillerée à café dans un verre d'eau représente environ 5 grammes de tartrate de soude.

Forme. — Poudre blanche granulée très fine, sans aucun goût ni parfum et ne contenant aucun sel minéral.

Propriétés. — Régulateur simple et efficace de la Santé, son effet repose sur les propriétés bienfaisantes des fruits frais.

Indications et mode d'emploi. — **Maladies du foie et des intestins.** Une cuillerée à café dans un verre d'eau à jeun.

N. B. — Plus l'eau sera chaude, plus l'action sera rapide.

Estomac, impuretés du sang, maux de tête. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau une demi heure après les repas.

État bilieux, indigestion, excès de table. — Une cuillerée à dessert dans un verre d'eau en se couchant, renouvelée le matin au réveil.

Désaltérant et rafraîchissant. — Contre la soif, état fiévreux, etc... Presser une tranche de citron dans un verre d'eau et y faire couler une cuillerée à café. Boire par gorgées.

Des doses proportionnées en feront pour les enfants un moyen agréable de remédier à leurs petits maux.

Obésité. — Une cuillerée à café dans de l'eau tiède, matin et soir, combat l'embonpoint et aide à conserver au corps sa souplesse naturelle.

Comme breuvage. — Dans l'eau : en fait une boisson hygiénique et désaltérante.

Dans le vin et le cidre : une pincée combat l'excès d'acidité, et produit une boisson de table pétillante.

Présentation. — En flacons de 200 grammes : 20 fr
Le modèle « Week-End » de 60 grammes est réservé à l'usage personnel des praticiens, auxquels il est offert gracieusement.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le N° 333-1.

Préparé par : **Georges MIQUEL**

Pharmacien de 1^{re} classe, 3, avenue Lowendal — PARIS.

SÉPHYDINE

Composition. — La Séphydine est une solution, dans le sérum physiologique, de chlorure de zinc réagissant en milieu acide sur la formaldéhyde. Médicament non irritant jouissant de propriétés particulières vis-à-vis de la peau et des muqueuses.

Propriétés thérapeutiques. — Action antiseptique et stérilisante sur la peau et les muqueuses, action microbicide puissante sans aucune irritation. Action conservatrice de l'intégrité de la cellule épidermique par saturation des liquides humoraux et par excitation des phénomènes biologiques de défense contre l'infection. En raison de ses propriétés excitantes sur la phagocytose, la Séphydine constitue un excellent réparateur des lésions cutanées et des muqueuses, action désodorisante très grande.

Indications :

Dermatologie : Folliculites, furoncles, anthrax, panaris, acnés, érysipèles, ulcères variqueux et cancéreux, alopecie, pelade, sueurs fétides.

Obstétrique : Infections puerpérales.

Gynécologie : Vulvites, vaginites, métrites, cancer utérin.

Vénérologie : Blennorragie, chancre mou, balanite.

Stomatologie : Gingivite chronique, granulations de la bouche, angines, fétidité de l'haleine.

Oto-Rhino-Laryngologie : Otite, coryza (guérison très rapide de cette affection), laryngite.

Posologie :

Dilution pour injections, lavages locaux : 1 cuillerée à café par litre d'eau.

Dilution pour gargarismes, lavage de nez et des oreilles : 2 cuillerées à café par litre.

Dilution pour lavage de l'urètre : 3 cuillerées à café par litre.

Dilution pour pansements (chancre mou) : 4 cuillerées à café par litre.

Dilution pour ulcères variqueux, anthrax, panaris, désodorisation des pieds et des aisselles : 5 cuillerées à café par litre.

Dilution pour frictions du cuir chevelu : 1 cuillerée à café de Séphydine pour 5 d'eau.

Dilution par attouchements pour piqûres d'insectes, (moustiques, guêpes, etc.) : 1 cuillerée à café de Séphydine pour 3 d'eau.

Laboratoire Séphyda.

PUAUX, pharmacien de 1^{re} classe

CHABEUIL (Drôme).

SEPTICÉMINE CORTIAL

Composition. — Di-formine iodobenzo-méthylée, cristallisée, dialysable, injectable, atoxique, *indolore*. Aucune réaction locale ou générale.

Propriétés. — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien (Maloëns). Chute de la température, régulière, complète, définitive. Microbicide et antitoxinique ; éliminateur hépatique et rénal.

Indications. — Infections aiguës médicales : Grippe, encéphalite, broncho-pneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhino-pharyngées.

Infections Chirurgicales : Septicémies, pyohémies, infections puerpérales. Pyélonéphrites, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonite tuberculeuse.

Forme. — Ampoules de 4 cc. et 10 cc.

Dose. — Septicémies à marche rapide : 10, 20 cc. dans les 24 h. Septicémies à marche lente : 4 à 10 cc. dans les 24 h.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations. Pure ou étendue de sérum. Urologie, Gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes, Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Stomatologie : pulvérisations alvéolaires et gingivales, injections intra-gingivales, circonscrivant le foyer infectieux.

Laboratoires CORTIAL

15, boulevard Pasteur — PARIS.

SEPTOMETROL VELY

Composition. — Peroxyde de magnésium, Borate de sodium, Benzoate de sodium, Bicarbonate de sodium, Sulphophénate de zinc, Thymol.

Forme. — Poudre blanche, soluble dans l'eau.

Indications. — Antisepsie des muqueuses : Métrites, Leucorrhée, Salpingites, Angines, Stomatites, Gingivites, Abscess dentaires, Plaies, Ulcérations, Brûlures.

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuillerées à café par litre d'eau bouillie.

Laboratoires des Produits VELY
132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

SERIFER LAURENCON

Traitement des déficiences sanguines par le fer vitalisé rendu assimilable après absorption par des Levures vivantes.

Composition. — Ions fer et manganèse, Sérum de cheval, Hormones antianémiques de foie frais, Arsenic organique.

Indications. — Toutes déficiences sanguines, Anémies diverses, Chlorose, Lymphatisme, Etats hémorragiques, Suite d'Opérations, Paludisme.

Forme. — Délicieux granulé chocolaté.

Posologie :

Adultes : 2 ou 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Enfants : Demi-doses.

Laboratoire d'Actino-Biologie
J. LAURENCON, Pharmacien
Professeur de Chimie et Pharmacologie
16, rue de la République
VILLEFRANCHE (Rhône).

SÉRO-COMPRIMÉS MÉRIEUX

Composition :

A base de sérums polyvalents antidiph-térique, streptococcique, staphylococcique, de l'Institut biologique Mérieux, Lyon.

Indications :

Préventivement : dans tous les cas de contagion ou d'irritation de la gorge.

Curativement : dans le traitement local des diverses angines.

Mode d'emploi :

Prendre toutes les heures et le soir au coucher, 1 à 2 comprimés qu'on laissera fondre lentement dans la bouche en évitant l'absorption trop voisine de liquides ou aliments.

Prix du flacon de 40 compr. : 14 francs.

S. SAVIGNEUX

Dépositaire général.

63, rue Victor-Hugo — LYON.

SERODAUSSSE ANTITOXISENYL

(Sérum activé de taureau.)

Ce sérum contient les hormones circulantes des jeunes animaux mâles et les anticorps des poisons séniles.

Le médicament est indiqué contre l'asthénie des personnes âgées ; il améliore leur capacité de travail physique et intellectuel et produit une orientation de leur caractère vers l'optimisme.

Il s'administre tous les mois, pendant six jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule dans un demi-verre d'eau, sucrée ou non, 30 minutes avant le petit déjeuner. Chez certains sujets, une dose de 3 ampoules prises à jour passé est suffisante.

SERODAUSSSE OVARIEN

(Sérum activé de Génisse.)

Ce sérum contient, comme le précédent, les hormones circulantes des jeunes animaux femelles et les anticorps des poisons de Carrel.

Il est indiqué contre l'asthénie des femmes âgées et contre les troubles de la ménopause physiologique, chirurgicale ou radiologique. Chez les femmes en état de déficit ovarien, il fait disparaître les bouffées de chaleur, les vertiges et les sueurs.

Même posologie, même mode d'emploi que le Séro-dausse Antitoxisenyl.

SERODAUSSSE INFANTILE

(Sérum de jeune bovidé en croissance.)

Ce sérum contient les facteurs internes de la croissance. Il produit une augmentation de la taille et du poids chez les enfants dont le développement est retardé.

Il s'administre tous les mois, pendant 5 à 10 jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule le matin à jeun, 30 minutes avant la première prise d'aliments, dans un quart de verre d'eau sucrée.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

SÉROLÉINE GRANULÉE BARON

Forme. — Granulé parfaitement toléré par les estomacs les plus délicats.

Composition. — Sels de Gaïacol et sels de chaux assimilables.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques ; désinfecte et assèche rapidement les lésions pulmonaires. Reconstituant général.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires, tuberculose pulmonaire, osseuse et ganglionnaire.

Posologie. — Trois cuillerées à café par jour dans un peu de lait entre les repas. Demi-dose pour les enfants en dessous de 14 ans.

Prix : 18 francs le flacon.

Littérature et échantillons :

Laboratoires BARON

LES SABLES-D'OLONNE (Vendée).

SÉROMA REY

Sérum granulé, activé, total.

Composition :

100 gr. de Séroma contiennent :

Sérum normal d'équidés.....	90 gr. 90
Calcium	0 gr. 05
Fer	0 gr. 30
Manganèse	0 gr. 15

Préparation. — Sérum total de sang d'équidés, scientifiquement traité, stérilisé sans coagulation, rendu atoxique, stabilisé par dessiccation et activé par des co-ferriments minéraux.

Indications. — Surmenage, Fatigue cérébrale, Chocs moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies. Dans les Affections chroniques, quelle que soit leur nature (tuberculose, cancer, paludisme, etc.), adjoint à la thérapeutique appropriée, il permet à l'organisme de résister, ainsi que dans toutes les maladies infectieuses.

Doses moyennes :

Adultes : 1 cuillerée à café de granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

Enfants : demi-doses.

Prix : 16 fr. 80 le flacon
(pour une dizaine de jours de traitement).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 302-3.

Laboratoires REY

(Ludin) — DIJON.

*Séroma contient près de son poids
de sérum activé.*

SÉRO-SÉRUM RIVIER

Tonique. — Hémopoiétique. — Hémostatique
Rigoureusement désalbuminé.

Chaque préparation passe par un double service de contrôle.

Injectable, sans risque d'anaphylaxie.
Contient la totalité des éléments sériques (lipoides, hormones, etc.), sauf les albumines.

Injection indolore.

Ampoules de 2 cc. représentant 5 cc. de sérum frais de cheval.

1 à 4 ampoules par jour, suivant la gravité des cas et l'urgence.

Laboratoires RIVIER

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS.

SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE de HECKEL

Composition. — Le Sérum de Heckel a pour base un extrait organique pur des glandes surrénales stabilisé dans un liquide isotonique.

Mode d'emploi. — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

Action. — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel, en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumogastrique et le spasme cesse.

Indications. — Toutes les formes d'asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, chez les cardiaques, les hypertendus et chez les sujets présentant un foyer de gangrène pulmonaire.

Présentation. — Sérum de Heckel pour adultes. 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 22 francs.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 16 francs.

Voir Cytophédrine page 280.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS. — Tél. : Carnot 78-11.

SÉRUM DE JOUSSET

Provient de chevaux longuement immunisés contre les toxines du bacille tuberculeux. Combat l'infection mais non les lésions. **Traitement de choix à la période initiale**, nuisible dans la tuberculose devenue phtisie. **Convient surtout aux enfants et adolescents**. Tuberculoses aiguës ou subaiguës, hémoptysies.

Si après une semaine d'observation la courbe de température apparaît régulière et peu oscillante on devra aborder la sérothérapie. Température irrégulière, oscillations dépassant 2° est une contre-indication formelle.

Posologie. — Injection hypodermique face antérieure de la cuisse. Environ 3 cc. par kg. du poids du sujet en 3 injections à 2 jours d'intervalle (voir notice explicative, page 8). Ne pas oublier fortes doses salicylate si arthralgies le douzième jour.

Contre-Indications. — Asthmatiques, emphysémateux.

Demandez notice explicative :

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}

17, rue de Berri — PARIS (VIII^e).

SÉRUM NEUROPSYCHIQUE

Ampoules.

Propriétés thérapeutiques. — Préparation tonique et reconstituante injectable. Contre tous les cas d'anémie, dépression nerveuse, surmenage physique intellectuel, neurasthénie.

Forme. — Ampoules injectables.

Mode d'emploi. — 1 ampoule par jour.

Formule. — Glycérophosphates composés, cérébrine et moelle.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

Composition :

Glycérophosphate de Soude : 0 gr. 10 ;
Cacodylate de Strychnine : 1/2 milligr. ;
pour un cc. d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant. Active la phagocytose. S'emploie dans l'adynamie et la neurasthénie.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules :
16 francs.

2° En gouttes, prix du flacon : 14 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin, 8 — PARIS.

SÉRUM NORMET

Chirurgical.

Composition. — Préparation à base de citrates métalliques (calcium, sodium, magnésium, fer et manganèse).

Présentations. — Ampoules de 20 cc. (boîte de 2).
Ampoules de 10 cc. (boîte de 4).

Indications. — Grandes hémorragies, métrorragies.

Mode d'emploi. — Par injections intraveineuses en solution à raison de 20 cc. de Sérum Normet dilués dans 1 litre de sérum physiologique (chlorure de sodium à 7 p. 1 000).

Prix : 20 francs la boîte.

SÉRUM NORMET

Médical.

Composition. — Préparation à base de citrates métalliques (les mêmes que ci-dessus, mais avec une très faible proportion de manganèse).

Présentations. — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6).
Ampoules de 5 cc. (boîte de 12).

Indications. — Anémies graves, hypotension, myocardites, hémophilie, états infectieux.

Mode d'emploi. — En injections hypodermiques, 1 à 15 cc. En goutte à goutte rectal après dilution dans du Sérum physiologique, à raison de 20 cc. par litre de sérum. En injections intraveineuses (non dilué) à raison de 1/2 à 5 cc. et plus, en surveillant la réaction du sujet.

Prix : 25 francs la boîte.

Établissements **T. LECLERC**

D^r P. LEMELAND, pharmacien,
10, rue Vignon — PARIS.

SÉRUM OLIVIERO

Sérum normal de cheval, créé en 1906

Le *Sérum normal de cheval* possède de nombreuses propriétés qui en font un agent thérapeutique de tout premier ordre. Son action est des plus manifeste dans les *Anémies*, les *Asthénies*, les *Consumptions*, les *Hémorragies*.

Son action est héroïque et nettement spécifique dans le pansement des plaies à cicatrisation rebelle, dans les *brûlures*. Il se délivre sous les formes les plus variées, pour les besoins de la médecine et de la chirurgie.

1° En Ampoules buvables. — De 10 cc., une par jour ; de 2 cc., 2 à 4 par jour.

Ces ampoules contiennent du sérum pur, sans addition d'antiseptique ou de conservateur quelconque.

2° En Capsules de Sérum Olivier. — Sérum de cheval, pur, desséché à froid. Titré à 0,25 de sérum sec par capsule glutinisée.

4 capsules de Sérum correspondent à 10 cc. de sérum liquide.

Se prescrivent dans toutes les Hémorragies, pour augmenter la coagulabilité du sang.

Six capsules par jour et plus si besoin est.

3° Comprimés de Sérum Olivier. — Préparation mondialement connue pour le traitement des *Anémies*, des *Asthénies*, de la *Convalescence*. Résulte de l'association du sérum desséché à la poudre de foie et au fer. Trois fois par jour, 2 comprimés aux repas.

4° Granulé de Sérum Olivier. — Mêmes principes, mêmes indications que les Comprimés de Sérum. Spécialement étudié pour la médecine infantile. Produit très agréable.

1 à 2 cuillerées à café, 2 fois par jour, aux repas.

5° Pastilles de Séro-Ciman. — Spécialement étudiées pour le traitement des affections de la gorge : Angines, Inflammation, Trachéites, Grippe, Suites d'Angines diphtériques.

Principes actifs : Sérum desséché et *Cinnamate de soude*. 5 à 10 par jour (à sucer).

6° Sérum sec Olivier. — Sérum desséché, pur, en tubes. Excellent cicatrisant employé pour le pansement des plaies atones. Pansements secs.

Laboratoire de Biothérapie OLIVIERO
41, rue Denfert-Rochereau — PARIS (V°).

SÉRUM-VÉGÉTAL

du Docteur CUGUILLÈRE (antituberculeux;

Composition :

Essences d'ail finement distillées et indolores, sels de chaux d'origine végétale, diastases vivantes soufrées.

Références scientifiques :

Expérimentation sur des bovidés sous le haut patronage de M. le marquis de Castellane et sous le contrôle de l'éminent vétérinaire M. Faure, guérisons reconnues par le célèbre anatomopathologiste, le docteur H. Martin-Roux (hôpital Bichat, à Paris).

Académie de médecine (séance du 10 mars 1908). Travail scientifique : *Guérison de la tuberculose par l'ail*. En vente : Librairie Norbert Maloine, 27, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris.

Indications. — Le sérum est indiqué dans toutes les formes de tuberculose, néanmoins il doit être employé avec la plus grande prudence dans les tuberculoses pulmonaires, et son emploi doit être arrêté en périodes hémoptoïques.

Il donne des résultats tout à fait satisfaisants dans les tuberculoses pulmonaires, mais c'est toujours particulièrement dans les tuberculoses osseuses même prises très tard avec mauvais état général et fistulisations qu'il donne des guérisons aussi merveilleuses qu'inattendues.

Dans le courant de l'année 1930, 320 médecins français et de nombreux médecins étrangers sont venus nous dire leur profonde reconnaissance pour les guérisons qu'ils avaient obtenues par l'emploi du sérum.

Posologie :

Le sérum existe sous 3 formes : Ampoules à 5 cc. (adultes). Ampoules à 2 cc. 1/2 (enfants), et sirop où le sérum est mélangé à du sirop iodotannique et à de l'arrhénal.

Le sérum végétal du Docteur Cuguillère ne possède aucune toxicité et est employé depuis 21 années avec le plus grand succès par les plus éminents praticiens.

Dans les formes chroniques : *Enfants* : une injection de 2 cc. 1/2 par semaine, et une cuillerée à café de sirop par jour. *Adultes* : une injection de 5 cc. par semaine et une cuillerée à soupe de sirop par jour.

Dans les formes aiguës : *enfants* : 2 injections de 2 cc. 1/2 par semaine et 2 cuillères à café de sirop par jour. *Adultes* : 2 injections de 5 cc. par semaine et 2 cuillerées à soupe par jour.

Arrêter le traitement par le sérum en période d'accidents congestifs.

Échantillons et ouvrage *Guérison de la tuberculose par l'ail* (200 pages, édité par la librairie Norbert Maloine) tenu gracieusement à la disposition de Messieurs les Docteurs qui ne connaissent pas encore le sérum.

Laboratoires CUGUILLÈRE

19, rue des Chalets — TOULOUSE (France).

SILGUINE

Composition. — Chaque comprimé contient :

0,05 Extrait sec stabilisé de gui de pommier.

0,01 Extrait sec d'aubépine.

0,10 Poudre de prêle.

0,03 Extrait de glandes endocrines mâles.

Action. — La « SILGUINE », à base de produits végétaux particulièrement assimilables, abaisse la tension artérielle, augmente la diurèse, tonifie le cœur. Elle comble le déficit des sécrétions endocrines particulièrement important au moment de la ménopause. Elle sature l'organisme de silice et empêche l'apparition de lésions athéromateuses et de l'artériosclérose.

Indications. — Tous les symptômes de l'« Automnose », hypertension artérielle, artério-sclérose, céphalées, somnolence, vertiges, bourdonnements d'oreilles, troubles oculaires, troubles de la circulation, dyspnée nocturne, dyspnée d'effort, hémorragies, hémorragies cérébrales, accidents rénaux, accidents cardiaques.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés, avant chaque repas, 20 jours par mois.

Laboratoires G. REAUBOURG

2, rue Boucicaut — PARIS (XV^e)

Bureaux : 31, rue St-Georges — PARIS (IX^e)

SILICYL

Médication de base et de régime des carences siliceuses et des *états artérioscléreux*, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la *lésion initiale* et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

Principe. — L'adrénaline ne produit plus de lésions athéromateuses chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude (Professeur Goujet, P. M. 1911). — L'injection intraveineuse, inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffler et Pélissier, Acad. Sciences, Août 1920.)

Composition. — Silicates de formule $\text{Si}^{\text{O}} \text{O}^{\text{1a}} \text{Na}^{\text{s}}$ et K^{s} stables, solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

Emploi et doses. — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

GOUTTES : Seule préparation titrée à 25 p, 100 de SiO^{2} , X à XXV gouttes aux repas, matin, midi et soir.

COMPRIMÉS : Titrés à 0,40 de sel de soude et de potasse ; 1 à 2 comprimés, au repas, 3 fois par jour.

AMPOULES : Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : préscléreux, angor.).

Résultats. — Abaissement de la tension Mm et Ma. Viscosité ramené, à la normale, Elimination chlorurée, Diurèse. Action anti-athéromateuse, Hypotension, Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

Indications. — 1° Action minéralo-tissulaire : Bacilliose, Consolidation accélérée des fractures. Surdit   (Ionisation). Etats   lastopathiques.

2° Art  rioscl  rose, Hypertension, Aortite, Ath  rome aortique, Scl  rose r  nale, Angine de poitrine, Endart  rite obl  t  rante progressive. Prophylaxie de l'ath  rome et de l'h  morrhagie c  r  brale, Troubles c  r  braux, Migraines, Vertiges, Paresse intellectuelle, Bourdonnements, etc. Otite scl  reuse, Scl  rose auriculaire Troubles oculaires Presbytie, Fatigue et Scl  rose cardiaque, An  mie siliceuse.

Gouttes : 20 fr. — Ampoules : 16 fr. — Comprim  s : 18 fr.

Echantillons — Litt  rature

D  p  t, Paris : Pharmacie P. LOISEAU

61, Bd Malesherbes. — PARIS.

Laboratoire CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle. — PARIS.

SILISODE

Forme. — Granulé.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

Silicate de soude : 0 gr. 40

Benzoate de lithine : 0 gr. 10

Dose. — Une cuillerée à café avant les repas, 15 à 20 jours chaque mois.

Action. — Hypotensive, antiscléreuse.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes. Artério-Sclérose. Aortites. Angine de poitrine.

Laboratoires MICHELS

9, rue Castex — PARIS. Tél. : Archives 45-12.

SINAHIN

Antidiabétique.

Forme. — Pilules de Semen-contrà total.

Propriétés :

Traitement sans restrictions trop sévères dans l'alimentation normale.

Formule extraite des travaux d'Avicenne
(Communication Académie de Médecine,
décembre 1913.)

Posologie :

Trois à quinze pilules par jour.

Prix de vente au public. La boîte, 12 francs.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

LE SINAPLASME

**Cataplasme sinapisé instantané
du docteur Jean Faure.**

Le premier en date. Le plus régulier.

Le moins cher. Le meilleur de tous.

Mode d'action. — Agit comme un cataplasme de farine de lin sinapisé et non comme un sinapisme.

Prix de la boîte de 3 sinaplasmes doubles :
5 francs.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} Classe

AIX-LES-BAINS

SINASEPTIC

Sinapise-Aseptise

Mélange de cinq essences balsamiques, d'essence de Moutarde noire, de Camphre, de Menthol et de Gaïacol en dilution huileuse.

Action sinapisante et vaso-dilatatrice.

Action antiseptique par absorption cutanée et élimination par les voies respiratoires.

Indications. — Angine, Laryngite, Bronchite aiguë ou chronique, Pneumonie, Broncho-pneumonie. Formes respiratoires de la Grippe, Congestion pulmonaire. Certaines formes de tuberculose.

Révulsion préventive post-anesthésique.

Emploi. — Appliquer au pinceau et recouvrir de ouate. Pour les enfants et les peaux sensibles diluer avec de l'huile ordinaire.

Laboratoire LE MAROIS

197, avenue de Versailles — PARIS (XVI^e).

SINUZYL

Indications. — Sinusites, Coryza, Rhinites, Laryngites, Ozène.

Composition. — Résorcine, camphre, essences végétales, antiseptiques, huile d'amandes douces.

Forme et Mode d'emploi. — Se vend en *huile* pour instillations nasales.

En *pommade* dans un tube spécial.

En *rhino-capsules* pour auto-injections.

Laboratoires Pierre CHATEAU

137, avenue Parmentier — PARIS (Xe).

SIROP AXARIA

Laxatif mannité.

Parfaitement toléré par les nourrissons dès le premier âge.

Essentiellement végétal, dépourvu de principes drastiques.

Ne provoque pas de coliques, ne détermine aucune accoutumance.

Indications. — Traitement de la Constipation chez les enfants, les femmes enceintes, les nourrices, les personnes âgées ou affaiblies et tous les sujets délicats.

Posologie :

De 2 à 6 mois : 1/2 cuillerée à café.

De 6 mois à 2 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

De 2 ans à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café.

Au-dessus de 5 ans : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe.

Modifier les doses suivant la sensibilité du sujet et l'effet désiré.

Le flacon : 9 fr.

Les Spécialités de l'Enfance.

Laboratoires AXAREL

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

SIROP BRAHMA

Composition. — Sulfogaïacolate de potasse, benzoate de soude, codéine, dionine, aconit, belladone, grindélia.

Action. — Antiseptique puissant, régularise les sécrétions, les diminue. Calme rapidement la toux.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, laryngites, coqueluche, tuberculose au début.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, 1 heure avant ou 2 heures après manger, pur ou mieux dans de la tisane.

Prix : 11 francs.

Laboratoires G. COULLOUX
116, rue du Pont — AUXERRE (Yonne).

SIROP CASTANOL

Sédatif spécifique de la Coqueluche et des toux quinteuses.

Composition. — Extrait de châtaigner du Limousin, de Drosera, d'Anémone.

Posologie :

Enfants : au-dessous d'un an : quatre 1/2 cuillerées à café par jour.

—	de 1 à 2 ans :	3 cuillerées à café par jour.	
—	de 2 à 4 ans :	4	— à café —
—	de 4 à 8 ans :	4	— à dessert —
—	de 8 à 12 ans :	4	— à soupe —

Adultes : 4 à 6 cuillerées à soupe, pris au milieu des repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du CASTANOL

Pierre LACHAISE, Docteur en Pharmacie
9, place Municipale — TULLE (Corrèze).

SIROP DE CRÉOSOTE VACHERON

Composition. — 0 gr, 15 de créosote par cuillerée à soupe.

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire et antiseptique puissant des bronches et du poumon.

Avantages. — De saveur agréable, nullement caustique, très bien toléré par l'estomac. Excellent sirop pectoral.

Indications. — Rhumes de toutes natures, bronchites aiguës et chroniques, toux rebelles, catarrhes, laryngites, grippe, influenza, etc...

Modes d'emploi. — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures, à prendre dans l'intervalle des repas.

Prix : 14 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SIROP DE GAÏARSOL

Composition. — Méthylarsinate de Gaïacol dont la supériorité sur les cacodylates est double : tolérance absolue et assimilation parfaite.

Action thérapeutique. — 1^o Calme immédiatement la toux, désinfecte les voies respiratoires, aseptise les lésions pulmonaires ou bronchiques par le GAÏACOL.

2^o Stimule la résistance organique, relève l'état général, lutte contre la cachexie par l'ARSENIC ORGANIQUE.

Indications. — Contre la toux en général : rhumes négligés, bronchites (chroniques ou non), catarrhe, état pré tuberculeux, etc. ;

Préventif des complications pulmonaires de grippe, rougeole, scarlatine, coqueluche, etc...

Posologie.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants, de 8 ans et plus : 2 à 3 cuillères à dessert par jour.

Moins de 8 ans : selon l'âge, par cuillère ou fraction de cuillère à café

Autres formes du Gaïarsol. — Ce produit est également préparé en : Dragées, Gouttes et Ampoules avec les mêmes indications.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

SIROP DE GLYCÉROPHOSPHATES VACHERON

Au Gaïacol de synthèse cristallisé
et aux glycérophosphates de chaux, de soude et de
potasse.

Composition. — Cette préparation contient par cuillerée à soupe :

0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé.

0 gr. 30 de glycérophosphates.

Avantages et Propriétés thérapeutiques. — Ce sirop possède le même pouvoir antibacillaire que le sirop Vacheron au Gaïacol (*voir plus loin*), et en plus l'action reconstituante des phosphates organiques.

Indications. — Affection des voies respiratoires, chez les anémiques, les lymphatiques, les rachitiques et contre la tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SIROP DE LA MATERNITÉ

Sirop de Cassia ac., 60 gr.; sirop de fleur de pêcher, 20 gr. ; sirop de pomme Reinette, 18 gr. ; teinture d'orange douce, 2 gr.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

Indications. — Constipation, Embarras gastrique, Pas de contre-indications.

Prix : le flacon, 10 fr.

Dépôt : **Laboratoires H. NOGUÈS**

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS.

Anciennement :

11, rue Joseph Bara — PARIS

SIROP DE LOVEL

Iodo-phosphaté tannique.

1 cuillerée à soupe contient :

Iode métalloïdique, combiné aux roses rouges.....	0 gr. 02
Extr. tannique des roses de Provins et de Ratanhia	0 gr. 20
Phosphate monocalcique cristallisé.....	0 gr. 25

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe matin et soir.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Lymphatisme, rachitisme, carie des os, affections scrofuleuses, maladies dues à l'anémie et à la débilitation générale.

Préparation très recommandée aux enfants.

Prix : 12 francs.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SIROP DU D^r GELINEAU

Composition :

Arsenic-Chloral-Bromuré.

Indications thérapeutiques :

Insomnie, Névralgie, Hystérie.

Posologie :

Par cuillerée à soupe :

Kbr.....	1 gr. 50
Chloral cristallisé	1 gramme.
Arsenic.....	1 milligr.

Une à deux cuillerées à bouche le soir au coucher.

Doses supplémentaires en cas de besoin.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoires J. MOUSNIER-DELERME

9, bd Carnot — BOURG-LA-REINE (Seine).

SIROP FAMEL

Antiseptique. — Lactocréosote soluble. — Cicatrisant, non caustique bien toléré.

Calmant. — Codéine, Aconit.

Récalcifiant. — Lactophosphate de chaux.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuill. à soupe le matin, avant déjeuner, et une le soir, au coucher ; délayer dans infusion chaude non sucrée. En cas de besoin, 3^e cuill. à midi.

Enfants : de 8 à 14 ans, par cuill. à dessert ; de moins de 8 ans, par cuill. ou demi-cuill. à café, ou moins, selon l'âge, toujours dans infusion non sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, puissant antiseptique du poulmon.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches et du poulmon : bronchites chroniques, tuberculose, rhumes négligés, toux. Comme adjuvant dans la grippe, coqueluche, rougeole, scarlatine, pour écarter les dangers de complications pulmonaires.

Prix : 10 francs.

16 à 22, rue des Orteaux — PARIS (XX^e).

SIROP GRIBELL

Composition. — Baume du Canada, « *Prunus virginianus* », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble. Baume de Tolu.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Le flacon : 9 francs.

PATE GRIBELL

Même composition. — Mêmes indications.

La boîte : 4 francs.

SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé.

Mode d'emploi. — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Le flacon : 7 francs.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron.
Approbation scientifique de l'Académie de médecine de Paris.

Indications thérapeutiques :

Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bismuthisme.

Posologie :

Adultes : une cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par jour, une heure avant ou deux heures après les repas.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans ; 2 à 3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

— GRANULES MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER. —

Composition et indications thérapeutiques :
Celles du sirop.

Posologie :

2 granules = 1 cuillerée à soupe de sirop.

Laboratoires CROSNIER

6, rue Chanoinesse — PARIS.

SIROP MIREILLE

Le plus *agréable* au goût, le plus *actif*, pour le **traitement polyvalent** des **affections de l'appareil respiratoire**.

Calmant, sédatif, hypnotique, par : le bromhydrate de codéine, l'eau de laurier-cerise, l'aconit et la belladone.

Balsamique, *antiseptique, diurétique*, par : la terpine et le benzoate de soude du benjoin.

Expectorant, *émollient, sudorifique*, par : des extraits de plantes pectorales.

Doses par 24 heures et mode d'emploi :

Adultes : 4 à 6 cuillerées à soupe.

De 10 à 16 ans : 3 à 6 cuill. à dessert.

De 2 à 10 ans : 2 à 6 cuill. à café.

Se prend à toute heure ; aucune contre-indication ; pas de toxicité ; pas d'intolérance ; pas d'accoutumance. Une cuiller à soupe prise le soir au coucher dans une infusion chaude assure un sommeil paisible.

Prix au public : 10 fr. 50 (exempt d'impôt).

LABORATOIRES LEGENDRE et Cie.
Section D. S. — HOUILLES (S.-et-O.).

DÉPOT GÉNÉRAL

France, Colonies et Protectorats :

O. C. P. 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut
à Bruxelles-Maritime

SIROP MORLAS

Hérédo-syphilis des nouveau-nés et des enfants.

Tonique et spécifique discret pour les petits malades à hérédité douteuse (végétations, glandes, eczéma, convulsions, etc...).

Dose :

Jusqu'à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café, etc...

Echantillons sur demande.

Pharmacie MOURE

18, rue Favart — PARIS (II^e).

Dépôt général :

O. C. P., Paris et ses succursales.

SIROP MYRIANIS

Sédatif polybromuré pour enfants.

Chaque cuillerée à café renferme 0 gr. 065 de polybromures.

Tolérance parfaite : aucun narcotique. aucun hypnotique.

Indications. — Excitabilité, Insomnie, Epilepsie, Vomissements spasmodiques du nourrisson et toutes manifestations nerveuses de la première enfance.

Posologie. — De 3 mois à 1 an : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

De 1 à 3 ans : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Au-dessus de 3 ans : par cuillerées à soupe.

Le flacon : 7 fr. 50.

Les Spécialités de l'Enfance.

Laboratoires AXAREL

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

SIROP NEVRA

Composition. — Sirop à base de bi-iodure de mercure, iodure de potassium, iodure de fer, iode, tannin, arseniate de soude, dosé à :

0,005 de Bi-Iodure.

0,20 de KI.

par cuillerée à soupe.

Mode d'action. — Traitement dissimulé de la Syphilis.

Mode d'emploi :

1 à 2 ans, 1 cuillerée à café par jour.

2 à 3 ans, 2 cuillerées à café par jour.

3 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour.

5 à 10 ans, 2 cuillerées à dessert par jour.

A partir de 12 ans, 2 cuillerées à soupe par jour.

Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire R. FAURE

80, rue du Rocher — PARIS.

SIROP NOGUÈS

Composition :

Alcoolature d'aconit	{	ãã	0,04
Teinture de belladone			
Teinture de grindelia			0,09
Bromoforme			0,022
Codéine			0,012
Benzoate de soude			0,10
Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise			Q. S.
pour une cuillerée à bouche.			

Dose et mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, incisif, pectoral.

Indications. — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections des bronches.

Prix : 12 francs.

Laboratoire NOGUÈS

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS.

Anciennement : 11, rue Joseph-Bara — PARIS.

SIROP PHÉNIQUE VIAL

Composition. — Sirop à base d'acide phénique, principe actif des goudrons.

Indications. — Trachéite, Laryngite, Bronchite aiguë et chronique, Asthme, Grippe, Coqueluche, Tuberculose pulmonaire, Hémoptysie, Bronchite fétide, Gangrène pulmonaire, toutes les Hémorragies, Diarrhées chroniques.

Action. — Antiseptique et désodorisant puissant ; augmente la coagulabilité du sang, diminue les sécrétions.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à soupe par jour, pur ou de préférence dans une tasse de tisane quelconque.

LABORATOIRE

DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE

Dr PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne, PARIS.

SIROP « ROCHE » AU THIOCOL

1 cuill. à soupe de Sirop « Roche » = 1 gr. de Thiocol « Roche ».

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. de gaiacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuill. à soupe par jour. *Enfants* : 2 à 4 cuill. à café selon l'âge.

Prop. théér. — Antiseptique pulmonaire. Phagocytogène. Eupeptique. Orexique.

Indic. théér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques. Grippe. Pneumonie. Coqueluche. Scrofule. Anémie. Rachitisme. Dyspepsies. Entérites. Diarrhées, etc.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

SIROP SENTINI

Aux Prunes d'Ente d'Agen.

Principes actifs :

Pruneaux d'Agen. Cassia Lenitiva. Cephaelis Ipécacuanha.

Propriétés :

Laxatif et Purgatif doux. Pas d'accoutumance. Efficacité parfaite.

Dose laxative :

Bébés : Une demi à une cuillerée à café.

Enfants : Une à deux cuillerées à café.

Adultes : Une cuillerée à soupe le soir.

Dose purgative :

Le double des doses laxatives.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires DOMERGUE

AGEN (Lot-et-Garonne).

SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur
Médecine du nourrisson.

Indications thérapeutiques. — Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

Doses. — Sommeil agité, Nervosité : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dentition : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Convulsions (pendant les accès), 1 cuillerée à café toutes les 5 minutes.

Convulsions (après les accès), 1 cuillerée à café toutes les 3 heures.

(Se méfier des imitations).

Prix de vente au public : 5 fr. 50 le flacon.

Laboratoire TEYSSÈDRE

34, faubourg d'Angoulême — LIMOGES.

SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté

Contenant pour 100 cc. :

Iode bi-sublimé	0 gr. 15
Extrait sec de ratanhia.....	1 gr. 10
Lactophosphate de chaux....	2 gr. 25
Sirop d'orange. Q. S. pour 100 cc.	

Posologie. — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe.)

Indications. — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

Prix : 12 fr. 50.

LABORATOIRE OBERLIN

J. TINARDON

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

SIROP VACHERON

au Gaïacol de Synthèse.

Composition. — Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé titrant 100 p. 100 de gaïacol absolu.

Avantages. — Le gaïacol est en solution complète et en dilution étendue, par conséquent sans action sur les fonctions digestives.

Propriétés thérapeutiques. — Calme la toux rapidement. Diminue et facilite l'expectoration. Détruit les germes morbides.

Indications. — Rhumes, Gripes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhe pulmonaire, Coqueluche.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un demi-verre de tisane, lait ou eau, à prendre dans l'intervalle des repas.

Enfants : De 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs le flacon de 250 cc.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SISTOMENSINE CIBA

Substance lipoïdique extraite de l'ovaire.

Action physiologique. — Equilibre la fonction menstruelle, limite et régularise le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

Indications.

- I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.
- II. — Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.
- III. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.

Comprimés, Ampoules.

Doses. — 3 à 6 comprimés par 24 heures, — 1 ou 2 ampoules.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

Le — de 100 — : 30 —

La boîte de 4 ampoules : 20 francs

(Voir *Agomensine*.)

Laboratoire CIBA, O. ROLLAND

109 à 113, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON.

SODERSEÏNE

Indication. — Coqueluche.

Composition. — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

Forme. — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue (ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

Doses journalières :

Enfants jusqu'à 6 mois 100 gr.

— de 6 mois à 2 ans 150 gr.

— de 2 ans et au-dessus . 200 gr.

(Echelle de doses sur le flacon).

Prix du flacon de 500 gr. : 10 francs.

J. DEPRUNEAUX, Pharm. de 1^{re} classe
18, rue de Beaune et 31, rue de Verneuil
PARIS (VII^e).

SODOLACTINE

(Estomac.)

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant. De goût très agréable, la *Sodolactine* est le médicament de choix dans la plupart des affections stomacales.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle facilite physiquement l'évacuation de l'estomac. Non laxative.

Outre son activité, facile à vérifier, elle a l'énorme avantage de constituer un traitement très économique.

Posologie :

Une mesure dans une tasse à *thé* d'infusion ou d'eau tiède.

Après les repas : Hyperchlorhydrie, Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse, Vomissements des nourrissons : (1 cuillerée à café dans un biberon de 120 cc. d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuillerées à soupe de cette solution après chaque tétée.)

Avant les repas (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

Remarque importante. — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : *une mesure par tasse à thé de liquide.* (A titre indicatif une tasse à thé 120 cc. ou 8 cuillerées à soupe.)

Prix : 10 francs.

Laboratoires GERDA

163, boulevard Croix-Rousse — LYON.

SODOTHIOL

Composition :

Solution stérilisée pure, isotonique, injectable de thiosulfates alcalins.

Forme pharmaceutique :

Ampoules de 2 centicubes préparées pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Indications thérapeutiques majeures :

Affections hépatiques. — Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Angiocholite lithiasique, Cholécystite calculueuse, Cholémie simple, Ictère catarrhal ou émotif, Hépatisme de Roger Glénard.

Manifestations arthritiques. — Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Anurie calculueuse, Calculs vésicaux, Rhumatisme noueux déformant, chronique, Ankyloses fibreuses articulaires, Otosclérose, Otospongiose.

Indications thérapeutiques secondaires :

Dermatologie. — Eczémas, Acnés, Accidents cutanés récidivants ou prurigineux.

Etats congestifs chroniques des muqueuses respiratoires.

Mode d'emploi :

A. *Cure d'assaut.* — 10 injections, une tous les jours.

B. *Cure de fixation.* — 10 autres injections 15 jours, puis deux mois plus tard.

C. *Cure d'entretien.* — 10 injections 6 mois, puis un an après la première série.

Dans le cas de Rhumatismes chroniques noueux ou déformants et quelques affections cutanées récidivantes, la *Cure d'assaut* comprendra 20 injections à raison d'une par jour, complétée d'une *Cure de complément A bis* après 15 jours de repos.

Le *Sodothiol* étant dépourvu de toute toxicité, son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé tout le temps jugé nécessaire.

Incompatibilités

Acides, Sels acides, Iodures.

Prescrire :

Sodothiol : 1 boîte d'ampoules.

Prix, la boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe. — BEAUVAIS (Oise). Tél. : 4-84

Echantillons et littérature médicale sur demande.

SOL-BI FRAISSE

Bismuth lipo-soluble.

Composition. — Solution de Campho-Carbonate de Bismuth.

Chaque ampoule de 2 centimètres cubes contient 0,08 de Bismuth métal.

Indications. — Traitement d'attaque, aussi actif que l'Arsénobenzol.

2 ampoules par semaine.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuthyle.

Indications :

Le Solmuth s'emploie en *injections intramusculaires* dans le traitement de la syphilis à toutes périodes. Tolérance parfaite ; élimination complète, sans dépôt huileux ou bismuthique intramusculaire. Activité supérieure à celle des sels insolubles de bismuth, action stérilisante aussi rapide que celle des arsenicaux en solution aqueuse.

Mode d'emploi :

2 injections intramusculaires de une ampoule de 1 cc. par semaine.

Présentation :

En boîte de 12 ampoules de 1 cc. (une ampoule contient 4 centig. Bi-métal par cc.).

Prix de vente au public :

25 francs la boîte de 12 ampoules.

Laboratoire **L. LECOQ** et **F. FERRAND**

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau, succédané de l'huile camphrée.

Avantages. — Injection facile et indolore. Résorption immédiate, d'où action plus vive et plus vigoureuse. Injection intraveineuse sans danger. Toxicité nulle.

Action physiologique. — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre.

Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneumogastrique en régularisant celles-ci.

Mode d'emploi :

Ampoules : 2 à 8 cc. par jour en médecine, 2 cc. en intraveineuse, 10 à 15 cc. par jour en chirurgie.

Gouttes : 25 à 100 gouttes par jour dans un peu d'eau sucrée.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc., 3 cc., 5 cc. et 3 amp. de 10 cc. et gouttes.

Le Solucamphre en solution à prendre « per os ».

Prix : 6 ampoules de 1 cc., 10 fr. ; 6 ampoules de 2 cc., 12 fr. 75 ; 6 ampoules de 3 cc., 14 fr. 50 ; 6 ampoules de 5 cc., 17 fr. ; 3 ampoules de 10 cc. 17 fr. ; Gouttes, 14 fr.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

MICHEL DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

SOLUCAMPHRE SPARTÉINÉ

Delalande.

Sel de Spartéine du Solucamphre en dissolution dans le Solucamphre lui-même.

Correspondant à Spartéine base : 0,035 par ampoule de 2 cc.

Avantages. — Tous les avantages du Solucamphre et de la Spartéine réunis.

Injections indolores.

Indications. — Toutes les indications de la Spartéine et du camphre.

Présentation :

Ampoules : Boîtes de 6 ampoules de 2 cc : 12 75

Comprimés : Tubes de 20 comprimés : 12 »

Mode d'emploi.

Ampoules : 2 à 4 cc. en injection intramuscul

Comprimés : *Adultes* : 2 à 6 par jour ; *Enfants* : 1 à 2 par jour.

Laboratoires Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

SOLUPROTINE " ROCHE "

Solution à 10 p. 100 de Protéine Solubilisée (Peptone de Caséine « Roche ») de composition constante, stérilisable et inaltérable.

Indications. — Toutes celles de la Protéinothérapie

Posologie. — *Injections intramusculaires.*

Etats aigus ; doses croissantes de 1/4 à 1 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Etats subaigus et chroniques ; de 1/2 à 2 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Injections endoveineuses. — De 1/4 à 1/2 cc. dans 10 cc. de sérum physiologique pour une injection tous les 3 ou 4 jours.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

SOLUTION BARDET

à l'Extrait sec de Quinquina.

Adoptée par le Ministère des Colonies.
Médaille d'Or, Strasbourg 1924. Diplôme
d'Honneur, Exposition Coloniale Inter-
nationale, Paris 1931.

Composition :

Solution sans sucre, sans alcool, contenant
0 gr. 50 de principes actifs par cuillerée
à soupe et titrant au minimum 10 p. 100
d'alcaloïdes totaux.

Propriétés thérapeutiques :

Tonique de premier ordre. Fébrifuge à forte
dose. Action rapide et fidèle.

Indications :

Asthénie, Anorexie, Anémie, Convales-
cences, Lymphatisme, Pyrexies diverses,
Paludisme en particulier.

Mode d'emploi :

Tonique :

Adultes : 1 cuillerée à soupe. *Enfants* :
1 à 2 cuillerées à café au début des deux
principaux repas.

Fébrifuge :

Adultes : 4 à 5 cuillerées à soupe. *Enfants* :
4 à 8 cuillerées à café par 24 heures.

Se méfier des nombreuses contrefaçons et
imitations.

Formuler : « **Solution Bardet** ».

Échantillons et littérature :

Laboratoires BARDET

fondés en 1860

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

SOLUTION HUILEUSE AU NESTOSYL

Anesthésique par contact.

Caractéristiques. — Association d'éthers des séries phthalique et para-aminobenzoïque puissamment anesthésique par contact. Aucun produit des tableaux A et B. Antiseptique.

Indications. — Anesthésie des muqueuses et des plaies : Cathéters, bougies exploratrices ou dilatatrices, cystite, cystoscopie, rectoscopie, cautérisations, changements de pansement, brûlures, démangeaisons, inflammations, éruptions, excoriations, etc...

Posologie. — Anesthésie des canaux : instiller 5 à 10 cc. dans le canal quelques minutes avant d'introduire l'instrument enduit lui-même de solution ; de la vessie : instiller quelques centimètres cubes, dose généralement suffisante 10 à 15 cc. ; de la muqueuse vaginale : introduire un tampon vaginal imbibé de solution ; de la muqueuse rectale : instiller 10 à 15 cc. avec une poire en caoutchouc ; des plaies et dermatoses : recouvrir d'un pansement imbibé de solution et maintenu en permanence.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du NESTOSYL.

P. BAUDE, pharmacien

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e)

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl, 27, Paris.

SOLUTION PAUTAUBERGE

Composition. — Créosote pure de hêtre, 0 gr. 10 ; Chlorhydro-phosphate de chaux, 0 gr. 50 ; par cuillerée à potage.

Action. — A l'action anticatarrhale, antiseptique et cicatrisante de la créosote, elle joint l'action tonique et récalcifiante du chlorhydro-phosphate de chaux, le plus assimilable des sels de chaux.

Grâce à sa forme de solution complète et bien diluée, elle est toujours bien supportée par l'estomac.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Bronchite chronique, Toux, Grippe, Prétuberculose, Tuberculose, Coqueluche.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à potage par jour avant les repas pour les adultes.

2 à 3 cuillerées à dessert par jour avant les repas pour les enfants au-dessus de 5 ans.

2 à 3 cuillerées à café par jour avant les repas pour les enfants au-dessous de 5 ans.

Prix : 15 fr. le flacon de 350 cc

Laboratoire PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS VIII^e)

SOLVOSCLÉROSE

Composition. — Silicate de soude chimiquement pur. Extrait de gui frais stabilisé. Peptone iodée sèche.

Action. — Hypotensive, diurétique, déchlorurante.

Indications. — Artério-sclérose, Athérome, Aortite. Angine de poitrine : Troubles de la circulation, Vertiges, Torpeur intellectuelle, Affaiblissement de la vue, Paresse auditive et Bourdonnement d'oreilles, Refroidissement et Engourdissement des extrémités, Crampes, etc...

Forme et posologie. — Comprimés vernis solubles dans l'intestin ; 5 par jour (1 le matin, 2 à midi, 2 le soir), avec une gorgée d'eau 10 minutes avant les repas.

Prix ; 15 fr.

E. GAUCHON, Docteur en pharmacie
83, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

SOLVURIC

Forme :

Granulé effervescent à base de formine et de benzopyruvate de soude et de lithine.

Indications :

Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artério-sclérose, Antisepsie urinaire.

Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

Laboratoire P. MAUCHANT

14, rue de Birague — PARIS (IV^e).

SOMNICONES BÉRAL

Suppositoires hypnotiques, sédatifs et antipasmodiques.

Composition. — Chaque Somnicone contient :

Phényl éthyl barbiturate de soude	0 gr. 20
Extrait de Valériane.....	0 gr. 10

Propriétés. — Assurent un sommeil calme, tranquille et réparateur sans mauvais réveil et sans aucun trouble des fonctions digestives. Action lente et progressive. Calmants électifs des centres hypnogènes.

Indications. — Insomnies au cours des affections les plus variées, Affections aiguës, Algies de toutes natures (Sciatique, Douleurs tabétiques, Névralgies), Excitations cérébrales, Douleurs méningées, Etats neurasthéniques, Préoccupations obsédantes, Nervosismes, Céphalées, Vomissements d'ordre central, Mal de mer, etc.

Posologie. — Un Somnicone en se couchant. Si l'effet semble insuffisant, en introduire deux ensemble ou l'un après l'autre.

Dans les affections chroniques, éviter l'accoutumance en suspendant l'emploi pendant 2 jours sur 6.

Formuler : Somnicones Béral. Une boîte.

ROGER, pharmacien,
194, rue de Rivoli. — PARIS.

SOMNIFÈNE « ROCHE »

Dialcoyl-barbiturate de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Lavastine, Weiss, Etienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloëtta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des D^{rs} Perlis, Vullien, Assoignon, Kindler, Boisnière, Jourdan, Journiac, de Teys-sieu, Hamant, Bénech, Redonnet, G. et D. Bar-det, etc., etc.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insom-nies simples ou compliquées, Agitation, Délire, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles ner-veux, Epilepsie, Tétanos, etc.

SOMNIFÈNE « ROCHE » Gouttes

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spé-ciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de *donner à chacun sa dose*, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

Doses habituelles. — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.
Enfants : V à X et XV gouttes (selon l'âge).

SOMNIFÈNE « ROCHE » Ampoules

Ampoules de 2 cc.

pour injections intramusculaires.

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.).

Ampoules de 5 cc.

pour injections endoveineuses.

Delirium tremens, Eclampsie, Tétanos, Etat de mal épileptique, etc.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

SOMNOPOL

Composition. — Formule du NEUROPOL
+ extraits de valériane, de cratægus et
gardénal.

Présentation. — Comprimés solubles.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique et
sédatif du système nerveux, reconstituant
et protecteur de la cellule nerveuse.

Indications. — Toutes les affections ner-
veuses, nervosisme, chorée, excitation,
insomnies, manies, instabilité, etc.

Posologie. — *Sédatif* : 1 ou 2 comprimés à
chacun des deux principaux repas.

Hypnotique : 3 comprimés le soir au coucher.

M. FAURE, pharmacien
80, rue du Rocher — PARIS.

SOMNOTHYRIL

(Traitement de l'insomnie.)

Composition :

Une pilule =	Diéthylmalonylurée...	0,20 gr.
	Analgésine	0,05
	Thyroïdine	0,001
	Salicylate d'Ésérine..	0,0002

Caractéristiques. — Seuil d'activité thérapeutique fort éloigné du seuil de toxicité.

Pas d'accoutumance, sommeil calme, et réveil agréable. Effet secondaire apaisant.

Renforcée dans son action par l'*analgésine*, sédatif à petites doses des *centres corticaux*, fixée d'une façon élective sur les cellules nerveuses des *centres mésodiencephaliques* par le complexe *ésérine-thyroïdine*, véritable « catalyseur physiologique du sommeil » la diéthylmalonylurée arrive à réaliser à *doses réduites et atoxiques* un effet hypnotique rapide et sûr.

Indications thérapeutiques. — Toutes insomnies et particulièrement insomnies rebelles, Anxiété, Excitation psychique et maniaque, Cures de désintoxication. Insomnies de la Ménopause, Insomnies post-opératoires.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer, ni croquer, avec un demi-verre d'eau ou *mieux de tisane chaude 2 heures environ après le repas.*

D'une façon générale, prendre, le premier soir, une pilule. En cas d'efficacité insuffisante, porter le lendemain la dose à deux pilules *prises au même moment.*

Dans de très rares cas, il y a lieu de maintenir cette dernière dose pendant deux à trois soirs pour obtenir l'effet recherché.

Dans les cas de grande agitation (thérapeutique psychiatrique) donner trois pilules d'emblée, et essayer par la suite d'abaisser à deux et une pilule.

N. B. — Eviter l'emploi simultané de médicaments tels que la Belladone, etc..., qui peuvent contrarier l'action de l'Ésérine.

Echantillons et littérature :

Laboratoires CANTIN

PALAISEAU (Seine-et-Oise — France).
Sabourin, 51, rue Jean-Robis, — BRUXELLES

SONAGAR

Composition. — Association de farine, de son et d'agar-agar aromatisé avec essence de légumes.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment laxatif doux, Éducateur et régulateur de l'intestin avec action nutritive marquée.

Indications. — Paresse intestinale, Spasmes de l'intestin.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche tous les soirs dans le potage.

SONAMEL

**Présenté sous forme
de cubes de pain d'épices.**

Composition. — Sonamel *adultes* : son, miel, bourdaine, très faible dose de phénol-phtaléine. Aromatisé à l'anis et à la badiane.

Sonamel *enfants* : son, miel, manne, traces de bourdaine, angélique.

Indications. — Constipation, atonie intestinale, légère insuffisance hépatique.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Un cube, le soir après dîner.

Enfants : Un demi, ou un cube-enfant.

Laboratoire MICHELON

20, boulevard Heurteloup — TOURS.

LE SONÈNE

Son purifié et désamidonné.

Propriétés. — Action émolliente régulière sur l'intestin.

Indications. — Traitement végétal, préventif et curatif de la constipation.

Mode d'emploi. — Le *Sonène* se présente sous formes de cachets, de comprimés, de granulés et de poudre.

Dose journalière, — 2 à 8 cachets ou comprimés par jour ; 2 à 6 cuillerées à soupe de granulés ou 2 à 4 cuillerées à café de poudre.

Laboratoires de la Liposeptine
2, Place des Vosges — PARIS.

SONÉRYL

Butyl-éthyl-malonylurée.

Action hypnotique très sûre, propriétés sédatives marquées, sans effets toxiques ni phénomènes d'accoutumance.

Indications :

Insomnies de toute nature, même celles qui sont provoquées par la douleur.

Posologie et mode d'emploi :

Deux comprimés à 10 centigr. le soir au coucher. Répéter cette dose dans la nuit en cas de besoin.

Dose maximum (adultes) : 6 comprimés par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

SOPORALOSE

Principe actif. — Anhydroglucotrichloréthanol et Phénylbromopropanoate de soude chimiquement purs.

Action physiologique. — Agit à la fois comme calmant sur le système nerveux encéphalique et sur la moelle. Aucune action sur la circulation, la respiration, la digestion. Non toxique, élimination parfaite, accoutumance nulle.

Action thérapeutique. — Provoque un sommeil calme et exempt de rêves, avec sensation agréable au réveil. Pas de contre-indications.

Posologie. — Dose normale moyenne : 1 cachet (0 gr. 20 de chaque constituant).

Usage. — Contre toutes les insomnies simples ou provenant de causes passagères, de fatigue, de surmenage, de soucis, de neurasthénie.

Cohvient remarquablement aux cardiaques, dyspeptiques, artérioscléreux, vieillards, tuberculeux.

La boîte de 12 cachets : 10 francs.

Laboratoires POINTET et GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

SOPORIGÈNE DELQUÉ

Composition. — Cachets de buthyl-éthyl-malonylurée, dosés à 20 centigrammes.

Action thérapeutique. — Hypnotique, analgésique.

Avantages. — Le moins toxique des hypnotiques, ne laisse au réveil aucune sensation désagréable, procure un sommeil parfait.

Indications. — Toutes les insomnies nerveuses et douloureuses,

Mode d'emploi. — 1 à 2 cachets par jour au maximum, dans un peu d'eau, 1/2 heure avant le sommeil, à une heure de distance des repas.

Prix : 8 fr. 50 la boîte de 10 cachets.

Laboratoires J. M. RICARDOU

Docteur en pharmacie.

46, rue Pierre-Charron — PARIS.

SORNYAL

Produit supérieur au Benzoate de Benzyle, dont il ne présente pas les inconvénients et contenant tous les dérivés benzyliques en association médicamenteuse.

Deux présentations : 1° *Gouttes* ; 2° *Comprimés*.

GOUTTES. — Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse :

Asthme vrai (ou essentiel). Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche. Hypertension.

Posologie. — V à XL gouttes 4 à 5 fois par jour.

COMPRIMÉS. — Spécifique de la **DYSMÉNORRÉE** (Règles douloureuses).

Posologie. — 2 comprimés à un quart d'heure d'intervalle, 6 à 10 par jour.

Gouttes : le flacon : 12 francs.

Comprimés : la boîte de 2 tubes de 10 : 10 fr.

Laboratoires pharmaceutiques,
L.-G. TORAUDE, O. *, O. I. (3).

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

SPASMACOL

(NORMACOL ATROPINÉ)

Préparation associant le pouvoir antispasmodique de la Belladone aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

L'effet utile et maximum de l'alkaloïde est obtenu remarquablement, au point voulu, grâce :

1° A la forme pharmaceutique de petits grains très menus demeurant indépendants, même après gonflement, et répartis sur toute la surface du bol intestinal.

2° Aux propriétés émollientes du mucilage-Normacol, véhicule adéquat de l'alkaloïde.

Forme. — Granulé dragéifié en grains très menus.

Dosage. — 4/10^e de millig. d'Atropine-sulfate par cuill. à café rase.

Indications. — Toutes gastro-entéropathies avec spasmes.

Emploi. — 1 ou 2 cuill. à café aux repas ou en dehors des repas. Mettre le granulé sur la langue, puis l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien
41, rue de Rome — PARIS (VIII°).

Tél. : Laborde 08-00.

SPASMALGINE « ROCHE »

Antispasmodique vrai.

Composition. — 1 ampoule ou 1 comprimé contient :

A. 1 centigramme PANTOPON « ROCHE »
(Opium total injectable).

B. 2 centigrammes PAPAVERINE « ROCHE »
(Alcaloïde de l'opium le moins toxique, à propriétés spasmolytiques spéciales).

C. 1 milligramme ATRINAL « ROCHE »
(Ether sulf-atropine, sans action sur le centre para-sympathique).

Propriétés. — Les propriétés antagonistes des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine* « Roche » expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

Indications thérapeutiques. — Tous les états spasmodiques, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyperexcitation, etc.

Doses et modes d'emploi :

Voie buccale.....	{	Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour. Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour.
Voie hypodermique ou intramusculaire.	{	Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

SPASMINE JOLLY

Sédatif de choix du système nerveux.
Combinaison physiologique stabilisée de
Valériane fraîche et Aubépine.
Odeur et saveur agréables.

Forme. — Elixir dosé à 0 gr. 10 de chaque substance par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 6 cuillerées à café par 24 heures ; 1/2 dose pour les enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, hypnotique et hypotenseur, régulateur cardiaque.

Indications. — Névropathies et Cardiopathies.

Prix du flacon : 12 francs.

Echantillons et Notice sur demande.

Laboratoire JOLLY

1, rue Christine — PARIS (VI^e).

Tél. : Danton 49-39.

SPASMOSÉDINE

Antispasmodique — Sédatif nerveux.
(*Thérapeutique cardio-vasculaire.*)

Composition :

Phényléthylmalonylurée	0 gr. 015
Bromhydrate de quinine.....	0 gr. 05
Extrait de Cratægus stabilisé...	0 gr. 05
Excipient q. s. pour 1 comprimé	<i>glutinisé.</i>

Présentation :

Comprimés glutinisés.

Indications et posologie :

a) *Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.*

1 à 2 comprimés avant chacun des deux principaux repas (10 jours par mois).

b) *Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires de l'hypertension (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc.).*

1 à 2 comprimés avant chacun des deux principaux repas (10 à 15 jours par mois.)

c) *Angine de poitrine et algies précordiales.*

1 à 3 comprimés avant chacun des deux principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).

Avaler avec un peu d'eau, sans sucer ni croquer.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

Digibaïne, Cardibaïne, Théoxanthine, etc.

6, rue d'Assas — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 31-85.

Belgique : Agent général : **L. Prunières**
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

SPÉCIFIQUE BEJEAN

La préparation antigoutteuse et antirhumatismale la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

Composition. — Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0 gr. 20 d'iodure de potassium par cuillerée à café.

Indications. — Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse et rhumatismale.

Doses. — *Cas aigus* : 3 cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

Cas chroniques : 1 ou 2 cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

Pour les enfants et les vieillards, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

Dépôt général :

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies.

Composition. — Sérum frais hémopoïétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine par saignées préalables, contenant les hémopoïétines spécifiques du Professeur Carnot (*Ac. des Sc.*, 1906). Ce sérum n'est pas inactivé par tyndalisation, ses substances minimales sont intactes.

Propriétés thérapeutiques. — 1^o Agent d'Hémopoïèse (Hémopoïétines de Carnot);
2^o Agent de Leucopoïèse et de Phagocytose (opsonines);
3^o Action tonique générale du sérum de cheval;
4^o Agent d'Hémostase générale (Traitement prophylactique des interventions sanglantes).

Indications. — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragipares, convalescences, déficiences organiques, tuberculose, infections et toxi-infections, cure pré-opératoire dans les interventions chirurgicales sanglantes. Pas d'accidents sériques ou infectieux.

Mode d'emploi. Posologie. — Sirop agréable à prendre.

Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude).

Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III
PARIS (VIII^e).

SPLÉNARMONE

Composition. — Réunit en une préparation facile à prendre l'hormone anti-anémique, l'hormone splénique et les acides aminés (1 ampoule ingérable de 10 cc. correspond à foie frais, 50 gr. ; rate fraîche, 50 gr. ; acides aminés exprimés en glycocolle : 0 gr. 50.)

Propriétés thérapeutiques. — Le foie et la rate agissent en puissante synergie pour régénérer la formule sanguine et augmenter la teneur en hémoglobine du sang. Les acides aminés reconstituent les réserves azotées tissulaires et exercent une action excito-sécrétoire sur les sucs digestifs.

Indications. — Energique reconstituant, indiqué dans toutes les anémies, la tuberculose, les états consomptifs, anémiques, anorexiques, toutes les déficiences du métabolisme basal. *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour. *Enfants* : 1 ampoule, dans un peu d'eau tiède ou de bouillon non salé.

Les Établissements **BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

SPLÉNOCARBINE

Simple ou Naphtolée.

Composition. — Splénine, formine, gastérase, charbon animal absolument pur (exempt de toute trace de cyanogène) avec ou sans addition de benzonaphtol. Présenté sous forme de granulé anisé, très agréable.

Action. — Absorbant de choix, désinfectant interne de premier ordre, facilite la digestion, ne constipe pas, n'anémie pas.

Indications. — Toutes *affections et infections gastro-intestinales, rénales, vésiculaires, hépatiques* de quelque sorte qu'elles soient. Aérophagie.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à café à croquer ou avaler, délayées dans un peu d'eau aux repas, ou en dehors des repas.

Le grand flacon de *Splenocarbine* : 18 francs.

Laboratoire de l'**HYDROCAMPHRE**

88, rue Duhesme — PARIS (XVIII^e).

SPLÉNOCRISINE

Solutions injectables de Rate désalbuminée à haute concentration.

Splénocrisine 15

(15 grammes rate par ampoule).

Splénocrisine 30

(30 grammes rate par ampoule).

Splénocrisine 60

(60 grammes rate par ampoule).

Dermatoses prurigineuses. Voir Opo-
thérapie Fournier (Endocrisines.)

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

SPLÉNO-MAGNÉSIUM

Composition. — Comprimés dragéifiés inaltérables à base de :

Extrait de rate.

Oxalate de fer.

Chlorure de magnésium.

Citrate de soude.

Mode d'action. — Reminéralisation, excitation de la défense cellulaire, renforcement de l'action du Chlorure de Magnésium par la Splénine.

Indications. — Manifestations cancéroïdes, asthénie, insuffisance hépatique, tuberculose.

Laboratoire R. FAURE

80, rue du Rocher — PARIS.

SPLÉNOMANGANOL

Propriétés thérapeutiques. — Réparateur puissant, reconstituant, reminéralisateur physiologique.

Indications. — Convalescences difficiles, grossesse, allaitement, amaigrissement, rachitisme, bacilloses pulmonaires et osseuses, anémie, neurasthénie.

Formule. — Extrait de vitamine B, fluorure de calcium, extrait de rate, nucléinate de manganèse, os frais pulvérisé, surrénale, foie, moelle osseuse rouge, céréaline, arseniate de strychnine 1/2 milligr.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose et mode d'emploi. — Deux à trois comprimés à chacun des deux principaux repas.

Laboratoires HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.

SPYROLIDES

Composition. — Comprimés gynécologiques à base de bleu de méthylène, méthylbenzénols, tanin, perborate de sodium (oxygène naissant).

Présentation. — Dernier mot de la science pharmaceutique en matière de comprimés gynécologiques. Emploi commode et discret ; dissolution complète et instantanée ; ni caustiques, ni irritants, ni toxiques. Désodorisants, décongestionnants, antiseptiques. Ne tachent pas. Parfum agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact de l'eau, les *Spyrolides* produisent instantanément un vif dégagement d'oxygène, donnant une solution puis samment bactéricide, dont l'emploi, même prolongé, n'irrite jamais les muqueuses, favorisant au contraire leur rapide régénération et assurant la défense de leur vitalité.

Mode d'emploi. — Un ou 2 comprimés par litre, pour l'injection quotidienne ou biquotidienne de propreté et d'hygiène.

A titre curatif : 2 à 3 comprimés par litre, en cas de leucorrhée, métrites, vaginites, salpingites, etc..., ou après l'accouchement.

L'eau Spyrolidée par 1 ou 2 comprimés désodorise complètement la peau (transpiration excessive des aisselles, des pieds, etc.).

Prescrire : *Spyrolides* : 1 tube (faire suivre du nombre d'injections quotidiennes et du nombre de comprimés à employer).

Tube de 28 comprimés : Prix : 8 fr. 95.

Echantillons et littérature :

Laboratoires du Dr NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

STAL-KOSAL

« La poudre qui calme »

Coréine bismuthée.

Pansement gastro-intestinal.

Poudre et tablettes.

Formule. — Coréine, mucilage pur, et carbonate de bismuth, chimiquement pur, associés au kaolin et au Co^3Ca .

Indications. — Toutes les Gastrites et toutes les Colites. Toutes les inflammations du Cœcum,

Mode d'emploi :

Poudre : Une cuillerée à soupe *bien délayée* dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun. Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.

Tablettes : dès l'apparition des douleurs, prendre 2 tablettes. Si après quelques minutes les douleurs persistent, prendre une demi-tablette de 5 en 5 minutes jusqu'à sédation.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE — PARIS-OUEST

Précédemment : 8, rue de la Source — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 11-86.

STALYSINE

Vaccin curatif antistaphylococcique

(D'après la technique du Dr Fisch).

Indications. — Furonculose, anthrax, acné, et toutes affections d'origine staphylococcique.

Double supériorité : Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

Formes :

Buccale, *la plus pratique* (10 ampoules de 3 cc.).

Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré.

Injectable, *la plus rapide et la plus sûre* (10 ampoules de 1 cc.).

Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 25 fr.

Boîtes de 50 ampoules pour cliniques et hôpitaux.

Laboratoires du Dr P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche, PARIS

STANION

(Procédé A. Lancien)

Description. — Étain colloïdal en capsules et en ampoules.

Capsules : contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage de kératine (50 capsules par flacon)

Ampoules : contiennent 3 cc. de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récidives sont évitées.

Indications. — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

Capsules : 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémie staphylococciques.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

STANNOXYL

Oxyde d'étain et étain métallique
absolument purs.

Indications. — Furonculose et toutes affections à staphylocoque : acné, anthrax, abcès du sein chez les nourrices, etc.

Formes. — Pour l'usage *interne* : comprimés, cachets, ampoules. — Pour l'usage *externe* : liquide, pommade.

Avantages. — Traitement **pratique, rapide et définitif** : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE

37, rue de Bourgogne — PARIS

STAPHYLAGONE

Vaccin antistaphylococcique, antitoxique et antimicrobien composé de :

Corps microbiens + lysat + anatoxine.

Indications. — Vaccination pré-opératoire et traitement de toutes les suppurations et *infections rebelles* à Staphylocoques.

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les deux ou trois jours, de 1/2 à 2 cc. progressivement.

Littérature et échantillons :

H. CARRION et C^o

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS

Tél. : Elysées 36-64 et 36-45.

STAPHYLASE

du Docteur DOYEN.

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

Indications. — Acné, Furonculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

Doses. — *Adultes* : 4 à 12 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

Laboratoires LEBEAULT

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e)

STAPHYLOCIDE AUDRAS

Tablettes sucrées parfumées à la menthe, dosées à 0 gr. 25 d'Étain-Oxyde d'étain plus purs et plus solubles que les produits commerciaux, parce que « Étain d'électrolyse ».

— Croquer 2 à 4 tablettes par jour, aux repas de préférence.

— Contre furonculose, acné, orgelets, phlegmon, abcès divers et toutes infections staphylococciques.

Enfants et adultes : pas de contre-indication.

NOTA. — Préparation particulièrement pratique, absorbable, efficace, à cause de sa forme de tablettes, nécessitant une longue trituration et division des principes actifs avec le sucre, et leur assurant en outre une fine émulsion par la salive. L'étain arrive ainsi à l'estomac dans l'état idéal pour une absorption rapide et totale.

La boîte (10 à 20 jours) : 12 fr. toutes pharmacies.

Demander échantillon à :

Laboratoire du STAPHYLOCIDE AUDRAS

112, rue de Gerland — LYON.

STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres.

Propriété thérapeutique. — Agent de la phagocytose.

Indications. — Furonculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses.

Doses et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 5 cuillers à soupe par jour.

— : 4 à 10 comprimés —

— : 1 ampoule —

Enfants : Moitié de ces doses ou moins suivant l'âge.

Prix au public :

Solution, Comprimés ou Ampoules : 15 fr.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications thérapeutiques. — Toutes les staphylococcies : Furoncle, Anthrax, Abscess tubéreux de l'aisselle, Ostéomyélites, Ostéites, etc.

Se recommande dans les cas rebelles à toute autre médication.

Posologie et Présentation :

Adultes : 1 ampoule de 2 cc. tous les 3 jours ; boîte de 6 ampoules : 18 fr. Ou 1 suppositoire tous les 2 jours ; boîte de 10 suppositoires : 15 fr.

Enfants : 1 ampoule de 1 cc. tous les 3 jours ; boîte de 6 ampoules : 13 fr. Ou 1 suppositoire tous les 2 jours ; boîte de 10 suppositoires : 12 fr.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

R. C. Seine 143-981.

STAPHYLO-VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Duchon.

Composition. — Lysat de Staphylocoques.

Indications. — Furonculose, Anthrax, Abscess et lymphangites du sein, Pleurésies purulentes à Staphylocoques, Staphylococcémies.

STREPTO-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Streptocoques hémolytiques.

Indications. — Erysipèle, Lymphangites, Pleurésies purulentes à streptocoques, grandes infections à Streptocoques.

Posologie. — Les lysats vaccins s'emploient à la dose de 1/2 cc. pour la première injection, les suivantes 1 cc, tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 cc.
Prix : 25 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

Tél. : Carnot 78-11.

STÉRAMINE

Pâte antiseptique soluble.

Composition. — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 p. 100 de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

Indications. — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

Avantages. — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Prix : 5 fr. le tube.

Echantillons médicaux sur demande.

Laboratoire

des **ANTISEPTIQUES CHLORES**

40, rue Thiers — LE HAVRE.

STÉROGYL DU D^r ROUSSEL

Formule. — Solution huileuse au centième d'ergostérine irradiée pure.

Présentation. — En flacon de 10 cc. dont X gouttes = 4 milligr. de vitamine D. La faible quantité d'huile administrée à chaque prise n'est pas susceptible de provoquer le moindre trouble digestif même chez les nourrissons les plus fragiles.

Propriétés thérapeutiques. — Sous l'influence des rayons ultraviolets, l'ergostérine, substance inerte, donne naissance à une substance active, la vitamine D, douée d'un pouvoir antirachitique très puissant.

La vitamine D est la seule partie agissante de l'huile de foie de morue qu'elle remplace totalement dans toutes ses indications.

Indications thérapeutiques. — Tous les états rachitiques, tous les troubles du métabolisme du Calcium, toutes les déperditions en chaux et en phosphates.

Par conséquent, rachitisme, états ganglionnaires, anémies pré-tuberculeuses et post-infectieuses, grossesse, carie des dents, consolidation des fractures.

Posologie. — Jusqu'à 1 an..... X gouttes par jour.

De 1 à 10 ans..... X à XX gouttes

Au delà de 10 ans et chez l'adulte : XX à XXX gouttes.

Prix au public, le flacon : 15 fr.

Laboratoire Français de Chimiothérapie

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e)

STHENOXAL

Médication réparatrice et reconstituante, en comprimés dragéifiés. Fer et Arsenic organiques, Kola ; Strychnos.

Indications. — Syndromes d'hypovitalité générale. Insuffisances, appauvrissements et affaiblissements organiques. Grossesse, allaitement, vieillesse. Anémies, chlorose, hérédité. Déchéances progressives. Convalescences. Intoxications et toxi-infections.

Emploi et doses.

Adultes : 3 comprimés par jour au total, aux repas ; avaler sans croquer.

Vieillards : 2 comprimés par jour.

Enfants : A partir de 6 ans : 1 comprimé par jour ;
de 10 à 15 ans : 1 ou 2 comprimés par jour ;
de 15 à 18 ans : 2 comprimés par jour.

Prix : 17 francs.

Echantillons grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

LE STOMAGYL

du Docteur Frémont.

Composition. — Mélange de poudres inertes désinfectantes cicatrisantes et de poudres végétales excitantes des fonctions digestives.

Caractéristiques. — Le STOMAGYL tapisse et cicatrise la muqueuse stomacale, excite la contractibilité de l'intestin, régularise les fonctions digestives déficientes, décongestionne et désintoxique le foie.

Indications thérapeutiques. — Dyspepsie, gastralgie, aérophagie, pyrosis, dilatations, états pré-ulcéreux, urticaire, vertiges, entérites (sous toutes leurs formes), diarrhées (de toutes natures), intoxications, dermatoses, ictère, maladies coloniales.

Mode d'emploi. — 1 cachet au début ou au milieu des 2 repas.

Prix : 12 fr.

Laboratoire du STOMAGYL

143, cours de la Somme — BORDEAUX.

STOMARINE BILLAULT

Traitement des maladies de l'estomac par le tricarbonate de chaux, magnésie, bismuth.

Forme : Comprimés.

Il résulte des recherches faites sur des affections stomacales et notamment des travaux remarquables du professeur ROBIN que les meilleures médications provoquant le soulagement et la guérison de la presque totalité des troubles de l'estomac comportent dans leur formule de la magnésie et du bismuth.

Partant de ces données, nous avons fait un choix judicieux des composés de magnésie et de bismuth qu'il fallait utiliser et après un dosage rigoureux des éléments actifs, nous avons adopté le tricarbonate de magnésie, bismuth et chaux ; ce dernier corps agissant comme neutralisant de l'acidité stomacale sans action laxative.

Mode d'emploi. — Sucrer 2 comprimés et davantage sans inconvénient chaque fois que les douleurs se font sentir ; celles-ci sont calmées instantanément.

La boîte : 12 francs.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE O.  O. I. O.

Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e)

STOMAROL

Estomac de porc desséché et délipoidé
(Méthode de Castle.)

Composition. — Le Stomarol est un Extrait d'estomac de porc desséché et délipoidé selon la *méthode de Castle* qui permet de conserver intégralement au produit les ferments résolutifs de la viande tels qu'ils se trouvent dans un estomac normal.

Présentation. — Forme poudre, insoluble, sans mauvais goût, dont ;

30 gr. représentent 250 gr. estomac frais de porc.

Indications. — Le Stomarol est recommandé dans tous les cas d'insuffisance gastrique et particulièrement dans l'anémie pernicieuse généralement accompagnée d'achylie.

Posologie :

Adultes : 20 à 30 grammes par jour (2 à 3 cuillerées à soupe).

Enfants : 10 à 15 grammes par jour (2 à 3 cuillerées à dessert).

Mode d'emploi. — A prendre au début des repas délayé dans : potage, lait, purée de légumes, confiture, etc.

Laboratoire Albert ROLLAND

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV^e).

STOMAXINES

Médication complète des affections digestives.

Formule A : Antiseptine.

Phosphate de Na Charbon végétal et animal.

Benzonaph. Bic. de Na. Citrate de Na.

Magnésie calc. carb. de Ca.

Médication d'attente. Embarras gastriques.

Fermentations.

Formule B : Neutraxine.

Substances neutralisantes notamment.

Carb. de Ca, de Magnésie. Charbon.

Hyperchlorhydrie.

Formule C : Eupexine.

Pepsine. Pancréatine (Système de conservation breveté).

Hypopepsie.

Formule D : SPASMAXINE.

Extrait jusquiame..... 1 cgr.

Extrait thébaïque 5 mmgr.

Poudre de belladone 2 cgr.

Stovaïne 2 mmgr.

Sels digestifs Q. s.

Spasmes. Crises douloureuses gastriques.

Aérophagie.

Formule E : BISKAOGASTRINE

Combinaison de Carb. de Bi et Kaolin par procédé spécial assurant l'adhérence parfaite à la muqueuse.

Pansements gastriques (Poudre).

Formule F : PURGOLAXINE.

Purgatif 2 à 3 cachets.

Scammonée Jalap Rhubarbe (poudre de belladone. Q. s.).

Constipation.

Formule G : ENTEROLACTINE.

Comprimés de ferments lactiques.

Affections gastro-intestinales.

Formule H : HEPAXINE.

Citrate de Na, Bic., de Na, Phosph. de Na, Sulf. de Na, desséchés et chimiquement purs.

Etats gastro-intestinaux et hépatiques.

Formes :

Cachets : 3 à 6 par jour.

Poudre : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Les Laboratoires Médico-Pharmaceutiques de France

6/8, rue Lacretelle — PARIS (XV^e)

STOMÉOL-VICHY

Poudre-Cure alcaline.

Composition. — Papaine, Kaolin, Carbonate de Chaux, Magnésie, Phosphate de Chaux, Sel de Vichy, Ess. de Menthe.

Indications. — Le meilleur saturant des Hyperacidités gastriques. Digère les albuminoïdes. Agit aussi bien en milieu acide que neutre ou alcalin.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, après les repas ou au moment des douleurs.

Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

STOMOBROL

Sédatif et Curatif puissants des Gastropathies, Troubles dyspeptiques douloureux.

Propriétés thérapeutiques. — *Pansement véritable de la muqueuse gastrique par le Kaolin.*

Antiseptique : par le Carbonate de bismuth.

Absorbant : par le Carbonate de chaux léger et la Magnésie hydratée.

Sédatif : par le bromure de sodium, la belladone, la codéïne.

Musculopoiétique : par la noix vomique qui rétablit les contractions normales de l'estomac rendues indolores par la belladone.

Reconstituant : par le phosphate tricalcique et la strychnine (noix vomique) dans les états dépressifs consécutifs aux gastropathies.

Indications. — Dyspepsies, hypersthénies, gastralgies, pyrosis, ulcères, aérophagies, anorexies d'origine digestive. Entérites aiguës et chroniques.

Présentation et mode d'emploi. — *Poudre* : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau après les repas ou au moment des douleurs.

Cachets : 2 à 4 par jour, après les repas ou au moment des douleurs avec une infusion chaude de préférence.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires CLAVERIE

4, avenue de Brazza — ROMAINVILLE (Seine).

STOMOPHILE

RÉGULATEUR ENERGIQUE DES FONCTIONS STOMACALES

(Alcalin-Antiferment.)

Forme. — Paquets (de saturation).

Composition. — Alcalins (sodium, calcium, magnésium). Bismuth (professeur Hayem).

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Gastrites aiguë et chronique, Hyperchlorhydrie, Hypersthénie, Pyrosis, Ulcère.

(Supprime, dans de nombreux cas, l'atonie intestinale.)

Posologie. — Un paquet, délayé dans un peu d'eau, à la fin ou 1 heure après les principaux repas.

Dans les crises aiguës, prendre supplémentairement 1 ou 2 paquets dans le courant de la journée.

INNOCUITÉ ABSOLUE

Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 francs.

Peut-être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS.

STOMOXYGÈNE

Troubles gastro-intestinaux. Constipation. Fétidité de l'haleine. Insuffisance hépatique.

Composition. — Peroxyde de magnésie, chimiquement pur, extraits biliaires, émodine et belladone (Travaux de Tschirch).

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Double réaction en milieu stomacal.	{	Dégagement d'O.	{ Naissant.	Action antiseptique.
		Production de chlorure de magnésium.	{ Naissant.	Action cytophylactique.

Propriétés thérapeutiques. — Action antifermentescible désinfectante, antiseptique, anti-colibacillaire. Effets toniques et cytophylactiques des sels halogènes magnésiens. Laxatif puissant, sans accoutumance.

Indications. — Toutes les dyspepsies. Constipation sous toutes ses formes. Fétidité de l'haleine. Toutes les fermentations. Rééducation intestinale, colites, entérocolites, etc... et toutes les manifestations colibacillaires.

Mode d'emploi. — 1 à 2 pastilles avant chaque repas. Littérature et échantillons.

Société Française d'Extension Bio-Chimique,

2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre — SAINT-QUENTIN (Aisne).

STOPRAL

Analgésique, sédatif, antipyrétique, régulateur nerveux. Strictement atoxique. Formule établie pour adultes seulement.

Comprimés à avaler, ou à déliter dans l'eau auparavant.

Indications. — Douleurs de la goutte, de l'arthritisme.

Névralgies.

Règles douloureuses, spasmes douloureux.

Fièvre, malaises généraux, grippe, maladies fébriles.

Migraines, céphalées, coryza.

Le STOPRAL ne provoque aucune fatigue des voies digestives,

Exerce sur le cœur une action tonique.

Agit rapidement.

Ne présente pas de contre-indication.

Doses. — Pour adultes seulement :

Un comprimé dans 1/2 verre d'eau au moment de la douleur, à n'importe quel moment de la journée. Un second comprimé peut être utile quelques heures après le premier, un troisième est rarement utile et constitue la dose maxima.

Prix : 12 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées
47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

STOVAÏNE

Chlorhydrate de diméthyl-amino-benzoyl-pentanol.

Anesthésique local moins toxique que la cocaïne. Vaso-constricteur et antiseptique. Pas d'accoutumance.

Indications :

Toutes les applications médicales et chirurgicales de la cocaïne.

Posologie et mode d'emploi :

Solution à 0,50 et à 1 p. 100 (Anesthésie locale), solution à 10 p. 100 (Rachi-anesthésie), Pastilles à 2 milligrammes (Affections de la bouche et du pharynx).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPÉCIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

STOVAR SOL

Acide - 4 - oxy - 3 - acétylamino - phényl -
1 - arsinique.

Forte teneur en arsenic (27, 2 p. 100). S'administre par la voie buccale.

Indications :

Amibiase, Lambliose, Helminthiases, Spirochétoses intestinales, États diarrhéiques, Syphilis, Pian.

Posologie et mode d'emploi :

Comprimés à 25 centigr., 5 centigr. et 1 centigr.
Doses moyennes : adultes : 50 centigr. à 1 gr. par 24 heures ; enfants : 1 à 2 centigr. par 24 heures et par kilogr. de poids.

Le *Stovarsol sodique*, soluble, convient aux injections hypodermiques (paralysie générale).

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

STOVÉDRINE

Pommade nasale atoxique.

Effet puissant. Pas d'accoutumance.

Elle comprend deux principes essentiels :

La **Stovocaïne** (Chlorhydrate d'Amyléine) 6 p. 100.

L'**Ephédrine** (Chlorhydrate) 5 —

L'originalité de la formule de la **STOVÉDRINE** réside dans l'association de la Stovocaïne et de l'Ephédrine employées à un taux de concentration suffisant pour combattre efficacement :

- 1) *Affections aiguës* : Coryza, Sinusite, Céphalée, Obstruction nasale.
- 2) *Affections chroniques* : Asthme, Rhume des foins.

Posologie. — Introduire gros comme un pois dans chaque narine.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Tél. : Maillot 17-75.

STROPHANTINE CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de Strophantine cristallisée
extraite du Strophantus Gratus.

Synonyme : **Ouabaïne.**

Indications. — Affections mitrales, Dyspnée, Oppression, Œdèmes, Asystolie, Cardiopathies des enfants et vieillards, Lésions cardiaco-aortiques. Artério sclérose avec ou sans néphrites.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur.

STROPHANTUS CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,001 Extrait titré de Strophantus.

Indications. — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique.*

En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Prix de l'Académie de médecine.

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin — PARIS.

STRYCHNAL LONGUET

Toutes indications de la strychnine.

Dérivé synthétique de la strychnine, de toxicité dix fois moindre.

Affections médullaires et névritiques. — Asthénie. — Neurasthénie. — Tuberculose. — Maladies infectieuses. — Convalescence. — Anémie.

Doses. — Par jour :

2 à 4 granules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal.
1 à 2 ampoules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal par cm³.

Le flacon de 50 granules : 14 fr.

La boîte de 12 ampoules : 18 fr.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable

Glycérophosphate de soude, acide nucléinique et méthylarsinate de strychnine.

Ampoules injectables de 2 cc.

Dose et mode d'emploi.

Une injection Hypodermique de 2 cc.
par 24 heures.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

STUPHO

Antidiarrhéique non toxique.

Composition. — Lactate de Chaux, Extrait de Salicaire, Benzonaphtol.

Aux propriétés antidiarrhéiques de la salicaire signalées par d'éminents thérapeutes (de ROUVILLE, CAMPARDOU, DUFOUR) s'associe l'action remarquable du Lactate de chaux dans toute diarrhée ou dysenterie.

La présentation en comprimés ou granulés en permet l'administration aisée aux enfants les plus jeunes, la solution du granulé dans l'eau donnant instantanément une préparation vanillée très agréable au goût.

Mode d'emploi. — *Comprimés* : 2 à 6 par 24 heures pour l'adulte ; 1 à 4 par 24 heures pour l'enfant ; délayer dans 1/4 de verre d'eau sucrée tiède.

Granulé : 1 à 4 cuillerées à bouche pour l'adulte.

1 à 3 cuillerées à dessert pour l'enfant.

1 à 4 cuillerées à café pour le bébé.

à croquer ou dissous dans un peu d'eau tiède.

Prix : *Granulé*, 12 fr. *Comprimés*, 7 fr.

LABORATOIRE DU MAINGUY

M. BASSIN, docteur en pharmacie — BONDY (Seine).

Echantillons sur demande.

SUCRE EDULCOR

dit le Sucre des Diabétiques.

Très ancienne préparation, très connue, recommandée aux Diabétiques par tout le Corps Médical.

Une pastille suffit pour sucrer une tasse de café, thé, grog, etc...

LITHARSYNE

Indications. — Traitement du diabète et de l'arthritisme par le Chlorhydro-Méthylarsinate de Lithine.

Posologie. — *Solution* : 1 cuillerée à soupe avant les repas de midi et du soir.

Gouttes : XXV gouttes avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau.

Comprimés : 6 par jour (3 avant chaque repas).

Echantillons gratuits à Messieurs les Docteurs.

Laboratoires E. FERRÉ

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI^e).

SULFA

Ampoules Sulfa de 10 cmc.

Monosulfure de sodium inaltérable, Soufre colloïdal (S. non oxydé).

Emploi. — Verser une ampoule dans 1 litre d'eau bouillie pour obtenir 1 litre d'eau sulfureuse artificielle type eau sulfurée de Caunterets.

Boisson, etc... (comme eau sulfureuse naturelle) gargarismes, inhalations, pulvérisations, lavage de sinus.

Avantages. — Pas d'oxydation par le transport, grande activité.

Indications. — Toutes applications O. R. L., pulvérisations, etc... et traitements sulfurés des voies respiratoires.

En méd. gén. : Bronchites chroniques, Peau, Oxyurose (lavements), etc...

Boîte de 10 ampoules : 20 fr.

Tablettes Sulfa.

Gargarisme sec. Sulfo, M. boraté, cocaïne.

La boîte : 5 fr.

Société PYRNE

M. LAFITTE, pharmacien

CAUTERETS (Hautes-Pyrénées.)

SULFARSÉNOL

Adopté par les Hôpitaux.

Dioxydiaminoarsénobenzène diméthylène sulfite de soude. Teneur en arsenic : 20 p. 100.

Injectons (au choix du médecin) : Intraveineuses, sous-cutanées, intramusculaires.

Indications. — Syphilis, Hérédo-Syphilis, Paludisme, Pian, Infection puerpérale, Blennorrhagie, Erysipèle, Athrepsie, Anorexie des nourrissons, Goitre endémique, Angine de Vincent, Dermatoses chroniques, Zona, Pyorrhée alvéolaire, Interventions chirurgicales.

Doses :

A	B	C	D	E	1	2	3	4
5 milgr.	1 ctgr.	1,5	2	3	6	12	18	24
5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	36	42	48	54	60	72	84	96 ctgr.

Voir Arsénos-Solvant.

Laboratoires de Biochimie Médicale
Ch. DESGREZ, Docteur en pharmacie
 19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).
 Téléphone : Auteuil 26-62 et 04-30.

SULFOBYL

Forme. — Dragées glutinisées.

Composition :

Soufre colloïdal.....	0,02
Extrait de bile	0,05
Extrait de foie	0,05
Entérokinase	0,02
Extrait de pancréas	0,02
Urotropine	0,05
Aloïne	0,005

Par dragée.

Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hématoclasique de Widal.

Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.

Enfants : 1 dragée.

Avaler sans croquer. — Prix : 10 francs.

Laboratoire LAFARGE

6, boulevard Arago — PARIS.

SULFOCADOL

Composition. — Pommade du professeur Gaucher de l'Hôpital Saint-Louis rendue blanche et inodore.

Huile de cade désodorisée et décolorée. Soufre, camphre, acide salicylique.

Indications. — Traitement de l'eczéma et des affections de la peau d'origine eczémateuse. Toutes les indications de l'huile de cade.

Avantages. — Mieux que toutes les pommades à l'huile de cade ordinaire, parce qu'elle ne tache pas et ne sent pas mauvais.

Emploi. — En onctions sur la partie malade. Pour l'enlever, utiliser l'huile d'amandes ou une bonne huile végétale.

Prix : 9 francs.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

Laboratoires Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault
COURBEVOIE (Seine).

SULFOCRÈME LILESS

Composition. — Crème non grasse contenant 20 p. 100 de Soufre précipité desséchant et formant poudre adhérente à la peau.

Indications. — Contre séborrhée et acnés.

Mode d'emploi. — Appliquer la nuit en couche très légère dans les cas légers, plus ou moins épaisse dans les cas rebelles et en couche aussi légère que l'on veut pour la journée, en poudrant par-dessus. Elle se nettoie avec la plus grande facilité avec des tampons d'ouate et de l'eau chaude ou par le simple lavage.

Prix : 7 francs.

Laboratoires FISCH et C^{ie}

4, rue d'Illzach — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Dépôt à PARIS : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

SULFODERMOL FLAHAUT

Composition. — Hyposulfites benzoïnés chimiquement purs.

Forme. — Cachets.

Indications. — Eczémas, États séborrhéiques, et dermatoses associées, Acné, Pityriasis, Psoriasis, Alopécies, Furunculose, Impetigo, Sycosis, Urticaire, Troubles de la Nutrition soufrée des rhumatisants chroniques.

Mode d'emploi. — Un cachet avec un 1/2 verre d'eau avant chacun des trois repas.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).

SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.

Granulé, Ampoules, Pommades.

Doses et mode d'emploi. — Granulé : 2 cuillers-mesure 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 centigr. de soufre colloïdal.

Injectable : 1 injection par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires 1 injection tous les 2 ou 3 jours.

Indications. — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques. Bronchites chroniques. Antisepsie de l'intestin. Rhumatismes aigus et chroniques. Arthritismes, Syphilis.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

SULFOLÉINE

du D^r E. ROZET

Principe actif. — Sulfolitholate d'ammonium.

Propriétés thérapeutiques. — Médication soufrée organique, antiseptique, expectorante, balsamique, décongestionnante. Ni toxique, ni narcotique, ni antispasmodique, n'entrave pas l'expectoration.

Forme. — Solution désodorisée aromatisée.

Indications. — Coqueluche, Bronchites aiguës et chroniques, Laryngites et Rhino-pharyngites aiguës et chroniques, Associations microbiennes secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Doses moyennes. — 3 à 5 cuillerées à café, à dessert, à soupe par 24 heures, suivant les âges et l'intensité des cas. La Sulfoléine peut être prescrite aux plus jeunes nourrissons. Les doses moyennes peuvent être doublées.

Mode d'emploi. — Donner les doses prescrites avant les repas, après une quinte, soit pures, soit dans eau sucrée, lait, tisane, à volonté.

Prix : 8 francs.

Laboratoire de la Sulfoléine ROZET

Benderitter et C^{ie} — VENDÔME (Loir-et-Cher).

SULFO-THIORINE

(Soufre et hyposulfite de soude en granulé anisé, friable, agréable au goût)

1^o Médication de choix des affections respiratoires subaiguës ou chroniques.

Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches : Ozène. — Adénoïdites et amygdalites subaiguës ou chroniques. — Pharyngites et laryngites traînantes. — Trachéo-bronchites récidivantes. — Dilatation des bronches. — Expecto-rations tenaces (La Thiorine fluidifie, puis assèche les sécrétions). — Gazés. — Tuberculose pulmonaire torpide non fébrile.

2^o Médication de l'auto-intoxication intestinale chronique et des affections qui en découlent. (Accidents anaphylactiques, acné, eczéma, urticaire, etc.).

3^o Médication des maladies par ralentissement de la nutrition. (Arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, etc.).

4^o Médication des intoxications médicamenteuses, sels d'or, de mercure, de bismuth, etc.

Dose moyenne : 1 cuillerée à café 2 à 3 fois par jour, au début des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Enfants : 1/2 dose ou 1/4 de dose suivant l'âge.

Echantillons :

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

Jean Dedieu, Pharmacien.

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

SULFUR CONCENTRÉ DAX

Ancien Sulfureux concentré Dax

Soufre colloïdal par voie buccale;

Composition. — Soufre colloïdal : 1 gr. 50 pour une **AMPOULE** de 10 cc. à diluer dans 250 gr. d'eau pour en faire une **POTION-SEMAINE**, 3 ampoules par boîte.

Avantages. — 1° **ÉTAT COLLOÏDAL** certain, car le liquide conserve les mouvements browniens ; 2° conservation indéfinie, à l'abri de l'air (pas de formation d'acide sulfhydrique) ; donc **AUCUNE MAUVAISE ODEUR** ; 3° attrait pour le malade de la fabrication de la potion, 3 potions dans une boîte pour 18 francs.

Posologie. — Chaque ampoule, diluée dans 250 gr. d'eau, sucrée ou non, fait une potion pour une semaine.

2 à 4 cuillerées à soupe par jour, matin et soir.

Indications. — Toute manifestation arthritique. Emphysème, asthme, catarrhe, rhumatismes, dermatoses (eczéma, acné).

Coqueluche : 2 à 4 cuillers à café au-dessous de 10 ans ; 2 à 4 cuillers à soupe au-dessus de 10 ans.

Adjuvant du traitement syphilitique, action antitoxique et éliminatrice du HG et AS et Bi..

Prix au public : 18 francs (traitement d'un mois).

Laboratoire MORELLET

Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des hôpitaux de Paris,
BAGNOLES-DE-L'ORNE— (Orne).

SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de Médecine.

MÉDICATION SULFUREUSE

Le *Sulfureux Pouillet* pour boisson est une poudre sulfureuse amorphe créée par M. Pouillet, l'éminent professeur de Chimie.

Mode d'action. — Au contact de l'eau, formation de Monosulfure de sodium à l'état naissant.

Indications thérapeutiques. — Les propriétés sont celles des eaux minérales sulfureuses naturelles prises à la source.

Son action est merveilleuse dans les Rhumes au moment de l'expectoration. Catarrhes pulmonaires ou Bronchites, Affections du Larynx, Granulations de la Gorge, Pharyngites, Extinctions de voix, Catarrhes nasopharyngiens, dans l'Ozène et autres maladies du nez et de la gorge, les Diathèses arthritiques, herpétiques, rhumatismales, et en lavements contre les oxyures.

Enfin l'effet curatif est surprenant dans la plupart des Eczémas, dans l'Acné et en général dans toutes les affections de la peau.

Le *Sulfureux Pouillet* s'emploie en boisson ou en bains. Il est des plus efficaces en vaporisations et pulvérisations.

Mode d'emploi. — *Boisson* : 1 mesure pour un verre d'eau ou de lait tiède, le matin à jeun ou matin et soir.

Pour oxyures : en lavement 5 jours de suite.

Pour inhalations : 1 mesure pour un verre d'eau très chaude.

Echantillons sur demande. Prix : 10 fr. 50

SULFUREUX POUILLET

pour bains et lotions.

Un flacon pour un bain d'adulte.

Un demi-flacon pour un bain d'enfant.

1 cuillerée à café pour 2 litres d'eau (pour lotions).

Prix : 6 fr.

Laboratoire **POMPANON**

62, rue du Cardinal-Lemoine — PARIS (V^e).

SULFURINE DU DOCTEUR LANGLEBERT

Composition. — A base de : Carbonate neutre de sodium, de soufre spécial et de chrome.

Action :

La *sulfurine* donne, par sa dissolution dans l'eau, un bain alcalin sulfuré ; et réalise, à domicile, le bain hygiénique par excellence.

Indications. — Dermatoses, rhumatisme chronique, traumatismes, blessures, diabète, lymphatisme, scrofule, anémie, chlorose, rachitisme, convalescences, déchéance organique.

Bain hygiénique, tonique et fortifiant. N'abîme pas les baignoires.

Mode d'emploi. — Une boîte pour un grand bain. Utiliser, pour les soins de la toilette et dans les dermatoses, le savon *Sulfurine Langlebert*.

ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS.

SULFURION

(Procédé A. Lancien)

Description. — Complexe colloïdal électrique isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

Indications. — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorrhagique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

Laboratoires Ch. GOUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

SULFURYL MONAL

Formes. — Deux formes.

Usage interne : Pastilles agréables à sucer ou à croquer.

Usage externe : Comprimés inhalants pour gargarismes, inhalations, pulvérisations, etc.

Composition. — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

Doses. — *Usage interne :* Croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour.

Usage externe : 1 comprimé dans un récipient d'eau chaude chaque 4 minutes.

Propriétés. — Permet d'instituer d'une façon active partout et en toute saison la *médication sulfureuse interne et externe.*

Action. — Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges.

Indications. — Affections de la gorge et des voies respiratoires, Grippe, Coqueluche, Lymphatisme, Rhumatismes, Syphilis, Maladies de la peau, Etats infectieux et post-infectieux.

Le tube de 30 pastilles (Sulfuryl Monal) ; 12 francs.

Le flacon de 30 comprimés (Sulfuryl Monal Inhalant) : 12 francs.

Laboratoires MONAL et C^{ie}

6, rue Bridaine — PARIS.

SULF-Y

Composition. — Fénugrec et soufre.

Forme. — Granulé sucré et anisé.

Indications. — Amaigrissement, affections chroniques du poumon (toux opiniâtre, bronchites chroniques, bronchites suspectes, prébacillose, bacillose) et de l'intestin (entérite bacillaire, entérites chroniques, infections intestinales).

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

M. SALAVERT

SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde).

SUNOXOL

Sulfate neutre d'ortho oxyquinoléine.

Sunoxol. — Sulfate neutre d'ortho oxyquinoléine.

Propriétés. — Antiseptique ni irritant, ni caustique, ni toxique, ne coagulant pas les albumines, à action double : 1^o Antiseptique : arrête le développement des microorganismes à doses infinitésimales ; 2^o biologique en stimulant les défenses naturelles des cellules.

Indications. — Spécifique des épidermomycoses. Antiseptique de choix dans toutes les infections de la peau, des muqueuses : pansements, instillations, injections.

Présentation. — Solution hydroglycérinée à 33 p. 100 2,5 cc. par litre, X gouttes par verre = solution à 1/1 000.

Posologie. — Suivant le cas, solution telle quelle, ou à 1/100 ou 1/1 000.

Produits RAL

Etablissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

SUPER-DIGESTIF LEGRAND

Antigastralgique.

Indications. — Hypopepsie, Hyperchlorhydrie, Fatigue de l'estomac, Fermentations, Pyrosis, etc.

Muqueuse ulcérée.

Médication prénéoplasique.

Posologie. — 1 cachet après les trois repas.

Prix : 15 francs la boîte de 30 cachets.

Laboratoire DU SIÈCLE

94-96, rue Monge — DIJON.

SUPERNUCLÉINE LEGRAND

Reconstituant cellulaire.

Indications. — Chlorose, Cachexie, Anémie, Asthénie, Intoxications intestinales, prétuberculose et néoplasmes. (Littérature discrète sans aucune mention de ces deux derniers cas.)

Posologie. — 1 à 3 cachets par jour avant les repas, suivant la gravité du cas.

Prix : 15 fr. la boîte de 30 cachets.

Laboratoire du SIÈCLE

94-96, Rue Monge — DIJON

SUPPARGYRES

du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, *voie recto-portale (voie rectale)*, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

Forme. — Adultes. — Suppositoires à 0.04 cgr. de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourrisson et enfants de 1 à 10 ou 11 ans : 0,02 cgr.

Dose. — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

Nota. — Hg. vif est et reste supérieur à tous les sels, toujours instable. Le seul anti-syphilitique *indiscutable et indiscuté*. Sa véritable voie d'absorption est la *voie rectale* parce que tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif. On mélange à une solution d'arséno benzol des tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'*EXTRAIT de FOIE*, les tréponèmes sont foudroyés. **Peuvent être prescrits comme désinfectants ou hepatogenes.**

(Expériences de Levaditi.)

Laboratoire du Docteur TISSOT
24, boulevard de Clichy — PARIS

SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif, local et général.

FORME. — Suppositoires.

Composition. — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame et de sénéçon, beurre de cacao.

Propriétés thérapeutiques. — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles et, en général, celles qui ont pour siège les organes pelviens, les règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc...

Mode d'emploi. — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un **Suppo-Gynal**. Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les suppo-gynals dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr.)

Prix : 12 francs.

Laboratoires LEES
124, rue du Bac — PARIS.

SUPPOSITOIRES A L'ESCULÉOL

Contre les hémorroïdes.

Adrénaline, stovaine, extrait de marron d'Inde et d'Hamamelis, Euproctol.

Avantages. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants.

Ne provoquent aucun choc local et atténuent rapidement les douleurs.

Mode d'emploi. — Un suppositoire matin et soir et après chaque garde-robe pendant les crises. Pour les chroniques, un suppositoire par jour.

Prix : 12 fr.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

MICHEL DELALANDE
16, rue Henri-Regnault
COURBEVOIE (Seine).

SUPPOSITOIRES AU NESTOSYL

Anesthésiques par contact.

Caractéristiques. — Association d'éthers des séries phthalique et paraaminobenzoïque puissamment anesthésique par contact. Aucun produit des tableaux A et B. Antiseptique.

Indications. — Suppression rapide de la douleur, antiseptie et décongestion, dans : Hémorroïdes internes, prurit anal, fistules, fissure, constipation douloureuse, plaies anales ou rectales, prostatite, cystite, ténésme, douleurs du bas-ventre, douleurs post-opératoires, règles douloureuses, coliques néphrétiques, etc.:

Posologie. — Un à deux suppositoires renouvelés suivant les besoins. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer concurremment la pommade au Nestosyl.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du NESTOSYL

P. BAUDE, Pharmacien

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 96-46.

Adr. télégr. : Nestosyl, 27, Paris.

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Suppositoires à la Glycérine solidifiée, pour adultes et pour enfants.

Mode d'emploi. — Mouiller légèrement le suppositoire, en le trempant dans l'eau chaude, puis l'introduire dans l'anus par la pointe. Lorsqu'il est complètement enfoncé, le pousser profondément avec le doigt, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le contact du suppositoire.

Indications. — Prescrits contre la constipation chez l'adulte et chez l'enfant.

Les Suppositoires Chaumel à la glycérine solidifiée se préparent également aux principaux médicaments, pour leur administration par la voie rectale.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

Composition. — A base d'Arsénobenzol (606).

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement 24 jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

Présentation. — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 de 606.

(Prix : 18 francs.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr. 03 de 606.

Prix : 16 francs.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01 de 606.

Prix : 15 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. — Tél. : Carnot 78-11.

SUPPOSITOIRES GONNON

(Glycérine dans du beurre de cacao.)

Pour enfants : 1 gramme de glycérine.

Pour adultes : 2 grammes de glycérine.

Indications. — Constipation, Hémorroïdes.

Ils présentent l'avantage des lavements de glycérine sans en avoir les inconvénients ; sont appréciés par les personnes qui voyagent.

Prix : 7 francs la boîte

de 12 suppositoires pour enfants
ou de 10 suppositoires pour adultes.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SUPPOSITOIRES HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

2 Titrages :

Adultes : 0,06 Onguent napolitain, soit 0,03 Hg. métal.

Enfants et Nourrissons : 0,03 Onguent napolitain, soit 0,015 Hg. métal.

Originalité. — Préparés entièrement à froid, ce qui assure une exacte répartition de mercure dans le produit fini. Aussi ils sont très *bien tolérés*, ne causant ni ténésme, ni diarrhées, ni coliques.

Présentation dissimulée. — Sans indication de maladies, ni de nature de produit actif.

Posologie. — Un le soir au coucher, pendant 20 jours de suite.

Prescription. — De préférence, intercaler une période de 20 jours d'Elixir Hymel entre deux périodes de suppositoires Hymel.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

SUPPOSITOIRES LOGEAI

Composition :

Extrait d'Hamamélis.....	0,33
Sulfoïchtyolate de Soude.....	0,33
B. Cacao.....	Q. S.

Par suppositoire.

Indications. — Hémorroïdes internes et rectite concomitante.

Propriétés. — Atoxiques, analgésiques, décongestionnants, vaso-constricteurs. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite.

Ni cocaïne, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques. Prescription facile sans contre-indication.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir après lavage un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Prix au public : 13 fr. 75.

Laboratoires Émile LOGEAI

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénostyptiques.)

Adrénaline	0 gr. 00015
Stovaine	0 gr. 025
Anesthésine	0 gr. 025
Ext. de Marron d'Inde frais stabilisé	0 gr. 05

Pour un suppositoire.

Dose et mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes ; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, astringents, anesthésiques, calmants, antiseptiques.

Indications. — Traitement rationnel des Hémorroïdes.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).

SUPPOSITOIRES PACHAUT

**Huile de Palma Christi, Glycérine,
Beurre de cacao.**

Traitement de la CONSTIPATION

S'introduisent par la grosse extrémité. Leur forme bi-conique spéciale permet, sous l'effet des contractions du sphincter, une ascension dans le rectum.

Présentation :

- 1^{re} Boîte de 12 suppositoires pour *adultes*.
- 2^e Boîte de 12 suppositoires pour *enfants*.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS
Téléph. : Lab. 16-72

SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao — Glycérine)
pour Bébés, pour Garçonnetts,
pour Adultes.

CONSTIPATION. HEMORROÏDES

La boîte : 12 fr. 50.
La 1/2 boîte : 7 fr. 50.

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie
56, boulevard Péreire
PARIS.

SUPPOSITOIRES PYRAX

Médication sédative et antithermique de
choix dans toutes les maladies de l'En-
fance. Action antithermique (Quinine).
Action tonidiurétique (aspirine caféinée).

Deux dosages. — Bébés jusqu'à 3 ans.
Enfants au-dessus de 3 ans.

Présentation. — 3 étuis de 2 suppositoires
par boîte.

Emploi. — 1 à 3 par jour.

Toutes Pharmacies, la boîte bébé : 7 fr. 50.

La boîte enfants : 9 francs.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle
des médicaments sous les Nos 155-4 et 155-5.

Échantillons :

Laboratoire CHAVIALLE

70, Grande-Rue — SÈVRES (S.-et-O.).

SUPPOSITOIRES ROCAV

Médication mercurielle active et d'un emploi particulièrement commode.

Les suppositoires ROCAV ne provoquent pas d'épreintes. Leur forme particulière facilite l'introduction et surtout la pénétration profonde dans le rectum, condition optima d'absorption du médicament.

Dosage. — *Adultes* : 0,05 Hg vif. *Enfants* : 0,025 Hg vif.

Indications. — Traitement d'usure. Syphilis hépatiques, Syphilis du tube digestif.

Mode d'emploi. — Un suppositoire tous les deux jours le soir en se couchant.

Prix : *Adultes* : 20 francs. *Enfants* : 18 francs.

NOTA. — Le conditionnement de ce produit ne porte aucune indication concernant sa composition ou son emploi thérapeutique.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLES

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

SUPPOSITOIRES SFÉAT

Traitement dissimulé de la Syphilis par l'huile grise argentique.

Généralités. — A côté de l'huile grise argentique injectable, les Laboratoires SFEAT préparent des suppositoires à l'amalgame d'argent présentés à la vente sans aucune mention de formule ni d'indications.

On sait l'avantage du traitement mercuriel par voie rectale qui permet l'activation par le foie et en facilite l'absorption. Les suppositoires SFEAT possèdent les avantages suivants :

Tolérance remarquable. — Due à la finesse de la préparation et à la constance de la composition.

Renforcement d'activité. : Par la présence d'argent métallique dans la combinaison moléculaire.

Mode d'emploi et posologie. — 1 suppositoire chaque soir pendant 10 à 20 jours.

Deux dosages

Suppositoires : *Adultes* : à 0 gr. 05 Hg, et 0, 025 d'Ag.

Suppositoires : *Infantiles* : à 0 gr. 02 Hg et 0, 01 d'Ag.

Prix :

Suppositoires SFEAT adultes. La boîte de 12 : 20 fr.

Suppositoires SFEAT enfants. La boîte de 12 : 16 fr.

Echantillons et littérature :

Laboratoires S. F. E. A. T.

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

SUR-BI-CAL

Formule du D^r Martin du Theil.

Forme. — Cachets.

Composition. — Phosphate bicalcique, 0 gr. 50 ;
Solution d'adrénaline au millième, 1 goutte pour
1 cachet.

Propriétés. — Particulièrement assimilable en
raison de sa solubilité dans tous les acides faibles
y compris les acides de fermentation.

Indications. — Toutes les indications des phos-
phates de chaux.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cachets par jour
au milieu des repas.

Enfants : 1 cachet par jour.

On peut aussi délayer le contenu du cachet dans un
peu d'eau ou de lait.

Laboratoires LACOMBE et Cie
42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e)

SYLCASE

Silicium — Calcium

Formule du Docteur CRETIN.

Rachitisme.

Fractures, toutes maladies osseuses.

Comprimés, Granulé, Poudre.

Prix : 15 francs.

Laboratoires GRYSA

7, rue Saint-André — LE MANS.

C. LÉTANG, pharmacien.

SYMPATHYL

Chantereau

La première synergie médicamenteuse constituant, non pas seulement un sédatif, mais un régulateur complet des dystonies organo-végétatives.

Forme. — Comprimés.

Indications principales. — Emotivité, Irritabilité, Anxiété, Eréthisme cardiaque, Angor, Spasmes, Asthmes, Troubles thyroïdiens, Séquelles d'hystérectomie et d'ovariotomie, Syndromes solaires.

Composition :

Extrait spécial de crataegus	0,06
Extrait de boldo	0,01
Phénylméthylmalonylurée.....	0,01
Hexaméthylènetétramine.....	0,06
Peptone polyvalente	0,03

Pour 1 comprimé.

Posologie. — 3 à 8 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

Laboratoires CHANTEREAU

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

SYNCRINES CHOAY

Nature. — Associations opothérapiques correspondant aux principaux syndromes glandulaires.

Formes pharmaceutiques et posologie :

Cachets et Comprimés, en tubes hermétiques :
2 à 4 par jour.

Ampoules injectables, désalbuminées, stérilisées : 1 cc, tous les 2 jours.

Nomenclature des principales formules :

- | | |
|-------------------|--|
| 1..... | Pluriglandulaire F. |
| 1 <i>bis</i> | Pluriglandulaire M. |
| 2..... | Surréno-Hypophysaire. |
| 3..... | Thyro-Surréno-Hypophysaire. |
| 3 <i>bis</i> | Thyro-Surréno-Ovariennne. |
| 4..... | Thyro-Ovariennne. |
| 4 <i>bis</i> | Surréno-Ovariennne. |
| 5..... | Thyro-Orchitique. |
| 6..... | Hypophyso-Orchitique. |
| 6 <i>bis</i> | Hypophyso-Ovariennne. |
| 7..... | Thyro-Hypophyso-Ovariennne. |
| 8..... | Pluriglandulaire digestive :
PEPTOSTHÉNINE (Voir ce mot). |
| 9..... | Surréno-Hypophyso-Ovariennne. |
| 10..... | Placento-Mammaire. |
| 11..... | Ovaro-Mammaire. |
| 12..... | Spléno-Médullaire. |

Prix :

De 15 à 25 fr. la boîte de 24 à 30 cachets ou comprimés, suivant formule.

15 fr. la boîte de 6 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

Téléphone: Auteuil 44-09 et 44-10.

SYNERGYL VADAM

Stimulant et Leucocytogène.

Formes. — *Ampoules et Granulé.*

Doses. — Une ampoule tous les 2 jours (ou une cuillerée à café de granulé 2 fois par jour), chez tous les déprimés et convalescents.

Composition. — Nucléophosphate de soude et de chaux associé aux arsenicaux assimilables et à la strychnine (0,001 par ampoule).

Prix : Boîte 12 ampoules : 18 francs. — Boîte 200 gr. granulé : 15 francs.

Demander Echantillons et Littérature aux

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en Pharmacie

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III^e).

SYNTHALINE B

Marque déposée.

Médicament **antidiabétique « per os »**.

Dichlorhydrate de dodécaméthylène de guanidine.

Forme. — Flacons de 60 dragées à 0 gr. 005.

Indications. — Cas légers et moyens du diabète sucré.

Contre-indications. — Coma ou état précomateux, ainsi que diabète grave et avancé du jeune âge.

La *Synthaline* se complète avec l'Insuline et peut être employée concurremment soit pour diminuer les piqûres, soit pour renforcer l'action de l'Insuline.

Laboratoires CRUET

13, rue Miollis — PARIS (XV^e).

TABLETTES HOVA

(ou Hovalettes).

Composition. — Chaque tablette renferme *cinq centigrammes* d'extraits dialysés, dont un tiers de HOUBLON et deux tiers de VALÉRIANE.

Propriétés. — Sédation inoffensive et *progressive* du système nerveux, dispensant de l'emploi du chloral, des bromures et des dérivés barbituriques.

Indications. — *Toutes les affections d'origine nerveuse* : Surexcitation, Insomnie, Neurasthénie, Troubles de la ménopause. Se prescrit également aux enfants dont le sommeil est agité; aux vieillards, pour combattre les battements de cœur et autres manifestations de l'artériosclérose.

Mode d'emploi. — 3 à 4 tablettes 3 fois par jour, aux deux repas et au moment de se coucher. Demi-dose pour les enfants.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e).

TABLETTES PERROUD

La « Tablette Perroud » est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *Gastralgie*, *Hypersécrétion*, dans les *fermentations intestinales*, à petites doses seule ou associée, la « Tablette Perroud » rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON
(anciennement, 7, rue des Archers)

TABLETTES ZEVA

Formule. — Extrait stabilisé d'ovaire. Extraits secs d'hydrastis, hamamélis, viburnum, bourdaine, kola. Excipient spécial.

(Aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures.)

Présentation. — Tablettes de 1 gr. équivalentes à 0 gr.03 d'extrait ovarien et environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable. Conservation parfaite.

Posologie. — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jours par mois. (Aucune contre-indication.)

Indications. — Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Prix : 15 francs.

Laboratoire H. GLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE
Médaille d'Or : Strasbourg 1927.

TABUROL MONAL

Dynamogène, Hématopoiétique, leucoocytogène.

Trois formes. — Ampoules, Dragées, Gouttes.

Composition. — Hémoglobine, manganèse, strychnine, fluor, méthylarsinate, glycérphosphate, acide nucléinique. Dans les ampoules, pas hémoglobine.

Doses. — 4 à 6 dragées par jour aux repas. Avaler sans croquer. — XV à XX gouttes avant les repas. — 1 ampoule chaque jour.

Action. — Stimule la nutrition cellulaire. Restaure les déficiences nerveuses. Reminéralise l'organisme.

Indications. — Etats anémiques, convalescences, troubles palustres, dépression nerveuse.

La boîte de 10 ampoules : 15 francs.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

Le flacon de gouttes : 12 francs.

Laboratoires MONAL et C^{ie}

6, rue Bridaine — PARIS.

TACHYGASTRINE DUCLOY

Accélérateur physiologique des sécrétions gastriques totales.

Forme. — Liquide.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-Albumoses-chlorures de sodium-magnésium calcium.

Propriétés thérapeutiques. — *Eupeptique complet excitant : des nerfs gustatifs et sécrétoires par l'acide fumaro-protocétrarique amer et anti-nauséux ; de la sécrétion acide par les alcalins choisis ; de la sécrétion pepsique par l'albumose.*

Indications. — Toutes les insuffisances sécrétoires de l'estomac :

Primitives : Dyspepsies et gastrites qui s'accompagnent d'hypo-pepsie ou d'apepsie, d'hypochlorhydrie ou d'anachlorhydrie, d'achylie, atonie gastrique — cancer de l'estomac.

Secondaires : Intoxication cancéreuse quelle que soit la localisation du néoplasme ; — dyspepsie et anorexie des tuberculeux, des chloroanémiques, des névropathes, des enfants débilités ou rachitiques, des femmes enceintes, des brightiques anorexiques, des convalescents, des nourrices ; *diarrhées gastrogènes* des achyliques, des gastro-entérostomisés, des nourrissons ; — anorexie et dyspepsie des nourrissons.

Contre-Indication. — Hyperchlorhydries et hyper-sécrétions.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 cuill. à café par jour. On peut aller jusqu'à 6 cuill. à café par jour.

Prendre le médicament dix minutes avant les repas matin, midi et soir ou midi et soir seulement ; dans une demi-tasse à thé (50 à 60 cm.) d'eau bien chaude ou mieux de bouillon de viande ou de légumes non salé.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée sans inconvénients.

Nourrissons : V gouttes 2 à 3 minutes avant chaque tétée dans une cuillerée à café d'eau.

Enfants : De 5 à 12 ans accomplis ; VIII gouttes par année d'âge, 5 minutes avant les repas principaux.

A partir de 12 ans : comme chez l'adulte.

Prix : 20 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).

TÆNIFUGE BARDET

Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

Composition. — Préparation liquide à base d'Aspidium Filix Mas, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal, lui conférant un maximum d'activité.

Indications. — Médication anthelminthique complète : Taenias, Ascarides, Oxyures, Ankylostomes, Tricocéphales et tous parasites intestinaux.

Présentation. — Dans la même boîte se trouvent : a) Le Taenifuge proprement dit ; b) Le Purgatif.

Posologie. — **Tænias.** — La veille, alimentation lactée. Absorber à jeun en 2 fois à 20 minutes d'intervalle le Taenifuge aux doses suivantes :

Adultes : la totalité du contenu du flacon ;

Adolescents de 15 à 20 ans : 8 à 10 cuillerées à café.

Enfants de 10 à 15 ans : 6 à 8 cuillerées à café.

Enfants de 3 à 10 ans : 2 à 6 cuillerées à café.

Une heure après, prendre le Purgatif mélangé à une infusion tiède, aux doses respectives suivantes : contenu du flacon : 4 à 5, 3 à 4, 1 à 3 cuillerées à café.

Tous les autres vers. — Pendant 4 jours consécutifs, donner le Tænifuge le matin à jeun aux doses suivantes :

Adultes : 1 cuillerée à soupe ;

Adolescents de 12 à 20 ans : 1 cuillerée à dessert ;

Enfants de 3 à 12 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Le 5^e jour, administrer le Purgatif à jeun, aux doses ci-dessus. Renouveler le traitement, plusieurs fois s'il y a lieu, à intervalle de 10 jours maximum.

Formuler : « TÆNIFUGE BARDET ».

Echantillon et Littérature détaillée.

Laboratoires BARDET

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

TÆNIFUGE DU D^r JACQUÈME

Composition. — Liquide en capsules à base d'Aspidium, Filix Mas et de Podophyllin en solution huileuse chloroformée par procédé spécial.

Indications. — Expulsion radicale du tænia.

Avantages — Aucune toxicité. Absorption de 4 capsules seulement pour adultes. Enfants, petites capsules spéciales dont le nombre varie de 3 à 12 ans. Indiquer l'âge.

Mode d'emploi. — Au repas du soir prendre seulement un demi-litre de lait sucré, le lendemain matin avaler les capsules avec un demi-verre d'eau.

Effet : deux heures au maximum.

Prix : 20 francs.

Laboratoires CHIARINI

68, rue du Roi-René

AIX-EN-PROVENCE,

TÆNIFUGE FRANÇAIS DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait chloroformo-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

Indications. — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

Caractéristiques. — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt du travail, absorption particulièrement simple, *non toxique*.

Mode d'emploi. — Absorption de capsules le matin à jeun, en 10 minutes, avec *aussi peu de liquide que possible*. Action au bout d'une heure ou deux. Si malaise ou nausées, absorption d'un peu de café ou de thé.

Doses. — *Adultes* : 12 capsules. *Enfants* au-dessous de 12 ans : autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).
Anciennement : 10, rue de Turenne — PARIS (IV^e).

TÆNIFUGE KIRN

En capsules

à base de filicine, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des tænicides, comme la pelletiérine.
(Travaux de thèse de Kirn et Schmid).

Capsules Kirn. — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme ; sans calomel.

Mode d'emploi. — 1^o Avant-veille, purgation ; 2^o la veille, diète presque absolue (lait) ; 3^o le matin à jeun l'absorption de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog, suivie à nouveau d'une légère purgation.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement observées.

Enfants : Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

PARIS-OUEST

Précédemment :

8, rue de la Source — PARIS (XVI^e). Tél. : Aut. 11-86

TAMAR INDIEN GRILLON

Laxatif végétal doux et agréable.

Présentation. — Bonbons chocolatés à la pulpe de tamarin et au sené ; ne renferme aucun produit chimique, n'irrite pas l'intestin.

Recommandé aux femmes et aux enfants.

Doses. — Un bonbon le soir en se couchant.

Enfants : Un bonbon ou 1/2 bonbon en prenant le repas du soir.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : Boîte de 12 bonbons : 9 francs.

Société du TAMAR INDIEN GRILLON

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

TAMARINE

Délicieuse confiture laxative à base de Casse muette et de Tamarin, infaillible dans tous les cas de constipation et de stases intestinales.

Posologie :

Enfants au-dessus de 5 ans : 1/2 cuillerée à café.

Adultes : 1/2 à 1 cuillerée à café à la fin du repas du soir.

Laboratoire de la TAMARINE

4, route de Médoc

BORDEAUX-BOUSCAT

TAMPOL « ROCHE »

Pansement gynécologique idéal.

Le *Tampol « Roche »* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

Mode d'emploi. — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol « Roche »* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait*.

N.-B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol « Roche »* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

TANNO-CALCINE

Médication reminéralisante.

Gluconate de Ca, Phosphate de Ca, Extrait hépatique, Tannin purifié.

2 formules :

TANNO-CALCINE A Contenant 0,05 de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

TANNO-CALCINE B Contenant 0,15 de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

Indications. — Convalescence, Grippe, Surmenage, Tuberculose, Croissance, Lymphatisme, Adénopathie.

2 cachets par jour.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Bd Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE — PARIS-ouest

Précédemment :

8, rue de la Source — PARIS (XVI^e).

Téléphone : Auteuil 11-86.

TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

Forme. — Cultures liquides.

Composition. — Excipient : Bouillon de Viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

Propriétés thérapeutiques. — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade en apportant une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des microorganismes qui assiègent l'individu continuellement.

Indications. — Gastrites, Entérites, Entérocolites, Intoxications alimentaires, Diarrhées chroniques, Dysenteries, Insuffisance hépatique, Appendicite chronique, Néphrites coli-bacillaires, Albuminurie, Impétigo, Eczéma, Furunculose, Pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (Grippe, Fièvres typhoïde et para-typhoïde) *comme agent anti-infectieux.*

Posologie. — De 1 à 2 flacons-ampoules par 24 heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas de récurrence.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

Prix de vente au public : 20 francs.

Laboratoires MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

Téléphone : Anjou 16-55.

TARTRATE BORICO- POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique pur à faire dissoudre au moment de l'emploi.

Conservation parfaite.

Indications. — Epilepsie, troubles névropathiques.

Présentation. — En boîtes de 30 tubes dosés à :
0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr., 8 gr.

Posologie. — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour pour les adultes. Dépouvé de toute toxicité, doit être pris chaque jour sans interruption jusqu'à guérison.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre le contenu d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en 2 ou 3 fois dans les 24 heures.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

Téléph. : Lab. 16-72

TAXOL

Composition :

Poudre de muqueuses intesti- nales.....	0 gr. 05
Extrait biliaire.....	0 gr. 10
Agar-Agar.....	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 05

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance. Non toxique.

Indications. — Constipation, Entérite chronique, Entérocolite, Dermatoses.

Doses et mode d'emploi. — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par deux comprimés après un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Prix de vente au public : 12 francs.

Laboratoires « LOBICA »

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

T. B. X. METACRYSINE

Indications. — Tuberculoses osseuses, ganglionnaires, rénales, testiculaires et cutanées.

Formes :

Ampoules de 1 cc. pour traitement interne.

Ampoules de 2 cc. pour traitement externe.

Mode d'emploi :

1^o *Traitement interne de choc à appliquer dans tous les cas.*

Injection intramusculaire profonde tous les 2 jours : ampoules de 1 cc.

La boîte de 6 ampoules 1 cc. : 25 francs.

(Toutes pharmacies).

2^o *Traitement externe complémentaire à appliquer en cas de fistules, plaies ou lésions cutanées.*

Pansements ou injections-irrigations tous les jours ou tous les 2 jours suivant l'intensité de la suppuration : ampoules de 2 cc.

La boîte de 10 ampoules 2 cc. : 25 francs.

(Toutes pharmacies).

Chloro T. B. X. — L'emploi du T. B. X. sous toutes ses formes doit toujours être accompagné de l'administration de Chlorure de Calcium par voie buccale.

Prescrire Chloro T. B. X.

Le flacon : 12 francs. (Toutes pharmacies).

Laboratoires M. A. WOLLACKER

S. O. G. I. P., 73, rue Général Sarrail — LE HAVRE

TEBEPHAGUINE FORNET

Vaccin antituberculeux.

Principe actif. — Bacilles de Koch isolés des affections tuberculeuses les plus diverses ; dégraissés par le procédé FORNET, breveté en France et retenu par l'Institut Pasteur.

Indications. — Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire, osseuse et autres.

Posologie. — 1 à 3 pilules par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Après une réaction locale et générale, légère diminution et disparition de la fièvre, des sueurs, de la Toux, des Douleurs et de la Faiblesse. Augmentation du poids et des forces. Amélioration de l'appétit, du sommeil et de l'état général.

Prix : 36 francs.

Vente et Echantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie.

23, rue du Caire — PARIS (11^e).

Service d'Etude et de Fabrication

Institut de Microbiologie.

SARREBRUCK (Sarre).

TÉCARINE

Homocaféinate de sodium.

Diurétique déchlorurant.

Présente sur la théobromine l'avantage de ne pas provoquer de troubles gastriques ni de céphalée.

Indications :

Toutes les indications de la Théobromine.

Posologie et mode d'emploi :

Voie buccale : 1 à 3 comprimés à 25 centigr. par 24 heures.

Voie hypodermique ou intramusculaire : 1 à 3 ampoules de 2 cc. par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

TEINTURE DE SUNOXOL

Teinture de Sunoxol. — Solution alcool-acétonique de chlorhydrate d'ortho-oxyquinoléine.

Propriétés. — Antiseptique ni irritant, ni caustique, ni toxique, ne coagulant pas les albumines, à action double : 1^o antiseptique à doses infinitésimales ; 2^o biologique en stimulant les défenses naturelles de l'organisme.

Indications. — Remplace la teinture d'iode dans la désinfection de la peau et des plaies et l'alcool iodé dans les épidermomycoses. Avantage : n'étant pas caustique, peut être appliquée quotidiennement aussi longtemps que nécessaire.

Présentation. — Flacon de 25 cc. de solution à 2 p. 100.

Posologie. — Est employée en badigeonnage comme la teinture d'iode.

Produits RAL

Etablissements KUHLMANN

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

TERGYL LAMO

Spécialité dermatologique.

1° POMMADE :

Composition. — Sulfo-Ichthyolate Amm., S/Galate de Bismuth, Oxyde de Titane, Onguent de Naphte, Chlor. de Mg., Huile Adrénalinée.

Indications. — La plupart des Eczémas, Acnés, Rougeurs des Nouveau-nés, Prurits, etc.

Prix au public : Petit tube : 6 francs.

Tube moyen : 10 francs. — Triple tube : 23 francs.

2° POUDRE (C. T. L.).

Composition. — Chlor. de Mg., Sulfo-Ichthyolate d'Amm., Extrait mou Hamamélis, Onguent de Naphte, Ceyssatite, Kaolin, Oxyde de Titane, etc.

Indications. — Complément de la pommade; mêmes indications thérapeutiques. Parfum léger.

Prix au public : la boîte : 6 francs.

Laboratoires LAMO

26-28, rue Paul-de-Kock. — PARIS (XIX^e)

TERKAL MONAL

Forme. — Dragées.

Composition. — Carbonate de gaïacol ter-pino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné et aux extraits de plantes béchiques.

Dose. — Quatre à six dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

Action. — Calmantes, Expectorantes, Curatives, Reminéralisatrices.

Indications. — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Le flacon de 40 dragées : 10 francs.

Laboratoires MONAL et C^{ie}

6, rue Bridaine — PARIS.

TERPINE GONNON

Présentation et composition. — *Elixir* : Terpene dissoute dans l'alcool et sirop de Tolu (1 verre à liqueur = 0 gr, 20 de terpene).

Pilules : Terpene, 0 gr. 10 ; Codéine, 0 gr. 005 ; Benzoate de soude, 0 gr. 15.

Pâte : Terpene, aconit, benzoate de soude, Tolu, Terpinol.

Pastilles : Terpene 0 gr. 05 et Tolu.

Propriétés thérapeutiques. — Augmente et fluidifie la sécrétion bronchique.

Posologie. — *Elixir* : 2 à 4 verres à liqueur par jour.

Pilules : 4 à 6 capsules par jour.

Pâte : 15 à 20 morceaux par jour.

Pastilles : 8 à 10 pastilles par jour.

Indications. — Toux, rhumes, catarrhes, bronchites, emphysème. Employée aussi avec succès contre les maladies des voies urinaires et contre les affections du système nerveux.

Elixir : 20 fr. ; *Pilules*, 8 fr. ; *Pâte et pastilles*, 4 fr. 50.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

TERPINE GRANULÉE BARON

Composition. — Terpene pure et benzoate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies respiratoires, facilite l'expectoration et tarit les sécrétions bronchiques ; diurétique et antiseptique urinaire.

Indications. — Rhinites, Laryngo-Trachéites, bronchites aiguës, subaiguës, chroniques ; catarrhe bronchitique des emphysémateux ; Bronchorrée ; Dilatation des bronches ; Coqueluche ; Cystites ; Infections urinaires, etc...

Doses. — 2 à 4 cuillerées mesures par jour. *Enfants* : demi-dose.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V°).

TERPOXYL INTERNE

du Docteur Barinque.

Liquide générateur d'oxygène à l'état naissant
au-dessus de 35° C.

Composition. — Solution alcoolique faible de Terpènes peroxydés.

Propriétés. — Anti-thermique, anti-toxique, tonique et stimulant.

Indications. — Toutes dépressions ; choc hémoclasique ou autres ; Pneumonie (régression fébrile en 24 heures). Toutes maladies infectieuses.

Posologie. — Fièvre intense : XV gouttes toutes les heures dans 1/4 verre d'eau sucrée ; espacer avec la régression fébrile.

Régime : XV gouttes, quatre fois par jour.

Prix du flacon : 15 fr.

TERPOXYL EXTERNE

du Docteur Barinque.

Cède son oxygène à l'état naissant au-dessus de 35° C.
Cicatrisant rapide. — Atoxique. — Non caustique.

Composition. — Solution alcoolique faible de sesquiterpènes peroxydés,

Propriétés. — Désinfectant et désodorisant parfait pour toutes plaies, même cancéreuses, cicatrisant rapide.

Indications. — Plaies, Blennorrhagies, Affections de la peau, de la gorge, Angines, Coryzas, Otites, Mastoïdites, Sinusites, etc...

Posologie. — En solution de concentration croissante depuis 1/10 de Terpoxyd externe pour 9/10 d'eau bouillie ou distillée jusqu'à 1/2 ou pur suivant la sensibilité de la muqueuse traitée.

Prix du flacon : 18 fr.

OVULES au TERPOXYL

du Docteur Barinque.

Indications. — Leucorrhée, Métrites, Salpingites, etc.

Echantillon et littérature :

Laboratoire JOLY

1, rue Christine — PARIS (VI°).

Tél. Danton 49-89.

TÉTRANITROL ROUSSEL

Composition.

Comprimés de Tétranitrates d'Erythrol à
1, 2, 5 mmgr. et 1 centigramme.

Indications :

Hypertension : Angine de poitrine,
asthme cardiaque, œdème pulmonaire.

Doses et mode d'emploi :

Laisser fondre les comprimés sur la langue
(de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).

THALASSOTONINE VADAM

Triade leucocytogène et tonique associée à l'action
catalytique de l'Eau de Mer vraie.

Formule :

Eau de mer isotonique	5 cc.
Cadodylate de soude	5 centigr.
Sulfate de strychnine	1 milligr.
Nucléino-phosphoglycérates de soude..	10 centigr.

Posologie. — Une injection, indolore, intramusculaire tous les deux jours, ou chaque jour.

Indications. — Etats infectieux torpides, déficiences cellulaires, surmenages, neurasthénie, convalescences.

Prix au public : Boîte de 10 ampoules : 25 francs.
Echantillon et littérature sur demande.

Laboratoire J. PLÉ

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III^e).

J. PLÉ, Docteur en Pharmacie (Univ. de Paris).

THAOLAXINE

(Laxatif-régime.)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. — Paillettes, 1 à 4 cuiller. à café à chaque repas ; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas ; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas ; granulé, 1 à 2 cuiller. à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

Propriétés thérapeutiques. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DURET et RÉMY
et du Docteur Pierre ROLLAND
ASNIÈRES (Seine).

THEBAÏL

(Opium essentiel.)

Propriétés. — Le *Thébaïl* (opium essentiel), qui exclut de sa composition les alcaloïdes convulsifs et stupéfiants de l'opium et qui n'en conserve que les alcaloïdes soporifiques et calmants, donne la puissance maxima de l'opium, avec toutes les efficacités pacificatrices que l'on attend de ce précieux agent. Enfin son activité physiologique est rigoureusement dosée *in vivo*.

Formes thérapeutiques. — Le *Thébaïl* est présenté sous 2 formes :

1^o En ampoules isovisqueuses indolores dosant par cent. cube :

Thébaïl	2 centigr.
équivalant à { morphine	1 —
{ extrait d'opium.....	5 —

2^o En suppositoires dosant :

Thébaïl	2 centigr.
---------------	------------

Pocologie pour les adultes :

Ampoules.....	1 à 2 par 24 heures...	Prix 20 fr.
Suppositoires.....	1 —	— 15 fr.

Dépôt: Laboratoires NOGUÈS

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS.

Anciennement : 11, rue Joseph-Bara — PARIS.

THÉINOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-9.

Forme. — Elixir.

Composition. — Théine en combinaison salicylique, Salicylate d'Antipyrine.

Propriétés pharmacodynamiques. — Euphorique. — Antidépresseur. — Analgésique. — Régulateur des fonctions nerveuses. — Tonique circulatoire.

Indications. — Migraines. — Névralgies. — Douleurs rhumatoïdes. — Crises gastro-intestinales. — Dysménorrhées.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à dessert à une heure d'intervalle l'une de l'autre.
Le flacon ; 14 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

THÉISINE DUBAT

Granulé de Théobromine et Extrait de maïs.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique idéal dans les affections du cœur et des reins. Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; pas de céphalées, pas d'intolérance. *Granulé* de goût agréable préféré aux cachets et aux solutions par les enfants et les vieillards.

Indications. — Toutes celles de la théobromine, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, fléchissement du cœur dans l'artériosclérose, affections cardiorénales, mal de Bright, albuminurie, néphrite, maladies infectieuses et tous les cas d'insuffisance urinaire.

Doses. — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

Cuillerée à café = $\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ gr. } 25 \text{ théobromine pure.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ extrait de maïs.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ phosphate de soude.} \end{array} \right.$

Prix : 14 francs.

Echantillons sur demande

LABORATOIRE DU D^r DUBAT

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

THEMSALINE

Composition. — La Thémisaline préparée d'après les travaux du Dr Jentzer, de Genève (Voir *Traitement biologique des infections*, Masson, éditeur), est un mélange fractionné et rectifié d'essences, de résine élém., de baume du Pérou et de thymol.

Propriétés. — Agit comme antiseptique, antitoxique, analgésique, sédatif, leucogène et tonique. Attaque l'infection *étiologiquement* et non *symptomatiquement* comme tous les narcotiques.

Indications. — *Toutes les infections aiguës* : grippe et infections pyogènes, érysipèle, angines, annexites, septicémies, anthrax, phlegmons, péritonites, fistules d'origine infectieuse, plaies infectées. *Contre-indications* : éviter les doses fortes dans la pneumonie, la broncho-pneumonie, les néphrites.

Mode d'emploi. — En injections intraveineuses, pratiquées *très lentement* (durée 10 minutes environ), avec une seringue à tuberculine et, de préférence, avec l'aiguille spéciale Jentzer : 6/10 cmc. chez l'adulte et 3/10 cmc. chez l'enfant. Une injection par jour, jusqu'à guérison ou apyrexie.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e).

THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Diurétique puissant.

Indications. — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

Formes. — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50.

Prix au public : 12 fr.

Pharmacie Centrale de France

21, rue des Nonnains-d'Hyères
PARIS (IV^e).

THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé.

Prop. théér. — Possède les propriétés toni-cardiaques et diurétiques de la théobromine, mais est dépourvue des inconvénients de celle-ci ; son activité se manifeste à des doses 5 fois moindres. Elle agit quand la théobromine est inefficace et provoque l'excrétion de l'urée et des chlorures.

Indications. — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, en outre de son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'uricémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

Formes. — 1^o Solution. Dose : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau sucrée.

Une cuillerée équivaut à 0,50 gr. de Théobromine.

2^o Gouttes. — Dose : 1 cuiller mesure ou LX gouttes, une à quatre fois par jour.

LX gouttes ou une cuiller-mesure équivalent à 0,50 gr. de Théobromine

3^o Comprimés. — Dose : 2 à 8 par jour.

2 comprimés équivalent à 0,50 cgr. de Théobromine.

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS.

THÉOBRYL « ROCHE »

(Théobromine injectable).

Indications, Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres. (Voir les travaux des Professeurs Pouchet, Rémond, E. Duhot, des Docteurs Jouisse, Richard St-Yves, Bénech, Ségard, Vigoureux, Colombiès, Crampon, etc.).

Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants.

THÉOBRYL « ROCHE » AMPOULES

chaque ampoule = 2 cc.

Cette forme est indiquée quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

ADULTES : dose moyenne utile, 1/2 ampoule 2 à 3 fois par jour.

(Voir page Ampoules Théobryl.)

THÉOBRYL « ROCHE » GOUTTES

Cette forme permet de continuer et de prolonger l'action obtenue par les injections ou de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée, ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et chiendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.

Adultes : dose moyenne utile, X gouttes 4 à 8 fois par jour.

Enfants : III gouttes 2 à 6 fois par jour.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

THÉOSALVOSE

Composition. — Cachets de Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

Propriétés. — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

Indications. — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

Moded'emploi. — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 ou 4 à 8 cachets dosés à 0 gr. 25 par jour.

Formes. — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, barbiturique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Prix : 15 francs et 17 fr. 50.

Laboratoires André GUILLAUMIN
13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

THÉOVADIL

DIURÉTIQUE CONSTANT

TOUJOURS VASO-DILATATEUR

Composition. — Diméthylxanthine rigoureusement pure ne provoquant ni nausées, ni céphalée, en comprimés dosés à 0 gr. 25.

Indications. — Affections cardiaques et rénales, Albumine, Artériosclérose, Urémie, Uricémie.

Mode d'emploi. — De 2 à 12 comprimés en 24 heures délités dans un peu d'eau et répartis en 2 ou 3 doses.

Dose moyenne : 3 comprimés matin et soir.

Laboratoires du THÉOVADIL
85, rue des Morillons — PARIS (XV^e).

THÉOVERINE LALEUF

(Dragées)

Composition. — Chaque dragée contient très exactement :

Théobromine pure	0,15
Papavérine chlorhydrate.....	0,01

Propriétés et Indications thérapeutiques. — Antispasmodique et hypotenseur remarquable. Grâce à son action vaso-régulatrice et dilatatrice, la THEOVERINE rétablit une circulation normale et évite le retour des crises angineuses.

La THEOVERINE présente une action favorable à l'augmentation de la Diurèse.

Spécialement indiquée dans :

Angine de poitrine (traitement préventif).

Artério-sclérose.

Insuffisance aortique.

C'est le médicament par excellence des Cardio-Rénaux.

Doses et Mode d'emploi. — De 3 à 6 dragées par jour, suivant les indications du médecin traitant. Maximum : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).

THÉOXANTHINE

Diurétique cardio-rénal

Adjuvant précieux des cures toni-cardiaques.

Composition. — Théobromine cristallisée pure associée au phosphate disodique.

Indications. — En général toutes celles de la théobromine. Pas d'intolérance. Activité plus grande à doses moindres. Complète très heureusement les cures toni-cardiaques.

Présentation et posologie :

Cachets A : Théobromine crist. pure.....	0,50
Phosphate disodique.....	0,20

Adultes : 2 à 3 cachets par jour.

Cachets B : Théobromine crist. pure.....	0,25
Phosphate disodique.....	0,10

Enfants : 1 à 2 par jour ; Adultes, 4 à 6,

Echantillons et littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

6, rue d'Assas — PARIS (VI^e). Tél. : Littré 31-85,
Belgique : Agent général : L. Prunières
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

THERMOCÉDONE

Analgésique et antithermique.

Le **Thermocédone**, en gouttes et en suppositoires, constitue un traitement d'attaque et d'entretien de toutes les algies et de toutes les fièvres.

Le **Thermocédone** est plus actif que les cachets d'antipyrine et pyramidon, et sans aucune action n-faste sur le système gastro-intestinal. Il convient aux enfants, aux adultes, aux vieillards et aux estomacs les plus délicats.

Composition des suppositoires Thermocédone.

Chlohydrate d'anilène.	1 cgr.	
Analgsine	75 cgr.	Excipient :
Diméthyl amino antipyrine.	25 cgr.	Q. S.
Extrait de jusquiame stab.	2 cgr.	

Composition des gouttes Thermocédone

Analgsine	6 gr.	Excipient :
Diméthyl amino.	4 gr.	Q. S.

Posologie :

Suppositoires : *Adultes* : 1 à 2 par jour.

Enfants : à partir de 13 ans : 1 par jour.

Gouttes : *Enfants* : 10 à 12 par jour et par année d'âge.

Adultes : 120 à 240 par jour.

Sur prescription médicale seulement.

Prix au public. Suppositoires : Boîte de 4 : 9 fr. 50. Boîte de 8 : 15 fr. 50

Gouttes : le flacon avec compte-gouttes : 1 fr. 50.

Laboratoire PERICHON

11, rue Lepic, 11 — PARIS (XVIII^e).

THÉ SUÉDOIS

Mélange dépoussiéré et spécialement séché, de bourdaine, saponaire, verveine, menthe, matricaire.

Type du thé laxatif et purgatif *sans sené* purgeant doucement et sans coliques.

Indications. — Constipation, paresse de l'intestin.

Doses. — 1 cuill. à soupe pour une tasse d'eau comme laxatif.

2 cuill. comme purgatif.

Faire bouillir 5 minutes, laisser tremper 8 à 10 heures et absorber sacré ou non.

(...)

Laboratoires des Produits Français.

L. HERIN, ex-interne des Hôpitaux,
LA MADELEINE (Nord).

THIGÉNOL « ROCHE »

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

Indications thérapeutiques. — Dermatologie, Otorrhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100) en applications externes.

Toutes les affections gynécologiques :

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100).

Ovules « Roche » au Thigénol à 30 p. 100 (voir page spéciale).

Tampol « Roche » pansement gynécologique idéal (voir page spéciale).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

THIOCITRAN THEVENOT

Granulé soluble.

Soufre — Magnésium

Composition. — Citrate de chaux, hyposulfite de magnésium, sulfate de magnésie, oxyde de magnésie, peptone et amidon soluble.

Propriétés. — Cholagogue et antianaphylactique, Régulateur des Fonctions gastro-intestinales, Dépuratif, Tonique.

Indications. — Affections du foie et des voies biliaires. Troubles digestifs, Constipation, anaphylaxie, dermatoses, urticaires, arthritisme.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, soit à jeun le matin, soit 1/2 heure avant chaque repas. *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 125 gr. : 18 francs.

Laboratoire THEVENOT — DIJON.

THIOL « ROCHE »

Dérivé du gaïacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 ctgr. de gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi :

SIROP « ROCHE » au Thiocol.

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol « Roche »)

Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge.

CACHETS « ROCHE » de Thiocol.

(1 cachet = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)

2 à 6 cachets par jour

COMPRIMÉS « ROCHE » de Thiocol.

(1 comprimé = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)

2 à 6 comprimés par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène,
Eupeptique, Orexique.

Indications thérapeutiques :

Toutes les affections broncho-pulmonaires,
Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

THIOPHYL

Indications. — Traitement interne de la *furunculose* et de toutes les *dermatoses à staphylocoques* : acné, anthrax, orgelets, panaris, abcès de l'aisselle et du sein.

Posologie. — 3 à 9 pilules par jour en doses régulières et progressives (voir prospectus.)

Composition. — Sulfures complexes, ions calcium et charbon activé.

Propriétés. — Disparition rapide de la douleur et généralement régression des phénomènes inflammatoires dès le 3^e jour.

Le flacon de 100 pilules : 20 francs.

Echantillons gratuits :

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 76-85.

THIORINE

(Voir Sulfo-Thiorine).

THIOSOTE

Lambiotte Frères.

Sirap concentré à base de sulfo-créosolate de potassium et de teintures de Lobélie et de Drosera.

Propriétés thérapeutiques. — Bactéricide, dynamogène, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Adultes : 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : À partir de 3 ans (4 cuillerées à café par jour), à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

Nourrissons : XXV à L gouttes par jour selon l'âge par prise de V à X gouttes mélangées au lait.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS.

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

THIO-TERPINE DALIN

Médication des voies respiratoires.

Composition. — Sulfogaiacolate de potasse associé à la terpine avec benzoate de soude et codéine.

Présentation et doses :

Cachets : 2 à 3 cachets par jour (un cachet = 0,20 sulfog. potasse, 0,10 terpine, 0,007 codéine).

Elixir : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour (une cuillerée = 0,20 sulfog. potasse, 0,10 terpine, 0,007 codéine).

Granulés : 2 à 4 cuillerées à café par jour (une cuillerée à café = 0,10 sulfog. potasse, 0,05 terpine).

La forme *Granulée* ne contient pas de codéine.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections des voies respiratoires. Antisepsie broncho-pulmonaire. Tuberculose. Laryngites. Asthme. Coqueluche, etc...

Laboratoires DALIN

R. BOITAS et C^{ie}

1, rue de la Martinière — LYON.

THORIUM X RHEMDA (THORIX)

INDICATIONS. — Traitement radioactif des Rhumatismes de toute nature. Sciatique. Névrites. Anémies. Leucémie. Psoriasis.

Emploi. — *Série de 8-10 injections indolores (une par semaine). Passer la commande le lundi matin au plus tard.*

Laboratoires RHEMDA

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE
(Seine).

Téléph. : Wagram 58-89.

THOROXYL

Antiseptique intestinal - antidiarrhéique
non constipant.

Pharmacologie. — A base de terres rares, bactéricide et favorisant l'action des sucs digestifs.

Indications. — Tous les états diarrhéiques du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Tous les syndromes infectieux à point de départ intestinal (colibacillurie, etc.).

Posologie. — Aucune contre-indication. Aucune toxicité. 6 à 10 comprimés pour l'adulte ; 2 à 6 comprimés pour l'enfant et le nourrisson.

Prix au public : 12 francs.

Laboratoires du D^r LAURENT-GÉRARD
Docteur ès sciences.

Ancien chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris.

40, rue de Bellechasse — PARIS.

Tél. : Littré 97-95.

THYMO-MENTHOL EUPNIQUE BELHOMME

Indications. — Infections du nez, de la gorge, des bronches, des poumons et des organes qui en dépendent. Pré-tuberculose.

Tarit toutes suppurations de l'appareil respiratoire.

Doses. — 3 à 4 cuill. à café par 1/2 litre d'eau bouillante en inhalations.

Pour combattre la contagion : 2 cuill. à soupe dans de l'eau portée à l'ébullition dans la chambre.

Laboratoire BELHOMME

2, rue Tiron — 13, rue de Rivoli,
PARIS (IV^e).

THYROIDINE ET RADIOPHORINE GORY

Thyroidine :

Traitement et déficiences nerveuses et circulatoires, par solution rigoureusement pure de suc thyroïdien, de saveur agréable et parfaitement assimilable.

Indications. — Neuro-arthritisme, Anorexie, Aménorrhée, Migraines, Psychoses, Convulsions et Epilepsie, Refroidissement habituel et Troubles vaso-moteurs. Arrêts du développement et troubles de la croissance.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe aux 2 principaux repas.

Adolescents : 1 cuillerée à dessert aux 2 principaux repas.

Enfants : 1 cuillerée à café aux 2 principaux repas.

Prix : 25 francs.

Le traitement est heureusement complété par la **Radiophorine** (association de phosphore et phosphate) (1 gr. de phosphate et 0 gr. 025 d'acide phosphorique pur pour une cuillerée à soupe), dont les indications sont les mêmes et plus spécialement : la neurasthénie, les névroses, les psychiatries, l'anémie cérébrale, tous les épuisements nerveux, le rachitisme infantile et la destruction du sucre dans le diabète.

(Même Posologie. — Même Prix.)

Laboratoire des Produits Gory.

M. JOOSS, Pharmacien,

7 bis, rue du Général-Galliéni, — MONTREUIL (Seine).

THYROXINE « ROCHE »

Thyroxine synthétique préparée suivant les données de Harington et Barger.

Ampoules : (boîtes de 6) une ampoule de 1 cc. = 1 milligr. de thyroxine.

Comprimés (tubes de 30) : un comprimé = 1/2 milligr. de thyroxine.

Solution (flacons de 15 cc.) : 1 cc. = 2 milligr. de thyroxine.

Indications :

Obésité générale, Myxœdèmes, Goitre, Cachexie strumiprive, Troubles de la croissance et du développement, Oligurie.

Modes d'emploi et doses :

Voie buccale : 1 à 2 comprimés ou X à XV gouttes par jour et plus.

Voie intramusculaire : 1/2 à 1 ampoule par jour et plus.

Les injections peuvent être aussi endoveineuses et même sous-cutanées, celles-ci déterminant une légère sensation de tension qui disparaît rapidement.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}
21, place des Vosges — PARIS (III^e).

TIODINE COGNET

$C^6S\ N^3H^{13}I$.

Composition. — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode (47 %) avec la thiosinamine.

Propriétés. — Réalise l'Association *Iode-soufre*. Médicament organo-iodique soufré. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications.

Indications. — Toutes celles de l'iode et du soufre, ensemble ou séparément. Toutes scléroses. Hypertension. Rhumatisme chronique. Tabès. Scléroses médullaires. Asthme. Emphysème. Syphilis. Obésité, etc.

Formes et posologie. — Pilules (Tiodine : 0 gr. 05 par pilule). *Adultes* : 2 à 5 par jour. *Enfants* : 2 par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie intramusculaire, sous-cutanée ou intra veineuse).

Prix au public : Pilules — Le flacon : 13 fr.

Ampoules — La boîte : 15 fr.

Laboratoires des Produits COGNÉT

Armingeat et C^{ie}

43, rue de Saintonge — PARIS (III^e).

TOCHLORINE

Para-toluène-sulfo-chloramine sodée.

Action antiseptique durable, par mise en liberté progressive d'hypochlorite de soude (principe de la solution de Dakin).

Indications :

**Antisepsie (chirurgie générale et spécialités),
Purification des eaux de boisson.**

Posologie :

Chirurgie générale : Solution aqueuse à 2 p. 100.

Urologie : Solut. de 0,10 à 0,50 p. 100.

Gynécologie : Sol. de 0,5 à 2 p. 100.

Stomatologie : Solut. à 1 p. 100.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon. — PARIS (VIII^e).

TONICALCINE

Association Magnésium-Calcium.

1 gr. (XL gouttes) $\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ gr. } 25 \text{ CaCl}^2. \\ 0 \text{ gr. } 10 \text{ MgCl}^2. \end{array} \right.$

Forme. — Liquide.

Indications. — Tonique général, hémostatique, antialbuminurique, régulateur de la sécrétion biliaire, etc...

Doses. — 1° *Adultes* : a) Comme tonique, régulateur biliaire, etc... 1 cuillerée à café par jour en 1 seule fois, avant le repas de midi.


b) Comme hémostatique : De 1 à 5 cuillerées à café par jour.

2° *Enfants* : De X à XX gouttes midi et soir suivant l'âge.

Prix : 15 francs.

G. MARTINIE, Pharmacien

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).
37, avenue de l'Écho — SAINT-MAUR (Seine)



TONICARDINE GONNON

Composition :

	Par granule.
Adonidine	0 gr. 002
Convallamarine.....	0 gr. 02
Extrait de strophantus.....	0 gr. 001
Extrait de Scille.....	0 gr. 004

Propriétés thérapeutiques.

Tonifie le muscle cardiaque et les artères, active la circulation sanguine et la diurèse sans élever la pression artérielle.

Indications :

Artério-sclérose, néphrites, hydropisies, angine de poitrine, myocardites infectieuses et toutes les cardiopathies asystoliques.

Avantages :

Dosage régulier. Effets thérapeutiques absolument certains et constants. Pas d'accumulation. Pas d'accoutumance. Ne provoque pas l'insomnie comme la caféine, ni la céphalée comme la théobromine.

Médicament de choix dans les intervalles du traitement digitalique et dans le cas où la digitale est nuisible et impuissante, lorsque le myocarde faiblit et que l'imperméabilité rénale augmente.

Posologie :

2, puis 3 ou 4 granules par jour loin des repas.

Prix : 18 francs.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique.

Ampoules contenant chacune :

Sulfate de strychnine	1 milligr.
Cacodylate de soude	0,05
Glycérophosph. soude (Cod. 1908).	0,20
Eau de mer diluée	5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — *Etats de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entérites, Tuberculose.*

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT
52, rue La Bruyère — PARIS.
Télégr. Chevrématte-90-Paris.

TONI-PECTORAL ADRIAN

Bonbon pectoral et stimulant à base de chlorure de magnésium et parfumé à l'anis.

Présentation. — Pâte pectorale, forme boursier.

Action thérapeutique. — Produit béchique, calmant et antiseptique par l'action de ses constituants (régliste, benzoate de soude, cachou, menthol, extrait thébaïque). Tonique général grâce à l'action du chlorure de magnésium.

ADRIAN ET Cie

9 et 11, rue de la Perle
PARIS (III^e).

TONIQUE GONNON

Aux Phosphoglycérates de soude, chaux et potasse.

Propriétés thérapeutiques. — Assimilation parfaite et certaine du phosphore, stimulant de l'appareil nerveux, il accélère la nutrition de tous les organes.

Indications. — Anémie, convalescence, neurasthénie, grossesse, médication infantile par excellence.

Forme et Posologie :

Vin et sirop : 2 à 4 cuill. à soupe par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

Granulé : 2 à 4 cuill. à café par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

Demi-dose pour les enfants.

Prix :

Vin et Sirop : 12 francs.

Granulé : 9 francs.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

TONIQUE « ROCHE »

Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale.

Goût très agréable. Efficacité certaine.

Propriétés thérapeutiques :

Propriétés classiques de ses constituants : Acide phosphorique, Arsyène, Strychnine, Kola, complétées et renforcées par un catalyseur de choix : le Manganèse.

Indications :

Tous surmenages, Asthénies, Neurasthénie, Anémies, Prétuberculose, Convalescences, Adénopathies, etc.

Mode d'emploi et doses :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un liquide quelconque.

Enfants (de 8 à 15 ans) : demi-doses.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges — PARIS (III^e).

TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer;

Dose et mode d'emploi. — 2 comprimés, 1 mesure ou cuillerée à café de granulé avant chaque repas.

Injectable : 1 ampoule de 1 cc. tous les jours ou tous les deux jours en injection intramusculaire profonde.

Indications. — Reconstituant de l'organisme indiqué dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la Croissance, la Chlorose et l'Anémie.

Fortifie sans provoquer d'excitation.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

TORIGYRE LAMO

Spécialité antisiphilitique.

Sirop.

Solution de bi-iodure Hg, pratiquement non iodurée, tonique et reconstituante par un complexe ; tannophosphato-arséno-magnésien.

Syphilis et tous états pathologiques évoluant sur terrain hérédo-spécifique.

Doses efficaces par jour :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à soupe.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café,

Nourrissons : 1/3 à 1 cuillerée à café, dans infusion ou lait.

Dragées.

Mêmes propriétés que le sirop. 1 dragée = 1 cuillerée à café.

Doses efficaces par jour.

Adultes : 3 à 12 dragées.

Enfants : 1 à 3 dragées (avalier sans croquer avec eau, infusion ou lait).

Prix au public :

Sirop ; 18 francs. — Dragées ; 18 francs.

Laboratoires LAMO

26-28, rue Paul-de-Kock — PARIS (XIX^e).

TORITANE LAMO

Spécialité antisyphilitique.

1° SIROP :

Principe du Sirop de Gibert, Arséniate de Soude et Biphosphate de Calcium ; Excipient agréable, Traitement dissimulé, présenté comme dépuratif polyvalent.

Doses efficaces par jour. — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe. — *Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café. — *Nourrissons* : 1/3 à 1 cuillerée à café (dans une infusion ou du lait).

2° DRAGÉES :

Mêmes propriétés que le sirop. — 1 dragée = 1 cuillerée à café.

Doses efficaces par jour. — *Adultes* : 3 à 12 dragées — *Enfants* : 1 à 3 dragées (avalées sans croquer avec eau, infusion ou lait).

Prix au public :

Sirop : 18 francs. — Dragées : 18 francs.

Laboratoires LAMO

26-28, rue Paul-de-Kock — PARIS (XIX^e).

TORITANOL LAMO

1° SIROP :

Iodures simples, très purs (potassium, sodium, str., Mg.). Goût parfait.

Lymphatisme, Goitre, Sclérose, Mycose, etc.

Doses efficaces par jour. — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe. — *Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café. — *Nourrissons* : 1/3 à 1 cuillerée à café (dans infusion ou lait).

2° DRAGÉES :

Mêmes propriétés que le sirop. — 1 dragée = 1 cuillerée à café.

Doses efficaces par jour. — *Adultes* : 3 à 12 dragées. — *Enfants* : 1 à 3 dragées (avalées sans croquer avec eau ou infusion).

Prix au public :

Sirop : 18 francs. — Dragées : 18 francs.

Laboratoires LAMO

26-28, rue Paul-de-Kock — PARIS (XIX^e).

TOTAL-TONIC

Le plus complet et le plus énergique des Reconstituants.

Forme. — Elixir.

Action. — Immédiate sur les systèmes nerveux, osseux, musculaire, glandulaire et sur le plasma sanguin.

Indications. — Toutes défaillances de l'organisme, Amaigrissement, Asthénie, Anorexie, Anémies, convalescences, maladies de la nutrition, bronchites chroniques et prébacillose, neurasthénie, etc.

Composition. — Chaque cuiller à soupe contient :

Fer (citrate ammoniacal).....	0.05
Manganèse (sulfate).....	0.0375
Phosphate de soude.....	0.50
Acide phosphorique officinal....	0.25
Méthylarsinate de soude.....	0.015
Extrait de quinquina.....	0.25
Teinture de noix vomique.....	0.25
Teinture de coca.....	1.25
Extrait fluide de kola.....	0.32

Le TOTAL-TONIC réalise une association nouvelle, complète, et moderne des éléments indispensables à l'organisme défaillant.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuiller à soupe avant le repas de midi et du soir dans un peu d'eau, de vin ou de lait.

Adolescents (14 à 18 ans) : Une cuiller à dessert aux mêmes heures et de la même façon.

Enfants (au-dessus de 10 ans seulement) : Une cuiller à café dans un peu d'eau ou de lait avant le repas de midi et du soir pendant 12 jours ; arrêter 5 jours et terminer le flacon aux mêmes doses.

Prix : 16 francs.

Laboratoires B. C. L.

M. BERGER

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.

TOT'HAMELIS

Chantereau.

Composition. — Hamamélis administré en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraîche* stabilisée.

Propriétés thérapeutiques. — Médication de base de l'insuffisance veineuse. Tonique de la fibre lisse et modificateur de la viscosité sanguine.

Indications. — Stases veineuses. Varices, hémorroïdes. États congestifs. Hypertension.

Posologie. — *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. *Cachets* : 2 par jour, aux repas. *Suppositoires* (hémorroïdes) : 1 à 2 par 24 heures.

Laboratoires CHANTEREAU
26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

TOUSSYL PY

Composition. — Gouttes sans stupéfiants à base de Bromoforme, Codéine, Drosera, Gaïacol, Ether de Kay et Phostyl.

Propriétés. — Calme très rapidement la Toux, facilite la respiration en rendant leur perméabilité aux poumons ; très précieux pour les bacillaires chez lesquels il améliore l'appétit, relève le poids, augmente les forces et procure un sommeil réparateur. TOUSSYL favorise grandement la phagocytose et la reminéralisation.

Indications. — Bronchite, Trachéite, Coqueluche, Grippe, Laryngite, Asthme, Congestion pulmonaire, Toux catarrhale, Toux des tuberculeux.

Posologie. — *Adultes* : LX gouttes 4 fois par jour. *Enfants* : IV gouttes par année d'âge, également 4 fois par jour, à prendre dans eau, tisane, grog, etc...

Prescrire : **TOUSSYL PY** : 1 flacon.

Laboratoire PY

58, bd Richard-Wallace — PUTEAUX (Seine).

TRÉPARSOL

Acide formyl-méta-amino-
para oxyphénylarsinique.

Indications :

Syphilis, à tous les âges (nourrissons, enfants, adultes), et à toutes les périodes de la maladie (Hérédo-Syphilis, Syphilis primaire, secondaire, tertiaire, Para-Syphilis).

Dysenterie amibienne. Le Tréparsol est un véritable spécifique de cette affection, qu'il guérit en détruisant les Amibes et les Kystes amibiens.

Protozooses intestinales, Diarrhée des Tuberculeux, entéro-colites diverses (d'origine parasitaire ou infectieuse).

Pian et toutes Spirochèloses : Angine fusospirillaire de Vincent, etc.

Présentation :

Tubes de 30 comprimés dosés à 0,25
(dosage adultes). Prix : 22 fr.

Tubes de 40 comprimés dosés à 0,10
(dosage enfants). Prix : 13 fr. 20.

Tubes de 60 comprimés dosés à 0,02
(dosage nourrissons). Prix : 11 fr.

Posologie :

Adultes : 1 à 4 comprimés par jour.

Enfants : 0,01 à 0,02 cg. par jour et par kilog.

Mode d'emploi :

Traitement *discontinu* (3 à 4 jours consécutifs par semaine), et *progressif* (commencer par des doses faibles et augmenter de semaine en semaine).

Dépôt : Pharmacie Générale.

54, rue de la Chaussée-d'Antin — PARIS.

Laboratoire

L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

TRÉPHONYL DU D^r ROUSSEL

(L'Hépatothérapie associée à la Sérothérapie et aux Tréphones embryonnaires.)

Composition. — Extrait de foie fœtal, Suc embryonnaire, Sérum hémopoïétique.

Mode d'action. — Par l'extrait hépatique fœtal et le sérum hémopoïétique, constitue la médication de choix de toutes les Anémies même les plus graves.

Par les Tréphones du suc embryonnaire, accélère la croissance et assure la régénération des tissus.

Indications. — Toutes les Anémies, même les plus graves. Toutes les déficiences organiques : convalescences difficiles ; retards dans le développement ou la croissance chez les enfants.

Présentation. — Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. Boîte de 10 flacons-ampoules de 5 cc. Flacon de sirop de 300 gr.

Posologie. — 1 à 2 flacons-ampoules par jour par voie buccale ou 1 à 2 cuill. de sirop.

Laboratoire de l'HEMOSTYL
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

TRÉPOBIUR

Seul sel de bismuth soluble uranié.

Thérapeutique spécifique active, indolore et sans danger.

Composition. — Tartrobismuthate d'urane ammonium en solution glucosée neutre assurant l'indolence complète et la tolérance parfaite.

Dosage. — Exprimé en Bi.métal permettant un traitement approprié à la virulence des accidents, au poids et à l'âge des malades.

Trépobiur : 0,05 de Bi.métal par ampoule de 4 cc.

Trépobiur infantile : 0,01 de Bi.métal par ampoule de 1 cc.

Propriétés et indications. — Grâce à sa solubilité et à sa rapidité d'élimination, le Trépobiur permet un traitement intensif sans risque d'accumulation. Son activité spécifique est de plus renforcée par l'uranium, ce qui en fait la thérapeutique de choix des accidents évolutifs, en particulier en cas d'arsénorésistance ou d'arsénorécidive.

Le TREPOBIUR ne détermine pas d'anémie bismuthique.

Posologie. — 2 à 3 injections intramusculaires par semaine, selon l'activité de la maladie.

Totaliser 12 à 15 injections par cure selon le poids du malade.

Un mois d'intervalle entre les cures.

L'injection de TREPOBIUR est indolore.

Pour les enfants : Utiliser le Trépobiur infantile.

Prix :

Trépobiur « adultes » :

La boîte de 6 ampoules 18 fr. La boîte de 12 : 30 fr.

Trépobiur infantile : La boîte de 12 ampoules : 20 fr.

(Aucune indication révélatrice dans les notices jointes aux boîtes.)

Littérature et échantillons :

Laboratoires S. F. E. A. T.

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine),

TRÉPOL

Traitement bismuthique de la syphilis. Médication intramusculaire en ampoules stérilisées (3 cc.).

Spirillicide à base de tartrate basique de bismuth renfermant environ 80 p. 100 de Bi en suspension huileuse.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

La boîte de 12 ampoules : 36 fr. ; de 6 : 20 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. , O. I. .

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

TRÉPOQUINOL

Traitement de la Syphilis par l'Iodo-Bismuthate de Quinine
en

Suspension Aqueuse

ne possédant pas les inconvénients des suspensions huileuses.

Sans danger de stomatite, sans abcès, sans indurations, sans toxicité.

Préparation adoptée par l'Assistance Publique à PARIS.

Ampoules de 3 cc. dosées à 0,10 par cc.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 21 francs.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 40 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE O. , O. I. .

Docteur de la Faculté de Pharmacie de Paris

Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

Membre de la Société de Pharmacie de Paris.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

TRIBROMURE GIGON

Composition. — Bromure triple de potassium, sodium et ammonium.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — États nerveux, Psychoses, Hyperexcitabilité, Insomnies, Épilepsie.

Mode d'emploi et doses. — Cuillère-mesure dosant 1 gr. : 2 à 12 par jour, suivant avis du médecin.

Flacons pM., mM., gM.

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables, phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et de magnésie nécessaires à l'organisme.

Propriétés thérapeutiques. — Recalcification de l'organisme (Formule et théorie de Ferrier-Sergent).

Indications. — Tuberculoses pulmonaire, osseuse, péritonite tuberculeuse, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofulose, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures.

Doses et mode d'emploi. — Tricalcine pure.

Adultes :

Poudre : 1 cuiller mesure.

Cachets : 1 cachet.

Comprimés : 1 comprimé.

Granulés : 2 cuillers mesure.

Tablettes chocolat : 2 tablettes.

Tricalcine adrénalinée : 1 cachet.

— méthylarsinée : 1 cachet.

— fluorée : 1 cachet.

Tricalcine Irradiée : 1 cachet ou
1 cuillerée à café de granulés.

Avant
ou
pendant
chacun
des trois
repas.

— **Opothérapique** (1) : 2 drag. ou 2 cuillers
à café de granulés aux 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : poudre, granulés, cachets, chocolat :
14 fr. ; comprimés : 12 fr. ; Méthylarsinée, adrénalinée, fluorée et opothérapique : 16 fr.

(1) La formule de la Tricalcine opothérapique a été établie d'après les travaux les plus récents des auteurs français et étrangers sur le métabolisme du calcium. Cette formule d'association pluriglandulaire est composée des meilleurs fixants endocriniens du calcium,

(Association Parathyroïdes, Sur-rénales, Thymus, Foie, Rate, Moelle osseuse.)

Autorisé par les *Assurances sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

TRIDIGESTINE DALLOZ

Composition. — Les trois ferments digestifs essentiels à leur maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

Forme. — Granulé.

Indications. — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire.

Dose. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Le flacon : 12 fr. 50

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (Xe).

TRIDYNOL

Médicament composé leucopoiétique puissant. Employé contre les tuberculoses.

Mode d'action. — Dans la tuberculose augmentation des globules blancs et spécialement des lymphocytes.

L'autolysat des globules blancs est bactéricide par ses oxydases et lipases. Dissolution des cires bacillaires par les lipases. Exp. de Fiessinger.

Agglutination des bacilles qui prennent des formes d'involution et de souffrance, puis diminuent de nombre et disparaissent souvent après 6, 8, 10 mois.

Ce traitement est activé et exalté par la Diathermie transpulmonaire qui, employée seule, est inutile.

Diathermie transpulmonaire 1 500 à 2 000 milliampères, trois séances par semaine une demi-heure. 20 à 30 séances consécutives.

Parfois momentanément dépression et fatigue vers le dixième ou quinzième jour.

En général, augmentation de la toux et des crachats qui deviennent souvent très abondants, purulents, puis muqueux et enfin disparaissent.

Contre indication absolue : l'*Albuminurie*.

La Diathermie ne provoque pas d'Hémoptysie (professeur d'Arsonval).

Réaction thermique variable souvent défervescence après un temps variable.

En dehors de la tuberculose, s'emploie aussi avec succès dans les maladies infectieuses, salpingites, entérites, suppurations, cachexies.

Résultats. — Malgré toute la prudence de rigueur en cette matière, on peut dire que les résultats sont très bons au premier et deuxième degré. Variable au troisième degré, tout dépendant de l'état général.

Administration à doses fractionnées pour éviter le choc.

Pilules : 5 par jour en moyenne, 8 h., 10 h., 12 h., 3 h., 7 h., sans s'occuper des repas.

Cette médication est très efficace à doses réduites chez les enfants, combinée avec les rayons ultraviolets (sans diathermie).

Pour renseignements s'adresser :

Pharmacie HUET

4, place de Strasbourg. — LILLE.

TRIGLANDINE

Composition et forme. — Dragées, Ampoules de 1 cc. et 3 cc, Thyroïde, Hypophyse, Ovaire (glandes totales desséchées sous vide profond à basse température).

Propriétés thérapeutiques. — Entraîne régulièrement le redressement du système endocrinien dans son ensemble, par l'administration des 3 glandes nobles, thyroïde, hypophyse, ovaire.

Régulateur du cœur périphérique.

Indications. — SYNDROMES ENDOCRINIENS SPECIAUX de la femme : Stérilité, Trouble de l'appareil génital, Hypertension de la Ménopause et des dysendocriniens. ASTHENIES ENDOCRINIENNES FEMININES,

Posologie. — 1 à 3 dragées par jour pendant 10 jours environ ; 1 ampoule de 1 ou 3 cc. par jour, suivant le cas.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél. : Nord 32-52 (2 lignes).

TRILUES

Arsenic trivalent en solution toute préparée, injectable par voie intramusculaire et intraveineuse.

Composition. — Le TRILUES est le diéthylène imino-glucyl-arséno-phényl amine mono-méthylène sulfoxy-late de sodium composé contenant 22, 5 p. 100 d'arsenic métallique. Son avantage réside dans le fait que sa molécule est asymétrique et se désintègre en deux temps. Cette libération freinée de l'As explique sa remarquable tolérance

en même temps qu'elle permet une imprégnation plus durable de l'organisme après chaque injection.

Présentation :

Deux formes : { Intraveineux } En ampoules de 5 cc.
 { Intramusculaire } En solution préparée d'avance.

Indications :

1° *Syphilis* : Traitement d'assaut, traitements mixtes, traitement de consolidation et cures abortives.

2° Fièvres récurrentes, Paludisme, Pian, Spirillozes, Spirochétoses, Trypanosomiasés, Kala-azar, Pyorrhée alvéolaire, Angine de Vincent, Pellagre.

Posologie. — La molécule de TRILUES étant lourde, les doses croissent de 0,22 en 0,22, les ampoules sont délivrées selon les 6 concentrations suivantes :

I	II	III	IV	V	VI
0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32

Correspondant à 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75, 0,90 d'arsénobenzène.

Spécifier endo-vétneux ou intramusculaire.

Traitement d'attaque. — Commencer par 0,44 puis 0,88 et arriver vite à 1,32. La grande marge de sécurité apportée par le TRILUES permet une thérapeutique particulièrement agressive.

Traitement d'entretien. — Suivre la gradation des doses, alterner pour le traitement mixte le TRILUES avec le STEROBI ou l'HUILE GRISE ARGENTIQUE SFEAT, 4 cures par an pendant 5 ans.

Prix : 4, 6, 8, 10, 12, 14 fr. selon la dose (boîte de 1 amp.).

Littérature et échantillons :

Laboratoire S. F. E. A. T.

15, rue Catullienne — SAINT-DENIS (Seine).

TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

(Dragées blanches à Noyau Mou).

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième II gouttes (3 centigr.).
Caféine 2 centigrammes.

Propriétés et indications thérapeutiques. — *Vasodilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate*, ne provoquant aucun phénomène réactionnel. Médicament de choix de l'*Angine de Poitrine*, l'*Asthme Cardiaque*, l'*Œdème Pulmonaire*.

Mode d'emploi. — Ces dragées doivent être *croquées* : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès. Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 15 francs.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV°).

TRINITRINE-PAPAVÉRINE LALEUF

(Dragées roses à Noyau Mou.)

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... II gouttes (3 centigr.).
Chte Papavérine 5 milligrammes.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Association synergique hypotensive et analgésique, à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Spécialement indiquée dans : *Angine de Poitrine*, *Asthme cardiaque* et *pulmonaire*, *Aorites*, *Artérites*, *Urémie*.

Mode d'emploi. — Ces dragées doivent être *croquées* : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle) au moment ou en prévision des accès. Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV°).

TRINITRINE ROUSSEL

Composition :

Comprimés n^{os} I, II, III correspondant à I, II ou III gouttes de la solution au 1/100^e.

Indications.

Hypertension : Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Doses et mode d'emploi :

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures.)

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).

TRIRADOL

Association d'iode organique, menthol, camphre et éléments radio-actifs.

Indications thérapeutiques. — Toutes les tuberculoses à lésions limitées et à évolution lente.

Contre-indications. — Tuberculose évolutive rapide, néphrite, insuffisance hépatique, etc.

Posologie. — *Adultes* : une ampoule de 1 cc. ou 4 à 6 capsules par jour, par série de 30.

Enfants : suivant l'âge. — Voir Littérature.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules : 20 fr. — Flacon de 60 capsules : 20 fr.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

R. C. Seine 143-981.

TRISEPTINE

Granulé de charbon animal uroforminé, citraté, pepto-magnésié, de goût très agréable.

Admise dans les Hôpitaux. Adoptée par les Ministères de la Marine et des Colonies après expérimentation.

Propriétés. — Triple action antiseptique (sur l'intestin, sur les voies biliaires, sur les voies urinaires), absorbant, cholagogue, désensibilisant, diurétique ; assure le drainage des voies biliaires et le bon fonctionnement de l'intestin.

Originalité. — Formation de citrate de magnésie, sans inconvénient, au moment de l'absorption ; action de l'ion critique qui fluidifie le sang, la bile et les sécrétions. Produit d'une innocuité parfaite ayant à la fois une action antiseptique, cholagogue, absorbante, désensibilisante et diurétique.

Indications. — Auto-intoxication et auto-infection intestinales avec leurs conséquences ; infections gastro-intestinales, biliaires et urinaires (entérite, colibacillose, cystites, cholécystites, ictères, manifestations anaphylactiques, urticaire, furonculose, etc.).

Dosés et mode d'emploi. *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.

Une heure environ avant les repas ou le matin à jeun et le soir en se couchant. Croquer et boire un peu d'eau aussitôt après ou délayer dans un peu d'eau.

Laboratoires G. LAMBERT, Docteur en Pharmacie,
6, rue de Longchamp — VICHY (Allier).

TRISODYL ROZET

Hypotenseur Antisléreux.

Composition (Dose quotidienne moyenne)

Nitrite de soude chimiq. pur... 0 gr. 20

Silicate de soude chimiq. pur... 2 gr.

Citrate de soude chimiq. pur.... 4 gr.

Formes Pharmaceutiques et Posologie.

Comprimés. — 6 comprimés par jour dans un peu d'eau.

Solution. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les deux principaux repas.

Action. — Provoque une vaso-dilatation périphérique modérée et continue, portant sur les Artérioles et les Capillaires (Nitrite de soude). Solubilise la chaux, augmente la diurèse, s'oppose aux fermentations (silicate de soude). Ramène à la normale la coagulabilité et la viscosité sanguine (citrate de soude).

Indications. — Hypertension artérielle. Artériosclérose. Etats pléthoriques et angiospasmodiques, Angine de poitrine, aortites, etc.

Prix : 20 fr. le flacon de solution ou la boîte de Comprimés pour un traitement d'un mois environ.

Laboratoire de la Sulfoléine Rozet

Benderitter et C^{ie} — VENDOME (L.-et-Ch.).

TRISTYL-NOYON

Traitement spécifique des règles douloureuses.

Cachet calmant, décongestionnant, régularisateur de la circulation sanguine.

Composition. — Le « TRISTYL-NOYON » réunit dans sa formule les propriétés actives de plantes emménagogues (anémone, jessanine, séneçon, hamamélis) associées à des sédatifs inoffensifs et puissants (phénamidopyrine, exalgine...).

Mode d'action. — Sédatif des spasmes musculaires, fluidifie le liquide sanguin, décongestionne les organes pelviens, modérateur et tonique du système nerveux.

Indications. — Règles douloureuses ou irrégulières, Migraines, états congestifs, troubles de la Ménopause. Suppression de l'élément douloureux dans les cas d'Hémorragies utérines.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 cachets par jour.

Prix au public : 10 cachets : 9 francs.

Laboratoire Chimico-thérapeutique de Paris

24, rue Paul Bert — PARIS (XI^e).

Téléphone : Marcadet 20-28.

TSÉAMINE

Médicament de choix des trypanosomiasés.

Composition. — Uréide double du para-amino-phényl-arsinate de sodium et de l'amino-naphtol-disulfonate de diéthylène imine, 1 gr. 20; Solution glucosée à 25 p. 100, Q. S. pour 10 cc.

Combinaison moléculaire d'un composé arsenical organique et d'un uréide aromatique.

Indications. — La maladie du sommeil à toutes ses périodes, même au cours des manifestations nerveuses de l'affection et même si le trypanosome rhodesiense est en cause.

Avantages. — Activité remarquable due à l'union des deux meilleurs trypanocides, pénétration méningée et marge de sécurité considérable.

Mode d'emploi. — Injections sous-cutanées, intramusculaires ou *intravéineuses*, une injection par semaine.

1 ^{re} période	6 à 8 injections par série.	
2 ^e —	8 à 12	—
3 ^e —	12 à 20	—

Prix : La boîte de 4 ampoules de 10 cc 25 francs.

Echantillons et littérature :

Laboratoires S. F. E. A. T.

45, rue Catulienne — SAINT-DENIS, près Paris.

TUBÉROL

TUBEROL (pur).

Forme. — Liquide.

Composition. — Association complexe d'Essences balsamiques pures.

Indications. — Toutes affections des poudrons, broncho-pneumonies, bronchites purulentes, coqueluche, tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — En enveloppements thoraciques : avec gaze hydrophile imbibée et en inhalations.

TUBÉROL (onguent).

Composition. — Tubérol + Excipient adhésif.

Indications. — Fin de broncho-pneumonie, bronchite légère, coqueluche, engorgements ganglionnaires.

Mode d'emploi. — En onctions de la poitrine ou des ganglions. Recouvrir de papier brouillard.

TUBÉROL (Oléo).

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — Tubérol + Huile stérilisée.

Indications. — Affections naso-pharyngées, oreillons, coqueluche, grippe, rhumes, etc.

Mode d'emploi. — En pulvérisations et instillations nasales. Badigeonnage dans oreillons, coqueluche, scarlatine.

TUBÉROL (Injectable).

Forme. — Ampoules.

Composition. — Tubérol + Benzoate de Benzyl + Huile d'Olive stérilisée éthéro-camphrée.

Indications. — Complément intensif du Tubérol dans bronchites fétides, pneumonies, coqueluche, tuberculose.

Mode d'emploi. — 1 à 6 ampoules par jour suivant gravité.

TUBÉROL (Sirop).

Composition. — Tubérol + véhicule.

Indications. — Antiseptique des voies respiratoires. Calme la toux.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 3 à 4 cuillerées à café.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

Tél. : Marcadet 04-02.

TUBES BLACHE

Toutes formules en pommades pour
l'Ophtalmologie.

Liste des principales préparations :

Adréno-éphédrine,
Aminothionine Westermann,
Analgo-contractine,
Analgo-mydriatine,
Argovyl, Cadmio-zinc, Camphocuiivre,
Chaulmocuprine, Chlorhydratine,
Colorants composés, Compositol,
Contractine, Dioptról, Ichto-zinc,
Iodure alcalino-calcique, Kinargol,
Mydriatine, Organo-bismuth,
Oxy-arsine Hg, Oxyde Hg,
Paléocaline,
Phocéol, Thiosulfol cuprique,
Thiosulfol hydrargyrique,
Zircotanyl, etc.

TUBES CHAUVIN

Toutes formules en pommades pour l'Oto-
Rhinologie et pour la Dermatologie :

Série *Rhino* pour le nez.

Série *Oto* pour les oreilles.

Série *Dermo* pour la peau.

Établissements Alfred CHAUVIN

AUBENAS (Ardèche).

TUBES DU D^r GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux
(Anciennement tubes DAVIEL).

POMMADES OPHTALMIQUES

munis d'une canulé spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'œil.

TOUTES FORMULES

Spécialement recommandées : Pommades à l'aristol, à l'oxyde jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Prix : 9 et 10 francs.

Echantillons sur demande.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

Téléph. : Marcadet 37-98.

TUBES DULCIS

Pommades ophtalmiques.

Argolène (Sel d'Ag). — Conjonctivites aiguës, à 5 p. 100 et 10 p. 100....	12 fr.
Cadmiol — Conjonctivites chroniques, à 1 p. 100 et 2 p. 100.....	12 fr.
Cuprinol (Sel organique de Cu). — Conjonctivites chroniques, à 1 p. 100, 2 p. 100, 5 p. 100.....	12 fr.
Iodo-Calcique. — Traitement de la cataracte, 8 p. 100.....	12 fr.
Ichtyol-zinc. — Blépharites.....	12 fr.
Novoptine. — Ulcères à pneumocoques, à 1 p. 100.....	12 fr.
Oxyde orangé de Hg. — Blépharites, conjonctivites phlycténulaires, à 1 p. 100, 2 p. 100, 3 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100	11 fr.
Ophthlmoforme. — Antipurulent, à 2 p. 100, 3 p. 100.....	12 fr.
Aristol. — Antipurulent, à 2 p. 100.	12 fr.
Iodoforme. — A 1 p. 100, et 2 p. 100	12 fr.
Thiosinamine. — Opacités et synéchies à 1 p. 100.....	12 fr.
Mydriatine. — Mydriatique puissant	16 fr.
Alcaloïdes seuls	12 fr.
Alcaloïdes associés	14 fr.
Myosine forte. — Glaucome.....	16 fr.
Myosine faible	14 fr.
Iodo-Rubidium. — Cataracte.....	16 fr.

Laboratoire de Thérapeutique Oculaire
du DOCTEUR FERRY

Place Clichy — MONTE-CARLO.

TUBES OPHTALMOLOGIQUES FERLUX

Tubes Ferlux :

Huile de Chaulmoogra, Chaulmoogra-Butelline.

Oxyde de mercure orangé, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100
— jaune, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100

Iodoforme, Calomel, Précipité blanc, Éthylhydrocupréine (optochin), Halocalcine ($I Na + CaCl^2$), Ichtyol-oxyde de zinc, Thigénol-oxyde de zinc, etc., etc.

Produits Orhino :

Pour Otorhinolaryngologie.

Prix moyen : 10 francs.

Laboratoires RHINOPHTA

G. Bousquet, Docteur en Pharmacie — ALBI.

TULLE GRAS LUMIÈRE

Pansement indolore des plaies :

Double la vitesse de cicatrisation.

Il peut être prescrit aux accidentés du travail

Constitution. — Carrés de tulle imprégnés d'une composition grasse à base de baume du Pérou, qui lui communique des propriétés désodorisantes, kératoplastiques (activation considérable de la cicatrisation).

Propriétés. — Evite l'adhérence des pièces de pansement aux plaies. Se détache aisément sans provoquer de douleur ni d'hémorragie, évite l'arrachement des bourgeons, respecte leur tissu fragile et supprime totalement la douleur du décollement des compresses, douleur souvent intolérable chez les amputés ou les grands brûlés, par exemple.

Le Tulle gras Lumière permet d'abréger la durée de la cicatrisation dans des limites très importantes.

Présentation. — Le Tulle gras Lumière est présenté en carrés de dimensions fixes :

0 ^m 10 × 0 ^m 10.	Boîte de 10 compresses.
0 ^m 10 × 0 ^m 10.	— 20 —
0 ^m 10 × 0 ^m 10.	— 30 —
0 ^m 22 × 0 ^m 22.	— 30 —

Ces carrés de tulle que l'on applique directement sur les plaies sont superposés dans une boîte, métallique, séparés les uns des autres par des carrés de papier. Le tout est ensuite stérilisé à l'autoclave à 120°.

Mode d'emploi. — Placer un carré de Tulle gras sur la plaie, appliquer par dessus le pansement stérilisé.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté, — LYON.

TULLE ROSE BESLIER

Pansement gras

Constitué par un carré de 13×13 imprégné d'un mélange plastique à base de Microcidine, Baume du Pérou, Huile essentielle de Verveine, Thym, Niaouli, Pélargonium.

Le **Tulle Rose Beslier** est un cicatrisant énergique ; il permet le renouvellement indolore des pansements sans arrachements des bourgeons charnus, sans hémorragies.

Il assure des cicatrices souples, sur les brûlures, plaies par vésication, ulères variqueux, plaies atones, plaies infectées, phlegmons, abcès, etc.,

Le **Tulle Rose Beslier** est livré en boîte de 10 carrés de 13×13 .

Prix : 7 francs la boîte.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN (S.-et.-L.).

UCLARSYL

(Ancien Métarsenobenzol Saca)

Dioxydiaminoarsénobenzène - monométhylène - Sulfoxylate de soude (914).

Rigoureusement pur (double contrôle chimique et physiologique). Traitement d'attaque et d'entretien de la syphilis.

Préparation intraveineuse. — Poudre très aisément soluble dans l'eau distillée pour injections intraveineuses.

Doses progressives de 0 gr. 15 à 0 gr. 90.

Usines Chimiques des Laboratoires Français.

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 58-43.

ULCÉOBALNÉINE

Poudre spéciale pour bains de jambe antivariqueux.

Alcalino-sodique-silicatée.

Par leur action sédative sur l'élément nerveux les bains à l'Ulcéobalnéine :

Calment les douleurs variqueuses, arrêtent l'évolution des varices et en diminuent le volume ; font résorber l'œdème et l'empâtement ; guérissent les congestions variqueuses et périphlébitiques.

Un bain de jambe de 30 minutes à 36° tous les jours pendant 24 jours.

Une boîte pour 4 bains de jambe.

Prix : 6 fr. 75.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e)

ULCÉOPLAQUE - ULCÉOBANDE

Pansement de marche.

Cicatrisation certaine des *Plaies aux jambes*, des *plaies atones* et des *Ulcères variqueux*, même anciens et trophonévrotiques, sans interrompre ni le travail ni la marche.

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité. **Résultats surprenants.**

Boîte de 6 pansements pour 20 ou 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaque n° 1 5/6 centim. Ulcéoplaque n° 2 7/9 centim.

Formuler : Une boîte Ulcéoplaque n° 1 ou n° 2.

Prix : 24 ou 36 francs.

1 Ulcéobande. Prix : 30 francs.

ULCÉOSINE

Sulfo-citrate de soude et pipérazine formino-bicarbonaté, arsénio-lithiné.

Action antitoxique et hypotensive.

Indiquée dans l'artério-sclérose, l'hypertension artérielle, les troubles hépatiques, les varices, les congestions variqueuses et phlébitiques, les plaies atones, les ulcères variqueux, le rhumatisme chronique, l'hyperglycémie, le diabète.

1 cuillerée à café par jour dans un verre d'eau chaude ou froide, pendant 15 jours consécutifs.

Prix : 10 francs.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e)

ULCÉOSOL-POMMADE

Oxyde de zinc, Cuivre salicylé, Silicate de magnésie et excipient spécial.

Guérison rapide de l'Eczéma variqueux sec, Irritation de la peau, Prurigo.

Prix : 10 francs.

ULCÉOSOL-POUDRE

Oxyde de zinc bismuthé, Acide salicylique, Silicate de magnésie.

Poudre siccative, guérit rapidement l'eczéma variqueux suintant, les excoriations eczémateuses superficielles.

Prix : 10 francs.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e)

ULCÉROPHILE NOSAN

Traitement ambulatoire des Ulcères
Variqueux.

Présentation et composition. — Bande de 0 m. 13 x 12 mètres imprégnée aseptiquement par un procédé spécial d'une pâte gélatino-amidonnée (pâte de Unna modifiée) constituant, après application, un appareil de contention parfait.

Action. — Décongestionnant, cicatrisant, on obtient par ce pansement un bas à varices semi-rigide moulé sur le membre et ne pouvant se distendre ; provoque par la marche un léger massage qui a pour résultat la résorption rapide du liquide séreux infiltré et le dégonflement du membre. Rétablissement de la circulation veineuse, meilleure nutrition des tissus qui retrouvent toute leur vitalité et enfin la cicatrisation des lésions.

Indications. — Toutes les plaies atones des membres inférieurs et particulièrement des Ulcères variqueux même les plus anciens, sans tendance à la cicatrisation. Plaies traumatiques à cicatrisation lente, phlébites, varices douloureuses, eczémas, brûlures à épidermisation difficile.

Mode d'emploi. — Plonger la boîte contenant la bande dans un récipient d'eau assez profond (bouillotte) et porter à l'ébullition jusqu'à ramollissement complet (15 à 20 minutes). Appliquer la bande directement sur la peau à la façon d'une bande molletière en évitant les renversés.

Prix au public : 25 fr. la bande.

Pharmacie MAYAUD

6 ter, rue Voltaire

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

ULMARÈNE GIGON

Composition. — Ether salicylique liquide d'odeur faible.

Indications thérapeutiques. — Analgésique local, antirhumatismal externe. Spécifique contre les rhumatismes, les névralgies.

Formes. — 1° Ulmarène pur flacons de 30, 60, 125 cc. (pM, mM, gM) ;

2° Ulmarène formulé dans une préparation magistrale (liniment, pommade) ;

3° Ulmarol Gigon (liniment) ;

4° Baume du docteur Gigon, en tube.

Mode d'emploi. — Onctions suivies d'enveloppements.

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

ULTRACAO LAURENÇON

Suraliment Minéro-Nucléiné

Délicieux déjeuner à base de Cacao,

Tonique Reconstituant.

Suralimentation Rationnelle de l'enfant et de l'adulte. (Ne constipe jamais).

Forme. — Poudre soluble.

Posologie. — Délayer à froid le contenu de 2 cuillerées à café dans une bonne tasse d'eau ou de lait de préférence. Porter à l'ébullition pendant quelques minutes en remuant jusqu'à complète homogénéité.

Laboratoire d'Actino-Biologie

J. LAURENÇON, Pharmacien

Professeur de Chimie et de Pharmacologie

16, rue de la République,

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.

ULTRA-LEVURE

Levure ultra-haute (37°) de H. Boulard.

Composition. — 120 à 150 millions de globules de levure par ampoule de 3 cc. 5 dans un milieu isotonique où la levure reste vivante pendant plus de 5 ans.

Propriétés. — Température d'activité et de reproduction optima correspondant à la température physiologique de l'intestin. Élimine les ferments pathogènes par concurrence vitale. Passe dans la circulation et se retrouve dans les urines.

Ne produit qu'une acidité insignifiante.

Facilite les phénomènes d'assimilation et de désassimilation — tonique par les diastases et les vitamines produites en grande abondance (principalement vitamine B). Action spéciale sur les dermatoses par la Vitamine B.

Indications. — *Infections intestinales*, états aigus et chroniques, diarrhées infantiles (se prend dans du lait), diarrhées et dysenteries amibiennes ou bacillaires, entérites, furonculoses et dermatoses ; *colibacilloles intestinales et urinaires* (résultats très rapides).

Mode d'emploi. — Livrée en boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5. *Dose normale* : 1 ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée ; *dans les cas aigus* : 1 ampoule deux fois par jour ; *dose d'entretien* : 2 ampoules par semaine.

Laboratoire des Ultra-Levures L. G. TORAUDE O. * O. I. O
Dr de la Faculté de Pharmacie de Paris, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine, Membre de la Société de Pharmacie de Paris.
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

ULTRA-VIOLETS

- 1° *Affections de la première et de la seconde enfance, hypotrophies, rachitisme, tétanie, anémies ;*
- 2° *Tuberculoses dites chirurgicales : ganglionnaire, osseuse et ostéo-articulaire, péritonéales, génitale ;*
- 3° *Affections cutanées : acné, psoriasis, engelures, lupus, et affections du cuir chevelu : pelade ;*
- 4° *Etats de surmenage et d'asthénie, convalescences ;*
- 5° *Infections de l'oreille, tuberculoses oculaires, carie dentaire, pyorrhée, blanchiment des dents.*

Vente et location de tous appareils et accessoires à

La Verrerie Scientifique

12, avenue du Maine — PARIS (XV^e).

Tél. : Littré 94-62 et Littré 01-63.

ULTRAVITAMINE 4

Les Quatre Vitamines A. B. C. D. (cholestérol ergostérinique irradié) associées à des éléments minéraux : Phosphore, Manganèse, Calcium, en combinaison avec des éléments opothérapiques : Moelles et Poudre d'Os frais.

Indications. — Déminéralisation. Rachitisme. Toutes Carences et Convalescences. Dépression nerveuse. Fatigue musculaire. Allaitement. Pré-tuberculose. Puissant Dynamogène. Récalcifiant intégral.

Forme. — Délicieux granulé bicolore.

Posologie. — La même pour enfants et adultes : 1 cuillerée à café de granulé sec ou dissous dans un peu d'eau froide, 1/2 heure avant les 2 ou 3 principaux repas.

Laboratoire d'Actino-Biologie
J. LAURENÇON, Pharmacien.
 Professeur de Chimie et de Pharmacologie,
 16, rue de la République,
 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.

URALYSOL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de la diathèse rhumatismale. Agent de dissolution et d'élimination de l'acide urique.

Indications. — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte, Coliques néphrétiques et hépatiques, Urétrites, Cystites.

Deux formes : a. *Granulés* ; b. *Comprimés*.

Formule. — Acide thyminique, Hexaméthylène-tétramine, Lysidine, Helmithol, Sels de lithine.

Modes d'emploi .

A. *Granulés* : Une cuillerée à café, matin et soir dans un verre d'eau.

B. *Comprimés* : 4 comprimés par jour en moyenne une demi-heure avant les repas ou une heure après.

Prix de vente au public : 14 francs.

Laboratoires LOBICA
 46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

URASEPTINE ROGIER

A base de Hexaméthylènetétramine et son citrate, Diéthylènediamine, Benzoate de soude et de lithine, etc.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de substance active par cuill. à café.

Dose. — 3 à 6 cuill. à café par jour.

Propriétés. — Antiseptique urinaire et biliaire par excellence. Dissout et chasse l'acide urique.

Le flacon : 12 fr. 50.

Henry ROGIER, docteur en pharmacie
56, boulevard Pereire — PARIS.

URAZINE

Citro-salicylate de pipérazine.

Dissolvant de l'acide urique. Action analgésique et antiseptique. Innocuité absolue.

Indications :

Goutte, Gravelle, Rhumatisme.

Posologie et mode d'emploi :

Comprimés à 30 centigr. : trois ou quatre par jour, au moment des repas.

Granulés effervescents : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

UR-CLAR

Antiseptique Urinaire.

UR-CLAR BLEU.

Composition. — Bleu de Méthylène, Citraminoxypène, Poudre d'Hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et analgésique des voies urinaires et du tube digestif.

Indications. — *Toutes* les infections urinaires et en particulier les colibacilluries, la tuberculose rénale et vésicale et la blennorrhagie.

Doses. — 9 à 12 capsules par jour.

UR-CLAR BLANC.

Composition. — Santalol citraminoxypène, poudre d'Hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et balsamique des voies urinaires.

Indications. — La blennorrhagie et ses complications.

Doses. — 9 à 12 capsules par jour.

Laboratoire Central Maubeuge

A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS.

Tél. : Trudaine 54-69.

URICÉMINE

Synergie médicamenteuse à doses non flocculantes.

Composition. — Salicylate de pipérazine, 0,04 ; benzoate de soude, 0,10 ; benzoate de lithine, 0,02 ; silicate de soude, 0,02 ; urotropine, 0,10 ; citrate acide de soude, 0,30 ; sous forme de granulés. Doses fractionnées utilisables en totalité par synergie et sans provoquer de précipitation.

Mode d'action. — Dissolvant de l'acide urique. anti-purinique, anti-flocculant, anti-sclérosant, antiseptique.

Indications. — Hyperuricémie, Lithiase rénale, hypertension artérielle, artério sclérose, athérome, goutte, sciatique, asthme, plethore, dermatoses. Infections urinaires et biliaires.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un verre de liquide, aux repas ou en dehors.

Produits SANOVA

29, rue de Liège — PARIS (VIII^e).

Tél. : Europe 60-39.

URICLARINE

(Comprimés.)

Antiseptique entéro-rénal.

Propriétés thérapeutiques. — Combat l'infection urinaire au lieu même où elle naît : dans le tube digestif. L'Uriclarine, dans laquelle le chlorure d'ammonium renforce l'action du salicylate de phénile et de l'urotropine, est le médicament des affections réno-vésicales d'origine intestinale.

Indications. — Maladies infectieuses des Voies Urinaires, Cystites, Pyélites, Colibacillurie, Blennorragie.

Mode d'emploi. — Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour de préférence aux repas.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et C^{ie}, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

URIFLUINE

Succinate de lithine.

Dissout l'acide urique, augmente la quantité des urines, empêche les coliques néphrétiques. Action anti-rhumatismale dans la Cellulite et le Rhumatisme chronique.

La boîte de comprimés ou pilules : 12 francs
prix public.

La boîte de 10 ampoules : 13 fr. 50
prix public.

Laboratoires STENE

2, place des Vosges — PARIS.

URISANINE

Composition. — Benzoate d'hexaméthylène-tétramine dissous dans un excipient à base végétale (plantes balsamiques) auquel a été incorporé l'extrait de stigmates de maïs.

Dosage. — Une cuillerée à café = 0 gr. 75 de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine + 0 gr. 25 d'extrait de stigmates de maïs dissous dans 4 gr. d'excipient végétal balsamique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique urinaire et biliaire complet ; balsamique et diurétique ; dissolvant phosphatique, urique et uratique ; éliminant sûr et rapide.

Indications. — Toutes affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

Mode d'emploi. — Se prend dilué dans 1/2 verre d'eau naturelle ou gazeuse.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : par 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS.

UROBUCCOL MALMANCHE

Composition :

Formine (uroformine, urotropine) ...	25 centigr.
Benzoate de soude	20 —
— de lithine	10 —
Sirop de buchu	2 grammes.
— de maïs	2 —
— de térébenthine	2 —

par cuillerée à café.

Forme. — Liquide sirupeuse.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires, antiseptique général, balsamique et diurétique puissant. Dissolvant phosphatique, urique et uratique.

Indications. — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, Prostatite, Blennorragie, Uricémie, Goutte, Lithiase rénale, Coliques hépatiques.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, par ou dans une infusion.

Prix au public : 12 francs.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien. Docteur ès sciences.

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

UROCLASE

Antiurique vrai
Préventif et curatif. Non toxique.

Définition et composition centésimale. — Bioxyde de Silicium (0,25) à l'état colloïdal, uni par adsorption au Carbonate de K (0,025) et au Chlorure de Na (0,19) dispersés en milieu aqueux par un procédé spécial.

Mode d'action. — Corrige progressivement le métabolisme vicié de la cellule vivante, rétablit l'équilibre acido-basique rompu vers l'alcalose, redresse jusqu'à la normale le pH humoral. La précipitation de l'acide urique dans l'organisme devient ainsi impossible. Il est donc aussi bien préventif des accidents à venir que curatif des accidents en cours, et de toxicité rigoureusement nulle.

Agit à la manière d'un ferment, suivant les lois de la physicochimie des colloïdes et, par conséquent, de la matière vivante.

Indications. — Tous les états uricémiques dans toutes leurs manifestations.

Emploi et Doses. — V gouttes le matin à jeun dans un peu d'eau. Cures régulières et successives de 10 jours, séparées par repos de 10 jours.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien
41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).
Tél. : Laborde 08-00.

UROFORMINE GOBEY

Comprimés dosés à 0 gr. 50. Comprimés effervescents dosés à 0 gr. 25 (solubilité instantanée). Solution injectable en ampoules de 2 et 5 cc., 0 gr. 25 par cc.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour dans un verre d'eau froide. Injections de 0 gr. 50 à 2 gr. par jour. (Intraveineuses seulement.)

Propriétés thérapeutiques. — Le plus puissant antiseptique interne. Dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Fièvres infectieuses, Grippe, Encéphalite, Complications broncho-pulmonaires, etc., Rhumatismes, Infections des voies biliaires et urinaires, etc.

Prix au public :

La boîte de 50 comprimés à 0,50 : 12 fr. 50.

— de comprimés effervescents : 12 fr. 50.

Laboratoires GOBEY
89, rue du Cherche-Midi — PARIS.

UROIODINE

Composition. — L'Uroïdine ou Iodoéthylate d'hexaméthylènetétramine est une combinaison organique contenant 42 p. 100 d'iode rigoureusement titré, associée à un sel de lithine.

Propriétés physiques et chimiques. — Solution dialysable, se décompose lentement, est diffusée dans tout l'organisme, s'élimine dans l'urine sous forme d'iodure alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique. Pas d'accumulation.

Propriétés physiologiques. — *Grâce à sa molécule iodée*, l'Uroïdine est un excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense, un fixateur d'oxygène, stimulant les échanges nutritifs de l'organisme, *Grâce à l'heureuse combinaison Iodo-Formine*, l'Uroïdine constitue un agent anti-infectieux particulièrement énergique. Enfin *grâce à l'association Formine-Lithine*, l'Uroïdine est un diurétique très actif et un excellent dissolvant de l'acide urique et des urates.

Indications. — Toutes affections glandulaires : adénites, adénopathies, végétations adénoïdes, scrofulides, etc... Maladies de la nutrition : toutes manifestations des diathèses. Urique : goutte, gravelle, calculs, etc. Arthritique : rhumatismes chroniques et déformants. Tuberculoses localisées : osseuses et ganglionnaires, Tertiarisme, Scléroses, Asthme, Emphysème, etc...

Formes et Posologie. — Ampoules de 3 cm. 3/4. Comprimés kératinisés de 0 gr. 50. Chez l'enfant au-dessous de 15 ans, 1/2 à 1 ampoule par jour. Chez l'adulte, 1 à 2 ampoules en injections intramusculaires ou intraveineuses (bien tolérées sans réaction locale ni chronique classique, résorption parfaite). Comprimés : 1 à 2 comprimés suivant l'âge chez l'enfant ; 2 à 6 comprimés suivant l'âge chez l'adulte, comme traitement d'entretien contenant 42 p. 100 d'iode ; remplaçant avantageusement les iodopeptones qui n'ont que 17 p. 100 d'iode, mieux tolérés grâce à leur enrobage spécial.

Laboratoire de l'UROIODINE

45, boulevard Lafayette — CALAIS.

UROMETHYL

Cachets - Dragées

Association stable. — Urotropine chimiquement pure, Salol, Citrate d'urotropine, Bleu de Méthylène.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique interne, particulièrement énergique et anti-infectieux par excellence. Aucune intolérance. Pas de contre-indications.

Indications. — Antisepsie générale, Maladies infectieuses, Infections urinaires et biliaires, Diathèse urique, Diathèse arthritique.

Mode d'emploi :

Cachets : 3 à 6 par jour au début des repas.

Dragées : 6 à 9 par jour au début des repas.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de l'UROMETHYL

J. BRESSIER,

102, rue Vincent — MARSEILLE

UROMÉTINE LAMBIOTTE FRÈRES

Hexaméthylènetétramine pure.

Formes. — Comprimés, Ampoules, Cristaux.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

Indications. — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses, toutes manifestations de la diathèse urique.

Mode d'emploi. — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques ; 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses ; 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Littératures et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

UROMIL

Composition. — Association d'éther phényl-cinchonique, piperazine, hexaméthylène tétramine.

Forme. — Granulé de goût agréable, effervescent, instantanément soluble dans l'eau.

Action. — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Par ses éléments phosphoriques, empêche la formation de purines endogènes, génératrices d'acide urique.

Par son phosphate disodique, entrave la précipitation de l'acide urique au niveau du rein et de la vessie.

Possède une activité double de celle des pipérazines granulées.

Indications. — Diathèse urique, goutte, rhumatisme chronique, lithiase hépatique et rénale.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

Laboratoires **UROMIL**

Dr L. BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

UROPHÉNYL

Composition. — Acide phénylquinolique carbonique et hexaméthylène tétramine recristallisée.

Action. — La puissance de l'acide phénylquinolique carbonique pour l'élimination de l'acide urique, sans ses inconvénients (ictère) par association en heureuse proportion avec l'urotropine recristallisée.

Indications. — Goutte et rhumatisme.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cachets par jour avant les repas, dans un grand verre d'eau alcaline.

Laboratoires **CROUY,**

Docteur en Pharmacie.

VERNON (Eure).

UROPHILE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le N° 363-10.

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Lithine en combinaison benzoïque, Hexaméthylène tétramine, Acide Thyminique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Uricolytique, Diurétique, Régulateur de l'activité hépatique, Antiseptique des voies urinaires et biliaires.

Indications. — Diathèse arthritique. — Goutte aiguë et chronique. — Gravelle urique. — Lithiase biliaire. — Rhumatismes. — Cystites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas,

L'étui : 14 francs. (En France.)

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

UROSALYL

Association stable de l'Urotropine et du Salol.

Composition :

Hexaméthylène tétramine. 0 gr. 40.
Salol..... 0 gr. 50.
Excipient neutre..... Q. S. pour 1 cachet.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique des infections urinaires, biliaires, intestinales. Il donne d'excellents résultats dans les urétrites, prostatites, cystites purulentes, pyurie ; prophylaxie de la fièvre typhoïde et toutes les maladies infectieuses.

Présentation. — En boîtes de 24 et de 60 cachets. (*Sous tubes de verre paraffinés*).

Doses. — 2 à 3 cachets par jour, au début des repas.

Prix de vente : G. M., 20 fr. ; P. M., 8 fr. 50.

UROSALYL MÉTHYLÉ

(Bande bleue.)

Réservé aux malades qui présentent de l'intolérance vésicale pour l'Urotropine.

Formule : Salol, 0 gr. 65 ; Bleu de méthylène chimiquement pur, 0,03 ; Excipient neutre, Q. S. pour 1 cachet.

Même présentation, mêmes indications, mêmes doses et mêmes prix que l'Urosalyl simple.

Enregistré au laboratoire national de contrôle des médicaments sous les nos 300-1 et 300-2.

(Peut être prescrit aux assurés sociaux)

Clément GARDIOL

Pharmacien de 1^{re} classe,
de la Faculté de Montpellier.

6, rue Félix-Pyat — MARSEILLE.

Échantillons. — Littérature sur demande.

UROSAN DUFAYARD

Forme. — Comprimé à faire dissoudre.

Composition. — Benzo-camphorate d'urotropine et extrait de styles de maïs.

Indications. — Antiseptique, urinaire et biliaire. *Médicament de choix* pour le traitement des Cystites, Prostatites, Urétrites, Pyélites, Pyélonéphrites de la Grippe, Fièvre typhoïde, Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Calculs, Phosphaturie.

2 à 6 comprimés par jour, dissous dans l'eau.

Echantillons sur demande.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DUFAYARD

12, rue des Saints-Pères — PARIS.

UROZEA

Antiseptique hépato-urinaire.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Maladies infectieuses, syndrome entéro-rénal, lithiases biliaire et rénale, goutte, rhumatisme chronique.

Forme. — Granulé effervescent agréable au goût.

Formule. — Hexaméthylène tétramine, benzoate de lithine, salicylate de lithine, carbonate de lithine, citrate hexaméthylène tétramine, théobromine, benzoate soude, scille, pipérazine. Ext. de stig. de maïs, ext. uva ursi, ext. chiendent.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Laboratoire LOBRY

6, rue Parrot — PARIS (XII^e).

UVARGOL

Argent colloïdal activé par la lumière.

Première utilisation en thérapeutique de l'action des rayons lumineux sur l'argent. (On connaît la sensibilité particulière de l'argent à la lumière : photographie).

Cette action a pour effet :

- 1° D'augmenter très fortement le pouvoir bactéricide de l'argent colloïdal, d'où pour action égale *dose extrêmement réduite*.
- 2° De fournir un produit d'action absolument constante.

L'Uvargol se fait sous forme :

Doses. — 1° *De Dragées*, pour adultes : 6 à 8 par jour, à prendre avant les repas. Contiennent 1 cgr. de principe actif.

2° *De comprimés*. — *Enfants et nourrissons* : 3 à 5 comprimés par jour, à faire dissoudre dans de l'eau ou du lait et à prendre en 2 fois avant chacun des principaux repas, ou avant les tétées. Contiennent 1 cgr. de principe actif.

3° — *D'Ovules* contenant 5 cgr. de principe actif. Un tous les jours ou tous les 2 jours.

Indications :

1° *Dragées ou comprimés* : toutes les maladies infectieuses de l'intestin ou des voies urinaires : Entérites, Diarrhées (et particulièrement diarrhées infantiles), fièvre typhoïde, grippe infectieuse, cystite, pyélo-néphrite à colibacilles, syndrome entéro-rénal, etc...

2° *Ovules* : Traitement des affections de la femme : Métrites, salpingites, vaginites.

Laboratoires de l'UVARGOL

G. MARTINIE

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI°).
37, avenue de l'Echo — SAINT-MAUR (Seine).

R. C. 440.107.

Télé. : Roquette 86-84 ; Gravelle 04-32.

UVÉ

(Gouttes)

Composition. — Solution aqueuse de Phosphate de chaux, Chlorures de manganèse, Magnésie et fer, acide phosphorique (11 centigr. par cc.) irradiés par rayons ultra-violet. **Ni Arsenic, ni Strychnine.**

Mode d'action. — Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

Indications. — Toutes les **ANOREXIES** (nourrissons, enfants, adultes) dont elles sont le *véritable spécifique*, Convalescences post-infectieuses, Asthénies, Surmenage, etc.

Posologie. — *Adultes* : XL à LX gouttes. *Enfants* : XX à XL gouttes, en une ou deux fois, dans un peu d'eau simple ou de préférence bicarbonatée. *Nourrissons* : 1 goutte par mois d'âge de 1 à 6 mois ; 1 goutte et demie de 6 à 12 mois, dans le lait des tétées.

Prix : Le flacon : 9 fr. 80 ; grand modèle : 18 fr.

Laboratoires UVÉ-CRINEX

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV^e).

UVÉOLINE

Pommade antiseptique aux essences aromatiques, longuement irradiée par les Rayons Ultra-Violet.

Indications. — Pyodermites, Plaies atones, Ulcères variqueux, Furonculose.

Mode d'action. — Agit par les essences végétales, l'hydroxyde de magnésium, le peroxyde de zinc, le bismuth, le calomel.

Mode d'emploi. — En onctions ; en compresses imprégnées ; incorporée à la paraffine dans les brûlures.

Prix du tube de 40 gr. : 10 francs.

Laboratoire de l'UVÉOLINE

Pharmacie AMBARD

CARCES (Var),

UVÉPHORINE

Spécifique de toutes les carences de l'organisme.

Composition. — Association de l'Ergostérine irradiée ou Vitamine D à la Phytosphosphine (Inosito-hexaphosphaté de chaux et de Magnésie).

Propriétés. — A pour buts bien définis : La fixation du calcium dans l'organisme, et l'apport de phosphore à un organisme qui s'en trouve insuffisamment pourvu. Possède un grand pouvoir reminéralisateur et reconstituant.

Indications. — Rachitisme, Déminéralisation, Faiblesse générale, Anémie, Surmenage, Croissance, Accidents de carie dentaire, Troubles de l'ossification, Grossesse, Allaitement.

Doses. — *Adultes* : 2 *cachets* par jour, aux repas ou 2 cuillerées à café de *granulé*.

Enfants : 1 à 2 *cachets* par jour ou 1 à 2 cuillerées à café de *granulé*.

Prix : *Cachets* (boîte de 24) : 15 fr. — *Granulé* : 16 fr. 50.

Laboratoire E. HAUTDIDIER
37, rue Galilée — PARIS (XVI^e).

UVESTÉROL

Vitamine D + Facteur de croissance.
ERGOSTÉRINE et CHOLESTÉRINE
Irradiées par rayons ultra-violets.

Composition :

Emulsion *non huileuse* contenant par cc. (XXV gouttes) : 1500 unités antirachitiques D ; Cholestérine, 15 mgr.

Mode d'action :

Fixe chaux et phosphore, Active la croissance, Antitoxique, bactéricide, hémopoïétique.

Avantages :

Remplace intégralement l'huile de foie de morue, parce qu'il unit à l'action exclusivement antirachitique de l'Ergostérine irradiée (Lesné, Clément, Simon) les activités de croissance, antitoxique et antianémique, de la Cholestérine.

II gouttes égalent 3 cuillerées à soupe d'huile de foie de morue.

Aucune toxicité, aucune contre-indication.

Parfaitement toléré même par les fébricitants.

Indications :

Croissances difficiles ou retardées, Lymphatisme, Prétuberculose.

Rachitisme, tétanie, décalcifications.

Toutes tuberculoses (osseuses, séreuses, ganglionnaires, pulmonaires).

Conservation :

Garde intacte son activité, même au bout d'un an.
Les flacons portent une date limite d'utilisation.

Posologie :

Adultes : XXX à LXXX gouttes. *Enfants* : X à XXX gouttes, soit pures, soit diluées dans une boisson lactée, une eau alcaline, du jus d'orange.

Chez le *nourrisson sain* (action préventive) : V gouttes.

Chez le *nourrisson rachitique* : X à XL gouttes.

Prix : Le flacon : 10 fr. 50 ; grand modèle : 18 fr. 50.

Laboratoires UVÉ-CRINEX

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV°).

VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE

du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe. Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané ; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5^e et la 6^e injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans ; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 10 ampoules : 35 francs (prix au public).

VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE

du Professeur MINET

« A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une modification véritablement impressionnante du tableau classique de la pneumonie. »

Indications. — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

Mode d'emploi. — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule soit 1 cc. et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs.

VACCIN ANTI-GRIPPAL

du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes les complications pulmonaires et suppuratives : otites, sinusites, etc., congestion grippale.

Enraye immédiatement toutes grippes légères ou graves dans leur évolution et évite ainsi leurs complications.

Mode d'emploi. — Voir « Vaccin Anti-Pneumonique ».

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs

Laboratoires " STÉNÉ "

2, place des Vosges — PARIS.

VACCIN DEMONCHY

anti-gonococcoïque

Le vaccin Demonchy, grâce à sa richesse en corps microbiens (25 milliards de germes au cc.), donne d'excellents résultats non seulement dans les urétrites aiguës et subaiguës, mais aussi dans les complications de la blennorrhagie.

Présentation :

Ampoules de 1 cc.

Posologie :

Pratiquer une série de 8 à 10 injections de vaccin à doses progressivement croissantes ($\frac{1}{4}$ de cc., $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 cc.) en s'abstenant rigoureusement de tout traitement local.

Technique des injections :

Les injections doivent être faites en plein tissu sous-cutané, entre la crête iliaque et les dernières côtes.

Les injections se font tous les deux jours. Pour éviter toute réaction du derme, ne pas utiliser pour l'injection l'aiguille qui a servi à prendre le vaccin dans l'ampoule. Lorsque la vaccination est effectuée en se conformant à cette technique, l'action du vaccin se manifeste par *une rapide amélioration et après la huitième injection, il suffit, pour obtenir la guérison, de quelques lavages.*

Prix de vente au public : 20 francs.

Prix médical : 12 fr. 60.

**Société Générale
d'Applications Thérapeutiques**

THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès-sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

VACCIN DE WEILL ET DUFOURT

Composition. — Pneumocoques, Entérocoques, Staphylocoques, Tétragènes.

Indications :

1° *Préventif* : Bronchites profondes ou épidémiques. — Broncho-pneumonies post-opératoires.

2° *Curatif* : Broncho-pneumonies de l'enfant et de l'adulte. — Pneumonies.

Avantages. — Aucune contre-indication. — Aucune réaction.

Posologie :

Nourrissons : $\frac{1}{3}$ de cc. ; puis $\frac{1}{2}$ cc. ;
puis 1 cc. *Adultes* : 1 cc.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS.

VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.

Médication causale naturelle.

Innocuité absolue.

Vaccin Ac. Sa (aéné).....	Cépède.
Vaccin Bg. Pf. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications).....	Cépède.
Vaccin C. (colibacillaire).....	Cépède.
Vaccin C. E. (coli-entérococcique).....	Cépède.
Vaccin C. E. S. (diarrhée).....	Cépède.
Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite).....	Cépède.
Vaccin E. (entérococcie).....	Cépède.
Vaccin E. S.....	Cépède.
Vaccin E. Sa.....	Cépède.
Vaccin G. (gonococcie).....	Cépède.
Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie).....	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. (affections blennorrhagiques de l'homme et de la femme).....	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. Psd.....	Cépède.
Vaccin Mo (Morax) (conjonctivite aiguë).....	Cépède.
Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
Vaccin P. E. S. (pneumonie).....	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca.....	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Otitis).....	Cépède.
Vaccin Pf. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications).....	Cépède.
Vaccin Pf. Pb. S. P. E. S. Ca. (Asthme).....	Cépède.
Vaccin S (érysipèle).....	Cépède.
Vaccin Sa (furoncles).....	Cépède.
Vaccin S. Sa (peau-ostéomyélite).....	Cépède.
Vaccin S. E. S (puerperalité).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S (100 millions).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S (400 millions).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. 100.....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz. (Ozène).....	Cépède.

Tous curovaccins atoxiques sur demande
de MM. les médecins

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les curovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajouté.

La boîte de 10 ampoules : 30 francs au public.

Institut de Biologie appliquée

57, 59, 60, rue Mathurin-Régnier et 47, rue Bague

PARIS (XV^e) — Téléph. : Ségur 11-40

Adresse télégraphique : Ibacépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.

Adopté par les Hôpitaux.

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Stock-vaccins constitués par des émulsions de cultures traitées par le fluorure de sodium, injectables par la voie sous-cutanée ou intramusculaire; composition polyvalente.

Nomenclature et Indications :

Néo-Dmégon : Antigonococcique (voir p. 681).

Néo-Dmesta : Antistaphylococcique.

Néo-Dmètys : Anticoquelucheux (voir p. 681).

Aplexil : Préventif des complications pulmonaires de la Grippe et des Fièvres éruptives.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)

Prophylaxie — Vaccinothérapie.

VACCIN : Antityphoïdique.

- Antistaphylococcique.
- Polyvalents.
- Pneumo-streptococcique.
- Anticoquelucheux.
- Antigonococcique.
- Antistreptococcique.
- Anticolibacillaire.
- Antimélitococcique.

Injectables en injections sous-cutanées.

Vaccin-Pansements non injectables.
(polyvalent).

Dépositaires généraux

DEFFINS, 40, faubourg Poissonnière — PARIS.

LABORATOIRE de BIOLOGIE MÉDICALE

16, rue Dragon — MARSEILLE.

HAMELIN, 16 ter, rue Burdeau — ALGER.

AVIGNON et HAYAT, 9, rue Malta-Srira — TUNIS.

Pour littérature et échantillons :

16, rue Dragon — MARSEILLE.

VACCINS

(Bruschettini).

2 vaccins sont préparés selon la méthode très originale et très personnelle du professeur BRUSCHETTINI, de Gênes, par les

Laboratoires FOURNIER Frères.

7, rue Biscornet — PARIS.

1° Un vaccin Antipyogène polymicrobien polyvalent s'appliquant à toutes les infections dues aux pyogènes communs. Son absence à peu près totale de réactions, tant générales que locales ou focales, en fait le type de vaccin d'urgence.

2° Un vaccin Antigonococcique avec ses applications spécifiques.

Posologie.

Ces 2 vaccins s'emploient à une dose moyenne d'une ampoule par jour et il est particulièrement recommandé de répéter les injections dans les cas graves. Cette posologie leur est particulière.

Sur demande il est envoyé littératures et échantillons ainsi qu'une trousse de vaccinothérapie d'urgence : trousse métallique contenant seringue, aiguilles et ampoules.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS.

VACCINS INTRADERMIQUES ET GELÉES-VACCINS IVAGO.

de L. Goldenberg,

Caractéristiques des vaccins injectables. — Injection intradermique par *gouttes* avec la seringue de Barthélemy, ou de préférence, celle de Goldenberg. Pas de réactions locales ou générales.

Posologie. — Une série de dix piqûres. A la première injection, injecter une goutte. Augmenter progressivement toutes les 48 heures d'une goutte jusqu'à six gouttes; dose maxima.

Caractéristiques des Gelées-Vaccins. — Elles s'appliquent en pansements. Pour la furonculose et les abcès recouvrir le pansement de *coton cardé*. Renouveler le pansement deux ou trois fois par 24 heures en le faisant précéder d'applications d'eau bouillie très chaude sans antiseptiques.

N. B. — L'emploi simultané des vaccins et des gelées correspondantes donne une immunisation durable.

NOMENCLATURE

Vaccins. — A (Antigrippal) ; B (Antipyrorrhéique) ; D (Antistaphylococcique) ; G (Antigonococcique) ; M (Gynécologique) ; P (Antipyogène) ; R (Antiozéneux), U (Anticobacillaire).

Gelées-vaccins. — B (Antipyrorrhéique) ; D (Antistaphylococcique) ; M (Gynécologique) ; P (Antipyogène) ; et gelée-vaccin Anticoryza.

Ovules-vaccins. — Seringue et aiguilles spéciales Goldenberg.

Laboratoires IVAGO

17, Rue de Provence — PARIS (IX^e).

L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie.

VACCINS PANSEMENTS

préparés par les Laboratoires « VIRULTRA »

Agissant par contact. Indolores, Atoxiques, Polyvalents.

1^o Spécial trachome. — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et 12 ampoules de 5 cc.

2^o Ophtalmologique. — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et 12 ampoules de 2 cc.

(Conjonctivites, Dacryocystites, Blépharocystite, Ophtalmie purulente du nouveau-né et toutes affections oculaires suppurées.)

3^o Oto-Rhino-Laryngologique. — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et 6 ampoules de 5 cc..

(Rhinites, Sinusites, Otites, Mastoïdites et toutes affections des voies respiratoires supérieures.)

4^o Gynécologique. — Boîtes de 3 ampoules de 20 cc. et 6 ampoules de 20 cc.

(Métrites, Salpingites, Fièvre puerpérale, etc.)

5^o Anti-pyogène général. — Boîtes de 3 ampoules de 10 cc. et 6 ampoules de 20 cc.

(Plaies, Affections cutanées, Brûlures, Eczéma, Furoncles, Impétigo, etc...)

6^o Anti-pyogène chirurgical. — Boîtes de 3 ampoules de 20 cc. (Pré et post-opératoire.)

Pour tous ces vaccins, emballages spéciaux par 25 ampoules pour Services hospitaliers, corps médical, dispensaire, etc...

Laboratoires « VIRULTRA »

LAUNAY-SERQUIGNY (Eure).

VACCINS POLYVALENTS

du Docteur RENARD

pour le traitement des Infections Oculaires.

Composition. — *Vaccin n° 1* : Staphylocoques, Streptocoques, Massues, Entérocoques, Gonocoques, Pneumocoques, Filtrat de B. Pyocyanique.

Vaccin n° 2 : Même formule, mais sans Gonocoques.

Indications. — *Vaccin n° 1* : Conjonctivites purulentes graves.

Vaccin n° 2 : Infections post-opératoires ou traumatiques, Infections palpébrales ou orbitaires.

Mode d'emploi. — Injections hypodermiques.

Posologie. — *Nouveau-né* : 1/4 de cc. le premier jour.

Adultes : 1/3 le premier jour.

Les jours suivants, augmenter la dose suivant réaction.

Laboratoires ROBERT et CARRIERE

37, rue de Bourgogne — PARIS.

VACCINS-RONCHÈSE

AMPHO-VACCINS

Lysat bactérien, ou filtrat de cultures, et bactéries entières.

Avantages. — L'association lysat microbien et microbes entiers détermine *rapidement* la formation d'antitoxines et provoque des phénomènes de défense contre l'infection (agglutination puis neutralisation de l'élément infectant), aboutissant à l'état d'immunité. Par leur double composition, les Ampho-Vaccins constituent un perfectionnement remarquable de la vaccinothérapie.

AMPHO-VACCINS INJECTABLES

Par cc. : lysat de 2 milliards de germes et 200 millions de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Anti-infectieux. — *Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Toutes infections générales ou locales. Vaccin général des affections thermiques même avant le diagnostic précis. Vaccination pré-opératoire.

Antistaphylococcique. — *Staphylocoques.*
Furoncles, Anthrax, Ostéomyélites, Impétigo, Acné, Folliculites, Staphylococcémies.

Intestinal. — *Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.*

Tous états intestinaux aigus ou chroniques.

Pulmonaire. — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques, Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer.*

Pneumonie, Broncho-pneumonie, Bronchites, Grippe, certains Asthmes, Sinusites, Otitis, Conjonctivites.

Urinaire. — *Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques.*

Toutes infections de l'appareil urinaire.

Posologie :

<i>Adultes.</i>	{	1 ^{re} injection	1/4 de cc.
		2 ^e —	1/2 cc.
		3 ^e inject. et suiv...	1 cc.
<i>Enfants.</i>	{	1 ^{re} injection	1/8 de cc. (II gttes)
		2 ^e —	1/4 de cc.
		3 ^e inject. et suiv...	1/3 ou 1/2 cc. selon l'âge.

Injections journalières pour les doses d'essai, tous les 2 ou 3 jours pour les suivantes. Injections sous-cutanées ou intramusculaires. L'injection intraveineuse est possible si elle est jugée nécessaire. Délivrés en boîtes de 6 ampoules de 1 cc. 5.

Prix: 25 francs.

AMPHO-VACCINS A INGÉRER

Par cc. : lysat de 1 milliard de germes et 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Anti-infectieux. — *Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Toutes infections générales ou locales, Dermatoses, Vaccination pré- ou post-opératoire.

Antistaphylococcique. — *Staphylocoques.*

Furoncles, Anthrax, Ostéomyélites, Impétigo, Acné, Folliculites, Staphylococcémies.

Antityphoïdique T. A. B. — *Bacilles d'Eberth, Bacilles para A et B, Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacilles pyocyaniques.*

Agent curatif remarquable des infections typhique et para-typhiques et, grâce à l'association microbienne étendue, des affections générales indéterminées d'origine intestinale.

Intestinal. — *Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.*

Auto-intoxications d'origine intestinale, Entérites, Appendicites, Cholécystites, Syndrome entéro-rénal, certains Rhumatismes, Insuffisance hépatique, Préparation des malades avant les interventions abdominales, préparation aux Accouchements.

Pulmonaire. — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques, Entérocoques, Micrococcus calarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer, Bacilles pyocyaniques.*

Grippe, Bronchite, Pneumonie, Broncho-pneumonie, certains Asthmes, Sinusites, Otites, Conjonctivites.

Urinaire. — *Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques.*

Toutes infections de l'appareil urinaire.

AMPHO-VACCINS A INGÉRER

Posologie habituelle :

Adultes et adolescents : 2 à 3 ampoules par jour, de préférence loin des repas.

Enfants : 1 à 2 ampoules par jour.

La posologie du *Vaccin intestinal* varie selon qu'il s'agit d'un cas aigu ou chronique ; elle est la suivante :

Cas aigus : 1 ampoule le matin à jeun, 1 le soir en se couchant, pour les *adultes* ; 1 ampoule par jour en 2 fois, pour les *enfants*.

Cas chroniques et auto-intoxications : Pour *adultes et enfants d'âge moyen* : 1 ampoule par jour le matin pendant 8 jours, puis 1 ampoule tous les 3 ou 4 jours.

Présentation :

L'Ampho-Vaccin à ingérer intestinal est délivré en boîtes de 8 ampoules de 5 cent. cubes.

Les autres Ampho-Vaccins à ingérer sont présentés en boîtes de 10 ampoules de 2 cent. cubes.

Prix : 25 francs.

AMPHO-VACCINS PANSEMENTS

Filtrat de culture additionné par cent. cube de un milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Antipyogène. — *Staphylocoques, Streptocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Furoncles, Anthrax, Abscesses, Dermatoses infectieuses, Interventions abdominales, Curettages, Cancers du col.

Mode d'emploi. — Mettre sur la plaie une compresse imbibée de vaccin. Un à deux pansements par jour. *Pour les cavités* : Imbiber une mèche de vaccin-pansement et l'introduire dans la cavité à traiter.

Deux présentations :

Ampoules de 10 cc. Prescrire : Ampho-Vaccin, pansement antipyogène.

Ampoules de 2 cc. Prescrire : Ampho-Vaccin antipyogène pour petits pansements.

Rhino-pharyngien. — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Entérocoques, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pleiffer, Staphylocoques.*

Affections du nez, du pharynx, des oreilles, de la mastoïde, de la conjonctive.

Traitement abortif du coryza. Rhino-prophylaxie de la grippe.

Présenté en ampoules qui se transforment en appareil d'instillation par l'adjonction d'une tétine livrée avec les ampoules.

Posologie. — 3 à 4 instillations par jour, ou encore des pulvérisations dans la journée, et 2 instillations, 1 le matin, 1 le soir.

Délivré en boîtes de 6 ampoules de 2 cent. cubes auto-instillables. Prix : 20 francs.

Ampho-Tablettes (Comprimés à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien). Voir page 38.

Pyo-Amphogel (Gelée molle à base d'Ampho-Vaccin pansement antipyogène). Voir page 833.

Laboratoires des Ampho-Vaccins.

A.-D. RONCHESE, Docteur en pharmacie,
6, rue Rothschild — NICE.

VACCINS " STÉNÉ "

Vaccin antifuronculeux « Sténé ». — Traitement de la furonculose et des affections à staphylocoques. (En injections sous-cutanées, ampoules de 1 cc. — en comprimés.)

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

La boîte de comprimés. Prix public : 12 francs.

Bouillon-vaccin antifuronculeux « Sténé », pour pansements.

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

Vaccin anti-coryza « Sténé » polyvalent. — Traitement des Coryzas aigu et chronique, des pharyngites, angines, rhinites et de l'ozène.

Le tube. Prix public : 8 francs.

Ovules-Vaccin « Sténé ». — Métrites, Salpingo, ovarites, pertes blanches.

La boîte. Prix public : 18 francs.

Vaccin « opératoire » Sténé. — Préventif des complications infectieuses post-opératoires. En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

Bouillon-Vaccin « opératoire » Sténé. — Pour pansements.

Vaccin antipyogène Sténé. — Pour le traitement des plaies. Préventif et curatif de l'infection des plaies de toutes natures.

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En Bouillon-Vaccin pour pansements.

Vaccin Antistaphylococcique « Sténé »

Bouillon-Vaccin Antistaphylococcique « Sténé ».

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En bouillon-vaccin pour pansements.

Laboratoires « STÉNÉ »

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

Téléph. : Archives 46-47. Adr. télégr. ; Sténé 21 Paris.

VACLYDUN

Lysats vaccins du Docteur Louis Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

Le Vaclydun est un vaccin d'un type entièrement nouveau. Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique. Utilisation des propriétés du bacille pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines (en particulier, la toxine diphtérique), ce qui permet sa stérilisation par filtration sur bougie serrée. Il est donc un « vaccin vivant ».

Voir : Broncho-Vaclydun ; Coli-Vaclydun ; Gono-Vaclydun ; Pyo-Vaclydun ; Staphylo et Strepto-Vaclydun.

VACLYDERM

Composition. — Le Vaclyderm est le Pyo-Vaclydun incorporé à un corps gras.

Indications. — Réalise une vaccinothérapie cutanée locale. Toutes les Dermites, Furunculose, Anthrax, Impétigo, Folliculites, Erysipèle, etc.

Mode d'emploi. — En applications locales, 2 à 3 fois par jour. Peut être associé à la vaccination profonde.

Le tube : 18 francs.

Laboratoires CORBIERE

27, rue Desrenaudes — PARIS

Tél. : Carnot 78-11. Télégr. : Pantuto 74 Paris.

VAGOSÉDYL

Sédatif du vague.

Dosage.

1 comprimé =	{	Phényléthylmalonylurée	} 44 0 gr. 017.
		Extrait de Jusquiame, titré en alcaloïdes.	
		Extrait de Valériane fraîche stabilisée...	
		Oxyde de zinc par voie humide.....	

Équivalence.

3 comprimés (pro die)	{	Pilules de Méglin.....	n° 1
équivalent sensiblement à		Phényléthylmalonylurée..	0 gr. 05

Posologie. — Les doses varieront suivant les cas de 2 à 5 comprimés par jour à prendre au début des repas.

Indications principales. — Hypervagotonie, Spasmophilie, Algies et Spasmes viscéraux, Entéralgie, Gastronévroses, Aérophagie, Mal de Mer, Troubles réflexes des Ptoses, Malaises en rapport avec la menstruation, la grossesse, la ménopause, Symptômes subjectifs du cœur (Vrais et Faux Cardiaques), Hypertension par artério-spasme et ses conséquences, Toux nerveuses, Dyspnées spasmodiques, Asthme infantile. Angoisses, Nervosisme, Mélancolie anxieuse, Excitation psychique, Tremblements, Prurits, Incontinence d'urine, Troubles du sommeil.

Laboratoires du VAGOSÉDYL.

20, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

G. COUSSINET, Pharmacien de 1^{re} classe

Ancien interne des Asiles de la Seine, licencié ès sciences.

VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé.)

Perles. — 3 à 6 par jour avant les repas ;
ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux
heures après un léger repas.

Propriétés. — Antispasmodique énergique
et puissant sédatif du système nerveux,
régulateur de la circulation et de la respi-
ration.

N. B. — La Valbornine n'est pas un sopori-
fique. Le sommeil n'est régularisé qu'au
bout de quelques jours par sédation du
système nerveux.

Le flacon : 10 fr.

Henry ROGIER

Docteur en pharmacie,

56, boulevard Péreire — PARIS.

VALBROL

Essai de rajeunissement de la Formule de Meglin.

Composition :

Extrait alcoolique de valériane <i>stabilisée</i>	0 04
Extrait alcoolique de jusquiame.....	0 01
Extrait alcoolique de passiflore.....	0 03
K Br	0 05
Extrait alcoolique de cratœus	0 03
pour une dragée de 0 gr. 16.	

40 dragées par étui — Prix en France : 12 fr.

Propriétés : Activité due à la valériane stabilisée et à l'association jus-
quiame-passiflore, beaucoup moins toxique que la jusquiame employée
seule, aux doses thérapeutiques (H. Leclerc). Le cratœus agit syner-
giquement.

Indications. — Etats nerveux : angoisse, mélancolie, anxiété. Insom-
nie, quelle qu'en soit l'origine : surmenage, éthylisme, affections car-
diaques ou vasculaires, digestives, génitales.

Posologie : Etats nerveux : 1 à 2 dragées par jour.

Insomnie : 1 à 3 dragées le soir au coucher.

A avaler sans croquer avec une boisson chaude.

Laboratoires MA YOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.

VALEDYL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement phytothérapique des névropathes, cardiopathes.

Indications. — Insomnies, vertiges, neurasthénie, états spasmodiques, états névropathiques troubles cardiaques.

Formule. — Extraits stabilisés de valériane, de Passiflore, de cratægus, acide diacétylbarbiturique sodique, alcoolature de ballote, teinture de jusquiame.

Forme. — Le Valedyl est présenté sous forme de liquide sirupeux sans aucune odeur.

Mode d'emploi. — En cas de troubles nerveux ou cardiaques, 1 cuillerée à café avant les 3 repas. En cas d'insomnie, 1 à 4 cuillerées à café le soir au coucher.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

Téléphone : Diderot 04-71.

VALENAL NOVALIS

Composition. — Valériane extr. 0,045 ; Cratægus extrait, 0,015 ; Saule blanc extr., 0,015 ; Passiflore extrait, 0,016 ; Hamamélis extrait, 0,01 ; Gardénal, 0,005 pour une dragée.

Produit joignant à toute une série d'extraits végétaux l'action antispasmodique et hypotensive du gardénal à petite dose ; ce n'est pas une révolution, mais une association logique bien dosée, active et sans danger.

Indications. — Déséquilibre du sympathique, Insomnies, Agitations nerveuses, Etat nerveux de la ménopause, Hypertension (surtout spasmodique), etc..

Dose. — De 1 à 4 dragées par jour. Cette dose peut être largement dépassée.

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

VALERAMYL

(Produit Foulon.)

Formule. — Capsules dosées à 0 gr. 20 de Valérianate d'Amyle pur et lavé, obtenu par une préparation spécialisée.

D'odeur agréable, bien toléré grâce à son absolue pureté, parce que nullement toxique le VALERAMYL FOULON, plus actif que les Valérianates alcalins et non déprimant comme les bromures, est considéré comme un antispasmodique très précieux, à la fois puissant et doux.

Indications et doses (sauf prescription spéciale du médecin traitant).

Hypnotique. — (Sommeil normal, dépourvu de phénomènes dépressifs au réveil).

2 à 3 capsules au coucher, avec une gorgée d'eau ou de tisane.

Sédatif et antispasmodique. — (Déséquilibre nerveux : Irritabilité, Anxiété, Emotivité, Syndromes solaires, Spasmes cardiaques, Angine de poitrine, Douleurs d'origine nerveuse.

6 à 8 capsules en 24 heures, par 2 à la fois (matinée, après-midi, soir et nuit) avec une bonne gorgée d'eau ou de tisane.

Prix : 12 fr. le flacon de 40 capsules.

Produits FOULON

Laboratoire du Lutéovar

14 bis, rue de la République — ERMONT (Seine-et-Oise).

VALÉRIANATE GRIGNON

à odeur dissimulée.

Composition. — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

Forme. — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

Propriétés thérapeutiques. — Antinerveux, antispasmodique.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

VALÉRIANATE PIERLOT

Liquide ou en capsules.

RÊSTE TOUJOURS ET MALGRÉ TOUT

l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

Neurotrophe, actif, sédatif, inoffensif, il rétablit toujours l'équilibre du système nerveux en supprimant l'excitabilité morbide des neurones.

Posologie :

1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée ou non, le soir avant de se coucher et le matin à jeun.

H. RIVIER

Pharmacien de 1^{re} classe

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS.

VALÉRIANE BYLA

(Sédatif régulateur du système nerveux.

Renferme tout le suc inaltérable de la *plante fraîche et vivante stabilisé* et concentré. Ne contient ni acide valérianique libre, ni ammoniaque combinée.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant des centres nerveux supérieurs affaiblis, dépresseur de l'excitabilité réflexe exagérée. Anti-épileptique, antispasmodique, analgésique, hypnotique.

Indications. — Névroses, hystéries, épilepsie, insomnies nerveuses, névralgies, neurasthénie, troubles de la ménopause, convulsions des enfants, palpitations, tachycardie, etc.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

VALÉRIANE GMET

Composition. — Extrait total obtenu exclusivement à l'aide de racines de valériane sans adjonction d'acide valérianique ou d'autres produits de synthèse.

Propriétés. — Puissant toni-sédatif du système nerveux central et périphérique.

Odeur conservée (indice de son activité), mais *goût peu prononcé*. Bien acceptée par les femmes et les enfants.

Indications. — Tous les états d'excitation et de dépression nerveuse. Névroses, Insomnie, Epilepsie. Chorée, Nervosisme, Convulsions, Terreurs nocturnes, Cauchemars. Dans la neurasthénie, lui adjoindre le *Composé Gmel.* (Voir page 244).

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café avant les repas.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

Indications. — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide PACHAUT est inodore et d'une saveur agréable.

Laboratoires PACHAUT

130, Bd Haussmann — PARIS.

Téléph. : Lab. 16-72

VALÉRIANOSE GIGON

Composition. — Extrait de valériane fraîche stabilisée et pepsine.

Forme. — Pilules glutinisées.

Indications thérapeutiques. — Sédatif du système nerveux, Antispasmodique, Anti-névralgique.

Mode d'emploi et doses. — 4 à 6 pilules par jour. Solubilité dans l'intestin.

PEPTO-VALÉRIANE

Solution sans odeur d'extrait de valériane fraîche stabilisée et pepsine.

De 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

VALÉRIFLORE

Composition. — Valériane stabilisée, passiflore, véronal sodique.

Formes — Liquide.

Comprimés à 0 gr. 50 = une cuillerée à café.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif du Système nerveux central.

Indications. — Insomnies, palpitations, nervosisme, angoisse, excitation psychique, chorée, convulsions, toux nerveuse, etc.

Doses. — *Liquide* : 2 à 3 cuillerées à café par jour. *Comprimés* : 2 à 3 par jour.

Nota. — Forme liquide absolument *inodore*.
Intrait de valériane.

M. GLORY, Pharmacien,
38 bis, boulevard Beaumarchais — PARIS

VALÉRINODOR MALMANCHE

Composition. — Préparation liquide sirupeuse contenant par cuillerée à café : 0 gr. 10 d'extrait sec de Valériane stabilisée, 0 gr. 50 d'extrait fluide de Passiflora incarnata, 0 gr. 15 de Véronal sodique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant sédatif du système nerveux central. Tolérance parfaite. Sommeil calme sans nausées au réveil.

Indications. — Insomnies, Palpitations, Spasmes musculaires, Excitation psychique, Angoisse, Chorée, Convulsions, Toux nerveuse.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion de tilleul.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoire MALMANCHE
Pharmacien, Docteur ès sciences,
101, avenue de Paris,
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

VALÉRIUM PAUL THIBAUT

Dragées de *Valerianate de Cérium*, sans odeur, de P. Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Le meilleur sédatif régulateur du système nerveux. Action particulièrement élective sur le grand sympathique.

Indications. — Troubles gastriques d'origine névropathique, Dyspepsies nerveuses, Vomissements chroniques, Vomissements incoercibles de la Grossesse, Insomnies, Névralgies, Neurasthénie, Mal de Mer, Hoquet.

Posologie. — Prescrire 2 dragées le matin et 2 dragées dans le milieu de la journée. Dans les affections chroniques, prescrire, si possible, 2 dragées 2 à 3 heures avant les troubles. Continuer le traitement 10 à 12 jours. Cesser 2 à 3 jours et reprendre.

Les dragées de Valérium P. Thibault sont dosées à 0,05 de principe actif.

Laboratoire R. J. SOUDAN


Pharmacien de 1^{re} classe,

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

VALÉROBROMINE LEGRAND

Composition. — Éthers-Sels de l'Acide α Bromovalérianique



Avantages. — La VALÉROBROMINE LEGRAND (*brome organique*) offre, par rapport aux bromures (*brome minéral*), des avantages de même ordre que les Cacodylates et les Glycérophosphates (*arsenic et phosphore organiques*), par rapport aux arseniates et aux phosphates (*arsenic et phosphore minéraux*). Elle possède, contrairement au valérianate d'ammoniaque, une régularité d'action constante, et sa toxicité, quatre fois moindre que celle de ce produit, est nulle aux doses usitées. Effets plus nets et plus durables que les bromures et les valérianates, sans avoir à redouter, quelles que soient la durée du traitement et les doses employées, les inconvénients trop connus de ces produits.

Indications. — Toutes les névroses : Épilepsie, Insomnies nerveuses, Hystérie, Migraines, Vertiges, Coqueluche, Neurasthénie, Troubles mentaux de la ménopause, etc.

Formes. — *Liquide* : 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café, 2 à 6 cuillerées à café par jour. — *Capsules* : 0,25 d. bromovalérianate de magnésie par capsule enrobée de gluten, ne se dissolvant que dans l'intestin. 4 à 12 capsules par jour.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : 18 francs.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

VALÉROMENTHOL

Préparation à base de *suc frais de valériane*
combiné à l'éther mentholique
de l'acide valérianique.

Propriétés thérapeutiques. — Tous les avantages
des bromures sans aucun de leurs inconvénients.
Calmant par excellence. Antispasmodique sûr.
Antidote de la douleur, des troubles nerveux et
des états pathologiques de la neurasthénie.

Indications thérapeutiques. — Neurasthénie,
Hystérie, Insomnie, toutes affections nerveuses.

Mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café par jour
dans un peu d'eau ou d'infusion.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoire du VALÉROMENTHOL

10, rue Poncelet — PARIS.

Tél. : Wagram 37-58.

VALÉRONAL

Solution ou comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif
des troubles nerveux, Psychopathies.

Hypnotique doux sans odeur.

Antispasmodique.

Par cuillerée à café ou par comprimé.

Véronal sodique très pur..... 0 gr. 15

Extrait physiologique de Valériane fraîche
par plasmolyse 5 cc.

Dose sédatif. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé
2 à 3 fois par jour.

Dose hypnotique. — 1 cuillerée à café ou 1 com-
primé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher
dans infusion.

Pas de contre-indication.

Prix : Solution : 16 francs.

Comprimés : 13 francs

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoire BERGER

14, rue des Pyramides — PARIS.

VAL'OVARINE

Déficiences ovariennes, Névroses, États spasmodiques, Malaises.

Composition. — Association pluriglandulaire d'*ovaire intégral* contenant toute la *folliculine* et d'une infime proportion de *thyroïdine* avec l'extrait physiologique, déchlorophyllé, dégraissé et concentré de *valériane fraîche stabilisée*.

Pour un cachet : Ovarine intégrale..... 175 milligrammes.
 Thyroïdine..... 5 —
 Extrait de valériane fraîche... 150 —

Avantages. — Cachets roses très petits. — Odeur agréable. — *Conservation garantie par procédé spécial.* — Présentation soignée. — Nullement toxique. — Assimilation facile.

Les composants opothérapiques, obtenus d'après une technique tout à fait nouvelle, rendent leur efficacité thérapeutique maximum, l'extrait ovarien contient absolument toutes les hormones. *La rapidité d'extraction de ces produits permet en outre d'affirmer qu'aucune fermentation n'a été possible au cours de leur fabrication. Les ovaires en particulier sont garantis de premier choix et prélevés sur des animaux jeunes.*

L'extrait physiologique de valériane préparé par une méthode brevetée très récente est désormais le médicament valérianique le plus actif.

Propriétés thérapeutiques. — Insuffisances ovariennes,

Hypotenseur. — Tonique des centres nerveux. — Modérateur de l'excitabilité réflexe. — Antispasmodique et sédatif du système nerveux central. — Analséique. — Hypnotique.

Rendement maximum de l'action sédatrice et névrossthénique de la valériane.

Indications. — Infantilisme génital. — Troubles de la croissance et du développement. — Menstrues rares, peu abondantes, douloureuses. — Coliques utérines. — Troubles de la grossesse, de la sécrétion lactée. — Castration ovarienne. — Obésité glandulaire.

Tous états accompagnés de troubles nerveux. — Inquiétude de la Puberté. — Troubles divers de la Ménopause. — Chorée. — Cauchemars. — Neurasthénie. — États hystériques. — Insomnies nerveuses. — Névralgies,

Epilepsie menstruelle. — Palpitations — Tachycardie.

Posologie. — Pratique de la cure : *La boîte de cachets VAL'OVARINE a été créée pour un traitement normal d'un mois.*

Adultes : 2 cachets par jour à prendre aux repas, pendant une semaine Cesser 10 jours et reprendre pendant une semaine. (Selon avis du médecin, 3 à 4 par jour).

Adolescents : 1 seul cachet par jour.

Laboratoire de la VAL'OVARINE (Produit FARMA)
 64, rue d'Orsèl — PARIS (18^e).

VALOVOSAN

1 comprimé : 0,15 Isopropyl brome-acétylurée et 0 gr. 04 d'ovaires frais.

Indications. — Malaises neurasthéniques, Symptômes hystériques, troubles nerveux de la ménopause, Maux de tête de la période menstruelle, etc.

Forme. — Comprimés.

Mode d'emploi. — 2 comprimés 2 fois par jour.

Échantillons et Littérature :

31, avenue de Saint-Mandé à PARIS (XII^e)

P. BASUYAUX, pharmacien

94, rue Pasteur

FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine)

VALTHÈNE

(Gouttes)

Antispasmodique puissant.

Indications. — Toux laryngées, coqueluche, asthme, toux rebelles des tuberculeux.

Composition. — Alcoolature d'Alium Cepa, Teinture de Drosera, Teinture de Cochenille.

Ne contient aucun toxique. Goût agréable.

Posologie. — *Doses moyennes* à prendre dans une petite quantité d'eau sucrée et à répéter 4 à 5 fois par jour.

Enfants au-dessous d'un an... V à X gouttes.

— de 1 an à 5 ans X à XX —

— au dessus de 5 ans.... XX à LX —

Adultes L à LX —

Flacon de 30 cc. Prix : 11 fr. 50 (exempt d'impôt).

Laboratoire de la VALTHÈNE

A. VALAT

51, rue de Tourtille — PARIS (XX^e).

VANADARSINE GUILLAUMIN

GOUTTES

Composition. — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

Propriétés. — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

Indications. — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

Mode d'emploi. — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler; dose moyenne, X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

Prix : 12 francs.

VANADARSINE GUILLAUMIN

AMPOULES

(Sérum Vanadarsiné.)

Composition. — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cent. cube..

Propriétés. — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

Indications. — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Injecter 1 à 3 cent. cubes par jour ou tous les deux jours.

Enfants : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos recommencer le traitement si nécessaire. Se prescrit en ampoules de 1 cc. (prix 15 fr.), et de 3 cc. (dose forte) (prix 20 fr.).

Laboratoires **ANDRÉ GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes,
numérotés de 1 à 5.

Doses et mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le sixième jour, et continuer la variation.

Propriétés thérapeutiques. — Action laxative toujours identique. — Jamais d'accoutumance ni d'irritation. — Tolérance parfaite. — Innocuité absolue.

Prix : 10 francs la boîte,

Laboratoire de la VARILAXINE
164, rue Saint-Honoré — PARIS.

VARISCLÉRINE

(Ampoules)

préparées selon les indications du
Professeur Sicard

Injectons sclérosantes intravariqueuses,
sans accidents, sans succès.

Varisclérine A: Salicyl de soude.

Varisclérine B: Quinine.

Prix de la boîte de 12 : 30 fr.

Prix spéciaux au corps médical.

Laboratoire Angelini
61, rue de Seine — PARIS.
Tél. : Danton 92-73.

VARI-SÉRUM LEBON

(Ampoules, gouttes, dragées.)

Traitement rationnel des Varices et des Hémorroïdes

- a) Ampoules Quinine..... }
 b) — Salicylées... } **Varices.**
 c) — Bio-iodurées. }
 d) Ampoules. Urée **Hémorroïdes.**

Une notice détaillée contenant le mode d'emploi, les indications et contre-indications du traitement est jointe à chaque boîte ou envoyée gracieusement sur demande.

Les *gouttes* et les *dragées* complètent l'action des ampoules et agissent seules d'une façon remarquable dans les varices douloureuses, les crampes, les œdèmes, les hémorroïdes et les métrorragies de toute nature.

Prix en France : ampoules : 25 fr. la boîte.

Gouttes ; dragées : 16 fr. le flacon.

Laboratoires G. LEBON

CHAROST (Cher).

VASCUROL

(Dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles de la ménopause.

Composition. — Gui, cratægus, formine iodée, scille, pyrole, extraits laxatifs et opothérapiques.

Indications. — Hypertension, Presclérose et Artério-sclérose. Troubles de la ménopause. Varices. Hémorroïdes. Obésité.

Mode d'emploi. — 2 dragées au début de chacun des deux principaux repas.

Laboratoire P. GUÉRIN

MEULAN (Seine-et-Oise).

VASOLAXINE

Huile de vaseline pure.

Dose :

Adultes : 1 cuillerée à soupe en se levant à jeun et le soir en se couchant.

Enfants : 1 cuillerée à café.

Aromatiser, si jugé nécessaire, avec menthe, citron, cognac, etc.

Indications :

Constipation, Entérites, Appendicites chroniques, Hémorroïdes.

Le flacon : 12 francs.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

VASO-NEURINE

Extrait de Jaborandi et Chlorure de magnésium.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques.

Troubles circulatoires : Migraines, Congestions broncho-pulmonaires, Hémoptysies, Vertiges, Bourdonnements d'oreilles.

Troubles glandulaires : Congestions thyroïdienne, ovarienne, pancréatique ; Troubles sécrétoires, salivaires et cutanés.

Troubles sensitivo-moteurs : Arythmie, Tachycardie, Névralgisme facial, Névro-dermites.

Mode d'emploi. — VIII à XV gouttes, 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau, en commençant par la dose la plus faible.

Après les repas, matin, midi et soir.

Prix de vente au public : 16 francs le flacon.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e).

Tél : Auteuil 35-25.

VASO-RHINOL

Simple et mentholé.

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — 1° (V. R. simple) : Oxyde de Terpilène, Résorcine, Camphre, Linalol; Para-amido benzoate d'éthyle, Terpènes purifiés, Huile olive stérilisée.

2° (V. R. Mentholé) : Même formule plus menthol.

Indications. — 1° V. R. simple : Infections du Nez, du Pharynx, du Larynx et des Oreilles.

2° V. R. mentholé : Troubles sécrétoires, état congestif du Rhino-Pharynx, des Fosses nasales et du Sinus.

Doses. — X gouttes ou plus selon les cas, 2 à 4 fois par jour en position couchée.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

VASO-RHINOL ADRÉNALISÉ

Forme. — Pommade pour enfants et adultes.

Composition. — 1° Pommade pour enfants : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Pétroléine ;

2° Pommade pour adultes : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Novocaïne, Pétroléine.

Indications. — Infections du Rhino-Pharynx, Etat catarrhal, Troubles Vaso-Moteurs.

Doses. — Gros comme un pois dans chaque narine, deux à trois fois par jour.

Laboratoires des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

VÉGANINE

Le médicament à action renforcée.

Analgésique — Antipyrétique — Antigrippe.

Comprimés d'un procédé de fabrication nouveau, assurant une désagrégation immédiate.

Composition :

Phosphate de Codéine ...	0 gr. 01	} par comprimé.
Acide acétylsalicylique .	0 gr. 25	
Phénacétine.....	0 gr. 25	

Action thérapeutique et Indications :

La Véganine, composée d'après la théorie de l'association médicamenteuse, possède tous les avantages de chacun de ses composants, sans en avoir les inconvénients isolés :

Sédatif puissant par la Codéine.

Analgésique par l'acide acétylsalicylique.

Analgésique et antithermique par la Phénacétine.

Elle constitue un excellent agent thérapeutique à utiliser dans les maladies par refroidissement, courbatures fébriles, grippe et sa toux réflexe, rhumatismes, névralgies, céphalées, douleurs dentaires, également utile en neurologie (états anxieux).

Sa double action, synergique d'activité et diminutive de toxicité, permettra d'atteindre le résultat recherché avec des doses faibles et sans phénomène d'intolérance.

Doses et Mode d'Emploi :

1 à 6 comprimés par 24 heures, à prendre de préférence avec café ou thé.

Deux Modèles :

Le tube de 10 comprimés : 6 francs.

Le tube de 20 comprimés : 10 francs.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

Laboratoires SUBSTANTIA S. A.

F. Guillemoteau, pharmacien

13, rue Pagès — SURESNES.

VÉGÉPHOS

Composition. — Phosphore organique, *extrait de l'embryon de blé.*

Propriétés. — Récalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette, du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation.

Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.

Formes. — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulé à 12 p. 100. — Poudre.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Cachets : au public : 11 fr.

Granulé : — : 13 fr.

Pharmacie Centrale de France

21, rue de Nonnains-d'Hyères — Paris (IV^e).

VÉGÉTOL EXTERNE

Médication picro-balsamique.

Spécifique des infections locales de la peau et des muqueuses.

Composition. — Complexe liquide renfermant les constituants de plusieurs essences (thym, aspic, citronnelle, etc.) et les produits de réaction de l'acide picrique sur ces constituants.

Propriétés. — Produit non toxique, microbicide, décongestionnant, analgésique et cicatrisant, grâce à l'action de l'acide picrique, des essences et de leurs dérivés.

Indications. — Plaies, furoncles, anthrax, panaris. Affections des yeux, du nez, de la gorge, des oreilles. Maladies gynécologiques (en injections). Maladies des voies urinaires en injections et en instillations.

Suppositoires : Hémorroïdes, fistules, fissures, prostatites.

Ovules : Métrites, vaginites, salpingites, pertes blanches.

Laboratoire du VÉGÉTOL

8, rue des Quatre-Fils — PARIS.

Tél. : Archives 65-65.

VEGUVA

Composition. — Aliment hydrocarboné riche en vitamines A, B, C, renferme, à l'état de poudre impalpable, la totalité des substances azotées, des sels minéraux et de la cellulose des épinards, carottes et tomates.

Forme. — Poudre.

Indications. — *Nourrissons* : anorexie, arrêt de croissance, troubles du développement, troubles nutritifs aigus et chroniques, alimentation de transition pour passer du régime lacté au régime mixte.

Adultes : Régime achloruré, alcalose.

Doses. — *Nourrissons* : une mesure répartie dans les biberons de la journée.

Adultes : deux à trois mesures à répéter plusieurs fois dans la journée.

Délayer le Véguva à l'aide d'un liquide bouilli et refroidi (lait, eau, bouillon), puis l'incorporer à l'alimentation déjà prête.

Ne pas faire cuire.

Pour la poudre de légumes frais voir également : CAROTTASE.

Laboratoires WANDER
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

VEINOPOSINE

Régénérateur du système artério-veineux.

Composition. — Surrénales, Hypophyse, Ovotest, Thyroïde, Extrait d'Hamamélis, Cratœgus, Cœsculus, Viburnum, Valériane.

Indications. — Congestion sanguine sous toutes formes, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Vapeurs, Migraines, Troubles ovariens de la Puberté et de la Ménopause.

Formes. — Pilules et gouttes.

Dose :

Pilules : 4 à 6 par jour aux repas.

Gouttes : X à XXX deux fois par jour aux principaux repas.

Prix : *Pilules et gouttes* : 12 francs.

Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie Médicale
40. rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

VEINOSÉRUM

Indications. — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes, et tous états congestifs.

1^o *Forme gouttes* : Formule très active à base d'extraits de plantes *stabilisées* par procédé spécial (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamélis, rhamnées).

Doses : XX gouttes matin et soir, 15 jours par mois. — 15 fr.

2^o *Forme liqueur*, à base de citrates alcalins, urotropine et extraits de rhamnées.

Doses : 1 cuill. à soupe matin et soir, 15 jours par mois. — 12 fr.

Laboratoires ABADIE-TANZI,
3, Place Intérieure Saint-Michel
TOULOUSE.

VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica, Marrons d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

Indications. — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques, Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

Doses. — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

Laboratoires LEBEAULT
5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

VEINOTROPE

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des troubles veineux.

Indications. — Varices. Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Troubles de la Ménopause et de la Puberté.

Composition.

A. — *Veinotrope. M.*

(Usage masculin, comprimés roses).

Para-thyroïde.....	1 milligr.
Orchitine.....	35 —
Surrénale.....	5 —
Pancréas.....	10 centigr.
Hypophyse.....	1 milligr.
Noix vomique.....	5 —
Extrait Hamamélis, Marron d'Inde.	15 milligr.

B. — *Veinotrope. F.*

(Usage féminin, comprimés violets.)

Para-thyroïde.....	1 milligr.
Ovarine.....	35 —
Surrénale.....	5 —
Pancréas.....	10 centigr.
Hypophyse.....	1 milligr.
Noix vomique.....	5 —
Extrait Hamamélis, Marron d'Inde.	15 milligr.

Mode d'emploi. — 2 comprimés 1 heure avant les principaux repas. 3 semaines de traitement, 1 semaine de repos.

Formule F : interrompre pendant la période menstruelle.

Prix de vente au public : 18 francs.

VEINOTROPE POUDRE

Ulcères variqueux et plaies en général.

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pan-	
créas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Talc stérile, q. s. pour.....	100 gr.

Poudrer, après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Prix de vente au public : 22 francs.

Laboratoires LOBICA

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII°).

BANDE DE CRÊPE VELPEAU

Bande de tissu élastique sans caoutchouc.

La meilleure des bandes de crêpe : **Légère, douce, extensible, chaude, lavable.**

Filet bleu à utiliser lorsque la chaleur n'est pas nécessaire.

Plaies, Varices, Efforts. Prix marqués 5 cm. : 5 fr. 50 ; 7 cm. : 7 fr. 25 ; 10 cm. : 9 fr. 75.

Filet rouge. — Plus riche en laine. A utiliser lorsque la chaleur est nécessaire **Douleurs, Rhumatismes.**
5 cm. : 7 fr. 75 ; 7 cm. : 9 fr. ; 10 cm. : 13 fr. ; 15 cm. : 18 fr.

Ceintures de 20 et 30 cm. (25 et 40 fr.) pour **Grossesse et Opérations.**

Bande rose sans filet. Même qualité que la bande filet rouge. Spécialement créée pour l'*usage féminin*. Prati-
quement invisible sous les bas fins.

5 cm. : 7 fr. 10 ; 7 cm. : 9 fr. 50 ; 10 cm. : 13 fr. 60.

Toutes les bandes de crêpe ne sont pas des bandes de crêpe **Velpeau.**

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS

VENECINE

(Venio-ex-cinéré)

Composition :

Préparée par un procédé physico-chimique breveté, présenté sous forme d'eau, à l'état de complexe colloïdal stable et de solution, les éléments essentiels nécessaires à la cellule vivante : calcium, sodium, potassium, fer, silice, strontium, chlore, carbone, soufre à l'état colloïdal et à tous ses degrés d'oxydation.

Propriétés :

La Vénécine est la seule préparation stable contenant du soufre assimilable et fixable par la cellule vivante. Grâce à cette propriété et à sa charge électrique élevée, elle active les échanges et favorise l'activité humorale et tissulaire. C'est un excitant de la croissance et des glandes endocrines.

Indications :

1° Vénécine à l'usage interne.

Chez l'enfant et l'adolescent : arrêt et retard du développement, maladies par carence, anémie, troubles endocriniens.

Chez l'adulte : troubles de la nutrition, rhumatisme chronique, goutte, troubles endocriniens, arthritisme, asthénie, neurasthénie, maladie de Basedow. Insomnie.

Chez le vieillard : artériosclérose, urée, sénilité.

2° Vénecine à l'usage externe.

Dermatoses : démangeaisons, eczémas, eczémas suintants, herpès, ichtyose, psoriasis, rougeurs, ulcères variqueux, urticaire.

3° Ampoules injectables.

Troubles aigus de la nutrition, carence, troubles endocriniens, basedowiens, goîtres, artériosclérose, urée, sénilité.

Anti-chocs : dilution des novarsénobenzols, en remplacement de l'eau bi-distillée. Tolérance acceptée par tous les malades, plus de malaises, et par les grands asthmatiques. Comme diluant du Cyanure de mercure, évite intoxication.

Comme diluant de la Crisalbine chez les tuberculeux, évite les chocs produits par ce sel d'or (demander communications scientifiques à nos laboratoires).

Présentation :

Vénecine concentrée pour usage interne, flacon de 200 cc.
Vénecine concentrée pour usage externe, 200 cc.
Ampoules injectables de 10 centimètres cubes. Pommade à la Vénecine en tube.

Posologie :

Forme liquide (usage interne) concentrée : 2 cuillerées à café dans un verre à bordeaux d'eau ordinaire trois fois par jour à distance des repas (3 à 4 semaines).

Forme liquide (usage externe). En applications ou lotions à raison de 2 volumes pour 3 volumes d'eau bouillie tiède (matin et soir, suivre en même temps le traitement interne). Pommade : en applications (matin et soir).

Ampoules : tous les deux jours une injection intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée.

Continuer le traitement pendant deux ou trois semaines.

Prix :

1 flacon de Vénecine concentrée interne.....	15 fr.
1 flacon de Vénecine concentrée externe	15 —
Pommade à la Vénecine, le tube.....	10 —
1 boîte de 10 ampoules.....	24 —
1 boîte de 5 ampoules.....	15 —

Laboratoires de la VÉNECINE

7, rue des Italiens, PARIS

Tél. : Taitbout 90-50, 90-51, 90-52.

(Prix spéciaux aux membres du Corps Médical.)

VÉRALGINE

*Spécifique contre l'élément douleur,
Sédatif et analgésique à action ultra-rapide et prolongée.*

Association moléculaire d'analgésiques vrais (Phénétine, Amidopyrine) à action élective sur les centres corticaux de la douleur avec le Sonéryl dérivé barbiturique, étudié par MM. les Professeurs Carnot et Tiffeneau, agissant sur les pseudo-centres de Sherington. Cette association renforce et, selon l'expression de Burgi, potentialise l'action curative de chaque constituant, procurant ainsi une rapidité et une durée d'action remarquables avec des doses très faibles et sans aucune intolérance ni réaction cutanée.

Indications. — Tous cas justiciables de la morphine, toutes douleurs, Céphalées, Neuralgies, Coliques néphrétiques ou hépatiques, Goutte, Névrites, Rhumatismes, Zona, Sciatique, Migraines des hypertendus, Dysménorrhées, etc., et en art dentaire : Périostite, Pulpite, Interventions, Extractions, Fraisages, etc...

Les comprimés portent un trait de division permettant de fractionner les doses.

Posologie. — Adultes 1 à 2 comprimés ou cachets.

Enfants 1/4 ou 1/2 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures.

Comprimés : 8 francs. Cachets : 6 francs.

Laboratoire du MAINGUY

M. BASSIN, Docteur en pharmacie BONDY (Seine).

Échantillons sur demande.

VÉRIANE BURIAT

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 amide barbiturique diéthyle et 1 gr. Valériane fraîche et INODORE.

Indications. — Hypnotique fidèle, inodore et sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats. Sommeil calme, réveil normal.

Posologie. — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café espacées dans les 24 heures.

Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 3 heures avant le moment du sommeil, dans une infusion ou eau sucrée.

Prix : 14 fr.

Laboratoire BURIAT

25, rue Copernic — PARIS (XVI^e).

VERMIFUGE CORNET

Composition. — Macération dans un liquide hydro-alcoolique de plantes anthelminthiques (semen-contra, mousse de corse, fougère mâle, etc.) de produits médicamenteux et d'huiles essentielles.

Forme. — Liquide, de conservation indéfinie.

Indications thérapeutiques. — Destruction de tous les vers intestinaux (ascarides, oxyures, trichocéphales).

Doses et mode d'emploi :

Jusqu'à 1 an	1/2 cuillère à café.
De 1 à 8 ans.....	1 — —
De 8 à 15 ans.....	2 — —
Adultes	1 à soupe.

Le matin à jeun dans un peu d'eau sucrée, ces doses doivent être données régulièrement tous les huit jours.

Laboratoires SERRE,

7, place Pey-Berland — BORDEAUX.

VERMIRÈNE AUDIBERT

Macération de semen-contra d'Alep de chœnopodium anthelmenthicum et de pyrethrum anthemis, présentée sous forme de sirop aromatisé à la vanille.

Agréablement accepté par enfants et adultes. Ne nécessite ni diète, ni régime et n'offre pas les inconvénients de la Santonine.

Chaque cuillerée à café renferme 42 mgr. 5 de semen-contra, 50 mgr. de pyrethrum anthemis et 2 mgr. 5 d'essence de chœnopodium.

Posologie :

Enfants de 1 à 5 ans : Une cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours consécutifs.

Enfants de 5 à 10 ans : Une cuillerée à dessert.

Adultes : Une à deux cuillerées à soupe.

En cas de crise aiguë, doubler les doses.

Prix : 8 francs.

M. AUDIBERT, Docteur en Pharmacie.

Cinq-Cantons — BAYONNE.

VERNIS A LA DIACHUSINE

Arsénicale.

Traitement externe des Néoplasmes, Cancroïdes, Cancer épithélial de la face.

Le Vernis à la Diachusine arsénicale s'adresse aux cancroïdes en général, surtout aux petits cancroïdes de la face.

Mode d'emploi. — On commence à déterger l'ulcération cancroïdale de ses croûtes à l'aide de compresses humides, puis on pratique l'assèchement exact à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Cela fait, à l'aide d'un pinceau, on recouvre de vernis à la Diachusine arsénicale la surface ulcérée de façon qu'il dépasse et recouvre largement ses bords ordinairement épaissis. Il n'y a plus rien à faire alors, qu'attendre que la croûte formée se détache spontanément, ce qui arrive généralement du quinzième au vingtième jour. Une palpation minutieuse permet alors de s'assurer qu'il ne reste aucune induration suspecte, auquel cas on devrait recourir à une nouvelle application de vernis.

Remarque. — Si la tumeur a une surface plus étendue qu'une pièce de deux francs environ, il est préférable de faire des applications successives sur les diverses parties constituantes du néoplasme et de mettre un intervalle de neuf à dix jours entre les deux applications.

Prix : 15 francs le flacon.

Laboratoires A. LEJEUNE.

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

VERONIDIA BUISSON

Solution de diéthylmalonylurée associée à l'extrait de *Passiflora incarnata* dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuill. à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de principe actif.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses, Palpitations, Phobies, Insomnies, Névrose d'angoisse, etc.

Dose. — 2 cuill. à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuill. à soupe ou comprimés comme hypnotique, le soir au coucher.

Prix de vente au public : 18 fr. (solution). Le tube de comprimés : 14 fr. 50.

Prix médical : 12 fr. 15 (solution). Le tube de comprimés : 9 fr. 80.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

VERRULYSE

Composition. — A base de glycérophosphates (phosphate vital) de chaux, fer, manganèse, magnésie, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

Formes. — Poudre légèrement comprimée en petits cachets.

Boîte de 60 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.

Demi-boîte de 30 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de moins de 8 ans.

Dose et mode d'emploi. — *Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.* — 1 cachet par jour pendant 60 jours, au début d'un repas (toujours le même de préférence).

Pour les enfants de moins de 8 ans. — 1 cachet tous les deux jours (30 cachets en 60 jours) ou mieux : 1/2 cachet par jour délayé dans une cuillerée de potage ou tout autre aliment, pendant 60 jours.

Propriétés :

1° **Effet local.** — La 2^e ou la 3^e semaine, les verrues prennent une teinte rosée au pourtour ou deviennent le siège d'une légère démangeaison. Elles s'éliminent ou se résorbent dans le mois qui suit le traitement. Dans le cas contraire, reprendre celui-ci à dose double.

2° **Effet général.** — Reconstituant. Amélioration très nette chez les enfants de l'entrain, de l'appétit, du teint, des fonctions intestinales.

Indications. — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc.).

Exerce une action favorable contre d'autres productions épidermiques, pour lesquelles une expérimentation plus étendue est en cours.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 6 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes)

Formule Jacquemaire n° 60. — Cette formule, peu différente de celle de la Verrulyse, a l'avantage de pouvoir être prescrite comme une formule magistrale. Elle ne porte sur la boîte aucune indication et garde ainsi le secret du diagnostic.

M. MIGUET, docteur en pharmacie.

Établissements JACQUEMAIRE
VILLEFRANCHE (Rhône).

VERTICURINE

Composition. — Silicate de soude, chimiquement pur.

Action. — Hypotensive-antiathéromateuse déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

Indications. — Artério-sclérose, Angine de poitrine, Troubles cérébraux, Otite scléreuse, Hypertension, Aortite, Bourdonnements, Sclérose cardiaque, Pré-sclérose, Vertiges, Ménopause.

Formes et doses. — 1° *Liquide* : chaque cuillerée à soupe représente 1 gr. de silicate assimilable. Dose : 1 cuillerée à soupe aux deux principaux repas ; 2° *Comprimés* : chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose : 2 comprimés à chacun des principaux repas.

Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée sans goût désagréable.

Verticurine, liquide : le flacon, 18 francs.

Verticurine, comprimés : le flacon, 14 francs.

Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1^{re} classe.
47, rue Féray — CORBEIL (S.-et-O.)

VÉSICATOIRE ROSE BESLIER

Au Cantharidate de Soude.

Le Vésicatoire Rose Beslier à base de Cantharidate de Soude, produit chimique stable défini, pur, aseptique, offre au médecin l'avantage de mettre à sa disposition un **Vésicatoire aseptique, indolore, fidèle, et sans toxicité pour l'appareil rénal.**

Indications. — Bronchites, pleurésies, pleurites, pneumonie, réactions douloureuses des tuberculeux, péritonite, hydarthrose, arthrite, névralgies, sciatique, etc.

Présentation. — Pour éviter toute manipulation, toute substitution, le **Vésicatoire Rose Beslier** est délivré exclusivement en pochettes unitaires contenant un carré de 10×10.

Chaque carré mis sous pochette à l'usine, parvient ainsi sans souillures sur l'épiderme du malade.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN.

VICÉLIASE

Formule dragéifiée du D^r Mangin-Bocquet.

Antitoxique. Tonique. Cytophylactique.

Composition. — Citr. de soude, Phosph. de soude, Noix vom., Chlorure de magnésium, Hyposulfite de magnésium.

Propriétés. — Reconstituant général, Tonique du système nerveux, Régulateur des fonctions digestives et nutritives, Prophylactique des néoplasmes.

Indications. — Asthénies, Surmenage, Débilité des vieillards, Troubles digestifs par hypofonctionnement, Troubles de la nutrition, Insuffisance hépatique, Hypertrophie de la prostate, Préventif des maladies de la peau et du cancer.

Toutes indications du Chlorure de magnésium.

Tube de 80 dragées (traitement pour 1 mois) : 17 fr.

Laboratoire J. MESSIS

71, avenue de la République — CHAMPIGNY
(Seine).

VICHY-PURGATIF

Association de l'Eau alcaline naturelle de Vichy avec les Sulfates de Soude et de Magnésie (75 gr. par 1/2 litre).

Recommandé dans tous les états inflammatoires de l'intestin, dans l'obésité, les maladies du foie, de l'estomac, le manque d'appétit.

Dose purgative : prendre le 1/3, la moitié, les 3/4 ou même la bouteille entière, suivant l'âge ou la constitution de la personne.

Dose laxative : Un verre à bordeaux ou un demi-verre le matin à jeun.

Administration :

7 et 7 bis, rue Galvani — PARIS.

Anciennement : 11, rue Joseph Bara — PARIS

Exploitation :

111, rue du Maréchal-Pétain — VICHY.

VIGARDYNE

(Ferment lactique actif).

2 Formes. — *Culture liquide*, en boîtes de 4 flacons de 60 cc. : La boîte : 16 francs.

Comprimés : en boîtes de 48 comprimés : La boîte : 12 francs.

Indications thérapeutiques. — Affections gastro-intestinales. Entérites sous toutes ses formes, Diarrhées des adultes et nourrissons, Embarras gastriques et intestinaux, Auto-intoxications.

Posologie. — *Culture liquide* : a) *Adultes et enfants* : La moitié d'un flacon 1/2 heure avant chaque repas, dans un peu d'eau sucrée. b) *Nourrissons* : 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les tétées.

Comprimés : a) *Adultes et enfants* : 8 à 10 comprimés par jour avant les principaux repas, délayés dans un peu d'eau sucrée ou de lait tiède. b) *Nourrissons* : 2 comprimés avant chacune des principales tétées.

Echantillons et Littérature :

Laboratoire VIGARDYNE

21, rue du Chemin-de-Fer — SCEAUX (Seine)

Dépôt général pour la France :

Office Commercial Pharmaceutique

71, rue du Temple — PARIS.

VIGOSTEROL

Irradié.

Composition. — Ergostérine activée par les rayons ultra-violets. Nucléinate de Manganèse. Phosphate tricalcique d'origine végétale. Extrait de glandes surrénales.

Indications. — Le rachitisme de l'enfant et de l'adulte. L'Ostéomalacie et la déminéralisation des femmes enceintes et fatiguées par l'allaitement. Les dystrophies et la débilité de l'enfance. Toutes les infections déminéralisantes et en premier lieu la tuberculose non congestive et les tuberculoses locales, les convalescences de la grippe.

Mode d'emploi. — 2 cuillerées à café, deux fois par jour pour les adultes.

1 cuillerée à café 3 fois par jour de 7 ans à 15 ans

1 cuillerée à café 2 fois par jour de 2 ans à 7 ans.

Laboratoires BRICHARD et Fils

BAR-LE-DUC (Meuse).

VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphaté.

Composition. — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison organique et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif.

Avantages. — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

Indications thérapeutiques. — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

Posologie. — Un verre à madère pour les adultes et un verre à liqueur pour les enfants à prendre au moment des repas ; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 par jour.

Prix : 18 francs.

Laboratoire VAUDIN et GUILLAUMIN

Docteurs en Pharmacie, 12, rue Charles-V — PARIS.

VIN DE BUGEAUD

Toni-nutritif.

Malaga vieux. Quinquina. Cacao.

Indications :

Faiblesse générale, Anémie,
Surmenage, États consomptifs, Diabète,
Convalescence des maladies aiguës,
Anémie palustre, etc.

Dose :

Un verre à madère aux deux principaux repas.

Laboratoires LEBEAULT

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

VIN DE CARNÉOSE

Vin supertonique.

Composition. — Quina-cola-coca, lactophosphate, condurango, plasma musculaire.

Propriétés thérapeutiques. — Super-toni-nutritif rapide et sûr. Ne fatigue pas l'estomac.

Posologie. — *Adultes* : 1 verre à madère 3 fois par jour avant les repas.

Enfants : demi-dose.

Prix :

Le litre : 24 francs.

Le demi-litre : 15 francs.

USINES DU BLOSSET
MOULINS-SUR-YÈVRE (Cher).

VIN DE CHASSAING

à la pepsine et à la diastase.

S'emploie dans toutes les affections stomacales provenant d'une insuffisance de digestion, à la dose d'un ou deux verres à liqueur immédiatement après le repas.

CHASSAING, LE COQ et C^{ie}

1, Quai Aulagnier

ASNIÈRES (Seine)

VIN DIURÉTIQUE VÉGÉTAL AMER


PYROLA

Composition. — Le vin diurétique PYROLA est préparé par macération dans du vin blanc de nombreuses plantes diurétiques et tout particulièrement d'une plante très en faveur en Amérique et bien que peu connue encore en Europe de nos jours : la *Pyrola umbellata*. Cette plante présente une action diurétique remarquable, si bien qu'à son sujet, M. le professeur Planchon, ancien directeur de l'Ecole supérieure de Pharmacie de Paris et membre de l'Académie de Médecine, a écrit la note suivante :

« Des expériences entreprises avec la *Pyrola umbellata* à l'hôpital Cochin, à Paris, confirment pleinement les propriétés diurétiques que les Américains lui attribuent.


Sous son influence, la diurèse se produit progressivement dès le deuxième jour, se maintient à son maximum jusqu'à complète disparition de l'œdème et la quantité d'urine retombe ensuite à son état normal. »

Avantages. — 1° Le produit ne présente aucune toxicité ; 2° Il ne contient aucun produit synthétique ; 3° Il ne renferme pas de théobromine, dont la parenté avec l'acide urique est malheureusement trop nette, comme le montre la comparaison des 2 formules suivantes :



Diméthyl 3-7 Dioxypurine 2-6

— Théobromine



— Acide urique —

4° Enfin sa préparation qui se borne en une simple macération ne modifie en rien de ce fait les complexes et délicates molécules des glucosides actifs et permet de conserver aux éléments la puissance très grande et non brutale que possèdent les plantes fraîches.

Indications. — C'est le médicament de choix de la *petite insuffisance cardio-rénale*, de l'*artério-sclérose* et des *hydropisies non inflammatoires*.

Contre-indications — Bien que ne contenant aucun produit toxique, il est contre-indiqué dans les *cachexies graves* et la *grande insuffisance hépatique*.

Posologie. — *Adultes* : Depuis 1 cuillerée à café jusqu'à 2 cuillerées à potage 1/4 d'heure avant les principaux repas.

Enfants : Ne pas dépasser une cuillerée à café au-dessous de 6 ans.

Tous les 2 mois arrêter 15 jours le traitement.

Echantillon permettant un essai loyal.

Laboratoire du PYROLA

Laboratoire de Biologie du D^r CUGUILLÈRE.

19, rue des Chalets — TOULOUSE (France).

VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

Nature. — Le *Vin Girard* est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage. — Un verre à madère de *Vin Girard* contient :

Iode	0 gr. 075 mgr.
Tannin	0 gr. 50 cgr.
Lactophosphate de chaux	0 gr. 75 cgr.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne ; demi-dose pour enfant.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique et reconstituant, augmente la phagocytose.

Indications. — Lymphatisme, scrofule, tuberculose au 1^{er} degré, engorgements ganglionnaires, convalescences.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

VIN « LUX GAILLAC » MOUSSEUX

(Cuvées réservées, méthode champenoise)

Irradié par les rayons Ultra-Violets.

Procédés des docteurs Loubat, Durand, Muller, Popovitch.

Tonique — Stimulant.

S'emploie dans tous les états de fatigue cérébrale et physique, les anémies, le diabète, etc... Il convient tout spécialement aux convalescents d'affections chirurgicales ou médicales. Il stimule toutes les fonctions de défense organique.

Vente exclusive par caisse de 12 bout. à 180 francs la caisse doux, demi-sec, brut

Établissements du Docteur DURAND

6. avenue Foch. — GAILLAC (Tarn).

VIN RAIMOA TONIC

Composition. — Champagne. Chlorure de magnésium, 0,80 par bouteille. Stimulants digestifs aromatiques divers.

Indications. — Mal de mer. Vomissements même dénommés incoercibles. Atonie générale, notamment d'origine digestive. Surmenage physique ou intellectuel. Cancer.

Mode d'emploi :

Enfants : De 2 cuillerées à café à 2 verres à madère en 24 heures.

Adultes : Comme stimulant, 2 flûtes en 24 heures ; comme excitant, jusqu'à une demi-bouteille par 24 heures.

Laboratoire des Produits Raimoa

COLLIGNON-SAVERS

264, boulevard Voltaire — PARIS.

Téléph. : Diderot 54-96.

VIOFORME CIBA

(et ovules au Vioforme)

Iodochloroxyquinoléine.

Succédané de l'iodoforme, inodore, non irritant : antiseptique et kératoplastique.

Indications. — Plaies atones, ulcères variqueux, eczémas, escarres, brûlures.

Doses. — En poudre, 2 à 3 gr. pour une application. Pommade de 2 à 10 p. 100.

Se formule magistralement, ou :

Boîte poudreuse : 12 francs.

Ovules au Vioforme. — Antiseptiques, analgésiques, décongestionnants, désodorisants, résolutifs : métrites, vaginites, etc.

La boîte de 6 : 13 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

109-113, Bd de la Part-Dieu — LYON.

VIOPHAN

Acide phénylcinchoninique de synthèse spéciale :
fabrication entièrement française.

Propriétés. — 1° *Non toxique* : Le chien supporte plus de 2 gr. par kilo de poids ; à l'autopsie, foie et reins magnifiques, ne présentant pas de signes de dégénérescence, ni d'inflammation.

2° Mobilisateur et éliminateur spécifique de l'acide urique et des insolubles après modification interne profonde empêchant l'irritation des muqueuses de l'appareil urinaire et permettant une *miction indolore*.

3° Antithermique, Antinévralgique, Antiphlogistique.

Indications. — Goutte aiguë et chronique, Sciatique, Rhumatisme articulaire aigu et chronique, Névralgies rebelles, Lumbagos.

Posologie. — 2 à 12 comprimés ou cachets par 24 heures, au repas. Boissons abondantes. Cure intermittente.

Présentation : 20 cachets ou comprimés 0 gr. 40.

Prix : 15 fr.

Laboratoire du Viophan

81 et 83, rue de Lille. — ROUBAIX.

VIOSTEN

Composition. — Vitamines (ergostérol et lipoides irradiés), Phosphatides (glycérophosphate de choline), Ether benzylocinnamique.

Injections en 1 cc. — Comprimés. — Granulé.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme.

Chez les nourrissons et les déicients digestifs employer la *Zymatine irradiée* (ergostérinée).

Doses. — *Enfants* : Au-dessous d'un an : 1 cc. tous les 4 jours. — 1 comprimé par jour, pendant les repas. 1/2 cuillerée à café de granulé par jour avant le repas principal.

De 1 à 3 ans : 1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour, pendant les repas. — 1 cuillerée à café de granulé par jour.

De 3 à 12 ans : 1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour, pendant les repas. — 2 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Au-dessus de 12 ans : 1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Adultes : 1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Prix : Comprimés, 15 fr. — Ampoules, 20 fr. — Granulé, 15 fr

LABORATOIRES LESCENE

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

VIOXYL MOUNEYRAT

**Puissant accélérateur
de la nutrition générale.**

Indications. — Asthénies diverses, Cachexies, Convalescences, Maladies consomptives, Anémie, Chloro-anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

Formes. — Elixir et Granulé.

Posologie. — *Adultes* : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert,
VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

VISCO-SÉRUM

Sérum reminéralisateur nerveux sensibilisant, isotonique, isovisqueux.

Indications thérapeutiques. — Tous les états de dépression du système nerveux et de l'appareil cardio-vasculaire.

Présentation :

Ampoules : Boîte de 10 ampoules : 18 fr.

Gouttes : Flacon de 20 grammes : 18 fr.

Posologie. — Une ampoule de 5 cc. tous les deux jours (une cure comprend deux séries de 10 piqûres). Gouttes : XX à chaque repas.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

R. C. Seine 143-981.

VISCUM ZYMA

Composition. — Dialysé de baies, feuilles et tiges de Gui blanc, obtenu selon le procédé original du Prof. GOLAZ.

Propriétés. — Le *Viscum Zyma* abaisse la pression sanguine, agit comme tonique du cœur et favorise l'élimination des chlorures et de l'urée.

Indications. — *Convient dans tous les états morbides associés à l'hypertension : artériosclérose, urémie, albuminurie de la grossesse ; est également indiqué dans certains cas d'épilepsie.*

Mode d'emploi. — S'emploie à la dose de XX à XXX gouttes, diluées dans un peu d'eau, avant les repas (2 à 3 fois par jour).

Laboratoires « ZYMA »

4, rue Bellart — PARIS (XV^e).

VITACALCINE

« Moncour »

Complexe opothérapique irradié.

Composition. — Vitamines, Lipoides et Cholestérine du foie et de la moelle rouge des os frais, ainsi que les éléments minéraux de ces derniers.

Les mordants physiques (radiations ultra-violettes), endocriniens (parathyroïde et surrénale) et minéraux (nucléinate de manganèse) en assurent la fixation.

Indications. — Toutes maladies déminéralisantes et hyposthénisantes telles que : Prébacillose, Bacillose, Cachexie, Rachitisme, Décalcifications dentaires et osseuses, Neurasthénie, etc.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour.

Enfants : 1 à 4, suivant l'âge.

Le traitement sera prolongé aussi longtemps que nécessaire, la Vitacalcine n'étant pas toxique.

Laboratoire « MONCOUR »

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE (Seine).
Téléphone : Molitor 08-47.

VITADONE

Vitamines A et D.

Composition. — Association de la *vitamine A* de croissance et anti-infectieuse et de la Vitamine D anti-rachitique, titrées physiologiquement (1 goutte de Vitadone = 8 unités de vitamine A et 80 unités de Vitamine D).

Propriétés thérapeutiques. — La Vitadone remplace *intégralement* l'huile de foie de morue dans toutes ses indications. Elle en contient tous les principes actifs, mais *en quantités infiniment plus considérables*.

Indications. — La Vitadone est indiquée dans tous les troubles de la croissance, la déminéralisation, les divers troubles de l'ossification, la scrofule, le lymphatisme, les états de maigreur, les pyodermites, la *prétuberculose*, etc...

Posologie. — En flacons de 24 cc., solution dans l'huile d'olives. — *Nourrissons* : XX gouttes. — *Enfants* : XL gouttes. — *Adolescents et adultes* : LX gouttes par jour, à mélanger à l'alimentation ordinaire, et dans du lait, pour les tout petits.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

VITAMINOL

1° *Malté*. 2° *Granulé*. 3° *Elixir*. 4° *Comprimés*.

Composition. — Réunit en une préparation facile à prendre les Vitamines B et les acides aminés (tryptophane, lysine, etc.) indispensables à la croissance et à l'entretien de l'organisme.

Propriétés thérapeutiques. — Apporte à l'organisme des facteurs de croissance et d'équilibre. *Complète la ration alimentaire*.

Indications. — *Adultes* : Tous sous-alimentés, dyspeptiques au régime des pâtes, convalescents, etc. (2 cuill. à soupe d'élixir ou 5 comprimés par jour, 1/2 heure avant les repas. *Enfants* : Tous enfants en période de croissance (2 à 4 cuill. à dessert par jour, dans un peu d'eau tiède ou de bouillon non salé). Le Vitaminol malté et le granulé malté permettent le maltage facile des bouillies, tout en apportant à l'enfant les vitamines indispensables à sa croissance.

Les Etablissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

R. C. Seine 71895

VITAMORRHUINE

Composition. — Principes actifs de l'huile de foie de morue (vitamines A et D) associés au phosphore et au calcium sous forme de granulés au cacao.

Une cuillerée à café de Vitamorrhaine équivaut à une cuillerée à soupe d'huile de foie de morue type. Préparation vérifiée au point de vue de son activité biologique.

Indications. — Rachitisme, Scrofule, Débilité, Lymphatisme, Tuberculose.

Doses. — *Enfants* : de 3 mois à 1 an ; 1 cuillerée à café par jour (dans du lait) ; de 1 à 5 ans ; 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 5 ans : 3 cuillerées à café par jour. *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

VITAMYL IRRADIÉ

Solution et Dragées

Contient les quatre Vitamines A, B, C, et D., conservées actives. Elles sont toutes indispensables.

Indications. — Rachitismes, Carences, Pré-carences, Troubles de la croissance. Tous les cas de déminéralisation.

Mode d'emploi. — Solution de Vitamyl irradié. Elle apporte par cuillerée à café 1 mmgr. 5 d'Ergostérol pur irradié (Vitamine D), en solution huileuse, soit 900 Unités biologiques antirachitiques, associé aux Vitamines A, B, C, du Vitamyl.

Doses. — Une à 3 cuillerées à café par jour, mélangé dans un peu d'eau sucrée.

Dragées de Vitamyl irradié. Elles contiennent par dragée 2/3 de milligramme d'Ergostérol Irradié (Vitamine D) pur, en solution huileuse, soit 400 Unités biologiques antirachitiques, associé aux Vitamines A, B, C, du Vitamyl.

Doses. — 2 à 6 dragées par jour.

Prix public :

Le flacon de solution G. M. : 18 fr.

Le flacon de solution P. M. : 12 fr.

Le flacon de 40 dragées : 16 fr.

Laboratoires des Produits AMIDO.

A. BEAUGONIN, pharmacien,
4, Place des Vosges — PARIS (IV^e)

VITARGYL

Composition et propriétés. — Protéose argentique dosée à 20 p. 100 d'argent. Petites masses cristallines très solubles dans l'eau. La solution de Vitargyl est neutre, ne précipite pas par les chlorures en solutions isotoniques, ne coagule pas l'albumine. Possède un pouvoir microbicide énergique.

Action thérapeutique. — Sédatif et décongestif externe. Son action non corrosive, parfaitement indolore, ses propriétés excitantes sur les éléments réparateurs des tissus en font l'antiseptique de choix pour toutes les muqueuses.

Application. — Traitements abortifs et curatifs de toutes les affections des yeux, du nez, de la gorge et de celles des muqueuses des voies génito-urinaires.

Pour les besoins de l'urologie, gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, est présenté sous forme pure et en préparations (crayons, ovules, suppositoires, ampoules et flacons compte-gouttes).

Laboratoires POINTET et GIRARD
30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

VITASTÉROL

« *Aucune médication à base d'ergostérine irradiée seule ne peut prétendre remplacer l'huile de foie de morue.* »

Lesné, Clément et Simon

(*Compte rendu de la Société de biologie*, Paris, mars 1928.)

Huile de foie de morue d'activité garantie et constante, dont les éléments actifs (*facteur de croissance, facteur antirachitique et calcopfixateur*) ont été éprouvés sur le rat blanc soumis à un régime rachitigène.

Un gramme de cette huile renferme un minimum de 50 unités antirachitiques (Méthode de dosage des D^{rs} Lesné et Clément).

Chaque flacon porte la date du contrôle biologique effectué.

Présentée en un **flacon de grès**, rigoureusement opaque aux radiations solaires ou autres, susceptibles d'en altérer l'activité, cette huile est de conservation pratiquement indéfinie et **peut être prescrite en été comme en hiver.**

Indications. — Toute déficience en calcium (Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, Spasmodophilie, Rachitisme).

Troubles de la croissance (Hypotrophie pondérale et staturale, Insuffisances endocriniennes).

États de dénutrition. Consolidation des fractures, Convalescences, Allaitement, Avitaminoses.

Doses. — *Nourrissons* : XV à XX gouttes par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Adultes : 1 cuillerée à bouche par jour.

F. GUILBERT, pharmacien

10, rue du Collège — ARRAS (Pas-de-Calais).

Dépôt :

Office Commercial Pharmaceutique

71, rue du Temple — PARIS (III^e).

VITÈNE

Médication vitaminée, phosphorée.

Composition. — Gouttes :

Phosphatides cérébraux.....	0 gr. 025
Vitamine A.....	200 unités-rats.
— D.....	400 —
Huile d'olive.....	Q. S. par 1 cc

Capsules :

Phosphatides cérébraux.....	0 gr. 025
Vitamine A.....	100 unités-rats.
— D.....	100 —
Huile d'olive.....	Q. S.

Propriétés. — Le Vitène possède un pouvoir de croissance et anti-anémique remarquable. Agent anti-infectieux et antirachitique puissant, il est aussi fixateur de calcium.

Indications. — *Chez l'enfant* : Troubles de croissance, Rachitisme, Anémie. — *Chez l'Adulte* : Convalescence, Surmenage, Lésions bacillaires. — *Chez la femme enceinte* : Pare aux perturbations du métabolisme du calcium. — *A tous les âges* : Agent anti-infectieux.

Mode d'emploi. — *Nourrissons* : X gouttes matin et soir. — *Enfants* : XX gouttes matin et soir. — *Adultes* : 2 capsules à midi et le soir au début des repas.

Laboratoire A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD

Docteurs en pharmacie,
12, rue Charles-V — PARIS

VITERGOMINE

(Vitamine D).

Composition. — Ergostérol irradié dissous dans de l'huile d'olive et incorporé au saccharure de glycérophosphate de chaux à 5 p. 100.

Action. — L'Ergostérol irradié constitue un véritable catalyseur du calcium.

Indications. — Rachitisme, Troubles de l'ossification, Carie dentaire, Ostéomalaccie, Prétuberculose et Etats de déminéralisation.

Doses. — Par cuillerée à café de 1 gramme environ de granulés.

Enfants : jusqu'à 5 ans, 1 cuillerée à café par jour ; de 5 à 10 ans, 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 10 ans, et pour les *adultes* : 3 cuillerées à café par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

VIVOLÉOL

Huile de foie de morue sélectionnée, non irradiée, garantie active et riche en vitamines :

(Vitamines antirachitiques et de croissance.)
(Contrôle biologique rigoureux).

Forme. — Liquide.

Indications :

Troubles de la croissance, de l'ossification, de la dentition, Etats de dénutrition, Lymphatisme, Convalescences.

Posologie :

Enfants — Nourrissons :

XV à XXX gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

Jusqu'à 3 ans :

1/2 à 1 cuillerée à café.

Au-dessus de 3 ans :

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Adultes :

1 cuillerée à soupe par jour.

(Peut être pris à toute époque de l'année).

N.-B. — *Le Vivoléol a été la première huile de foie de morue contrôlée biologiquement.*

Prix : 15 francs.

Laboratoire du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie.
Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux. — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 28-96.

VOCALDOP

Thérapeutique laryngologique.

1° La *poudre Vocaldop* réunit en une seule prescription une *inhalation* et un *gargarisme*.

Une cuillerée à café de *poudre Vocaldop*

+ H²O = Inhalation (respiration nasale).
+ chaude = Gargarisme (bain buccal).

Inhalation sans alcool. Thèse de Doctorat.

2° Le *cachet Vocaldop* représente une synergie médicamenteuse adaptée aux trois qualités de la voix parlée et chantée : timbre, puissance, résistance.

Indications :

Enrouement, Surmenage vocal, Pharyngite, Laryngite.

Prescriptions :

Deux inhalations par jour, 2 à 3 cachets par jour pendant 15 jours.

Laboratoire laryngologique du Dr Cordier
222, faubourg Saint-Martin — PARIS.

VONOL

Complexe colloïdal analgésique et antirhumatismal.

Composition. — Acides phényl-quinoléique carbonique et acétylsalicylique en proportions judicieuses (resp. 0,20 et 0,25) renforcés par 0,05 de caféine.

Avantages. — L'adjonction d'un *colloïde* permet une *fixation* catalytique des analgésiques, vis-à-vis des toxines, celles-ci se *précipitant* devant le colloïde. Effets plus longs, maxima, résorption rapide.

Emploi. — Comme analgésique, anti-arthritique Rhumatismes, Gouttes, Sciatique; principalement : *Névralgies, Céphalées*.

1 cachet ou comprimé avant le repas, 3 ou 4 fois par jour.

Prix :

13 fr. la boîte de 20 cachets. 20 comprimés : 10 fr.

Laboratoire MERMINOD

49, rue de Paradis. — PARIS (X^e).

Tél. : Provence 30-32.

VULCASE

(Comprimés).

Laxatif-dépuratif.

Soufre assimilable. Opothérapie biliaire.

Propriétés thérapeutiques. — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'Intestin. Dermatoses. Arthritisme.

Mode d'emploi. — Prendre de 1 à 4 comprimés par jour soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

Laboratoires **BRISSON**

Dr DEDET et **C^{ie}**, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

VULNÉRINE DU Dr BERGEN

Principes actifs. — Camphre associé au Phénol, Naphtol, Précipité blanc, Ether éthylypyramido-benzoïque, oxyde de zinc, etc...

Forme. — Emplâtre semi-fluide en tube d'étain de 50 cc.

Indications. — Ulcères variqueux, plaies atones, Brûlures, Eczémas, Cancroïdes, Lupus, Erysipèle, Engelures, Impétigo, etc.

Pansement précieux :

La VULNERINE calme, déterge, stérilise, épidermise toutes les plaies sans adhérer, sans macérer, sans intoxiquer. Les brûlures sont calmées instantanément et guérissent sans laisser de cicatrices.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 applications par jour avec le papier à pansement qui accompagne chaque tube de VULNERINE ou avec de la gaze hydrophile purifiée.

Prix du tube : 12 francs.

Laboratoire **DUCOQ**

LANGEAIS (I.-et-L.).

R. C. Chânon 2059.

WISMUTHANE VELY

Composition. — Poudre à base de Carbonate de bismuth chimiquement pur, Carbonate de calcium chimiquement pur, Carbonate de Magnésium chimiquement pur, Codéine phosph. (traces), Kaolin chimiquement pur (préparation spéciale).

Indications. — Pansement gastro-intestinal, aérophagie, crises douloureuses de l'estomac, ulcus, sténoses pyloriques, spasmes, colites. Désinfection du tube digestif. Régulateur des selles.

Posologie :

Affections de l'estomac : 1 cuillerée à café aux trois repas.

Constipation : 1 à 2 cuillerées à soupe le matin à jeun.

Laboratoire des Produits Vely

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

Tél. : Passy 87-85.

LA YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

Composition. — Ferments bulgares sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

Formes. — Dragées et granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

Posologie.

Nourrissons. — 1 à 2 cuillerées à café par jour.
Yaourtine granulée.

Enfants et Adultes. — Cas aigus : 2 à 4 cuillerées par jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 12 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 heure avant le repas.

L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1^{re} classe

18, place de Laborde — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 18-20.

YO-ANDROL

Tonique général
hormono-vitaminique masculin,
Fixation élective sur les centres
génito-spinaux.

Composition :

Vitamine E., Orchilipoïdes, Antéro-Hypophysine, Cortico-surrénine, etc...

Indications :

Frigidité, asthénie génitale,
masculines.

Dose :

Minimum de 6 pilules par jour et augmenter jusqu'à 12 si cela est nécessaire.

Contre-indication :

Adénome de la prostate.

Nous préparons aussi une forme sans yohimbine. Veuillez dans ce cas prescrire : Yo-Androl sans Yohimbine.

Homologue féminin : YO-GYNINE

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

Tél. : Galvani 07-09.

Adresse télégraphique : Lipoïdes Paris 54.

YOHIMBINE VICARIO

**Comprimés de Chlorhydrate d'Yohimbine
à 5 mmgr.**

L'YOHIMBINE est un tonique du centre médullaire génito-spinal ; il donne les meilleurs résultats dans l'impuissance quelle qu'en soit l'origine (psychique, paralytique, insuffisance de la glande interstitielle du testicule, etc...)

Dose moyenne. — 3 comprimés par jour, 1 après chaque repas. Le comprimé s'avale comme une pilule ; une gorgée d'eau est prise ensuite.

Dose maxima. — 9 comprimés par jour. Cette dose, qui ne convient qu'à des cas exceptionnellement rebelles, est généralement inutile.

Le tube de 15 comprimés : 4 fr.

La boîte de 60 comprimés : 15 fr.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

ZARYL

(Procédé André Lancien)

Médication décongestive et antispasmodique

(Cigarettes aux huiles essentielles sans eucalyptus ni toxiques)

Composition. — Essences ou infusions d'ambre, ambrette, myrrhe, styrax, rose, orange douce, catalysées et fixées sur hydra-celluloses provenant du maïs et du palmier nain.

Présentation et mécanisme thérapeutique. — La fibre hydra-cellulosique est distribuée en cigarettes qui, allumées, donnent une fumée colloïdale (aérosol thérapeutique).

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif analgésique, procure sommeil calme et réparateur, antispasmodique, décongestif, désodorisant, antiseptique.

Posologie. — 4 à 8 cigarettes par jour, et si possible, avaler la fumée.

Indications. — Toutes maladies congestives des voies respiratoires, extinction de la voix, enrouements, laryngites, trachéite, catarrhe, asthme, dyspnée, emphysème, grippe, bronchites, toux coquelucheuse, rhume des foins, coryza, sinusite, ozène, céphalée et névralgies dentaires,

NOTA. — Aucune contre-indication : ne donne ni vomissements, ni nausées ; inoffensif pour le rein, le foie, le cœur. Pas d'incompatibilités médicamenteuses.

Laboratoire biologique G. CHAUZEIX

26, Rue Pradier — VILLE-D'AVRAY (Seine-et-Oise)

ZIMBYL

(Procédé André Lancien)

(Académie des Sciences, PARIS, 1924)

Journées médicales de Bruxelles (médaille d'or 1926)

Médication cinnamique hypodermique

Composition. — Solution aqueuse de Cin. éthyl. aminoforme isotonique en ampoules de 3 cc. parfaitement indolore et d'assimilation immédiate. Entièrement dépourvue de toxicité. *Ne donne aucun choc.*

Propriétés thérapeutiques. — Disparition des sueurs profuses, baisse de la fièvre, augmentation régulière de l'appétit et du poids, augmentation rapide des anticorps et du taux d'hémoglobine. Amélioration de la formule leucocytaire. Désinfection rationnelle générale de l'organisme et en particulier des voies respiratoires et urinaires.

Posologie. — Une injection tous les jours pendant dix jours et repos dix jours. Cure deux mois.

Indications. — Amaigrissement, asthénie, anémie infectieuse, bronchite chronique, prébacillose, convalescences les plus diverses. Bacillose pure, même avec insuffisance hépatique, complications syphilitiques ou cutanées, de la néphrite ou un état fébrile. Grossesse, Malaria, Rhumatisme bacillaire (associé à BANIKOL). Affections gynécologiques les plus diverses (régressions des lésions inflammatoires, et action favorable sur les congestions, suppurations et ulcérations provoquées par les différents agents pathogènes, avec disparition de la douleur).

NOTA. — Aucune contre-indication, ni incompatibilité, ni accoutumance. Pas d'accumulation médicamenteuse. Élimination régulière, aucun accident à redouter. Conserve l'équilibre stomacal, intestinal, cardiaque, renal et hépatique.

Laboratoire Biologique G. CHAUZEIX

26, rue Pradier — VILLE D'AVRAY (Seine-et-Oise.)

ZOHOL

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant.

Indications. — Anémie, Surmenage, Phosphaturie, Convalescences.

1^{re} Forme : En granulés.

Composition :

Hypophosphite de chaux.....	0 gr. 06
— fer	0 gr. 06
— manganèse....	0 gr. 06

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café à chacun des principaux repas.

2^e Forme : En ampoules.

Composition :

Hypophosphites composés.....	0 gr. 18
Eau physiologique Q. P.....	2 cc.

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule chaque jour en injection sous-cutanée,

Prix de vente au public.

Ampoules : 18 fr. Granulés : 14 fr.

Laboratoires « LOBICA »

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e).

ZOMINE

du professeur CH. RICHET.

Plasma musculaire de bœuf sec et total.

Stimulant de la nutrition en même temps qu'aliment riche en vitamines et facilement assimilable, la Zomine provoque une véritable *régénération musculaire*.

Doses :

1 gramme	{	1/2 cuillerée à café de	2 à 4 ans.
par	{	1 — —	4 à 6 —
année d'âge	{	1 — 1/2 —	6 à 8 —
ou	{	2 — —	8 à 12 —

Enfants : La Zomine donne aux enfants *anémiques* ou en *période de croissance* les *vitamines* et la ration élevée d'*albuminoïdes* dont ils ont besoin. Voir : *Orthozomine*).

Adultes : La Zomine est un *aliment médicament* recommandé dans toutes les *anémies*, *convalescences*, *états de grossesse* et d'*allaitement*.

Dose : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prétuberculose et Tuberculose : Dans les premières périodes de la tuberculose, la Zomine provoque une augmentation de poids des malades traités en même temps qu'une amélioration de l'état général.

Dose : 4 à 6 cuillerées à café (ou 2 cuillerées à soupe) par jour.

La Zomine étant très légère, il faut remplir largement les cuillers sans se contenter d'affleurer les bords comme avec un liquide.

La Zomine doit se prendre dans des aliments tièdes ou froids.

Zomine intégrale.	{	Le petit flacon.....	23 fr.
		Le grand flacon.....	45 —
		La boîte de 4 grands flacons...	170 —

Zomine sucrée : en paillettes dosées à 50 p. 100 de Zomine intégrale.

Doses : double des doses de Zomine intégrale.

Le flacon : 25 fr. : La boîte de 4 flacons : 95 fr.
(Voir *Orthozomine*).

Laboratoires **LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS.

ZOMO-MUSCULOSINE BYLA

(sèche)

EXTRAIT SEC, préparé dans le vide et concentré, de chair musculaire de bœuf, à haut pouvoir métabolique.

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire, toni-nutritif, excitant physiologique.

Indications. — Convalescence, anémies, tuberculose, neurasthénie, etc.

Doses et mode d'emploi. — Un demi à un tube par jour, délayé dans une tasse de bouillon à peine tiède, ou mélangé à de la purée de légumes, ou encore à de la confiture.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

ZYMATINE LESCÈNE

Poudre sucrée.

Composition. — Ferments, Galactozymases, Alcalinité titrée, Carbonate de Mg., Phosphate de Na et de Mg., Bicarbonate de Na., Lactose.

Propriétés. — Déconstipant, Cholagogue alcalin, Maternise le lait de vache, Fluidifie le caséum, le peptonifie. Reminéralise. Empêche les fermentations intestinales.

Indications. — *Enfants* : Constipation, Vomissements, Gastro-entérite, Intolérance lactée, Maladies de la nutrition, Dermatoses, Hépatisme.

Adultes : Constipation, Vomissements, Hyperchlorhydrie, Ulcères de l'estomac, Affections hépatiques.

Doses. — *Enfants* : 2 à 6 mesures par jour dans lait (biberons), eau, bouillies (Éviter température supérieure à 50°). Dans la constipation, on peut augmenter les doses sans danger jusqu'à effet.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau avant ou après chaque repas, 2 à 3 fois par jour.

Constipation. — 2 cuillerées à café 3 ou 4 fois par jour.

Prix au public : 12 francs.

ZYMATINE IRRADIÉE

Poudre sucrée.

Composition. — Zymatine, Vitamines, Nucléinate de Ca.

Indications. — Anémies, Rachitisme, Prétuberculose, Dénutrition, Déminéralisation, Médication hépato-digestive et fortifiante associées.

Doses : Enfants.

Jusqu'à 6 mois : 1 mesure matin et soir.

— 1 an : — — midi et soir.

Au-dessus de 1 an : 2 mesures matin et soir.

On peut augmenter les doses sans danger :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour.

Prix au public : 10 fr. et 18 fr.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

ZYMOGASTRINE KERVAN

Auxiliaire puissant des fonctions digestives.

Forme. — Poudre.

Composition. — Mélange légèrement effervescent de sels alcalins associés à des ferments digestifs.

Mode d'emploi :

A. Adultes. — Le matin à jeun : une cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau.

Dans la journée : une cuillerée à café, soit : une demi-heure avant les deux repas (nausées, fringales, aigreurs, pyrosis), soit : une heure après les repas (comme saturant de l'acidité gastrique primitive ou secondaire).

B. Nourrissons. — Une pincée dans un peu d'eau bouillie avant chaque prise d'aliments.

Indications. — Tous états nauséux, états vésiculaires, mal biliaire, dyspepsies de tous ordres. Grossesses nauséuses, vomissements des nourrissons.

Sans contre-indications.

Prix de vente au public : 12 fr.

Laboratoire KERVAN


81-83, avenue Ledru-Rollin — PARIS (XII^e).

3^e Partie

NOMENCLATURE NOMINALE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES

**avec les adresses de leurs
Fabricants**

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 2^e partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies.



A

- Abactériol**
 ***Absuric**
 ***Acatar**
 ***Acécoline-Acecolex**
 ***Acépine Rambaud**
 ***Acésine Guillaumin**
 Acétosulfol Huerre
 ***Acétylarsan**
 ***Acide oléique P. Thi-**
 bault
 Acidural Dupraz
 Acimyl Monimart
 Acitophosan Merminod
 ***Acobella**
 ***Acodros**
 ***Acoégénol**
 ***Acolitol**
Actine
Actinophore
Actipyrine
 ***Adénoseptyl**
Adipolysine
Adolan
Adolol
Adolose Legrand
 ***Adonal Vicario**
Adonidine Clin
 ***Adoverne Roche**
 ***Adral**
Adréna Vincent
Adrénaline Byla
Adrénaline Clin
 ***Adrénaline Invar**
 ***Adrénargol**
 ***Adrénine Mialhe**
 ***Adrénocalcine**
 ***Adrénoides Béral**
- 54, bd Jacquain, Bruxelles
 17, r. de Provence, Paris.
BEAUXIS-LAGRAVE, 74, quai
 Jemmapes, Paris.
Labor. L. LEMATTE &
G. BOINOT, 52, r. La
 Bruyère, Paris.
 74, rue Monge, Paris.
 13, r. Cherche-Midi, Paris (VI^e).
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
SPECIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 (Voir : Oléocidase.)
 41, r. Etienne-Marcel, Paris.
 23, r. Grand-Cerf, Meaux.
 Merminod, 49, r. Paradis, Paris.
 191, fg St-Antoine, Paris.
BOUVELOT, 62, r. d'An-
 tibes, Cannes (A.-M.).
CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
LANCOSME, 71, av. Victor-
 Emmanuel-III, Paris.
 60, r. Vieux-Pont de Sèvres,
 Billancourt.
 84, av. de Saint-Mandé, Paris.
 9, r. Victor-Letalle Paris.
 50, rue de Turenne, Paris.
 45, r. du Marché, Neuilly.
D^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
 2, r. des Trois-Frères, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 21, place des Vosges, Paris.
Lab. ROBERT & CARRIÈRE,
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,
 Paris.
 21, r. Nonnains-d'Yères, Paris.
Labor. MONGE, Oullins (Rhône).
 8, r. Favart, Paris.
L. ADAM, à Granville (Manche),
 194, rue de Rivoli, Paris.

- Adrénol Total** (voir
Lipoides)
Adrénoléine
- Adrénophyséine**
Adrénopituine Byla
***Adrépatine** Laleuf
***Adréphédrine** Béral
Adrialgine
Adrianine
***Aérophagyl**
***Aesculase**
- ***Æthone-Falcoz**
Afatyl
- ***Agamétol**
- Agar du Dr Gigon**
***Agarase**
- Agarham**
Agaricine Clauss
Agaryl Fournier
Agesulf
- Aglo**
- Aglucol**
Agobyl
- ***Agocholone** Zizine
***Agomensine** Ciba
- Agonol** Cognet
Agoxyl
- ***Aigue d'Or**
Aimaquinase
- ***Airoglyce**
***Airol Roche**
Akésol Musi
***Albuplast** Vigier
Albuol Leisyn
***Alcacyl**
- Alcaderma**
- ***Alcalinose**
Alcaloïdes seuls et
combinés
***Alcamfétol**
- ***Alcasodine**
- Aldhylène**
- ISCOVESCO**, 107, r. des Dames,
Paris.
FALVY, 40, r. des Acacias,
Paris.
14, r. de Clichy, Paris.
26, av. Observatoire, Paris.
20, r. du Laos, Paris.
194, rue de Rivoli, Paris.
9, r. de la Perle, Paris.
9, r. de la Perle, Paris.
12, bd St-Martin, Paris.
MICHELON, 20, bd Heurte-
loup, Tours.
9, r. Boissonnade, Paris.
Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
Dames, Paris.
Lab. SALLE, 4, r. Elzévir,
Paris.
25, bd Beaumarchais, Paris.
REAUROURG, 2, r. Boucicaut,
Paris.
CATAR, r. Huguerie, Bordeaux.
GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
7, r. Biscornet, Paris.
MERMINOD, 49, r. du Paradis,
Paris.
21, r. Cacheux, Boulogne-sur-
Seine.
PATRICE à Vichy.
FOUCHERE, Rive-de-Gier
(Loire).
24-26, r. de Fécamp, Paris.
109-113, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
43, r. de Saintonge, Paris.
LETTY, 69, rue de Sèvres,
Paris.
53 bis, bd de la Liberté, Lille.
Société Régionale de l'Ouest, à
Rennes.
55, r. Chabrol, Paris.
21, pl. des Vosges, Paris.
Sarlat (Dordogne).
9, r. de la Gare, Levallois-Perret
1 bis, r. Molitor, Paris.
WANDER, 151 bis, rte de Join-
ville, Champigny (Seine).
47, r. de la Boule-d'Or, Romilly
(Aube).
27, r. Desrenaudes, Paris.
Labor. DULCIS, place Clichy,
Monte-Carlo.
Lab. DOR, 17 bis, av. Parmen-
tier, Paris.
GLORY, 38 bis, bd Beaumar-
chais, Paris.
74, r. de Rome, Marseille.

- Aldine**
Aldogène Carteret
Aldor
***Alepsal Genévrier**
***Alexime**
Algaliment
Algalopol
Algarine Nyrdhal
Algarol
***Algatan**

Alghiogyl

Algilaxine
Algional
***Algocratine Lancosme**
Algodigestine
Algolane Poulenc
***Algophagine**

Algoplast
***Algostérine**

Algovitine

***Alibourine**
Alimavèna
Alimentine Mory

Aliment Mono
***Aliment Tinardon**
**Allcock's Porous Plas-
ter**
***Allisatine Sandoz**
Allium Coirre
***Allocaïne Lumière**
***Allochrysine Lumière**
***Allonal Roche**
***Allophaquina**
***Aloïne Houdé**
***Aloplastine**

***Aloysine Gouzène**
***Alsodine**

Althine
Altsara
***Alucol Wander**

***Alunozal**

Alzine
Amandol
***Amborhinol**
Ambrine
***Amibiasine**
- 37, r. de la Fédération, Paris.
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).
 45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
 51, r. Gay-Lussac, Paris.
 47, r. Colbert, Tours.
 132, rue de Turenne, Paris.
 12, r. de la République, Puteaux.
 6, r. des Dames, Paris.
 3-9, r. des Alouettes, Nanterre
 (Seine).
 Lab. Paul Fontanier, Moulins-
 sur-Yèvre (Cher).
 id.
 id.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 PONCET, à Limoges.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 UNIS-SPES, 14, r. Demarquay,
 Paris.
 FOURNIER, Dijon.
 OLIVIERO, 41, r. Denfert-
 Rochereau, Paris.
 P. FONTANIER, Moulins-s.-
 Yèvre (Cher).
 Lab. B. E. A., Belfort.
 Bourg-la-Reine (Seine).
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 7, r. de Sèze, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.

 3 et 5, r. de Metz, Paris.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 23, c. de la Liberté, Lyon.
 23, c. de la Liberté, Lyon.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 3, r. Watteau, Courbevoie.
 9, r. Dieu, Paris.
 Lab. Biologique de l'Ile-de-
 France, 3, r. Laugier, Argen-
 teuil.
 139, r. de Paris, Pantin.
 Lab. B. C. L., 29, faub. de Bour-
 gogne, Orléans.
 3, r. Barbette, Paris.
 151, r. St-Maur, Paris.
 151 bis, rte de Joinville, Cham-
 pigny (Seine).
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 285, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 5, av. des Tilleuls, Paris.
 276, r. Lecourbe, Paris.
 48, bd La-Tour-Maubourg, Paris
 58, r. de Miromesnil, Paris.

- *Amidal 4, pl. des Vosges, Paris.
- Amidon Planche 2, r. Volney, Paris.
- *Amino-Sel Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Amiphène CARRON, 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
- Amipyrine 113, bd Voltaire, Paris.
- Amirargol AMICROS, 9, bd Edgar-Quinet, Paris.
- Ampélamine 7, r. de l'Arbre-Sec, Lyon.
- Ampelodine Bernhard 11, r. Lafayette, Paris.
- *Amphosthène 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Ampoules-Tablettes Ronchèse 6, r. Rothschild, Nice.
- *Amphotonyl 20, r. du Bourg, Laon.
- *Ampho-vaccins de Ronchèse 6, r. Rothschild, Nice (A.-M.).
- *Ampolases-opolases 163, r. de Flandre, Paris.
- Ampoules de benzoate et bi-iodure Hg. Vigier VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- Ampoules bi-iodure Hg. Midy 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- *Ampoules Boissy 49, r. Hoche, Courbevoie.
- Ampoules Cantonnet BELIERES, 19, r. Drouot, Paris.
- Ampoules Churchill 12, r. Castiglione, Paris.
- *Ampoules de Digalène HOFFMANN LA ROCHE, 21, pl. des Vosges, Paris.
- Ampoules Dubé MILLOT, 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
- Ampoules Egralène 157, r. Championnet, Paris.
- Brisson id.
- Ampoule huile soufrée Brisson id.
- *Ampoules de Pantopon Hoffmann-la-Roche et C^{ie}, 21, pl. des Vosges, Paris.
- Ampoules Optima Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Ampoules Pinceaux 37, r. de Bourgogne, Paris.
- *Ampoules Reipar DRAPIER, à Lucquy (Ard.).
- Ampoules Romon 6, r. Bridaine, Paris.
- *Ampoules de Sécacornine 21, pl. des Vosges, Paris.
- *Ampoules de Spasmalgine id.
- *Ampoules de Théobryl id.
- *Ampoules névrosthéniques Dausse 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- *Ampoules Sulfa Cauterets (Htes-Pyrénées).
- Ampoules Suractives Leisyn 1 bis, r. Molitor, Paris.
- Ampoules Sigmuth BRISSON, 157, r. Championnet, Paris.
- Ampoules d'Uriage 15, Champs-Élysées, Paris.
- Ampoules V.-E. Doumer BOMEL à Annonay (Ardèche).
- *Amunine BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.

Amyliodine	163, r. de Flandre, Paris.
*Amylodiastase Thépénier	12, r. Clapeyron, Paris.
*Anacamphre	37, r. de Bourgogne, Paris.
*Anacidase	MEUNIER, Auxerre (Yonne).
*Anaclasine Ranson	121, av. Gambetta, Paris.
Analgénine	17, r. Cadet, Paris.
AnalGINE dentaire	FANDRE, 4, fg Stanislas, Nancy.
Analgol	D ^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
*Anapeptone Vassal	28, r. Hôpital-Militaire, Lille.
*Anaquintine Lescène	à Livarot (Calvados) et 58, r. de Vouillé, Paris.
*Anasectol	DEBRUERES, 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
Anasepsine J. Muraire	3, r. des Laitières, Vincennes.
Anatoxine diphtérique	Institut Pasteur, 22 rue Dutot, Paris.
*Anaural	Lab. LAMAR, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rh.).
*Anaxeryl	BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
Androbion Netter	100, bd Sébastopol, Paris.
*Androcalcion	CORTIAL, 15, bd Pasteur, Paris.
Androcrinol	Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
Andropolycrinol	Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
*Androstine Ciba	109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
Andryl Vicario	17, bd Haussmann, Paris.
*Anégrine Rivier.	26-28, r. St-Claude, Paris.
Anéo Leisyn	1 bis, r. Molitor, Paris.
Anéol	25, r. Petits-Hôtels, Paris.
Anestile Bengué	47, r. Blanche, Paris.
Aneuvryl	71, r. du Fort, Aubervilliers.
*Anexol	DROUET & PLET à Ruell, (Seine-et-Oise).
*Angiolymphe	4 bis, r. Hébert, Courbevoie.
*Angiosedine	BEAU, 36, r. des Archives, Paris.
Angiosthénine	5, av. de Tilleuls, Paris.
*Angioxyl du D ^r Rous-sel	97, r. de Vaugirard, Paris.
Anhémor	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel, Paris.
*Aniodol	3-9, r. des Alouettes, Nanterre (Seine).
*Anoïde	116, bd Haussmann, Paris.
Anoxyne	GUERET, 23, r. des Cordeliers, Meung-sur-Loire (Loiret).
*Anozyl	D. DEROZIER, 24, r. Jardel, Bordeaux.
Antacidyl	DURET & RÉMY, à Asnières (Seine).
*Antalgol Dalloz	13, bd La Chapelle, Paris.
Antalgyl	MOITY-CHAUZEIX, Neuilly-sur-Seine.

- *Antasthène
 *Antasthme Cibrand
 *Antélobine Byla
 *Anthema
 *Anthraxone
 *Antialgos Christiaens
 *Antiasthmaticque
 Anti-asthmatiques du
 D^r Cléry
 Antriasthmaticque du
 D^r Hallay
 *Antiasthme Bengalais
 *Antiasthmine
 Anticalculose
 *Antidiabétique Mona-
 von
 *Ant-épileptique de
 Liège
 Antifébra
 *Antifuronculeux
 Antigastralgique
 Winckler
 *Antigénines
 Antiglaire Forézen
 Antigonal
 Antigrippal Demay
 *Antigrippine Midy
 Antikamnia
 Antimucose Marian
 *Antinéase
 Antipaludique
 Antipaludique Lumière
 *Antiphi
 Antiphlogistine
 Antiphlogosine
 Antiphymase Meurico
 *Antiphymique Vadam
 *Antipiol
 Antipsorine
 Antipur
 Antipyrine U. R.
 *Antirrhoïde Bélières
 *Antisciatique
 Antiseptinol
 54, fg St-Honoré, Paris.
 199, av. Victor-Hugo, Auber-
 villiers.
 26, av. de l'Observatoire, Paris
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 Institut de Microbiologie, à Sarre-
 bruck et 23, r. du Caire, Paris.
 r. du Ch.-de-Mars, à Reims.
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.)
 Lab. du D^r CLÉRY, 53, bd
 St-Martin, Paris,
 36, r. Eugène Carrière, Paris.
 FAGARD, 44, r. d'Aguesseau,
 Boulogne-sur-Seine.
 66, r. Nationale, Lille.
 HUGON, 108, av. Michel-Bizot,
 Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 48, r. Claude-Lorrain, Lille.
 132, r. de Turenne, Paris.
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
 MIDY & C^{ie}, 4, r. du Colonel-
 Moll, Paris.
 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
 62, r. Marengo, St-Étienne.
 26, r. des Petits-Champs, Paris.
 42, r. des Martyrs, Paris.
 MIDY et C^{ie}, 4, r. du Colonel-
 Moll, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 41, bd Haussmann, Paris.
 SALAVERT, Ste Foy la grande
 (Gironde).
 COUTURIEUX, 18, av. Hoche,
 Paris.
 23, c. de la Liberté, Lyon.
 CAPIN, Roquefort (Landes).
 11, r. du Petit-Parc, St-Maur
 (Seine).
 126, r. de la Pompe, Paris.
 Union chimique Belge, 61, av.
 Louise, Bruxelles.
 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 7, av. des Sources, Nice.
 14, r. Gravel, Levallois (Seine).
 121, av. de St-Ouen, Paris.
 21, r. Jean-Goujon.
 19, r. Drouot, Paris.
 CHAMBON, pl. Francheville,
 Périgueux.
 C. BARON, aux Sables-d'Olonne
 (Vendée).

- Antiseptique - Alcalin** 13, pl. Delille, Clermont-Fé-
Gros rand.
Antirique de Con- 5, av. Victoria, Paris.
tréxeville
- *Antivirus** La Blothérapie, 131, r. Cam-
bronze, Paris.
- Antixénol** 74, r. de Lourmel, Paris (XV^e).
Antodyne Poulenc 21, r. Jean-Goujon, Paris.
***Antonal** Lab. CARESMEL, 2, q. Paul-
Bert, Tours.
- Anuline** 10, r. de l'Union, Cléchy.
Anuroi 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
***Anusol** Lab. du D^r MIALHE, 8, r.
Favart, Paris.
- Anxiol** FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
***Anxioséline** Pl. Saint-Goery, Épinal.
Anytal Br.-sson 157, r. Championnet, Paris.
Apaludol AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
***Aphloïne** 15, r. des Immeubles-Indus-
triels, Paris.
- *Aphosal** 48 bis, av. Mozart, Paris.
***Apioline Chapoteau** 8, r. Vivienne, Paris.
Aplexil 21, r. Jean-Goujon, Paris.
Apocynine du D^r Des LALEUF, 20, r. du Laos,
champs Paris.
***Appetyl** Lab. Biologique de l'Île-de-
France, 3, r. Laugier, Argen-
teuil.
- Aprol Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
***Apsophol** 40, r. des Carmes, Orléans.
Apyrexine Optima OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
- Aquasoluble** 16, r. Ficatier, Courbevoie.
***Aquintol** Lab. du D^r MIALHE, 8, r.
Favart, Paris.
- Arachise** Lab. BÉLIERES, 19, r. Drouot,
Paris.
- *Arapal** La Blothérapie, 131, r. Cam-
bronze, Paris.
- *Arcanan** CRUET, 13, r. Miollis, Paris.
Archésine Trouette- 15, r. des Immeubles-Indus-
Perret triels, Paris.
Arcica 84, r. Rochechouart, Paris.
***Ardogène** 9, r. du Temple, Enghien
(Seine-et-Oise).
- Argent colloïdal élec-** MARONNEAU-MOREL, 156, r.
trique des Fauvelles, Courbevoie.
Argent colloïdal Nyr- 12, r. de la République, Puteaux.
dhal
- *Argion** BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
Argolène Labor. DULCIS, pl. Cléchy,
Monte-Carlo.
- *Argybil** LANCOSME, 71, av. V.-Emma-
nuel-III, Paris.
- *Argycuprol** 4 bis, r. Hébert, Courbevoie.
***Arhémapectine Gallior** 38, bd Montparnasse, Paris.
***Arhéol Astier** 45, r. du D^r-Blanche, Paris.

- *Arhine Lambiotte Fr.** 20, r. Dumont-d'Urville, Paris (XVI^e).
***Aristargol** 8, r. du Petit-Musc, Paris.
Armosine ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
Aromalt KARCHER, 139, r. des Pyrénées, Paris.
***Arquéritol** LESURE, 70, r. du Bac, Paris.
***Arrhénal Adrian** 9, r. de la Perle, Paris.
Arrhénalotine Bureau 86, bd Port-Royal, Paris.
Arrhéniques Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Arrhénomartiol Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Arrhéno-Splénine 6, r. Mathilde, Courbevoie.
***Arrhénuclène Bergevin** à Châteaudun (Eure-et-Loir).
Arrow-root BLOCH, Tomblaine près Nancy (M.-et-M.)
Arsallyl 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
Arsaminol Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Arsébényl Meurice Union Chimique Belge, 61, av. Louise, Bruxelles.
***Arsécrinol** 20 r. du Bourg, Laon.
Arsenic Organique COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.
Glasser
***Arséniode** BURIAT, 25, r. Copernic, Paris.
Arsenion Couturieux 18, av. Hoche, Paris.
Arsénobenzol Billon 21, r. Jean-Goujon, Paris.
Arseno-fer Henry 39, r. Sclessin, Liège.
***Arsénos-Solvant** 19-21, r. Van-Loo, Paris.
Arsétonyl CALMEL-DOMERGUE, 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
Arsiodyle CHASSAIGNE, Ruffec (Charente).
Arsiquinine Lemaitre 12, r. Vavin, Paris.
***Arsi-Strychnal Longuet** 34, r. Sedaine, Paris.
Arsoplasmine 52, r. La Bruyère, Paris.
***Arsycodyle Leprince** 62, r. de la Tour, Paris.
***Arsylène Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.
Arsynal Legrand GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
Arsysérum 46, r. de Rome, Marseille.
***Artérase** GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
***Arterion Vincardi** VIGUIER, 42, av. Borriglionne, Nice.
***Artérioveinine** 121, av. St-Ouen, Paris.
Arthridoi D^r FRAYSSE, 47, r. de Neuilly, Nanterre.
Arthrillax LYONS, 30, r. Monge, Paris.
Arthri-sel 22, rue Morère, Paris.
Arthritose La Biomarine, à Dieppe (S.-Inf.).
***Artoradine** Lab. de Radiumthérapie, 25, r. Vaneau, Paris.
Arvensyl GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
Arzonil 143, Gde-Rue Guillotière, Lyon.
***Ascéine** CIBA, 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.

- *Asclatine
 Asclérogénol
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
- *Ascoléine Rivier
 Aseborhal
 Aseptampoules
 mesnil
 Aseptène
 26, r. St-Claude, Paris.
 25, r. de Tocqueville, Paris.
 10, r. du Plâtre, Paris.
- *Aseptone
 Lab. MOULIN, 50, r. de République, Puteaux (Seine).
- *Aseptopoudre
 46, r. de Rome, Marseille.
- *Aseptoradol
 Etabl. LABORADIUM, 33, r. St-Jacques, Paris.
- *Aseptovules
 Aseptorhine
 Asepturol
 Aspiphane
 Aspirine U. R.
 Aspirine Vicario
 Asquiroi Poulenc
 Astasol Douetteau
 Astéine Biron
 Asthmacidine
 46, r. de Rome, Marseille.
 21, r. Feydeau, Paris.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 20, fg St-Honoré, Paris.
 10, r. Lafayette, Grenoble.
- Asthmapépton
 Asthmatyl
 14, r. de Birague Paris.
 3, r. du Pont, Epinal.
- *Asthmo-Actine
 Asthmor
 BERTHON à Dornes (Nièvre).
 88, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine.
- Asthmyl
 ROUSSELET, 9, bd de la République, Noisy-le-Sec (Seine).
- Asthmylose
 Atemnol
 Atensyl
 2, r. Lesdiguières, Paris.
 126, r. de la Pompe, Paris.
- *Athérolysine
 Atihai
 Atlasantol
 DORANTOWICZ, 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- Atolysan
 *Atophan Cruet
 *Atophanyl
 Lab. JONIDS, Dijon (Côte-d'Or).
 5, pl. Miremont, Vienne (Isère).
 MARONNEAU-MOREL, 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- *Atoquinol Ciba
 id.
 13, r. Miollis, Paris (XV^e).
 Lab. CRUET, 13, r. Miollis, Paris (XV^e).
- Atoxyl Pouenci
 Atrabiline Gory
 *Atural
 Auriculine
 Aurion Couturieux
 Autogénol
 Auto Inhalation Legras
 Auxeryl
 Avanazo' Couturieux
 *Avantol
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 JOOSS, Montreuil (Seine)
 35, r. de Paris, Clichy.
 21, r. Feydeau, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 57, r. Edgar-Quinet, Nantes.
 28, r. Monge, Dijon.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
- GOUIN, 20, r. des Écoles, Paris.

*Avistyl
 *Azigol
 *Azotyl
 *Azufrol Couturieux
 *Azym

11, r. Lepic, Paris.
 Thévenot, 21, r. des Roses, à
 Dijon.
 46, av. des Ternes, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 PARET, 22, r. Guibal, Marseille.

B

*Babeurre de Lafaye
 Babourre Lactella
 *Babeurre Nutricia
 Babutyrose
 Baby-Bala
 Baby-Ossine
 Bacilacrine
 *Backérine
 *Bacté-Coli-Phage
 *Bacté-Dysentéri-Phage
 *Bacté-Intesti-Phage
 *Bacté-Phage
 *Bacté-Pyo-Phage
 *Bactériophages Leclerc
 *Bacté Rhino-Phage
 *Bacté-Staphy-Phage
 *Bactioxylene
 Bains de Brides
 Bains carbogazeux de
 Royat
 *Bains carbogazeux
 Wolo
 *Bain Carré
 Bain de Royan Varech
 *Bain Salvia
 Bains médicamenteux
 Bakolyse
 *Baldisedan
 *Ballotyl
 *Balmiga
 Balnacid
 Balsamiode
 Balsamodo

Ferme de « La Faye », Marliès
 (Loire).
 à Tourcoing.
 1, bd St-Martin, Paris.
 59, bd Gambetta, Tourcoing.
 BRICHARD et fils, Bar-le-
 Duc (Meuse).
 Billy-Montigny (Pas-de-Calais).
 50, r. de la République, Pu-
 teaux.
 1, pl. des Vosges, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris
 id.
 id.
 id.
 id.
 10, r. Vignon, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 id.
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 Royat (Puy-de-Dôme).
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 LANCOSME, 71, av. Victor-
 Emmanuel-III, Paris.
 Labor. Marin, Pontailiac (Ch.-
 Inf.).
 av. Émile Zola, 139, Paris.
 D^r FAYES, 199, r. St-Denis,
 Paris.
 122, r. Cherche-Midi, Paris.
 133, r. Lecourbe, Paris.
 113, bd Voltaire, Paris.
 127, bd. St-Michel, Paris.
 49, r. Paradis, Paris.
 19, c. Morand, Lyon.
 10, r. Washington, Paris.

- ***Balsamol Lescène** à Livarot (Calvados) et 58, r. de Vouillé, Paris.
- Balsapëctor** 15, r. Catullienne, St-Denis (Seine).
- ***Balsoforme** SPECIA, 21, r. Jean-Goujon Paris.
- Bandes ulcérophiles** 6^{ter}, r. Voltaire, La Garenne-Colombes.
- Nozan**
- ***Baniko. Chauzeix** 26, r. Pradier, Ville-d'Avray. (Seine-et-Oise).
- Bardane stabilisée** 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- Dausse**
- Bardanyl** 4, imp. de Béarn, Paris.
- Barèges Fagard** 44, r. d'Aguessau, Boulogne-sur-Seine.
- Barkyl** 30, r. Bobillot, Paris.
- BaromyI** Sté française d'Extension Bio-Chimique, St-Quentin.
- ***Basedowine** GALLIER, 38, bd Montparnasse, Paris.
- ***Baume Adol** L. GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.
- Baume Agerca** 30, r. Bobillot, Paris.
- Baume Apard** 27, bd de Courtais, Montluçon (Allier).
- ***Baume Aroma** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- ***Baume Bengué** 16, r. Ballu, Paris.
- Baume Bernhard** 11, r. Lafayette, Paris.
- ***Baume D^r Baissade** Saint-Loup, près Marseille (Bouches-du-Rhône).
- Baume D^r Blancard** 114, av. Jean-Jaurès, Paris.
- Baume Bocglin** 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
- Baume Dalet** 94, bd des Batignolles, Paris.
- Baume Darnosl** HUBERT, Romorantin (L.-et-C.)
- ***Baume Daynoé** LEJEUNE, 142, rue de Picpus, Paris.
- ***Baume Delacour** 56, bd Péreire, Paris.
- Baume de Dentition** 32, fg Montmartre, Paris.
- Baume de la Faculté** 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.
- Baume Doiora** 50, r. de la République, Puteaux.
- ***Baume Durét** ROUTIER, 20, r. St-Lazare Paris.
- Baume du D^r G^rgon** 25, bd Beaumarchais, Paris.
- ***Baume Iki** MERCIER, Fécamp (S.-Inf.).
- Baume Kamol** 6, r. Mathide, Courbevoie.
- Baume Lartigol** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Baume Lorol** ZEDAIRE, à Grenoble.
- Baume Marta** BONNAURE, à Alais (Gard).
- ***Baume de la Maternité** 7, r. Galvani, Paris.
- Baume Merveilleux** RAVAUD, 6, pl. de Bretéuil, Paris.
- Baume Oco** 87, r. Lafayette, Paris.
- Baume Pélévine** 18, r. Barbette, Paris.
- Baume de Port-Royal** MOREL, 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.

- *Baume Py
 Baume des Pyrénées
 *Baume Rhodia
 Baume Robemard
 Baume Saihel
 Baume Saint-Antoine
 *Baume Selenia
 *Baume Suelta
 *Baume Tanex
 Baume Tetyl
 Baume Victor
 *Baumolacpinine
 *Béatol
 *Beef Lavoix
 *Belhémine
 *Belladenal Sandoz
 Belladone Dausse
 *Bellafoline Sandoz
 *Bernax
 Bémeccé
 Benedictus (Produits)
 *Bensamine
 Benzhermyl
 Benzoate de Naphtol
 *Benzo-Bismuth Millo
 *Benzobromine
 Benzocalypto
 Benzocarbène
 *Benzoflorine Julien
 Benzo - iodhydrine
 Brue!
 Benzolactine
 Benzo-Lactol
 *Benzophosphane
 Christiaens
 *Benzoquinol
 Benzo-Ringyl
 Benzothymol
 *Benzyany
 *Benzylocalcium
 *Benzylol
 Berkendyl
 Béryline du D^r Fayès
 Bestol du D^r Lavoué
 *Bétul-Ol Midy
 58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
 Chalet du Rêve, Bayonne.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 D^r PACHEBAT, Bayonne.
 70, Grand'Rue, Sèvres.
 38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).
 DAVID & ses fils, 49, r. de
 Bitche, Courbevoie.
 16, r. Henri-Regnault, Cour-
 bevoie.
 DEBRUERES, 66, r. de Paris,
 Poissy (S.-et-O.).
 7, r. Guillaume-Budé, Mont-
 geron.
 PELAUD & BAYLE, La Cour-
 tine (Creuse).
 4, r. d'Ilzsch, Mulhouse.
 46, av. des Ternes, Paris.
 5, av. Victoria, Paris.
 Lab. de Sérothérapie, 3, im-
 passe Adam, Boulogne-s.-Seine.
 3-5, r. de Metz, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 3-5 r. de Metz, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 21, r. Violet, Paris.
 74, r. Lamarck, Paris.
 74, quai Jemmapes, Paris.
 36, q. Fulchiron, Lyon.
 FRAUDIN, 4, av. Desfeux,
 Boulogne-sur-Seine.
 54, r. Bienfaisance, Paris.
 HERAULT, 14, pl. de l'Hôtel-de
 Ville, Beauvais.
 213, r. St-Honoré, Paris.
 FOUCHERE, Rive-de-Gier
 (Loire).
 105, r. de Rennes, Paris.
 36, r. de Paris, Colombes (Seine).
 38, r. Albouy, Paris.
 10, r. du Parc-Royal, Paris.
 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
 1, r. Alexandre-III, Dunkerque.
 9, r. Boissonnade, Paris.
 50, r. de la République, Pu-
 teaux.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Lab. DOR, 17 bis, av. Parmen-
 tier, Paris.
 37, r. Galilée, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 199, r. St-Denis, Paris.
 Rennes (Ille-et-Vilaine).
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.

- ***Bexinine Amblard**
Bi-98 6, r. Balainvilliers, Clermont-Fd.
MARONNEAU-MOREL, 156, r.
des Fauvelles, Courbevoie.
Lab. chimie physiologique, 37, r.
Tivoli, Bordeaux.
- B. antero** Lab. ORRILLARD, 245, r. de
Vaugirard, Paris.
- Biarsol** 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
17, bd Haussmann, Paris.
- ***Biazan** 52, r. de Flandre, Paris.
276, r. Lecourbe, Paris.
- Bibromure de Hg. Vi-**
cario 77, rte d'Orléans, Montrouge.
54, r. de Paris, Charenton.
- ***Bi-Citrol Marinier** BOMEL, Annonay (Ardèche).
Bicollyre 12, r. de Nice, Paris.
Biere Fanta (nourrices) 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
Bigynol 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
98, r. de Sèvres, Paris.
- ***Bi-Iodural Novat** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Bi-iodure Cros 7, r. Biscornet, Paris.
Bi-iodures Domergue à Asnières (Seine).
Bi-iodure Midy Lab. LAMAR, pl. Forbin, Aix
(B.-du-R.).
Bi-iodure Souffron Lab. STENE, 2, pl. des Vosges,
Paris.
Bilexabol 32, bd Beaumarchais, Paris.
- ***Biléyl Fournier** CHEVILLON, 99, r. de Paris,
Massy (S.-et-O.).
- ***Biliase Raby** 3, r. Dunkerque, Paris.
PATRICE à Vichy.
- ***Biliboldo** 41, r. Etienne-Marcel, Paris.
La Biothérapie, 131, r. Cam-
bronne, Paris.
- ***Bilifluine** 33, r. Rennequin, Paris.
30, r. Miromesnil, Paris.
- Biliodé** GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
- ***Biliogastrine Chevillon** DURAND, à Aigues-Mortes.
177, bd St-Germain, Paris.
- Bilio: Bouty** AUGIER, 2-4, r. des Lom-
bards, Paris.
- Biliose Vichy** LEMATTE & BOINOT, 52, r.
Labruyère, Paris.
- Bilirhéine** OLIVIERO, 41, r. Denfert-
Rochereau, Paris.
- ***Bilivaccin** ROBERT et CARRIERE, 37, r.
de Bourgogne, Paris.
- Billeros** 122, fg St-Honoré, Paris.
- Billirgyl** Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).
- Bilolive** 6, r. Bridaine, Paris.
- Bimaméra! Reynaud** 17, r. Cadet, Paris.
- Binol Roger** 1, r. des Augustins, Perpignan.
- Biocalcino** 58, r. de Miromesnil, Paris.
- ***Biocalcoso** 1, bd Henri-IV, Paris.
à Vienne (Isère).
- ***Biocéane** à Lorient.
- ***Biocholine** 7, r. Biscornet, Paris.
- Biocrine**
- Bioderma**
- Biodermyl Mona!**
- ***Biodynamine**
- Bioforcil**
- ***Bioentérase**
- Biogastrine**
- ***Biogénol Demasles**
- Biogésine Richard**
- ***Biolactyl Fournier**

- Biomagnésium**
 *Bionéol 20, 1g St-Honoré, Paris.
 Bionergyl 14, r. de Périgueux, Angoulême.
 Bionucléine 16, r. St-Gilles, Paris.
 *Biophorine Girard 4, imp. de Béarn, Paris.
 Biophosphine 48, r. d'Alésia, Paris.
 *Biophylactine M.-G. DEPOUILLY, Le Creusot.
 116, av. Berthelot, Vienne
 (Isère).
 Biophytol 90, av. des Ternes, Paris.
 Bioplasmyl LE DAVAY, 2, r. Notre-Dame,
 Guingamp (Côtes-du-Nord).
 Bioplastina Serono 6, r. des Ursulines, Paris.
 Biopulmol Lab. Termes, Miramont de
 Guyenne (Lot-et-Garonne).
 Bio-Sel COUENON, Lamalou (Hérault).
 Biosérine 63, cours Victor-Hugo, Lyon.
 *Biosine le Perdriel 11, r. Milton, Paris.
 Biotose Ciba 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 *Biotrignon 8, r. Pierre-Girard, Paris.
 Bioxyol Hussigny (M.-et-M.).
 Biozol 25, r. Drouot, Paris.
 Biquinyl Meurice Union Chimique Belge, 61, av.
 Louise, Bruxelles.
 Bircol Mauchant 14, r. de Birague, Paris.
 Bi-Ricin 72, route de Châtillon, Malakoff.
 Bi-Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
 Biscam-Gabail 5, r. Lefebvre, Paris.
 Biscols Fraudin 4, av. Desfeux, Boul.-sur-Seine.
 Biscopaks Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Biscottes Delft 45, r. Grange-aux-Belles, Paris.
 Biscottes Grégoire 24, r. du Bois, Clichy (Seine).
 Biscottes Rabiet 55, ch. d'Antin, Paris.
 Biscuits régénérateurs 44, r. Damrémont, Paris.
 du D^r J. Brown
 Bisermol
 *Bis-ka-ma
 Bismétine Clin
 *Bismhydral
 Bismint
 Bismupaïne
 *Bismusodine
 *Bismutartrol
 *Bismuth Desleaux
 Bismuth léger Adrian
 Bismuth Perroud
 *Bismuth Tulasne
 Bismuth 25
 *Bismuth du D^r Ques-
 neville
 *Bismuthion Coutu-
 rieux

20, 1g St-Honoré, Paris.
 14, r. de Périgueux, Angoulême.
 16, r. St-Gilles, Paris.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 DEPOUILLY, Le Creusot.
 116, av. Berthelot, Vienne
 (Isère).
 90, av. des Ternes, Paris.
 LE DAVAY, 2, r. Notre-Dame,
 Guingamp (Côtes-du-Nord).
 6, r. des Ursulines, Paris.
 Lab. Termes, Miramont de
 Guyenne (Lot-et-Garonne).
 COUENON, Lamalou (Hérault).
 63, cours Victor-Hugo, Lyon.
 11, r. Milton, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 8, r. Pierre-Girard, Paris.
 Hussigny (M.-et-M.).
 25, r. Drouot, Paris.
 Union Chimique Belge, 61, av.
 Louise, Bruxelles.
 14, r. de Birague, Paris.
 72, route de Châtillon, Malakoff.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 5, r. Lefebvre, Paris.
 4, av. Desfeux, Boul.-sur-Seine.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 45, r. Grange-aux-Belles, Paris.
 24, r. du Bois, Clichy (Seine).
 55, ch. d'Antin, Paris.
 44, r. Damrémont, Paris.
 VIGIER, 12, bd Bonne-Nou-
 velle, Paris.
 DURET et REMY, Asnières
 (Seine).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 LANCOSME, 71, av. Victor-
 Emmanuel-III, Paris.
 2, r. Paradis, Paris.
 194, r. de Rivoli, Paris.
 60, r. Auguste-Comte, Lyon.
 RAVAUD, 6, pl. de Breteuil.
 Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 9, r. de la Perle, Paris.
 7, r. des Archers, Lyon.
 50, bd des Batignolles, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 12, r. de Buci, Paris.
 18, av. Hoche, Paris (XVI^e).

- *Bismuthoidol Robin** 13, r. de Poissy, Paris.
Bismuthyl « Maurice » 61, av. Louise, Bruxelles.
Bisquina 7, r. Guillaume Budé, Montgeron
Biss ne DECAUD, St-Hilaire-des-Loges
 (Vendée).
Bissol 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
Bistan DUCATTE, 31, r. Francs-
 Bourgeois, Paris.
***Bivatol** Lab. Chimiothérapie, 89, r. du
 Cherche-Midi, Paris.
Bivigor SCOTT, 38, r. du Mont-Thabor,
 Paris.
***Blagny (gouttes, dra- Voir : Gouttes Blagny.**
gées, sirop)
Blastéase 21, pl. des Vosges, Paris,
Blécao Jacquemaître à Villefranche (Rhône).
***Blédine Jacquemaître** à Villefranche (Rhône).
***Blennopiat** GIROUD, 78, c. de la Liberté,
 Lyon.
***Blennosine** INSTITUT de MICROBIO-
 LOGIE, Sarrebruck et 23, r.
 du Caire, Paris.
Blennotoxyl 172, r. d'Alésia, Paris.
Bléomaltine AXAREL, 15, r. Catulienne, St-
 Denis (Seine).
***Blocs Vécor** 64, r. de la Folie-Méricourt,
 Paris.
Blokao BLOCH, à Tomblaine (M.-et-M.).
Bluetine MEILLER, Dumières (Haute-
 Loire).
Bokanol 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
***Bolcitol** 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
***Boldine Houde** 9, r. Dieu, Paris.
Boldo-Basma 9, pl. Félix-Faure, Paris.
Boldo-Biline DUCLOY et Cie, Arques (P.-de-
 Calais).
Boldo Glucine Chapo- 8, r. Vivienne, Paris.
teaut
***Boldo-Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
***Boldoine Eparvier** 26, Grande-Rue St-Clair, Lyon.
Boldolactol A. SALLES, 11, bd de Stras-
 bourg, Paris (X^e).
***Bolderhéine** D^r CHAPELLE, 8, r. Vivienne,
 Paris.
***Boldo-Verne** à Grenoble (Isère).
***Boléase Mona** 6, r. Bridaine, Paris.
***Bolène** 46, r. Pierre Charron, Paris.
Bonbons Lucas (Ver- JOUBERT & SIBASSIÉ,
mifuges) Nantes.
Bonbons vermifuges LAUMONNIER, 225, r. St-Mar-
Royer tin, Paris.
***Boréol** 21, r. Feydeau, Paris.
***Boricine Meissonnier** LOGEAS, 22 bis, r. de Silly,
 Boulogne-sur-Seine.
Bornyval 2, r. des Lions, Paris.
Boro-borax Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
***Borocalcy-Thévenot** 21, r. des Roses, Dijon.

*Borosodine Lumière	23, c. Liberté, Lyon.
*Borostyrol	MAYOLY, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Borotropine Sevin	2 bis, r. Chevallier-de-la-Barre, St-Quentin.
Bouchons Radioactifs Emania	14, r. de la Pépinière, Paris.
Boues Radioactives Emania	14, r. de la Pépinière, Paris.
Boues Radioactives de Putejan - les - Bains (Tchécoslovaquie).	45, r. du Marché, Neuilly.
Boues radioactives Rhemda	51, r. d'Alsace, Courbevoie.
Bougies Américaines	LOGEAS, 24, r., de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Bougies Chaumel	78, fg St-Denis, Paris
*Bougies Franklin	100, bd Sébastopol, Paris.
Bougies radioactives Rhemda	51, r. d'Alsace, Courbevoie
Bougies Raynal	12, r. de Nice, Paris.
*Boules Quiès	47, bd Victor, Paris (XV ^e).
Bouragar	BONNAURE, à Alès (Gard).
Bourgène Blanc	CELLIER, 8, r. de Loge, Montpellier.
Bouteilles Radioactives Emania	14, r. de la Pépinière, Paris.
Bovavèna	Bourg-la-Reine (Seine).
Bov'Cardiac	FUMOUE, 78, fg St-Denis, Paris.
Bov'Bilic	id.
Bov'hepatic	id.
*Bradygastrine	DUCLOY et C ^{ie} , Arques (P.-de Calais).
Brévanyl	15, q. de Bourbon, Paris.
*Brid s-les-Bains	46, r. Pierre-Charron, Paris.
Bridia	id.
*Bromadyl Vicario	17, bd Haussmann, Paris.
Bromalbin Adrian	9, r. de la Perle, Paris.
*Broméine Montagu	49, bd Port-Royal, Paris.
Bromhyl P. Peyre	42, av. de Breteuil, Paris.
*Bromiase Couturier	18, av. Hoche, Paris.
Bromidia	5, r. de la Paix, Paris.
Bromidine Henry	39, r. Sclessin, Liège.
Bromocarpine Rocher	32, r. Grenelle, Paris.
Eromoderme	8, av. Walkanaer, Nice.
Bromogastrine	4, imp. de Béarn, Paris.
*Bromogénol Pépin.	à Courbevoie (Seine).
*Bromomaisine	48, r. d'Alésia, Paris.
*Bromone Robin	13, r. de Poissy, Paris.
Bromopirine	PATRICE, à Vichy.
Bromostrontium	MERMINOD, 49, r. du Paradis, Paris.
Bromovaleron Henry	39, r. Sclessin, Liège.
*Bromovose	Lab. MADYL, 14, r. Miro-mesnil, Paris.

Bromure de camphre Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Bromure d'éthyle	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Bromure Laroze	2, r. des Lions, Paris.
Bromures Pachaut	130, bd Haussmann, Paris.
Bromure de sod. um du Dr Gigon	25, bd Beaumarchais, Paris.
*Bromures Souffron	98, r. de Sèvres, Paris.
*Bronchitol	H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
Broncho-Baume	34, r. Turgot, Narbonne.
*Bronchodermine	34, bd de Clichy, Paris.
*Bronchoforme	20 bis, r. Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
Bronchogénine	229, c. Gambetta, Lyon.
Bronchoplastre	CAVAILLES, 29, r. Singer. Paris.
*Bronchoseptol	Lab. E. LAURIAT, à la Garenne-Colombes (Seine).
*Broncho-Vaclydun	27, r. Desrenaudes, Paris.
Broncodyl	177, r. St-Maur, Paris.
*Broncosol	Lab. BRÉSIL, 12, r. St-Gilles, Paris.
Broséyl	40, r. des Acacias, Paris.
*Brumarsyl	65, Cours National, Saintes.
Bruméol Elixir	65, Cours National, Saintes.
Brunyl	17, r. de Berri, Paris.
Bucchu-Basma	9 pl. Félix-Faure, Paris.
Buccochlore	BEAUCHAMP, 5, c. St-Louis, Marseille.
Buccolan	24, r. Jardel, Bordeaux.
*Buccurol	83, bd de la Villette, Paris.
*Bucmine	WARIN, 4, ch. de la Muette, Paris.
Buctol Paris	4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
Buc-Vac	4, ch. de la Muette, Paris.
*Bulgarine Thépénior	12, r. Clapeyron, Paris.
Bulles d'Haley	60, r. St-Guilhem, Montpellier.
Bursol	COUSSINET, 20, r. des Martyrs. Paris.
Butyral	121, av. de St-Ouen, Paris.
Bylierine	37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).

- *C. 40 Drouet et Plet
Cachets Adol
- Cachets antigrippe
- Cachets Atlantis
Cachets Canol
- *Cachets du D^r Bovei
Cachets C. A. S.
Cachets Céli
Cachets Charvoz
- Cachets Cy-troène
- Cachets Dellé
- Cachets digestifs Car-
bowil
Cachets digestifs du
D^r Bern
Cachets du D^r Faivre
Cachets Fercocq
Cachets Gau
- *Cachets Kanytan
Cachets Lavoisiér
- Cachets opothérapi-
ques Byla
- *Cachets Pachaut
Cachets parégoriques
- Cachets Prodiges
Cachets Pyrana
Cachets Rava
Cachets Réal
- *Cachets réparateurs
- *Cachets Roche de
Thiocol
Cachets de Roux
Cacodylate Vigier
*Cacodyle Gonnon
Cacodyle Mars
*Cacodyline Jammes
Cacocylo Phosphate
vital Jacquematre
Cacticardine D^r Con-
raux
Cadmiol zinc
- 37, r. Marly, Rueil (Seine).
GIROUD, 78, c. de la Liberté,
Lyon.
D^r FLAMAND, 6, pl. Clichy,
Paris.
66, r. Paradis, Marseille.
5, r. des Lyonnais, Paris.
1, r. Lassalle, Lyon.
49, r. de Metz, Nancy.
LANDES, à Gramat (Lot).
3, chem. du Vallon, Lyon-
Caluire (Rhône).
Lab. de l'Adour, 38, r. Soult,
Tarbes.
LE NAOUR, à Quimperle (Finis-
tère).
13, r. St-Agricol, Avignon.
- 3, pl. Intérieure St-Michel,
Toulouse.
à Lyon.
16, r. Maison-Brûlée, St-Maur.
87, r. de la République, St-
Mandé (Seine).
76, r. de Sèvres, Paris.
Usine du Blosset, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).
26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 130, bd Haussmann, Paris.
BERNHARD, 11, r. Lafayette,
Paris.
12, r. Grande, Evreux.
26, ch. de la Madeleine, Nantes.
4, ch. de la Muette, Paris.
62, r. Petits-Champs, Paris.
HÉRIN, 98, r. Jeanne-Maillotte,
La Madeleine.
HOFFMANN-LA ROCHE &
C^{ie}, 21, pl. des Vosges, Paris.
56, r. des Minimes, Marseille.
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
14, r. Victor-Hugo, Lyon.
21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
86, r. Michel-Ange, Paris.
à Villefranche (Rhône).
- à Caudebec (Seine-Inférieure).
Labor. DULCIS, pl. Clichy,
Monte-Carlo.

- Cæcaline Gagnière**
Cafacétyl-Codéïne
Caféine Houde
Caféine Invar
Cafiodine
Calcéose Boillot
Calcicet
Calciclo
Calcifixine Bureau
Calcigénie
Calciline
***Calcional**
Calci-Ostéline
Calciphose
Calcitanol
***Calcisthénine**
Caloitine
***Calcium Sandoz**
Ca-co-céril
***Calcoléol**
***Calcomagnésie**
Calco magnésol
Ca cophore
Calcothéobromine
***Calcozymase**
Calmaby
***Calmag. Na.**
Calmigorge
Calmitine
Calmosuppos
Calogyre
Calomel R. B. Lagrave
Calomel Vicario
Calox
***Cama-Laminiode (Voir**
***Laminiode)**
Camphemol
***Camphodausse**
Camphoral Aguetant
***Campho - Spartéine**
Dubois
***Camphostyl**
***Camphro-SalylFraisie**
***Camphydryl Robin**
***Canol**
***Cantéine Bouteille**
Caoglands
- à Clermont-Ferrand.
BOEGLIN, 26, r. Ste-Claire,
 Mulhouse.
 9, r. Dieu, Paris.
 21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
 9, r. St-Paul, Paris.
 7, r. Aug.-Lançon, Paris.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 88, bd St-Denis, Courbevoie
 (Seine).
 21, r. Violet, Paris.
LEMATTE & BOINOT, 52, r.
 La Bruyère, Paris.
 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
BERGER, 14, r. des Pyramides,
 Paris.
 7, r. des Petits-Carreux, Paris.
MAIRE, 171, r. de Belleville,
 Paris.
DIGNE fils à Fréjus (Var).
 3-5, r. de Metz, Paris.
 16, r. Ste-Croix-de-la-Breton-
 nerie, Paris
Produits SCIENTIA, 21, r.
 Chaptal, Paris.
 47, r. Bokanowski, Asnières.
 52, bd Diderot, Paris.
 6, r. Raoul-Berton, Bagnolet.
 49, r. de Paradis, Paris.
 3, r. Fernand-Widal, Paris.
 84, r. Rochechouart, Paris.
SUBSTANTIA, 13, r. Pagès,
 Suresnes.
 à Thury-Harcourt (Calvados).
BILLEBAUD, Paray-le-Monial
 (S.-et-L.).
BOIVERT, La Mothe-St-
 Heraye (Deux-Sèvres).
IMBERT, à Toulon (Var).
 74, quai de Jemmapes, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 1, pl. Morand, Lyon.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 36, q. Fulchiron, Lyon.
 16, bd Pereire, Paris.
LACROIX, 37, r. Pajol, Paris.
 8, r. Jasmin, Paris.
 13, r. de Poissy, Paris.
 5, r. des Lyonnais, Paris.
 23, r. des Moines, Paris.
 10, r. Poncelet, Paris.

- *Caparlem** Lab. Lorrain de Pr. Synthé-
tiques Purs, Etain (Meuse).
- Capillairai** ARQUEVAUX, Etampes (S.-
et-O.).
- *Capsellase** 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
- Capsoléol** Lab. ANINAT, à Nîmes (Gard).
- Capsorhinol** 17, r. Choinet, Paris.
- Capsovules Diplos** 18, r. Pierre-Curie, Paris.
- *Capsules Bardet** 76, r. de Sèvres, Paris.
- Capsules Bonnefond** 49, bd Port-Royal, Paris.
- Capsules Bruel** 36, r. de Paris, Colombes (Seine).
- Capsules Cédro-Méthyle** 55, r. de Chabroi, Paris.
- Capsules Cognet** 43, r. de Saintonge, Paris.
- *Capsulos Dartois** 6, r. Abel, Paris.
- Capsules de Gonosan** 2, r. des Lions, Paris.
- Capsules d'Euviscol** 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-
s.-Seine.
- Capsules Dieu** 2, r. Marché des Blancs-Man-
teaux, Paris.
- Capsules Enos** Lab. BAPAUME, 85, av. de
Neuilly, Neuilly-sur-Seine.
- Capsules Goubaux** 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
- Capsules Gurgol** JEHAN & BRERA à Montau-
ban (Lot-et-Garonne).
- Capsules d'Hojasol** 19, r. Ferdin.-Duval, Paris.
- Capsules d'Ichtyol Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- *Capsules Franklin** 100, bd Sébastopol, Paris.
- *Capsules Joret et Homolle** 165, r. St-Honoré, Paris.
- *Capsules Kuchner** HINGLAIS, Épernay (Marne)
- Capsules de Morrhuine Puy** Grenoble (Isère).
- *Capsules Noguès** 7, rue Galvani, Paris.
- Capsules Ovigéniques** 50, r. de la République, Puteaux.
- Capsules Pautauberge** 10, r. de Constantinople, Paris.
- Capsules Pneumal** 172, r. d'Alésia, Paris.
- *Capsules et sirop Préga** DEHAUSSY, 66, r. Nationale,
Lille.
- Capsules Raquin** 78, fg St-Denis, Paris.
- Capsules salolées** LACROIX, 31, r. Philippe-de-
Girard, Paris.
- Capsules Sérafon** 9, r. de la Perle, Paris.
- Capsules Taetz** 2, r. Lesdiguères, Paris.
- Capsules Therpinol** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- Capsules Vigier** 12, boulevard Bonne-Nouvelle,
Paris.
- Carbaine Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Carbalcaloïdes** MONTAGU, 49, bd Port-Royal,
Paris.
- Carbalga**
- Carbarseno**
- Carbatropine**
- Carbémétine**
- Carbeserine**
- Carbocarpine**
- } Voir Carbalcaloïdes.

- *Carbocitrol 64, bd Barbès, Paris.
- *Carboiodino 132, r. de Turenne, Paris.
- *Carboiodure Fraudin 4, av. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
- *Carbolactyl 19, r. de Fleurus, Paris.
- *Carbolin MIDY, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Carbomagneson Lab. ASCO, 63, r. de Charonne, Paris.
- Carbométine 229, c. Gambetta, Lyon.
- Carbonal 14, r. Cantin, Courbevoie.
- *Carbonate de Bismuth 3, r. Sébastien-Gryphe, Lyon.
- Carbonate de Chaux 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- Lancosme 12, bd St-Martin, Paris.
- *Carbonésie NOË, St-Amand-les-Eaux.
- *Carbophos Lab. E. MILLET, Rambouillet (Seine-et-Oise).
- *Carbos 49, bd Port-Royal, Paris.
- *Carbosanis 94, r. Michelet, Alger.
- Carboseptyl 33, r. Pelleport, Paris.
- Carbozon 16, bd Péreire, Paris.
- *Cardialgine Dubois 6, r. d'Assas, Paris.
- *Cardibaine Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- Cardiocrino Pont-Ste-Maxence (Oise).
- Cardiobromine Reboul 42, av. Borriglione, Nice.
- *Cardion Vincardi Dr CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.
- *Cardiosthénine 54, fg. St-Honoré, Paris.
- Cardiostreptine GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- Cardiotonic COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
- Cardiotonine OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
- Cardyl SPECIA, 21, r. J.-Goujon, Paris.
- Carminase Produits FAYÈS, 199, r. St-Denis, Paris.
- Carnéose Dr Spès Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- *Carnine Lefrancq 78, fg St-Denis, Paris.
- Carnix Robert 62, r. Marengo, St-Étienne.
- Carnofer EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- *Carottase 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- *Carypaine CROC, 57, av. Jean-Jaurès, St-Fons.
- Cascara Alexandre 41, r. de Rome Paris.
- Casara Eparvier 26, Gde rue St-Clair, Lyon.
- *Cascara Midy 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- *Cascarine Leprince 62, r. de la Tour, Paris.
- Caseoline Girard 48, r. d'Alésia, Paris.
- Cassitol 14, r. de Birague, Paris.
- *Catalyl Mg. 10, r. de la Mairie, Ivry (Seine).
- Catalysine du Dr Vi-quérat FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.

- *Cataplasme du D^r Le-
 lièvre
 Cataplasme Electrique
 Morgin
 Cataplasme Optima
 Catéchiodé Martinet
 *Catémény!
 Cathartine
 Cathiodé Brisson
 Causyth
 *C. B. K.
 Ced roc.
 Cédro-Méthyle
 Cédre bleu
 Cellopansements
 Cellules Paret
 *Cellu-Son
 Cemag
 Centroserum Grosjean
 Cephœméline
 Cerdesol
 *Céréales-Bébé
 *Céréales granulées
 *Céréaline Tulivet
 Céréalose
 *Cérébrine Fournier
 Cérébrinol
 Cérébrocrinol
 Cérébroïl Leisyn
 *Cérébrolipase
 *Cérébrosthénine Dalin
 Cérédine Loudenot
 Céréol Gigon
 *Céréossine
 Cérévisine
 Cérinil
 Cériomine
 Cersomine
 Cervol
 Cetemol
 *Cethocal
 *Cétrarose Gigon
- 12, av. Grande-Armée, Paris,
 (XVII^e).
 46, r. Dauphine, Paris.
 gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 16, r. Petit-Musc, Paris..
 D^r G. LALAURIE, à Cuxac-
 d'Aude (Aude).
 EON, 3, r. des Rouairies, Dinan
 (C.-du-N.).
 157, r. Championnet, Paris.
 BOISSY, 49, r. Hoche, Cour-
 bevoie (Seine).
 15, r. Catulienne, St-Denis.
 19-21, r. Van-Loo, Paris.
 PIALOUX, 55, r. de Chabrol;
 Paris.
 P. HARDY, 42, bd St-Marcel,
 Paris.
 La Cellophane, Bezons (S.-et-O.)
 22, r. Guibal, Marseille.
 AUBRY, 54, r. de la Bienfai-
 sance, Paris.
 D^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
 36, r. de Malte, Paris.
 44, r. Gambetta, Biarritz.
 18, r. Favart, Paris.
 FAVRICHON, à St-Sympho-
 rien-de-Lay (Loire).
 FAVRICHON, à St-Sympho-
 rien-de-Lay (Loire).
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
 Laye
 Lab. ASTIER, 45, r. du
 Docteur-Blanche, Paris.
 147, bd Montparnasse, Paris.
 74, quai Jemmapes, Paris.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
 Dames, Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 17, r. Soufflot, Paris.
 49, quai St-Vincent, Lyon.
 106, av. du Roule, Neuilly-sur-
 Seine.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 DEHAUSSY, 66, r. Nationale,
 Lille.
 8, r. Vivienne, Paris.
 16, r. Ste-Croix-de-la-Breton-
 nière, Paris.
 id.
 18, r. Favart, Paris.
 19, r. de Fleurus, Paris.
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 8 bis, r. J.-J.-Rousseau, Fonte-
 nay-sous-Bois.
 25, bd Beaumarchais, Paris (IV^e).

- *Charbon Fraudin 4, av. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
- *Charbon Tissot 34, bd de Olichy, Paris.
- Chardyl Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- Chaulmorhuate Po- 21, r. Marbeuf, Paris.
- marêt
- *Chéloïdine DORANTOWICZ, 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- *Chenanthol HINGLAIS, à Epernay.
- *Chéralys comprimés 12, r. des Sts-Pères, Paris.
- *Chloccl L. ADAM, Granville (Manche).
- Chlomag 71, r. St-Jacques, Paris.
- Chlorakin 37, r. de Bourgogne, Paris.
- Chloral anisé Ilda 17, r. du Bouloi, Paris.
- *Chloral bromuré Du- DURIEZ, 20, pl. des Vosges, bois Paris.
- Chloral-Geranie GROSJEAN, 36, r. de Malte, Paris.
- Chloralgot 8, r. de la Paroisse, Versailles.
- *Chloralosane KÜHLMANN, 145, bd Haüssmann, Paris.
- *Chloramine FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.
- *Chloraseptine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- *Chloréthyle Bengué 16, r. Ballu, Paris.
- Chlorhydropeptine Dr COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.
- Chlorhydrol FOUCHÉ, Houdan (S.-et-O.).
- *Chloridia Produits Dannec'h 64, r. des Tournelles, Paris.
- Chlorinol 40, r. des Acacias, Paris.
- *ChlormagnésiumFisch 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- *Chlorobacilline TULIVET, St-Germain-en-Laye.
- *Chlorobyl 46, av. des Ternes, Paris.
- *Chloro-Calcion MICHEL, 9, r. Castex, Paris.
- Chloroforme anesthé- USINES DU RHONE, 21, r. sique Jean-Goujon, Paris.
- Chloroforme amp. OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
- Chloroforme Lam - 20, r. Dumont d'Urville, Paris.
- biotte irères
- Chloroma 4, imp. de Béarn, Paris.
- *Chloro-Magnésion 52, bd du Temple, Paris.
- Chloro T. B. X. S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
- Chlorosulfol Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- *Chlorumagène 42, r. Mont-Cenis, Paris.
- Chlorure ammonium BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris.
- P. L.
- Chloruröl PIALOUX, 55, r. de Chabrol, Paris.
- Chlory-choline 22, r. Morère, Paris.
- *Chocolate Milk C. G. Sté des Spécialités diététiques et pharmac. (Cow et Gate), 22, r. des Belles-Feuilles, Paris.
- Cholagol REBOUL, Pt-Ste-Maxencé (Oise)

- *Choléocystine
 *Choléine Camus
 *Choléine lactique
 Choléitoires Byla
 Choléfluine
 Cholélyse Carbou
 Choléoboldine Thévenot
 *Choléo-Combretol
 *Choléokinase
 *Choléolactol Daguir
 *Cholergine
 Cholestériodine
 *Choline Roche
 Cholotonon
 Cholotoxine
 *Chophytol
 Chromo - Thermo -
 Thérapie
 *Chrysemine
 Chymosine Fisch
 *Cibalgine
 Cidrase
 *G^d Cidre Bol régime
 Cigares Gicquel
 Cigarettes anti-asthm.
 Cigarettes du D^r Cléry
 Cigarettes Espic
 Cigarettes Indiennes
 Grimault
 Cigarettes Schulze
 *Cigarettes Zani
 Cimalvol
 Cimatoxyl
 *Cimatryl
 *Cinalose
 Cineyl Grysa
 Cinnolipol Chaulmogré
 Cinnozyl Clin
 Cinol
 *Cipromarol
 Circogénol
 Citrarose du D^r Gigon
- VINCENT, 14, av. Mac-Mahon,
 Paris.
 DARRASSE, 7 à 13, r. St-Mau-
 rice, Nanterre (Seine).
 DARRASSE, 7 à 13, r. St-Mau-
 rice, Nanterre (Seine).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 LECONTE, 7, r. des Petits-
 Carreaux, Paris.
 8, r. Jean-du-Bellay, Paris.
 21, r. des Roses, Dijon.
 37, r. de la Fédération, Paris.
 DURET & RÉMY, Asnières
 (Seine).
 5, r. des Remises, St-Maur.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
 sur-Seine.
 52, r. La Bruyère, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 49, r. Paradis, Paris.
 CHAUMONT-CAZALS, à Vichy
 (Allier).
 ROSA, 1 pl. Champerret, Paris.
 12, av. du Maine, Paris.
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 Lab. CIBA, 109-113. bd de la
 Part-Dieu, Lyon.
 18, av. Hoche, Paris.
 M. LANGLOIS, La Cresson-
 nière, Pont-l'Évêque.
 Produits DANNECH, 64, r. des
 Tournelles, Paris.
 ESCOUFLAIRE. Baisieux
 (Nord).
 18, r. de Maubeuge, Paris.
 20, r. St-Lazare, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-
 s.-Seine.
 52, r. de Poissy, St-Germain-
 en-Laye. (Voir Poudre).
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 6, r. du Bois, Nanterre.
 4, pl. Royale, Nantes.
 TAVERNIER, 32 r. de l'Ouest,
 Paris.
 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe).
 74, quai de Jemmapes, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Lab. IMMUNOS, av. des
 Sources, Nice.
 12, r. de la République, Puteaux.
 2 pl. République, St-Ouen.
 25, bd Beaumarchais, Paris.

- Citrase**
Citraspirinc
***Citrocarbine**

***Citrofluyl**
***Citrolargol**

***Citropaïne**
***Citropeptol**
***Citrophos**
Citrosalol
***Citrosodine**
Citro-thymol
Citrovanille
***Clearol**
***Clisémine Longuet**
***Clonazone Daufresne**
Cloranol
***Clupéyl**

***Coagulène Ciba**
***Coaltar Le Beuf**
Coca Gmet
***Cocaïne Midy**
Coccidal Grémy
Codarsyl
***Codérax**

***Codocol**
***Codoforme Bottu**
Colargyl
Colarsé
***Calarsénol**
Colchiflor Vial
***Colchi-Sal Midy**
***Colhépatyl**

***Colitique**
***Coli-Vactydun**
Collargol
Colleodin Leo

Collo-Bacilline
Collobiases Dausse
Colloïdes Amicros
Colloïdes Clin
***Colloïdine**
***Colloïdogénine**
Colcül Leisyn
***Collo-iode Dubois**
***Colloïxols**
Collophérine Bap
Collosol Pépin
Collothiol
Collaborine
***Collubleu**
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
 22, bd Sébastopol, Paris.
 WARIN, 4, ch. de la Muette,
 Paris.
 4, ch. de la Muette, Paris.
 LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé,
 Paris (III^e).
 304, r. St-Jacques, Paris.
 80, r. du Rocher, Paris.
 NOË, St-Amand-les-Eaux.
 57 bis, av. Motte-Picquet, Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.
 49, r. de Bitche, Courbevoie.
 LENOIR, 5, r. Ste-Isaure, Paris.
 194, r. Rivoli, Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.
 40, r. Thiers, Le Havre.
 58, r. Miromesni', Paris.
 Pharmacie PANIER, à Malo-
 les-Bains.
 113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 11, r. Milton, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 DUBOIS, 16 bd Pereire, Paris.
 COIRIER, 69, av. du Maine,
 Paris.
 20, r. des Martyrs, Paris.
 115, r. N.-D. des Champs, Paris.
 49, r. de Bitche, Courbevoie.
 49, r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.
 CARLIER, St-Florentin (Yonne)
 8, r. Vivienne, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 14, bis, r. de la République
 Ermont (S.-et-O.).
 41 à 47, r. du D^r-Blanche, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 11, square Marie-Louise, Bru-
 xelles.
 11, r. Mansart, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris.
 9, bd Edgard-Quinet, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 LALEUF, 20, r. de Laos, Paris.
 10, r. de l'Orne, Paris (XV^e).
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 16, bd Péreire, Paris.
 49, r. de Paradis, Paris.
 4, r. de l'Alma, Asnières.
 116, bd Haussmann, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 223, r. St-Martin, Paris.
 11, r. Lepic, Paris.

- *Collutoire V.-E. Doumer
 *Collyres Chibret
 Collyres Stéryl
 Collyre des Alpes Vicario
 Collyres stérilisés Clin
 Coloplastre
 Coluval
 Combrétine Boquillon
 *Comitiol
 Complexes colloïdaux
 Dr Riquoir
 *Complextraits
 *Composé Gmet
 *Compressif Beslier
 *Comprimés Adrian
 *Comprimés d'Alibour
 Comprimés Alla
 Comprimés Anta
 Comprimés Aqua Pura
 Comprimés Chéralys
 Comprimés de Gibert
 *Comprimés Galac
 Comprimés Garga
 *Comprimés Guillaumin
 *Comprimés gynécologiques Merminod
 *Comprimés Kléos
 Comprimés Maver
 *Comprimés Levure Myceta
 Comprimés Néothorium Millot
 Comprimés Neyret
 *Comprimés de Panto-laxine du Dr Boveil
 Comprimés du Prof. Pénières
 Comprimés Roy
 Comprimés Salvé
 *Comprimés de Thiocol Roche
 *Comprimés Urbé
- BOMEL, Annonay (Ardèche).
 5, r. St-Hérem, Clermont-Ferrand.
 94, r. Michelet, Alger.
 17, bd Haussmann, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 29, r. Singer, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 12, r. de Nice, Paris.
 GRORICHARD, 12, pl. de la Révolution, Besançon.
 Etabl. MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 HUCKEL, à Héricourt (Haute-Saône)
 27, Ig Montmartre, Paris.
 COQUELU, Digoïn (Saône-et-Loire).
 9, r. de la Perle, Paris.
 DURET & RÉMY, à Asnières (Seine).
 LAPEYRE, Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne).
 178, r. Montmartre, Paris.
 ROBERT & CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.
 12, r. des Saints-Pères, Paris.
 19, r. d'Aubagne, Marseille.
 LAMBERT, pl. du Châtelet, Orléans.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 49, r. de Paradis, Paris.
 2, r. des Cordeliers, Meung-sur-Loire.
 S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
 4, r. Bellart, Paris.
 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
 35, r. de la Bourse, Lyon.
 1, r. Lassalle, à Lyon.
 COUPAT, Ussel (Corrèze).
 81, bd Suchet, Paris.
 Lab. RICHER, 7, av. Marceau, Paris.
 HOFFMANN-LA ROCHE, 21, pl. des Vosges, Paris.
 LAFFARGUE, Barsac (Gironde)

- *Comprimés Vichy-
Etat
Conarsynol
*Condurango Gmet
Condurango granulé
Astier
Conhydrargol
*Conjonctol
Convallamarine
Copraxe
*Coprax
Coqluplaste
Coqueluchyl
*Coramine
*Coroine
Corpogénine
Corps Thyroïde Mon-
cour
*Cortiode
*Coryphédrine
Coryza-Ouate
Cosmargyre
*CratæGINE
Cratægol
Cratægus Bocquillon
*Cratægus Gmet
*Crayons Antifissure
Crayon à la chrysar-
bine Vigier
Crayons Chaumel
Crayons néothorium
Millot
*Créagenol Corbière
Créatonine
Crédone Dehaussy
Crémasepta
*Crème de Bismuth
Quesneville
*Crème de Bi-chlor,
magnésienne
Crème de laïne Vi-
gier
Crème de Sapolan
*Crème Graziana
Crème Probios anti-
pyogène
*Crème résolutive du
Dr Rap
Crémo-plastol Dumes-
nil
G. PRUNIER & C^{ie}, 4, r. de
la Coutellerie, Paris.
12, pl. Puget, Toulon.
27, fg Montmartre, Paris.
45, r. du Docteur-Blanche, Paris.
12, pl. Puget, Toulon.
Lab. des Etabl. SALLE, 4, r.
Elzévir, Paris.
DEGLAUDE, 6, r. d'Assas, Paris.
77, bd de Grenelle, Paris.
39, r. de Clichy, Paris.
COQUELU, Digoin (S.-et-L.).
3, r. du Pont, à Epinal.
Lab. CIBA, 109-113, bd de la
Part-Dieu, Lyon.
62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
sur-Seine.
LEBON, Charost (Cher).
Boulogne-sur-Seine.
15, bd Pasteur, Paris.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.
14, av. de Paris, Biarritz.
THÉVENOT, 21, r. des Roses,
Dijon.
46, r. d. la Barrière, Elb uf.
14, r. Eug.-Delacroix, Paris.
10, r. du Bac, Paris.
27, fg Montmartre, Paris.
DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
78, fg St-Denis, Paris.
54, r. de la Bienfaisance, Paris.
27, r. Desrenaudes, Paris.
Dr AUBERT, 3 pl. Jussieu
Paris.
C.6, r. Nationale, Lille.
Dr LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
12, r. de Buci, Paris.
(Voir Bismuth.)
12, r. de Buci, Paris.
(Voir Bismuth.)
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
29, r. Singer, Paris.
15, r. Catullenne, St-Denis.
1, av. Pasteur, Paris.
29, r. Singer, Paris.
10, r. du Plâtre, Paris.

- *Créoformine
 Crégarlic
 Créoline Pearson
 18, r. de Jouvence, Dijon.
 65, av. Parmentier, Ivry.
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,
 La Garenne (Seine).
 20, r. du Laos, Paris.
- *Créosal Dubois
 *Créositoires
 *Créosoforme Lam-
 biotte Frères
 20, r. Dumont-d'Urville, Pa-
 ris (XVI^e).
- *Créosote soluble Va-
 cheron
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- *Crêpe Velpeau
 6 r. des Nonnains-d'Hyères,
 Paris. (Voir Velpeau).
- *Crescogénol
 *Crescol
 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
 98, r. de Sèvres, Paris.
- *Crésentyl
 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
- *Crésopirine
 Crésyl Jeyes
 2, pl. des Vosges, Paris (V^e).
 35, r. de Fr.-Bourgeois, Paris.
- Crinocalcine
 *Crinosthényl
 HATIER, à St-Etienne.
- *Crisalbine
 FOURNIER, 7, r. Biscornet,
 Paris.
- *Cristolax
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
- Croquettes Marida
 151 bis, route de Joinville,
 Champigny (Seine).
- *Cryogénine Lumière
 1, Jardin-Anglais, Le Raincy.
- *Cryptargol Lumière
 23, c. de la Liberté, Lyon.
- Crypthermol
 23, c. de la Liberté, Lyon.
- *Crypthiol
 66, r. Nationale, Lille.
- *Crysiodal
 RENARD, 35, rue de Paris,
 Clichy (Seine).
- Crystol
 La Biothérapie, 131, r. Cam-
 bronne, Paris.
- Cupranine Léger
 8, r. Vivienne, Paris.
- Cuprase-Ducatte
 2, bd de Russie, Vichy.
- Cupremone
 191, r. St-Honoré, Paris.
- Cupressus Dauss
 GOUIN, 20, r. des Écoles, Paris
- Cuprifer
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- Cuprinol
 à La Ferté-Macé (Orne).
- Cuprion Couturieux
 Labor. DULCIS, pl. Clichy,
 Monte-Carlo.
- Cuprocithine
 18, av. Hoche, Paris.
- Cupro-Salyl
 GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- Curalgine
 12, r. de Buci, Paris.
- Curalués D^r Lafay
 P. FONTANIER, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
- Curatyl Laenneo
 LECOQ & FERRAND, 54, ch.
 d'Antin, Paris.
- *Curatine Brunot
 COUDERT, 116, av. Ledru-
 Rollin, Paris.
- Curatoxine
 23, r. des Ecoiffes, Paris.
- Curgol Vicario
 114, r. du Temple, Paris.
- *Curicde
 17, bd Haussmann, Paris.
- Curiosan
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- Curocalcine
 156, r. Fauvelles, Courbevoi.
- *Curogene
 11, bd de Strasbourg, Paris.
 145, r. Yves-Le-Coz, Versailles.

- *Curoraisin** 133, r. Lecourbe, Paris.
Curovaccins atoxiques 60, r. Mathurin-Régnier, Paris.
Cépède (Voir Vaccinothérapie)
***Curoxyure** Lab. B. E. A., Belfort.
***Cuscutine Foulon** 20, fg Poissonnière, Paris.
Custodine 19, r. St-Bazile, Marseille.
Cyanargyre GUILLAUMIN, 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
Cyanaulol du Dr Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris.
***Cyanhermine** 37, r. de la Fédération, Paris.
Cyanhermyl Dalin 1, r. de la Martinière, Lyon.
Cyanure indolore Ercé 37, r. de Bourgogne, Paris.
Cynarine Estèbe à Villefranche-du-Lauragais.
***Cynulol Rosa** 1, pl. Champerret, Paris.
Cypridol 8, r. Vivienne, Paris.
Cystitol 57, r. du Cherche-Midi, Paris.
Cystopurine 49, r. Paradis, Paris.
***Cytobiase** 24, r. de Charenton, Paris.
***Cyto-choline Corbière** 27, r. Desrenaudes, Paris.
***Cytomagnésium** OLIVIERO, 41, r. Denfert-Rochereau, Paris.
***Cyto-Manganol** CORBIÈRE, 27, r. Desrenaudes, Paris.
***Cytopan** 54, r. de Paris, Charenton.
***Cytophédrine** 27, r. Desrenaudes, Paris.
Cytoplasmine Ducatte 8, pl. de la Madeleine, Paris.
Cytosal 54, r. St-Blaise, Paris (XX^e).
***Cyto-Serum Corbière** 27, r. Desrenaudes, Paris.
Cytostrychnine 27, r. Desrenaudes, Paris.
Cytotropines FOURNIER (Fr.), 7, r. Bis-cornet, Paris.
Cytuline Couturieux 18, av. Hoche, Paris.

D

- Daturasolène** 2 pl. du Théâtre-Français, Paris.
Déclonal SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
***Decorpa** 41, r. de Rome Paris.
***Delbiase** 8, r. Vivienne, Paris.
Delbosel 8, r. Vivienne, Paris.
***Delcaïne Roques** 36, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.
***Demalgon** BASUYAUX, 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois.
Déméteros 163, r. de Flandre, Paris.
Denisia Brisson 157, r. Championnet, Paris.
Denisoline Brisson id.

- *Dentoline
 *Dentoryl
 Dento Stalys
 Dentoxyl
 Dépuratif Berry
 Dépuratif Dubreuil
 Dépuratif Dumesnil
 Dépuratif Kromelinck
 *Dépuratif Rob-Lechaux
 Dépuratine
 *Dépuriode
 Dépurlaxyl
 Dermadésine
 Dermajic
 Dermaline Corbière
 Dermaline Demeule-
 naere
 Dermathorium Rhem-
 da
 Derméon
 Dermodiol
 Dermodulcis
 *Dermofagine
 Dermogène
 Dermolène
 *Dermoplastol
 Dermopode
 *Dermoradol
 Dermo-rhinistol
 *Dermosplénine
 *Dermo-Stalys
 Dermosufrol
 Dermotyol
 *Désensibilysine
 *Desitin
 *Déstensyl
 *Détergine
 Diabésia
 *Diabétalim
 *Diabétifuge
 *Diabétuline
 Diachusine
 *Diadermine
 *Diagnothorine
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 3, r. Ch.-Gounod, St-Raphaël.
 64, r. La Boétie, Paris.
 HAUTDIDIER, 37, r. Galilée,
 Paris.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 172, r. Alésia, Paris.
 10, r. du Plâtre, Paris.
 19, r. Drouot, Paris.
 49, r. de Maubeuge, Paris.
 50, r. de la République, Pu-
 teaux.
 ANGELINI, 61, r. de Seine,
 Paris.
 229, cours Gambetta, Lyon.
 41, r. St-Pierre, Caen.
 R. MONIMART, 23, r. du
 Grand-Cerf, Meaux.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 KERFYSER, r. Alexandre III,
 Dunkerque.
 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-
 du-N.).
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 229, cours Gambetta, Lyon.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
 Boulogne-sur-Mer.
 10, r. de l'Union, Clichy.
 158, Promenade de Corniche,
 Marseille.
 10, r. du Plâtre, Paris.
 Evreux (Eure).
 Établ. LABORADIUM, 33, r.
 St-Jacques, Paris.
 Lipides, 40, r. d'Enghien, Paris.
 64, r. La Boétie, Paris.,
 6, r. Chanoinesse, Paris.
 Le Naour, Quimperlé (Finistère).
 BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
 Etabl. MERMINOD, 49, r. de
 Paradis, Paris.
 8, av. Walkanaer, Nice.
 D^r BOURDEAU, à Parthenay.
 50, r. de la République, Puteaux.
 61, r. Vandamme, Paris.
 21, r. Chaptal, Paris.
 V. CHARRET-TOMASI, St-
 Just-sur-Loire (Loire).
 142, r. de Picpus, Paris.
 (Voir Vernis à la Diachusine.)
 12, r. Vavin, Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.

- *Dial Ciba 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Dialacétine Ciba 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Dialine C. I. P., 128, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- *Dialyl Brunot 16, r. Boulainvilliers, Paris.
- Dialyses Golaz 4, r. Bellart, Paris.
- Diardyscol 86, bd Port-Royal, Paris.
- *Diasciérol 26, r. de Norvins, Paris.
- *Diases 77, r. Miromesnil, Paris.
- *Diasténine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- *Diastogène DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.
- *Diasto-Pepsine Riché-pin Lab. Dr TISSOT, 84, bd de Clichy, Paris.
- *Diathermie La Verrerie Scientifique, 12, av. du Maine, Paris.
- *Dicaliode 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- *Didial Ciba 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Diéménal 18, r. de Beaune, Paris.
- *Diénol 18, r. de Beaune, Paris.
- *Digalène Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
- *Digastrine 11, r. St-Agricol, Avignon.
- Digeryl 137, av. Parmentier, Paris.
- Digestif Capmartin 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
- Digestif Dal 36, r. de Verdi, Nice.
- *Digestif Harvey 101, av. de Paris, Ruell (S.-et-O.).
- Digestif Henry 39, r. Sclessin, Liège.
- Digestif Pinel à Bonnelles (Seine-et-Oise).
- Digestirol 25, r. des Petits-Hôtels, Paris.
- *Digestonic Produits Scientia, 21, r. Chaptal, Paris.
- *Digibaïne Deglaude 6, r. d'Assas, Paris.
- Digicardine Lab. IMMUNOS, av. des Sources, Nice.
- *Digifoline Ciba 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Digimialbaïne 8, r. Favart, Paris.
- Digistabiline P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
- Digitale Dausse 4, r. Aubriot, Paris.
- Digitale Ecalle 98, r. de Sèvres, Paris.
- Digitaline Homolle & Quévenne 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Digitaline cristallisée 27, r. de la Procession, Paris.
- de Nativelle
- *Digitaline cristallisée 8, r. Favart, Paris.
- du Dr Mialhe
- *Digitaline Invar 21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
- Digitalis Purpurea OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
- Dimétol Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
- Dimol Bois-Colombes (Seine).
- Diocöl 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse

- Diiodoforme Taine
 Dionol
 *Dioradin
 *Dioséine Prunier
 Dippol
 Dismenine Henry
 Disménol
 *Dismine Favrot
 *Disolurane Vély
 Disurol
 Disuryl
 Ditagel
 *Dithioléine
 Diumnal
 Diurédausse
 *Diurégine
 *Diurène
 Diuréol
 Diurésinol
 Diurétique Couturieux
 *Diurétique Gmet
 Diurobromine
 *Diurocalcine Gros
 Diurocardine
 Diurocystine
 Di-Uroiodine
 Dmégon (Néo)
 *Dmelcos
 Dmesta (Néo)
 Dmetys (Néo)
 *Dohyfral
 *Doloma
 *Dolophos
 Dolosol
 *Dolysine Rochereau
 Dosarter
 Dosotol
 *Dosurine (Trousses)
 Dozéal Deglaude
 *Dragées Adrian
 Dragées anticatar-
 rhales
 *Dragées Bengué
 Dragées Blagny
 Dragées Bondonneau
 Dragées Calm
 Dragées Carbonel
 Dragées de fer Cognet
 Dragées de fer Rabu-
 teau
 9, r. de la Perle, Paris.
 FLEURY, Arcachon (Gironde).
 37, r. de la Fédération, Paris.
 1, quai Aulagnier, Asnières.
 41, r. Denfert-Rochereau, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 SAUTER, Bellegarde (Ain).
 Lab. H. FERRÉ, 6, r. Dombasle,
 Paris.
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 42, r. des Martyrs, Paris.
 23, r. des Moines, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 157, r. Championnet, Paris.
 TORAUDE, 22, r. de la Sor-
 bonne, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 CHARRET-TOMASI, St-Just-
 sur-Loire).
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 COUDERT, 116, av. Ledru-
 Rollin, Paris.
 1, r. des Augustins, Perpignan.
 18, av. Hoche, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 285, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 13, pl. Delille, Clermont-Fer-
 rand.
 285, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 285, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 45, bd Lafayette, Calais.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon.
 Paris.
 id.
 id.
 id.
 15, bd Pasteur, Paris.
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 COLMANT, à Caudry (Nord).
 FOIRET, à Montargis (Loiret).
 Salbris (L.-et-Ch.).
 156, r. des Fauvelles, Courbevoix.
 54, r. de Paris, Charenton.
 16, r. Charlemagne, Paris.
 6, r. d'Assas, Paris.
 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
 Colombes.
 16, r. Ballu, Paris.
 Pamela, Forges-les-Eaux.
 49, r. de Bitche, Courbevoix.
 98, r. Jeanne-Maillotte, La
 Madeleine (Nord).
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 COMAR & C^{ie}, 20, r. des
 Fossés-St-Jacques, Paris.

Dragées Demazières	131, r. de Vaugirard, Paris.
Dragées de Royat	26, av. de Royat, Chamalières (P.-de-Dôme).
Dragées Dubourg	43, r. de Saintonge, Paris.
Dragées Efgé	40, av. Secrétan, Paris.
*Dragées Elkin	DEPRUNEAUX, 18, r. de Beaune, Paris.
*Dragées ferro-ergotées	MANNET, Loudun (Vienne).
Dragées Fernel	76, bd Haussmann, Paris.
*Dragées Gelineau	MOUSNIER, 9, bd Carnot, Bourg-la-Reine.
Dragées Gesta	43, av. la République, Paris.
Dragées Gmet	27, fg Montmartre, Paris.
Dragées Grimaud	La Courtine (Creuse).
*Dragées du Dr Hec- quet	49, bd Port-Royal, Paris.
Dragées hépatiques	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Dragées d'iodurine	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Dragées Japat	252, fg St-Martin, Paris.
Dragées de Mastho- phile Annie	à Montbron (Charente).
*Dragées Lumeval	52, bd du Temple, Paris.
Dragées menthol-bo- rax, cocaïne	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
*Dragées Névrosthé- niques « Yse »	65, r. Louis-Blanc, Paris.
Dragées Northon	CACHAT, Evian-les-Bains (Haute-Savoie).
Dragées Nyrdhal	12, r. de la République, Pu- teaux.
Dragées Pautauberge	10, r. de Constantinople, Paris.
Dragées de Prasion	14, r. Eug.-Delacroix, Paris.
Dragées Phlébos	229, cours Gambetta, Lyon.
Dragées pulmonaires Giry	49, r. de Metz, Nancy.
Dragées St-André - Mayniel	85, r. Turbigo, Paris.
Dragées Séranti	7 à 13, r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
Dragées Somedo	à Meudon (Seine-et-Oise).
Dragées Tasch	4, r. d'Illzach, Mulhouse.
*Dragées Tonicardia- ques Le Brun	155, bd Magenta, Paris.
Drosédéine	6, r. de Belleville, Paris.
Droserine Merminod	49, r. de Paradis, Paris.
*Dryco (Lait sec)	5, r. St-Roch, Paris.
Duodénase	12, r. de Nice, Paris.
Dusart sirop, solution	8, r. Vivienne, Paris.
Dynabiose	6, r. d'Alsace, Grenoble.
Dynamocalcine	CHAVIALLE, Sèvres (S.-et-O.).
Dynamoferol	PIALOUX, 55, r. de Chabrol; Paris.
Dynergyl Féminy	COUDERT, 116, av. Ledru- Rollin, Paris.
Dynos	4, imp. de Béarn, Paris.

Dyspepsia***Dyspeptine Hepp****Dyspeptol*****Dysthène****Dysurol****Dyoril**15, pl. Godefroy-de-Bouillon
(Boulogne sur-Mer).

Le Chesnay (Seine-et-Oise).

PATRICE, Vichy.

47, r. Bokanowski, Asnières.

37, r. de Bourgogne.

15, pl. Godefroy de-Bouillon,
Boulogne-sur-Mer.**E****Eatan****Eaux de Châtel-Guyon****Eau de Lorraine****Eau d'Enghien****Eau Sova****Ebanyl****Ectobiase Bonnay*****Eczéda****Eczémacure*****Eczosec*****Edistol****Edo-vaccins****Edulcoral****Egralene****Eitreb-embrocation*****Ektogan******Elastoplate*****Elatine Bouin*****Elbon Ciba****Electrargol Clin****Electrauroi Clin****Electrocuprol****Electro Hg****Electromanganol****Electromartiol**

34, r. Vignon, Paris.

6, sq. de l'Opéra, Paris.

OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.

10, r. Caumartin, Paris.

3, r. Volney, Paris.

59, r. Nollet, Paris.

112, Grande-Rue, Nogent-sur
Marne (Seine).35, r. des Blancs-Manteaux,
Paris.

121, av. St-Ouen, Paris.

35, r. des Blancs-Manteaux,
Paris.

40, r. des Carmes, Orléans.

SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.

PATRICE, à Vichy.

P. BRISSON & C^{ie}, 157, r.
Championnet, Paris.OPTIMA, Grande-Rue au Bois,
Bruxelles.

12, r. Lamartine, Paris.

4, r. d'Ilzack, Mulhouse.

44, r. d'Aguesseau, Boulogne-
sur-Seine.109-113, bd de la Part-Dieu,
Lyon.20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
id.COMAR & C^{ie}, id.COMAR & C^{ie}, id.COMAR & C^{ie}, id.COMAR & C^{ie}, id.

Electropalladiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro-platinol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro-Rhodiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electrosélénium	COMAR & C ^{ie} , id.
Eleodermine	38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).
*Elgine Julien	105, r. de Rennes, Paris.
*Elixir Bonjean	FAURE & DUSSUEL, Aix-les-Bains.
Elixir Bryol	97, av. Ledru-Rollin, Paris.
Elixir de Catéchiode	16, r. du Petit-Musc, Paris.
Elixir de Pepto-Car-dine	5, av. des Tilleuls, Paris.
Elixir Déret	COMAR & C ^{ie} , 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
Elixir digestif de pep-sine Grimault	8, r. Vivienne, Paris.
*Elixir Duchamp	16, r. Roeroy, Paris.
*Elixir Ducro	20, pl. des Vosges, Paris.
*Elixir du D ^r Mialhe	8, r. Favart, Paris.
Elixir Duret	12, r. de Nice, Paris.
*Elixir Dussaud	52, r. de Rome, Marseille.
*Elixir eupeptique Tisy	VAUDIN & GUILLAUMIN, 12, r. Charles-V, Paris.
Elixir eupnéique Mar-tin Mazade	St-Raphaël (Var).
Elixir de fer Koenig	37, av. Marceau, Paris.
*Elixir ferro ergoté	MANNET, Loudun (Vienne).
Elixir Fleig	18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
Elixir Gelm	D ^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
Elixir Glassér	à Turkeim (Haut-Mhin).
Elixir Glover	13, r. de Minimes, Paris.
*Elixir Godfrin	6, r. de Paris, Joinville-le-Pont.
*Elixir Grez	49, r. Maubeuge, Paris.
Elixir Hela	77, bd de Grenelle, Paris.
Elixir hépatique Henry	39, r. Sclessin, Liège.
Elixir Houde	9, r. Dieu, Paris.
*Elixir Hymel	DUTEIL, 90, av. de St-Ouen, Paris.
*Elixir iodépuratif Pé-pin	116, bd Haussmann, Paris.
Elixir Mannet à l'Io-dure de Potassium	Loudun (Vienne).
Elixir Mannet à l'Io-dure de Sodium	Loudun (Vienne).
Elixir Mariani	41, bd Haussmann, Paris.
Elixir Percy	M. AUBANEL, Pointe-Rouge, Marseille.
Elixir polybromuré Baudry	8, r. Vivienne, Paris.
Elixir polybromuré Yvon	5, r. de la Feuillade, Paris.
*Elixir Spark	19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
*Elixir Spes	10, imp. Milord, Paris.
Elixir supertonie Stel-la	Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Elixir du D ^r Thermes	Produits Dannec'h, 64, r. des Tournelles, Paris.

- *Elixir thiogalacolé Ar- Etampes (Seine-et-Oise).
 quevaux
 Elixir tribomuré Man- Loudun (Vienne).
 net
 Elixir vermifuge All- DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
 vers
 Elixir vermifuge Chia- Aix-en-Provence.
 rini
 Elixir Virenque 131, r. Vaugirard, Paris.
 *Elixir de Virgine Nyr- 12, r. de la République, Puteaux
 dhal
 Elixir Vital Quentin MOUSNIER, à Sceaux.
 *Elkin Dragées et Gra- DEPRUNEAUX, 18, r. de
 nulés Beaune.
 *Elzévir Dentition H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
 Emapirine Toraude 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 Embrocation Roche 5, r. de la Paix, Paris.
 *Embrocation Salas 132, r. de Turenne, Paris.
 Embryonine du HAMEL, 10, pl. Thiers, Le
 D^r Barré Mans.
 Emencyl 163, r. St-Denis, Paris.
 *Emerson's Bromo-Sel- 62, av. Champs-Élysées, Paris.
 tzer
 Emétinol Viel 7, r. St-Yves, Rennes.
 *Emgé Lumière 23, c. de la Liberté, Lyon.
 *Emplatres R. Cavaillès 29, r. Singer, Paris.
 Emplâtre Duret 61, r. de Vaugirard, Paris.
 Emulsion Bonnefond MONTAGU, 49, bd Port-Royal,
 Paris.
 Emulsion Marchais 11, pl. Castellane, Marseille.
 Endocalcase 74, r. des Jacobins, Amiens.
 Endocrisines Fournier 7, r. Biscornet, Paris.
 *Endopancrine 48, r. de la Procession, Paris.
 Endoxène 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Endoxidine HUGUES, 105, bd Malesherbes,
 Paris.
 Energétènes végétaux 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Byla
 Energetyl 137, av. Parmentier, Paris.
 *Energine Iodée de 21, r. St-Leu, Amiens.
 Berck
 *Energine Phosphorée 21, r. St-Leu, Amiens.
 de Berck
 Energinose D^r Fraysse 47, r. de Neuilly, Nanterre.
 Enésol Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Engeluro! 22, r. de Vienne, Paris.
 *Eniode Lefebvre 2, r. Duphot, Paris.
 Ennego 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Eno's Fruit Salt 4 ter, r. Barbès, Courbevoie.
 Entalva LUMIERE, 23, c. de la Liberté,
 Lyon.
 Enteralthine 3, r. Barbette, Paris (III^e).
 Entérargol 56, r. N.-D. de Lorette, Paris.
 Entéricure BRISSON, 157, r. Championnet,
 Paris.
 *Enteriode 39, r. de Clichy, Paris.
 *Entéro-Antigènes 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris

- *Enterobyl Dehaussy 66, r. Nationale, Lille.
 Entérochir LECLERC, 10, r. Vignon, Paris.
 *Entérofagos 7, av. des Sources, Nice.
 *Entérohépatine 77, bd de Grenelle, Paris.
 Enteropraxines Abry 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
 *Entéroseptyl 10, r. St-Antoine, Paris.
 *Entérovaccin Lumière 23, c. de la Liberté, Lyon.
 *Entéroxin Leclerc 10, r. Vignon, Paris.
 Entérozone 56, bd Pereire, Paris.
 Entérozyme 52, r. Labruyère, Paris.
 Enuczéma 53, r. Bourgogne, Orléans.
 *Enzypan ALEXANDRE, 41, r. de Rome, Paris.
 Eparseno 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 *Ephédrine Béral 194, r. de Rivoli, Paris.
 Ephédrine Proba FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
 Ephédrol 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 Epholéine 40, r. des Acacias, Paris.
 *Epicral LAMBERT, 6, r. de Longchamp, Vichy.
 Epidosine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
 Epinesthol 33 r. Vaugirard, Paris.
 Epoqualine François 16, c. Gambetta, Lyon.
 *Eranol 45, r. de l'Echiquier, Paris.
 Erbamil 105, bd Malesherbes, Paris.
 *Erce rhinol 37, r. de Bourgogne, Paris.
 *Ergorone SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 Ergot de seigle Dausse 4, r. Aubriot, Paris.
 Ergotine Bonjean 99, r. d'Aboukir, Paris.
 *Ergotine Lamante M. PARIS, 1, r. Lassalle, Lyon.
 Ergotine Yvon 5, r. Lafeuillade, Paris.
 Ergotinine Tanret 10, r. du Commandant-Rivière, Paris.
 Erystypticum Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
 *Erythra Dyn 5, r. Claude-Decaen, Paris.
 Erythrolués LECOQ & FERRAND, 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
 Erséol Prunier 6, r. de la Tacherie, Paris.
 *Esculéol 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.
 Eska 76, r. Orfila, Paris.
 Essence Algérienne pl. de l'Entonnoir, Berck-Plage.
 Essence Landaise 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.
 Essence Japonaise MAUGER, 79, r. Legendre, Paris.
 *Essoforme SIMON, 44, r. Inkermann, Lille.
 *Essoforme Ephédrine id.
 Etain Amicros 9, bd Edgard-Quinet, Paris.
 Ether amyvalérianique G. BRUEL, 36, r. de Paris, Colombes (Seine).
 Ether anesthésique SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 Ether pour narcose OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.

- Ether valérianique Vial** 8, r. Vivienne, Paris.
Ethoforme 18, r. de Jouvence, Dijon.
Etoléase CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
Eubiol 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
Eucalcine 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
Eucalcium 50, bd de Paris, Marseille.
Eucalinhal 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
Eucalyptéol Anthoine 8, r. Vivienne, Paris.
***Eucalyptine Lebrun** 155, boul. Magenta, Paris.
***Euchol** Bagnoles-de-l'Orne.
Eudermyl 4, imp. de Béarn, Paris.
Euférine 20, r. Vieille-du-Temple, Paris.
***Eufosfyl Vély** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
***Eugaline** 191, fg St-Antoine, Paris.
***Eugastrol** Lab. BOUTROY, 8, r. de Passy, Paris.
Eugéine Prunier 6, r. de la Tacherie, Paris.
Euglyma 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
***Eugynol Grandval** 12 et 14, r. Féry, Reims.
Eukénol Clément 7, pas. Thionville-Paris.
Eukinase Carrion 54, fg St-Honoré, Paris.
***Eumictine Leprince** 62, r. de la Tour, Paris.
***Euonymine P. Thibault** 48, r. d'Alésia, Paris.
Eupatorine Lab. d'Allopathie générale, Brignais (Rhône).
***Eupaveryl** PACHAUT, 130, bd Haussmann, Paris.
Eupectoral ARQUEVAUX, Etampes (S.-et-Oise).
***Eupeptique Monavon** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
***Euphon** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Euphonol Aguetant 36, quai Fulchiron, Lyon.
Euphorine, D^r Chabaud FAURE et DUSSUEL, à Aix-les-Bains.
Euphorol Loudenot 106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
***Euphoryl** 114, r. du Temple, Paris.
Euphrénine Bastia 1, pl. Carnot, Lyon.
***Euphytose** Lab. MADYL, 14, r. de Miromesnil, Paris.
Euplasmol VALENTIN, 79, rue de Wazemmes, Lille.
Eupnéol THÉVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.
***Eupnine Vernade** 7 à 13 r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
***Eupnogénol** 116, av. Berthelot, Vienne (Isère).
***Eurectol** PERROCHON, 57, r. Origet, Tours.
Euréka-Cooky 74, r. du Château, Boulogne-s.-Seine.
Euréka-Lax 74, r. du Château, Boulogne-sur-Seine.
Eurexine Dr-PETIT, 11, r. des Postes, Angoulême.

Eurhéine	7, pas. Thionville, Paris.
Eurhéose	COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
Euronol	15, r. d'Argenteuil, Paris.
Eurythmine Dethan	11, r. Al-de-Neuville, Paris.
*Euskine	7, av. Marceau, Paris.
*Eusomnine Bélières	19, r. Drouot, Paris.
Eutectyl	108, r. du Maréchal-Pétain, Vichy.
*Eutensyl Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Eutonon	49, r. Paradis, Paris.
Evatmine Carrion	54, fg St-Honoré, Paris.
*Evine	16, r. Barquette, Paris.
*Evolaxine	Lab. du D ^r LAURENT, GÉRARD, 40, r. de Bellechasse, Paris.
*Evonyl	BONTHOUX, Villefranche-sur-Saône
Excytol	MARTINET, 16, r. du Petit-Musc, Paris.
Exhêpa	39, r. Fondaudège, Bordeaux.
Exol Cognet	43, r. de Saintonge, Paris.
Exolysés Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Exonérol	8, r. de Passy, Paris.
*Extrait de céréales Adrian	9 et 11, r. de la Perle, Paris.
*Extrait Hamyd	GMET, 27, fg Montmartre, Paris.
Extrait Juvinium	2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes.
*Extrait de Malt Français Déjardin	10, r. Parent-de-Rozan, Paris (XVI ^e) (Voir Malt.)
Extrait de Malt Grütli	139, av. de Verdun, Issy-les-Moulineaux.
Extrait du D ^r Rap	29, r. Singer, Paris.
Extraits Moncour	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Extraits totaux Choay	48, r. Théophile-Gautier, Paris.
Extrait surrénal Meurice	61, av. Louise, Bruxelles.
Extrait de Yogourth Ilgaz	13, r. Nouvelle, Charenton.

F

*Facmine Longuet	34, r. Sedaine, Paris.
*Fanerval	42, r. Mont-Cenis, Paris.
*Fango Fisch et C ^{ie}	4, r. d'Illzach, Mulhouse.
*Fantine Adoue	à Pauillao (Gironde).

- Farine alimentaire** 12, av. Steph.-Mallarmé, Paris,
Suckine et 16, r. Berthelot, Le Havre.
Farines Benedictus 74, r. Lamareck, Paris.
Farines de céréales : BLOCH, Tomblaine, près Nancy
légumes et fruits (M.-et-M.).
***Farine de malt Heude-** 85, r. de Saint-Germain, Nan-
bert terre.
***Farines de régime** à Tomblaine, près Nancy.
Bloch
Farines Favrichon à St-Symphorien-de-Lay (Loire).
Farine lactée Heude- 85, r. de St-Germain, Nanterre.
bert
Farine lactée Larousse 99, Cours Balguerie, Bordeaux.
Farine lactée Nestlé 6, av. Portalis, Paris.
Farine lactée diastasée 4, r. Lambrechts, Courbevoie.
Salvy
***Farines Maltées Favri-** St-Symphorien-de-Lay (Loire).
chon
Farines Maltées Jam- 47, r. Miromesnil, Paris.
met
Farine maltée Vial 8, r. Vivienne, Paris.
Farré-Cure 29, r. Mogador, Paris.
Febrifuge Couturieux 18, av. Hoche, Paris.
Fébrifuge MOLIERE, à Constantine.
Fébriline 4, fg Stanislas, Nancy.
***Félamine Sandoz** 5, r. de Metz, Paris.
Félargent 21, r. Jean-Goujon, Paris.
***Félicol** 10, r. Vignon, Paris.
Felsol pl. Homme-de-Fer, Strasbourg.
***Féminadène** 120, r. Lecourbe, Paris.
Feminoglandol 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Féminose 7, r. Coq-Héron, Paris.
***Fénucine** pl. du Châtelet, Orléans.
***Fenugrène** 2, pl. des Vosges, Paris.
Fer Amicros 9, bd Edgar-Quinet, Paris.
Fer-Arsenic AUCHER, La Ferté-Macé
 (Orne).
Férarsényl 7, r. Guillaume-Budé, Montge-
 ron.
***Fer Bravais** 16, r. de Rocroy, Paris.
Fer Girard 8, r. Vivienne, Paris.
Fer Henry 39, r. Sclessin, Liège.
Fer injectable Roussel MOUSNIER, à Sceaux.
***Fer intraveineux** 8, r. Jasmin, Paris.
Fraisse
Fériode Byla 26, av. l'Observatoire, Paris.
Fer-ion Couturieux 18, av. Hoche, Paris.
Fer Jaquemaire à Villefranche (Rhône).
***Fer Larcade** 151, r. Lafayette, Paris.
Fer Leras 8, r. Vivienne, Paris.
Fer Manganèse Ami- 9, bd Edgard-Quinet, Paris.
cros
Fermentérol Milan 15, r. d'Argenteuil, Paris.
Fermentéryl 40, r. des Acacias, Paris.
Ferments de Backer 3, r. des Laitières, Vincennes.
Ferment Boss Lab. G. CESAR & B. BOSS,
 Besançon (Doubs).

- *Ferment pur de raisin à Malzéville-Nancy (M.-et-M.).
 Jacquemin
 Ferments organiques COIRRE, 5, bd Montparnasse,
 Zévor Paris.
- *Fer-Ovarine Vitalis 38, bd de Charonne, Paris.
 *Feroxal Buisson 98, r. de Sèvres, Paris.
 Fer Quévenne 26, r. Petit, St-Denis.
 Fer Rabuteau 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Ferrocaltbiose ROUSSY, Viroflay (S.-et-O.).
 Ferrocalcine GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).
 Ferrocalcose 71, r. du Fort, Aubervilliers.
 *Ferrocodile et Ferrico- 62, r. de la Tour, Paris.
 dille Leprince
- *Ferrocot 132, r. de Turenne, Paris.
 Ferro-Laminiode (Voir
 Laminiode)
 Ferroneurol
- TERMES, Miramont-de-
 Guyenne (Lot-et-G.).
 17, r. Cadet, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
- Ferropeptone
 *Ferrophytine Ciba
 Ferroplasma
 Ferroxyline
 Ferrygene Carrau
 Ferydal
- VIVIEN, 6, r. Abbeville, Paris.
 26, Gde-rue St-Clair, Lyon.
 34, bd de Clichy, Paris.
 ROY, 29, av. Charras, Clermont-
 Ferrand.
- Fibrinine 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Fidulax Warin 4, chaussée de la Muette, Paris.
 Figadol Vivien 62, r. du Cardinal-Lemoine,
 Paris.
- Filhosa 133, r. Lecourbe, Paris.
 *Filtrat Inopseta 60, r. de Prony, Paris.
 *Fixase PARET, 22, r. Guibal, Mar-
 seille.
- Fixine Grémy 34, r. Sedaine, Paris.
 Fixocalcine
 Fixococcine Corbière
 Fixogène Loudenot
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
 106, av. du Roule, Neuilly-
 sur-Seine.
- *Flavuroil STÉNÉ, 2, pl. des Vosges,
 Paris.
- Flévar TORAUDE, 22, r. de la Sor-
 bonne, Paris.
- Floravène MORTIER & C^{ie}, Bordeaux.
 Floréases 20, fg Poissonnière, Paris.
 Florhamélis CAVY à Montluçon (Allier).
 *Florhépatine 7, av. Marceau, Paris.
 Florisana 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
 *Fludiose TÉTARD, à Beauvais.
 Fluène LANDRIN, 12, r. de la Répu-
 blique, Puteaux.
- Fluenzyl 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 Fluérase FOUCHERE, Rive-de-Gier,
 (Loire).
- Fluidbos 24, c. Lafayette, Lyon.
 Fluidol 22 bis, r. de Silly, Boulogne
 s.-Seine.

- *Fluohyl
 *Fluocholine
 *Fluodyle
 Fluoformol Gonin
 *Fluoganèse
 Fluol
 Fluoram
 Fluoridia
 *Fluosaly!

 *Flusan
 *Fluveinose Mauchant
 *Fluxine (gouttes)

 *Fœnugol
 Foie - Endocrisines
 Fournier
 *Fokienyl

 *Follestrine
 *Follicormone buccale

 *Folliculine Choay
 *Folliculine Crinex
 *Folliculine cristallisée
 Roussel
 Folliovarine Laleuf
 *Fondantes Dausse
 Forcéase
 *Forcival
 Fordynol

 *Foriod

 Formadermine

 Formagol Bouty
 Formétine

 *Formine Adrian
 *Formint

 Formitrol Wander

 *Formocarbine
 *Formocarbos
 *Formocitrine

 Formogastrine
 Formo-Vaccins

 Formule Jacquemaire
 60
 Formyl
 *Fornose

 Fortiane
- 38, bd Bourdon, Neuilly-Paris.
 50, r. de Turenne, Paris.
 10, r. Pierre-Ducieux, Paris.
 60, r. Saussure, Paris.
 46, r. de Rome, Marseille.
 43, av. Kléber, Paris.
 17, r. du Bouloi, Paris.
 50, r. de Lille, Tourcoing.
 BEAUGOURDON, 43, av. Kléber, Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 14, r. de Birague, Paris.
 E. BONTHOUX, Villefranche-sur-Saône.
 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.

 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois (Seine).
 GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris.
 HINGLAIS, 30, r. de Miromesnil, Paris.
 48, r. Théophile-Gautier, Paris.
 18, r. St-Amand, Paris.
 89, r. Cherche-Midi, Paris.

 20, r. du Laos, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
 6, r. Bridaine, Paris.
 13, r. du Général-Foy, St-Etienne.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 3, r. Dunkerque, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 9 r. de la Perle, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 151 bis, r. de Joinville, Champigny.
 TÉTARD, à Beauvais.
 MILLET, à Rambouillet.
 37, av. Jules-Coutant, Ivry-s.-Seine.
 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
 LUCINIA, 154 bis, r. Breteuil, Marseille.
 Villefranche (Rhône).

 23, r. Valéry-Meunier, Pau.
 Lab. CHAVIALLE, 70 Gde-Rue, Sèvres (S.-et-O.).
 BONNAFFÉ, Milhau (Aveyron).

*Fortossan Ciba	109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
*Forxol	BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
*Fosfoxyl Carron	69, r. de St-Cloud, Clamart (Seine).
Fostrychnol Chante-reau	8, r. de Constantinople, Paris.
*Fosyls Carron	69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
Fraikola	4, r. des Carmes, Paris.
*Francoplaste Kraus	37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
Frangoléine	à Aigurande (Indre).
Frangulose Flach	6, r. de la Cossonnerie, Paris.
*Freinix	98, r. de Sèvres, Paris.
Freinolutéine	2, r. des Deux-Ponts, Paris.
Frène Gmet	27, fg Montmartre, Paris.
*Frenospasmyl Leprince	62, r. de la Tour, Paris.
Frialine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
*Fructia (Brides-les-Bains)	46, r. Pierre-Charron, Paris.
Fructines Vichy	49, av. Wagram, Paris.
Frugeolines Vichy	1 et 3, r. Lalogue, Vichy.
Fruits de Régime Tilloy	J. MIDY, 41, r. de Courbevoie. La Garenne (Seine).
Fruxatyl	TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
Fucobiline Prothière	55, r. Auguste-Comte, Lyon.
*Fucoglycine	11, r. Milton, Paris.
*Fuciodine	132, r. de Turenne, Paris.
Fucophosphine	COUGET, à Olonzac (Hérault).
*Fucosine Prothière	55, r. Auguste-Comte, Lyon.
Fuculose	223, r. St-Martin, Paris.
*Fucus Gmet	27, fg Montmartre, Paris.
Fumigator Gonin	60, r. Saussure, Paris.
*Furunculase	94, bd des Batignolles, Paris.
Furunculine	COUGET, à Olonzac (Hérault).
Furol	5, r. Chauveau-Lagarde, Paris.
Furosyl	156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Fusol	154 bis, r. de Breteuil, Marseille.

G

Gabiol	Sté française d'Extension Bio-Chimique, St-Quentin.
Gadéinol	8, bd Arago, Paris.
Gadilène Vasseur	114, r. Faidherbe, Boulogne-s-Mer.

- Gadiodine Labesse**
***Gaduamine**
- *Gaduase**
Gaduine algovitinée
- Gaïacalcine Latour**
Gaïacodil Godard
Gaïacol phosphaté Pau
 tauberge
Gaïacomalt
- Gaïacophosphal Clin**
- Gaïarsénan Ducatte**
Gaïarsol Bouty
- *Galabactéine**
***Galactésia**
- Galactina**
Galactogènes Jolivet
***Galactogil**
- Galazène**
***Galform**
- *Galliodine**
***Gambéol**
- *GamétoxyI**
- Gamostyl**
***Ganderma**
- Gangliosane**
***Gardenal**
- Gargarinal**
- Garsédol**
Gasterinase
Gastérine Frémont
Gastérol
Gastérophiline
- Gastiase**
***Gastrépatine**
- *Gastricine du Dr Du-**
 hourcau
Gastrobiase
***Gastrocalcine**
***Gastrocaol**
- Gastrocarbène**
***Gastrodium**
***Gastronaldine**
- 36, r. des Lices, Angers.
RENARD, 35, r. de Paris,
 Clichy (Seine).
 Lab. **SERVIER**, à Orléans.
P. FONTANIER, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 17, pl. des Vosges, Paris.
 13, r. Chernovitz, Paris.
 165, r. St-Denis, Courbevoie.
- U. C. E. P.**, 5, r. Labroque,
 Strasbourg.
 20, r. des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 191, r. St-Honoré, Paris.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 154 bis, r. Breteuil, Marseille.
AXAREL, 15, r. Catulienne,
 St-Denis.
 68, r. Phalsbourg, Le Havre.
 140, fg St-Honoré, Paris.
PROGIL, 77, r. Miromesnil,
 Paris.
 15, q. Bourbon, Paris.
 20, r. Dumont-d'Urville, Pa-
 ris (XVI^e).
 71, r. Ste-Anne, Paris.
 42, r. Emile-Deschanel, Cour-
 bevoie.
S. F. E. A. T., 15, r. Catulienne,
 St-Denis.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 42, r. Emile-Deschanel, Cour-
 bevoie.
 2, allées Spach, Strasbourg.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
SIMON, 44, r. Inkermann, Lille.
 77, bd de Grenelle, Paris.
 à Vichy (Allier).
 37, r. Galilée, Paris.
AMBLARD à Cunlhat (P.-de-
 Dôme).
 14, r. Demarquay, Paris.
 Lab. **B. C. L.**, 29, fg de Bour-
 gogne, Orléans.
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 2, pl. des Vosges, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
BENDERITTER, à Vendôme
 (Loir-et-Cher).
 Saint-Louis (B.-du-Rhône).
 51, r. de Paris, Pierrefitte (Seine).
 58, r. de Maubeuge, Paris.

*** Gastropansement**

Gastropeptyl
Gastrophiline

Gastroplasme
Gastrosalvine

*** Gastro-Sodine**
Gastrosic Léo

Gastrotherib

*** Gastrozymase Bouty**
Gastryl
*** Gatercodéine**
*** Gaurol**

Gayacolchine
Gaze Anadhère

*** Gaze Néolée**
Gelagar

Gelax
Gelée antidiarrhéique
Lumière
Gelées Vaccins Goldenberg
Gélicrème Dumesnil
Gélicurine

*** Gélobarine**

Géloboldine
Gélocalcase
Gelocalcine
Gelodelbiase

*** Gélogastrine**

Gélo-Pansement Byla
*** Gélo-Pansements gastro-intestinaux**

*** Gélor**
*** Gélotanin**

Gélotube 29

Gelsémium Dausse
*** Génacide**

*** Génatropine**
*** Générgosine**

*** Génésérine**

D^r ZIZINE, 24-26, r. de Fécamp, Paris.

40, r. des Acacias, Paris.

53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.

MILLET, à Rambouillet.

P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).

21, r. Violet, Paris.

11, square Marie-Louise, Bruxelles.

LA BIOTHÉRAPIE, 131, r. Cambronne, Paris.

3, r. de Dunkerque, Paris.

108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.

DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).

30, r. Armand-Sylvestre, Courbevoie.

40, r. Bienfaisance, Paris.

CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris.

115, r. N.-D. des Champs, Paris.

S. G. I. P., 73, r. G^{al}-Sarrail, Le Havre.

137, av. Parmentier, Paris.

23, c. de la Liberté, Lyon.

IVAGO, 17, r. de Provence, Paris.

10, r. du Plâtre, Paris.

AUDIBERT, Cinq-Cantons, à Bayonne.

SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.

4, imp. de Béarn, Paris.

8, r. Vivienne, Paris.

121, av. de St-Ouen, Paris.

Lab. Pharmacologie Générale, 8, r. Vivienne, Paris.

LICARDY, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine.

26, av. Observatoire, Paris.

8, av. de Grammont, Tours,

63, r. Faisanderie, Paris.

Lab. CHOAY, 48, r. Théophile-Gautier, Paris

49, r. de Bitché, Courbevoie (Seine).

4, r. Aubriot, Paris (IV^e).

MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.

4, pl. des Vosges, Paris.

Lab. JONIDS, Dijon (Côte-d'Or).

Lab. AMIDO, 4, pl. des Vosges, Paris.

- Genêt Gmet
 *Genhyoscyamine
 Génocuroï
 Génolactine
 *Génomorphine
 *Génoscopolamine
 *Genosthéniques
 *Génostrychnine
 Genovital
 Géo-baryum
 Géodyl

 Géraldine
 *Geranine

 Geraseptol
 Gercecure

 Gercérine Eon

 Gerdabyl

 Germocalcine
 Germoclasine

 *Germose

 Germosine Lumière
 Germyl
 *Gernal
 Gérol Testart
 Girasiol Dumesnil
 Givrinol
 Gladyl
 *Glandocalcy
 *Glaxo

 *Glésol
 Globabyl

 Globépal

 *Globexine
 Globugénol

 Globules Hébert
 *Globules Fumouze
 Globules Laincar

 *Globules Rebeaud
 *Globules Romon

 Globules Secrétan

 *Gloma (Malt Wander)
 *Glottyl
- 27, fg Montmartre, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 10, r. Maubeuge, Paris.
 3, bd Courcelles, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 id.
 id.
 3, r. Dulong, Paris.
 20, cours Morand, Lyon.
 J. ROBERT, 39, r. de Bourgogne, Paris.
 121, av. de St-Ouen, Paris.
 12, av. de la Grande-Armée, Paris.
 12, r. Vavin, Paris.
 AMBLARD, Cunlhat (P.-de-Dôme).
 EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du.-N.).
 GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
 29, r. de Metz, Toulouse.
 7, r. Guillaume-Budé, Montgeron.
 LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
 23, cours de la Liberté, Lyon.
 9, r. Petitot, Dijon.
 333, r. Vaugirard, Paris.
 Chalais (Charente).
 10, r. du Plâtre, Paris.
 14, r. d'Auge, Caen.
 66, r. Nationale, Lille.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
 RISSA, 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
 18, av. Hoche, Paris.
 KERFYSER, r. Alexandre-III, Dunkerque.
 BOUFY, 3, r. de Dunkerque, Paris.
 SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.
 Lab. COMTOS, Fesch-le-Châtel (Doubs).
 à St-Lô (Manche).
 78, fg St-Denis, Paris.
 LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
 36, r. de Verdi, Nice.
 MONAL & C^{ie}, 6, r. Bridaine, Paris.
 J. LOGEAIS, 22 bis, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
 151 bis, rte de Joinville, Champigny (Seine).
 85 bis, r. du Ranelagh, Paris.

- *Gloxines
 *Glucalcium R. X. 133, av. de St-Ouen, Paris.
 ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
 Glucoflavine 10, r. des Fleurs, Ronchin (Nord).
 *Glucolactol BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
 Glutaspirine MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 Glutéokina MAZURE, 3, r. de Vouillé, Paris
 Glutinettes d'Aspirine 14, r. des Pyramides, Paris.
 Glycalcion 21, r. Feydeau, Paris.
 Glycérine créosotée 3, bd St-Martin, Paris.
 phosphatée Catillon
 Glycéro-bromurine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 *Glycéro Gloma 151 bis, r. Joinville, Champigny (Seine).
 Glycéro-iodurine } OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 Glycéro-ovarine }
 *Glycérophosphate Dal- 13, bd de la Chapelle, Paris.
 loz
 Glycérométhylarsénic 6, r. Dombasle, Paris.
 Glycérophosphates de 48, r. d'Alésia, Paris.
 chaux granulé Gi-
 rard
 Glycérophosphates ef- LE PERDRIEL, 11, r. Milton, Paris.
 fervescents
 Glycérophosphates 6, r. Abel, Paris.
 Freyssinge
 Glycérophosphates à Villefranche (Rhône).
 Jacquemaire
 *Glycérophosphate Ro- 13, r. de Poissy Paris.
 bin
 Glycéro-Thyroidine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 Glycéro-Tribromurine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 Glycogène 8, r. Vivienne, Paris.
 Glycobl 4, pl. des Vosges, Paris.
 *Glycocarpine DALIN, 49, q. St-Vincent, Lyon.
 Glycogène Clin 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 Glycojasol 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
 *Glyco-lactimase Cou- 18, av. Hoche, Paris.
 turieux
 *Glyco. M. 3, av. Lowendal, Paris.
 Glyco-phénique du 6, r. de la Tacherie, Paris.
 Dr Déclat
 Glycophosphates gra- 45, r. Docteur-Blanche, Paris.
 nulés Astier
 Glyco-Phytol 3, r. Chanez, Paris.
 *Glyco-Thymoline 5 bis, r. des Haudriettes, Paris.
 *Glyctone phosphatée ARQUEVAUX, à Etampes (Seine-et-Oise).
 Charrière
 *Glykolaine Robin 13, r. de Poissy, Paris.
 *Glyphospher 56, ch. Combe-Blanche, Lyon.
 *Gmet (Extraits) 27, ig Montmartre, Paris.

- *Gobérol
- *Gobillettes Hypnos
Goiarsyl Meurice
- *Gomenol
Gometer
- Gometyl
- *Gonacrine
- *Gonagone
- Gonéine (Capsules)
- Gonocure
- *Gono-Vaclydun
- Gonurol B
- Gorgéine
- *Gosiérine Dalloz
- Gossyl
- Goudrinhal
- Goudroline
- Goudron Freyssinge
- Gouttes amères de
Baumé
- Gouttes antirhumasti-
males Wagner
- *Gouttes Antispasmo-
diques Dausse
- *Gouttes Arsénosté-
niques Dausse
- *Gouttes Blagny
- Gouttes calciques Zanit
- *Gouttes Daynoc
- Gouttes d'Yzeurol
- Gouttes Efgé
- Gouttes Esurine
- *Gouttes halogènes du
D^r Bern
- *Gouttes hypotensives
Fraissee
- Gouttes iodopeptiques
Narud
- *Gouttes livoniennes
- Gouttes Lo-Lo Tsé
Isberg
- Gouttes du D^r Ludlam
- *Gouttes Magalo
- *Gouttes Malone
- Gouttes Milko
- *Gouttes Nican
- CHARMAISON, 26, av. de
Royat, Clermont-Ferrand.
- Chabeuil (Drôme).
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- 48, r. des Petites-Ecuries, Paris.
- ROBERT et CARRIERE, 37, r.
de Bourgogne, Paris.
- id.
- SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujen,
Paris.
- CARRION, 54, fg St-Honoré-
Paris.
- A. GUILLAUMIN, 13, r.
Cherche-Midi, Paris.
- SAUBA, 1, r. d'Enghien, Paris,
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- FOIRET, à Montargis (Loiret).
- 13, bd la Chapelle, Paris.
- 4, imp. de Béarn, Paris.
- 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
- POINTET et GIRARD, 30, r
des Francs-Bourgeois, Paris.
- 6, r. Abel, Paris.
- D^r GIGON, 25, bd Beaumar-
chais, Paris.
- 107, av. de la Reine, Boulogne-
sur-Seine.
- 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- 4, r. Aubriot, Paris (IV^e)
- Pamela, Forges-les-Eaux (S.-I.).
- 3, pl. Intérieure St-Michel, Tou-
louse.
- LEJEUNE, 142, r. de Picpus,
Paris.
- 26, av. de Tourville, Paris.
- 40 av, Secrétan, Paris.
- D^r R. PETIT, Angoulême.
- 3, pl. Intérieure St-Michel,
Toulouse.
- FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris.
- 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
- 15, r. Immeubles-Indstriels,
Paris.
- F. BOUVIER, 31, bd de la Vil-
lette, Paris
- 17, r. Cadet, Paris.
- Etabl. GOY, 23, r. Beautreillis,
Paris.
- VINCENT, à Ancenis (L.-Inf.).
- CLUZEL, 60, c. E.-Zola, Lyon.
- CANTIN, à Palaiseau (S.-et-O.).

- *Gouttes Paldophiles du D^r Guiraud** 10, imp. Milord, Paris.
Gouttes Pectosérum 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
Gouttes Perettes 42, av. de Breteuil, Paris.
***Gouttes Phosphosténiques Dausse** 4, r. Aubriot, Paris (IV^e)
***Gouttes Pilka** Lab. ZYMA, 4, r. Bellart, Paris.
Gouttes Reynaud D U R A N D, Aigues - Mortes (Gard).
Gouttes Sap 83, r. des Martyrs, Paris.
***Gouttes Scandinaves** D^r H. PHILIPPE, 14, r. du Palais-Grillet, Lyon.
Gouttes Schmit anti-convulsives G, Vilas à Châlons-sur-Marne.
Gouttes Scélérocure CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
Gouttes Vigor 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
***Gouttes de Séru** 69, r. de Sèvres, Paris.
Goyl Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
Grains céphalgifuges
***Grains d'Evian** PERROCHON, 57, r. Origet, Tours.
Grainsgelm D^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude
Grains Miraton 48, r. d'Alésia, Paris.
Grains de santé du D^r Franck 59, r. Nollet, Paris.
***Grains de Vals** 7, r. Galvani, Paris.
Gramalt CHASSAIGNE, Ruffec (Ch.-I.).
***Granions de Fouard** 61, r. Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine).
***Granoxyl** 16, r. du Petit-Musc, Paris.
Granulé Bravais 3, r. Mogador, Paris.
Granulé calmafreinkel LEMATTE, 52, r. La Bruyère, Paris.
Granulé Caresmel 2, quai. Paul-Bert, Tours.
Granulé du D^r Mous-saud H. RIVIER, 26, r. St-Claude, Paris.
Granulé Girard 48, r. d'Alésia, Paris.
Granules 3 cachets D^r COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.
Granules d'Alcône OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Granules de Boldine id.
Granules Chanteaud 54, r. Francs-Bourgeois, Paris.
Granules Chevrier 21, fg Montmartre, Paris.
Granules Colchicine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Granules Crosnier 6, r. Chanoinesse, Paris.
Granules de Digitaline OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Granulé de Panphosphates 119 bis, av. Chemin-de-Fer, Rueil (S.-et-O.).
***Granules de Pantofort du D^r Boveil** 1, r. Lassalle, à Lyon.
Granules du D^r Papillaud GIGON, 25, bd Beaumarchais, Paris.

Granules Homolle & Quévenne	14, r. des Beaux-Arts, Paris.
Granules Houdé	9, r. Dieu, Paris.
Granules Hydrastinine	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Granules Hyosciamine	id.
Granules Spartéine	id.
Granule pulmonaire Giry	49, r. de Metz, Nancy.
Granulé dépuratif Künckel	3, r. Watteau, Courbevoie.
Granulé Tinardon	17, r. Cadet, Paris.
*Granules des Vosges	11, r. Lafayette, Paris.
*Grassyl	98, r. de Sèvres, Paris.
Graumanyl Meurice	61, av. Louise, Bruxelles.
*Gravural	28, r. de Seine, Paris.
Griponal	19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Grippol	INSTITUT DE MICROBIOLOGIE, à Sarrebruck.
Guarana Grimault	8, r. Vivienne, Paris.
*Guérysipèle	71, av. de la République, Champigny (Seine).
*Guéthural	Lab. PEPIN & LEBOUCC, Courbevoie (Seine).
*Gui Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Gui Gmet	27, fg Montmartre, Paris.
Guilyl	4, imp. de Béarn, Paris.
*Guipsine Leprince	62, r. de la Tour, Paris.
Gunose	D ^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
*Guttoléol	MAIRE, 171, r. de Belleville, Paris.
Gynaicéol	17, r. Cadet, Paris.
Gynalthine	3, r. Barbette, Paris (III ^e).
Gynaseptone	BREANT, 4, r. de Clichy, Paris.
Gynéose	14, r. des Pyramides, Paris.
*Gynergène	Etabl. SANDOZ, 5, r. de Metz, Paris.
Gynévrine	4, imp. de Béarn, Paris.
*Gynocalcion	Lab. CORTIAL, 15, bd Pasteur, Paris.
Gynocrinol	Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
Gynohypophysol	id.
Gynoluteol	id.
*Gynoestryl	89, r. du Cherche-Midi, Paris.
Gynolysats	4, imp. de Béarn, Paris.
*Gynopausine	42, du Mont-Cenis, Paris.
Gynophilne	DOUARD, Uzel (C.-du-N.).
Gynophyl Reboul	Pont-Ste-Maxence.
Gynopolycrinol	Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
Gynoster	133, r. Lecourbe, Paris.

H

- Haemaboeol**
- *Halocure**
- Hamamélide**
- *Hamaméline Roy**
- *Hamaméliode**
- Hamamélis Dausse**
- *Hamamélis Gmet**
- *Hamamélis Grandval**
- Hansénol**
- *Hectargyre Naline**
- *Hectine Naline**
- Helbine**
- Hélénine du Dr Korab**
- Hélieurone**
- Héliosodine**
- Héliostérine**
- Heliosthényl**
- Hélital**
- Helmazil**
- Helminthose**
- Helminthyl**
- Hémabéol**
- Hémabione**
- *Hémagène Tailleur**
- *Hémagénine Giraud**
- Hémaldine**
- Hémarsyl du Dr Roux**
- Hématéol**
- *HématoéthYROÏDINE**
- Hématogénine**
- Hématogénoï**
- *Hémato-iodine**
- Hématopan**
- Hématoquina Tran-**
- toul**
- *Hémaxol**
- *Hémoantitoxine Sofos**
- Hemobiose**
- BAILLY, 15-17 r. de Rome,**
Paris.
- 2bis, r. du Chevalier de la Barre,**
St-Quentin (Aisne).
- J. LOGEAIS, à Boulogne-sur-**
Seine.
- 41, r. de Rome, Paris.**
- 17, r. Cadet, Paris.**
- 4, r. Aubriot, Paris.**
- 27, fg Montmartre, Paris.**
- 12-14, r. Féry, à Reims.**
- 116, bd Haussmann, Paris.**
à Villeneuve-la-Garenne.
- id.**
- 94, r. Michelet, Alger.**
- 12, r. de l'Isly, Paris.**
- BYLA, 26, av. de l'Observa-**
toire, Paris.
- 249, r. de Vaugirard, Paris.**
- LAROZE, 54, rue de Paris, Cha-**
renton (Seine).
- LAURIAT, La Garenne-Colom-**
bes (Seine).
- 15, pl. Nationale, Dieppe.**
- 7, av. Marceau, Paris.**
- 132, r. de Turenne, Paris.**
- 14, r. Gravel, Levallois-Perret.**
- 72, av. Kléber, Paris.**
- MOURGUES, chemin Neuf,**
Ganges (Hérault).
- SEVENET, 10, r. Le Chapelais,**
Paris.
- pl. de l'Eglise, Argenteuil.**
- BILLEBAUD, Paray-le-Monial**
(Saône-et-Loire).
- CAILLAU, à Argentat (Corrèze).**
- 81, r. Le Corrège, Bruxelles.**
- 54, Fg St-Honoré, Paris.**
- DEMASLES, Vienne (Isère).**
- 37, r. Galilée, Paris.**
- 2, pl. des Vosges, Paris.**
- 37, r. du Canal, Bruxelles.**
- 7, r. Guillaume-Budé, Mont-**
geron.
- Lab. JONIDS, Dijon.**
- 4, r. Désirée, Lyon.**
- M. AUBANEL, Pointe-Rouge,**
Marseille.

- *Hémocalciopectine BOUDIER, 37, r. de Bour-
gogne, Paris.
- *Hémo - Cyto Sérum Labor. CORBIERE, 27, r.
Corbière Desrenaudes, Paris.
- Hémocléine Lafay 54, ch. d'Antin, Paris.
- *Hémodrome LANCOSME, 71, av. Victor-
Emmanuel-III, Paris.
- *Hémoductyl LICARDY, 38, boul. Bour-
don, Paris-Neuilly.
- *Hemofer LOBRY, 6, r. Parrot, Paris.
- Hemoferrine OPTIMA, Gdc-Rue au Bois,
Bruxelles.
- Hémofixine 4, r. Beaurepaire, Paris.
- *Hemofluidol Lab. LÉONARDON, Arcachon.
- Hémogénase à Courpière (Puy-de-Dôme).
- *Hémogénol Dausse 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
- Hémoglobine Bovel 101, av. Mozart, Paris.
- Hémoglobine Dalloz 13, bd de la Chapelle, Paris.
- *Hémoglobine Des- 9, r. Paul-Baudry, Paris (VIII^e).
- chiens
- Hémoglobine Star 2, r. Marché-des-Blancs-Man-
teaux, Paris.
- Hémoglobine Van Lier 30, r. St-Jacques, Namur.
- Hémoglyne Thuau 22, fg St-Michel, Angers.
- Hémo-Hépatext TAILLANDIER, 107, av. Jean-
Jaurès, Paris.
- *Hemoluol 6, r. Dombasle, Paris.
- Hémoneurol Cognet 43, r. de Saintonge, Paris.
- *Hémopanbiline Annonay (Ardèche).
- *Hémopausine 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- Hémopectal A. FALVY, 40, r. des Aca-
cias, Paris.
- *Hémo-Phagostyl A. PARIS, 4, r. La Motte-
Picquet, Paris.
- *Hémophiline Planche 2, r. Volney, Paris.
- *Hémoplasie Lumière 23, cours de la Liberté, Lyon.
- Hémopoïne D^r SCHOLL, à Gembloux,
Belgique.
- *Hémorroïdine 1, r. Alexandre-III, Dun-
kerque.
- *Hémosamine (Utéra- 4, r. Bellart, Paris.
- mine)
- Hémosédine 19, r. de Fleurus, Paris.
- Hemoserosan TORAUDE, 22, r. de la Sor-
bonne, Paris.
- Hémosine 89, bd Sébastopol, Paris.
- *Hémostatique Goy 23, r. Beautreillis, Paris.
- *Hémotra Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
- *Hémostyl D^r Roussel 97, r. de Vaugirard, Paris.
- *Hémotal UNIS-SPES, 14, r. Demarquay,
Paris.
- *Hémotonine 98, r. de Sèvres, Paris.
- Hémo-Tonikéine 52, r. La Bruyère, Paris.
- *Hémoveine BRICHARD, à Bar-le-Duc.
- Hémozol 12, boul. Saint-Martin, Paris.
- Hémyne 13, r. de la République, Yzeure-
Moulins (Allier).

*Hemypnal	109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
Hényl	31, av. Foch, La Garenne-Colombes.
Hépabyl	TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
Hépacoline	25, r. Petits-Hôtels, Paris.
Hepacurol	10, r. de Maubeuge, Paris.
Hépagastrol	33, av. de Villiers, Paris.
*Hépanème	54 fg St-Honoré, Paris (VIII ^e).
*Hépaphos	31, r. des Francs-Bourgeois, Paris (IV ^e).
Héparadénine	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
*Héparbiline	id.
Heparcyl	23, r. du Caire, Paris.
Héparène	30, r. Denis-Papin, Blois.
*Héparmone Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Hepatergol	Cousin, r. Albert I ^{er} , Beaumont-sur-Oise.
*Hépathemo	9, r. Paul-Baudry, Paris.
*Hépatie Efa	rue du Chateau, Carentan (Manche).
Hépatine Bouty	3, r. Dunkerque, Paris.
*Hépatine Gad	OLIVIERO, 41, r. Denfert-Rochereau, Paris.
*Hépatismine	29, r. de Liège, Paris.
*Hépato-Byl	62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
Hépatocrinol	Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
*Hépatodiase	UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris.
Hépatogastrine	4, chaussée de la Muette, Paris.
Hépatogènes Charvo	3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire.
Hépatolax	83, bd de la Villette, Paris.
Hépatomanganol	11, pl. Louis-XII, Blois.
Hepatoseptyl	108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
Hépato-Sérine	22, r. Guillaume-le-Conquérant, Caen.
*Hépatosodine	DURET & RÉMY, Asnières (S.).
Hépatotanic	14, r. de Clichy, Paris.
*Hépatozyl	40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
*Hépatrol	31, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
Héracléine	COUTURIEUX, 18, av. Hoche, Paris.
*Héracléol	Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
*Hergéno!	GROS, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
Hermarsinol	66, r. Nationale, Lille.
Hermomuthol	66, r. Nationale, Lille.
*Hermophényl	23, cours. de la Liberté, Lyon.
Hermostyrum	WARIN, 4, chaussée de la Muette, Paris.

- Héroïne Vicario**
***Hétérolysine**
Héxachol
***Hexafel**
Hexalithine
Hexaformine
***Hexaranol**
Hexarubrine
***Hexotal**
Hippo-Carnis
Hippoplasine du Dr Gran
***Hipposarcine Roy**
***Hirudinase**
Histocalcine
***Histogénol Naline**
Hojasol
***Holaseptine**
Holocalcine
***Holos Deschiens**
***Hologarine**
Holuryl
***Hopogan**
Hordéomaltine
Hordose
***Hormobiline**
***Hormocline**
Hormolaxine
Hormolutéine
Hormotone
***Hormovarine Byla**
Hordénine Lauth
Horsine
***Hova (Tablettes)**
Huile au Calomel Dumesnil
***Huilaxine**
Huile Boris
***Huile Crolas**
***Huile de foie de morue médicinalement suractivée**
Huile de genévrier Vial
***Huile Gallina**
***Huile grise argentique**
Huile grise Duret
***Huile grise Ercé**
Huile grise stérilisée
17, bd Haussmann, Paris.
OLIVIERO, 41, r. Denfert-Rochereau, Paris
26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
47, r. Bokanowski, Asnières.
REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
123, pl. Beauvoisine, Rouen.
88, r. Duhesme, Paris.
20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
LE GALLO, à Auray (Morbihan).
BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
56, ch. Combe-Blanche, Lyon.
114, r. du Temple, Paris.
83, bd de la Villette, Paris.
à Villeneuve-la-Garenne.
19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
5, Grande-Rue, Cannes.
15, pl. Godefroy-de-Bouillon (Boulogne-sur-Mer).
9, r. Paul-Baudry, Paris.
48, r. de la Procession, Paris.
A. FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
12, r. Lamartine, Paris.
10, r. Richelieu, Paris.
31, r. des Pierres, Bruges (Belgique).
17 bis, av. Parmentier, Paris.
LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.
16, r. du Petit-Musc, Paris.
2, rue des Deux-Ponts, Paris.
DÉGÉCÉ, 7, rue Princesse, Paris.
26, av. Observatoire, Paris.
9, r. du 4-Septembre, Paris.
4, r. St-Anastase, Paris.
ZYMA, 4, r. Bellart, Paris.
10, r. du Plâtre, Paris.
15, r. de Rome, Paris.
14, r. de Birague, Paris.
56, ch. Combe-Blanche, Lyon.
RHONÉ POULENC, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
8, r. Vivienne, Paris.
4, r. Candolle, Paris.
S. F. E. A. T., 15, r. Catullienne, St-Denis.
12, r. de Nice, Paris.
37, r. de Bourgogne, Paris.
VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

Huile de Hogg	13, r. Paul-Baudry, Paris.
*Huile iodée Scientia	21, r. Chaptal, Paris
Huile Parlaix	65, rue Douy-Delcupe, à Montreuil (Seine).
Huiles Cholestérinées Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IV ^e).
Hyclal	DURET & RÉMY, Asnières (Seine).
*Hydralin	37, r. de la Fédération, Paris.
Hydrargyrettes bert	Hu- HUBERT, Romorantin (L.-et-Cher).
Hydrargyrion	18, av. Hoche, Paris.
Hydrariode	à La Ferté-Macé (Orne).
Hydrastine Houdé	9, r. Dieu, Paris.
Hydrastis Dausse	4, r. Aubriot, Paris.
Hydrastis Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Hydrastol	222, fg St-Martin, Paris.
*Hydrocamphre	88, r. Duhesme, Paris.
Hydrogemmine gasse	La- 4, chaussée de la Muette, Paris.
*Hydrorrhéol	CORDIER, 222, fg St-Martin, Paris.
*Hydroxydase	10, rue Blanche, Paris.
Hygiénane	172, rue d'Alésia, Paris.
Hygiodine	5, av. Victoria, Paris.
*Hyol	Lab. NEUVILLE, 239, Fg St-Honoré, Paris.
*Hyoscyamine Houdé	9, r. Dieu, Paris.
*Hypalène	127, bd St-Michel, et 15, r. des Champs, Asnières.
Hypercytol	MATRAY, à Aubière (Puy-de-Dôme).
Hypergal Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Hypericia	3, r. Rodier, Paris.
Hypericoil	id.
Hyperityol	id.
Hypérol	49, r. Paradis, Paris.
*Hypersan	P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Hyperstyl	Etabl. H. O. E., 239, r. Nationale, Villefranche - en - Beaujolais (Rhône).
Hypnase Vergelot	163, r. de Flandre, Paris.
Hypneural Cos	99, r. d'Aboukir, Paris.
Hypnosédine	11, ch. de la Muette, Paris.
Hypnovel Vély	132, av. Victor-Hugo, Paris.
Hypochlorine	l'Antiseptique, 48, r. de Londres, Paris.
Hypochloryl	7 bis, r. de Musset, Paris.
Hypodermozone	56, bd Péreire, Paris.
*Hypophédrine	18, r. de Beaune, Paris.
Hypophos Hurbourgne	à Montmeyan (Drôme).
Hypophosphites Chur-chill	12, r. Castiglione, Paris.
Hypophosphites Fellows	5, r. de la Paix, Paris.

Hypophydose	D ^r FRAYSSE, 47, r. de Neuilly, Nanterre.
Hypophyse - Endocrines Fournier	7, r. Biscornet, Paris.
Hypophysine	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Hypophysol	107, r. des Dames, Paris.
*Hypotan	LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.
Hypotensol	LABESSE, Angers (M.-et-L.).
Hyrganol	SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.

I

I. A. M.	D ^r LAVOUÉ, à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Iasthol	Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Ibogaïne Nyrdhal	12, r. de la République, Puteaux.
Ichtyol Zinc	Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.
Idéalax	62, r. Marengo, St-Étienne.
Iénol	37, r. Galilée, Paris.
*Ifranol	Labor. Thérap. Exotique, Arpa-jon (S.-et-O.).
*Iloglandol Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Imido Roche	id.
*Immuniphages Gremy	14, r. de Clichy, Paris.
*Immunizols Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Immuno-Antivirus	61, av. Louise, Bruxelles.
*Immunovaccin Anti-rhumatismal	8, av. des Sources, Nice.
Immunovaccin broncho pulmonaire	id.
*Indhaméline Lejeune	142, r. de Picpus, Paris.
Indine	DABAT, à Pau (Bas.-Pyr.).
Inertyl	CHARVOZ, 3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire.
*Infangyl Carlier	St-Florentin (Yonne).
*Infra-rouges	La Verrerie Scientifique, 12, av. du Maine, Paris.
Infusion orientale R. B. L.	74, qual Jemmapes, Paris.
Inhalant de Luchon	
Inhalateur Hojasol	19, r. Ferdinand-Duval, Paris

- Inhalateur et Inhalations** Lab. INHAL, 98, r. J.-Mallotte, La Madeleine-Lille.
- *Inhalation-Gargarisme** VOCALDOP, 222, fg St-Martin, Paris.
- *Inhalation Lancosme** 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
- Inhalation Sargétyl** STOLZ, 50, av. Edouard-Vaillant, Boulogne-sur-Seine.
- Inhalatoriol** 57, r. Edgar-Quinet, Nantes.
- Inhalène** à Berson (Gironde).
- Inhalex** 37, r. Galilée, Paris.
- *Inhalo-Bol** P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.
- *Inhalol** 62, r. d'Antibes, Cannes (Alpes-Maritimes).
- *Inhalone** CH. DEHAY, à Arras.
- *Inhalo-Sel** P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.
- *Inhaloxyl** 4, chaus. de la Muette, Paris.
- Inhalyl** 137, av. Parmentier, Paris.
- Injection Clin Strychno** 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Phospharsinée** JEHAN & BRÉRA, Montauban (L.-et-G.).
- Injection sèche Bréra** 46, r. Pierre-Charron, Paris.
- *Innerclean** 60, r. de Prony, Paris.
- *Inogyl** 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
- *Inolène (simple, vaseliné, thymolé).** 60, r. de Prony, Paris.
- *Inorenol** D^rDEBAT, 60, r. de Prony, Paris.
- Inorhinyl** id.
- *In septa** id.
- Inosphaceloi** id.
- Inosplénol** id.
- *Inotyol** id.
- *Inoxemoi** id.
- Inoxyl** id.
- Inoxine** 22, av. Opéra, Paris.
- *Institut Pasteur** 22, r. Dutot, Paris.
- *Insulanol du D^r Roussel** 97, r. de Vaugirard, Paris.
- Insuline (voir *Endopancrine)**
- *Insuline A. B.** 1, r. Dajot, Melun.
- *Insuline buccale For-** INSTITUT DE MICROBIO-
- net** LOGIE, Sarrebruck.
- *Insuline Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- Insuline Léo** 39, r. Fondaudège, Bordeaux, et 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- *Insuline Phyloze (Poudre et pommade)** 48, r. de la Procession, Paris.
- Insuline Rogier** 56, bd. Pérelre, Paris.
- Insuloxyl Roussel** 97, r. de Vaugirard, Paris.
- *Insulyl Roussel** 97, r. de Vaugirard, Paris.
- Intaline** THOMAS, Chemillé (Maine-et-Loire).
- Integral Vaccin** 12, r. Paul-Baudry, Paris.
- Intestase** 58, r. de Miromesnil, Paris.
- Intestinal Merminod** 49, r. de Paradis, Paris.

- *Intrats Dausse
 Ioda
 Iodalbin Adrian
 Iodalia
 *Iodalose Galbrun
 *Iodamelis Logeais

 Iodaminase
 Iodamol
 Iodargol Viel
 Iodarsène
 *Iodarsenic Guiraud
 Iodarsine
 *Iodasclérine
 Iodaselle Delamarre
 *Iodaseptine Cortial
 *Iodassium

 Iodatoxine Laleuf
 Iode Aucher
 Iode liquide Lambiotte

 *Iodéine Montagu
 Iodel

 *Iodentérol
 Iode Oberlin
 Iodeclaxine

 *Iode Organique Boissy
 Iodéol Viel
 Iodeptol
 Iodéyl Fournier
 *Iodex
 *Iodhéma
 Iodhyrine du Dr Des-
 champs
 Iodine Médol

 *Iodiniectol Jammes
 Iodion
 *Iodo-Bismuthate de
 Quinine
 *Iodo-Bismuth Ercé
 Iodo-calcique

 *Iodocalcium

 Iodocéréol Dalloz
 Iodocol Carrion
 Iodogalle Vial
 Iodogéline
 Iodo-Juglan
 *Iodogénol Pépin
 *Iodo-Maisine
 *Iodométine Hautdidier
- 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 63, r. de la Faisanderie, Paris.
 9, r. de la Perle, Paris.
 12, r. Vavin, Paris.
 8, r. du Petit-Musc, Paris.
 22 bis, r. Silly, Boulogne-sur-
 Seine.
 2, rue des Deux-Ponts, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 7, r. Saint-Yves, Rennes.
 42, av. de Breteuil, Paris.
 10, imp. Milord, Paris.
 304, r. St-Jacques, Paris.
 SANOVA, 29, r. de Liège, Paris.
 49, r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.
 15, bd Pasteur, Paris.
 4, chaussée de la Muette,
 Paris.
 20, r. du Laos, Paris.
 La Ferté-Macé (Orne).
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 49, bd Port-Royal Paris.
 COUDERT, 116, av. Ledru-
 Rollin, Paris (XII^e).
 4, r. Candolle, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 49, r. Hoche, Courbevoie.
 7, r. Saint-Yves, Rennes.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
 4, r. Candolle, Paris.
 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.

 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,
 La Garenne (Seine).
 86, r. Michel-Ange, Paris.
 94, r. Michelet, Alger.
 FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris.

 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Labor. DULCIS, pl. Clichy,
 Monte Carlo.
 Lab. Biologique de l'Île-de-
 France, 3, r. Laugier, Argen-
 teuil.
 13, bd de la Chapelle, Paris.
 54, fg St-Honoré, Paris.
 4, pl. Croix-Rousse, Lyon.
 CROZET, à Cannes (A.-M.).
 LE GALLO, à Auray (Morbihan).
 à Courbevoie (Seine).
 48, r. d'Alésia, Paris.
 37, r. Galilée, Paris.

- *Iodone Robin**
***Iodonésyl**
 Iodonine
 Iodonion
 Iodonoses Clin
***Iodonucléol**
 Iodoplasme
 Iodoplume
 Iodo Rubidium
***Iodosan**
 Iodosigol
***Iodostarine Roche**
 Iodo-Théine Henry
***Iodo-Thyroidine Catil-**
 lon
 Iodo-Trypsine
 Iodoveine Leduc
***Iodo-Vitasine**
 Iodoxol
***Iodural Novat**
***Iodurase**
***Iodure d'Amidon**
 Iodures Cros
 Iodures Domergue
 Iodures Foucher
 Iodures Laroze
***Iodure Philippe**
***Iodures Pachaut**
***Iodures Souffron**
 Iolase Corbière
 Ionoides
***Ionyl**
 Iophénol
***Iosorbine**
 Ipéca digitale Dausse
***Irénine Gonnon**
 Irol Churchill
 Irovarine Tisy
 Irradiol
***Irrastérine Byla**
***Isacène Roche**
 Isobromyl
 Isoluel
 Isorhinol
***Isotonyl (Poudre de**
 Lausanne)
 13, r. de Poissy, Paris.
 34, r. St-Lazare, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 9, r. Victor-Letalle, Paris.
 20, r. d. Fossés-St-Jacques, Paris.
 14, r. de Birague, Paris.
 85, rue des Morillons, Paris.
 PIALOUX, 55, r. de Chabrol,
 Paris.
 Labor. DULCIS, pl. Ferry,
 Monte Carlo.
 O. C. P., 71, r. du Temple, Paris.
 ZAMBELETTI, à Milan (Italie).
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
 21, pl. des Vosges, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 3, boul. Saint-Martin, Paris.
 46, av. des Ternes, Paris.
 JAUME, à Tamaris (Gard).
 H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
 Dames, Paris.
 BOMEL, Annonay (Ardèche).
 18, av. Hoche, Paris.
 LUMIERE, 23, cours de la
 Liberté, Lyon.
 12, r. de Nice, Paris.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
 2, r. des Lions, Paris.
 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
 130, bd Haussmann, Paris.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 13, r. Pavée, Paris.
 La Biomarine, Dieppe (Seine-
 Inférieure).
 P. C. B., 12, r. du Téléphone.
 Bruxelles.
 VANDA, 16, r. Ficatier, Cour-
 bevoie.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 12, r. Castiglione, Paris.
 R. & A. FEIGNOUX, 95, r. de
 Turenne, Paris (III^e).
 16, r. de Rocroy, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fossés-
 St-Jacques, Paris.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.
 87, r. Lafayette, Paris.

Ivula Pearson

*Ixium

*Ixogyne

J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,
La Garenne (Seine).

98, r. de Sèvres, Paris.

24, r. Paul-Bert. Paris.

J

Jap

Jécofluy

*Jécol

Jecorine

Jecorsan Fornet

Jéjunine

*Jemalt Wander

Jicémine

Jovine Brisson

Juglamarine

Jugland Gmet

Juglandine Ferrouillat

*Juglane

Juglanrégine

Juniodyl

Juraisin Macon

Jus de raisins Challand

Jus de raisins Pampryl

Juvéol

Juvigor

52, rue La Bruyère, Paris.

P. HARDY, 42, bd St-Marcel,
Paris.

3, r. Watteau, Courbevoie.

OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.

Inst. de Microbiologie, à Sar-
rebruck.

42, av. de Breteuil, Paris.

151 bis, route de Joinville,
Champigny (Seine).

304, r. Saint-Jacques, Paris.

157, r. Championnet, Paris.

WARIN, 4, chaussée de la
Muette, Paris.

27, faub. Montmartre, Paris.

33, r. Daguerre, Paris.

à Chambéry (Savoie).

2, r. des Alpes, à Valence.

THÉVENOT, 21, r. des Roses,
Dijon.

Etabl. Œnologiques de Bour-
gogne, Mâcon (S.-et-Loire).

Nuits-St-Georges (C.-d'Or).

2, villa de la Terrasse, Paris.

17, r. Cadet, Paris.

Nuits-St-Georges (Côte-d'Or).

K

Kalastyl

Kaïmine

*Kalmobrol

Kalmogastrol

Kalmopyrine

Kamara C. 47

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

MÉTADIER, à Tours.

60, r. Aug.-Comte, Lyon.

132, av. Victor-Hugo, Paris.

49, r. Paradis, Paris.

47, quai Jemmapes, Paris.

- *Kaobrol 54, r. Paris, Charenton (S.).
- *Kaolinase 12, bd Saint-Martin, Paris.
- Kaolin Crookes 2, Fg St-Denis, Paris.
- Kaolin Géo 20, cours Morand, Lyon.
- Kéfir Carrion 54, fg. Saint-Honoré, Paris.
- Kéfir Caucase 53, r. de Spa, Bruxelles.
- Kélène 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Kénapirine Chanteaud 54, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Kénol MILLET & GUILLAUMIN, 8, r. Richer, Paris et 5, r. Ambroise-Thomas.
- Képhaline Brunot 10, pl. Thiers, Le Mans.
- Képhir Salmon 28, r. de Trévis, Paris.
- *Kerlactine 1, rue Lassalle Lyon.
- *Kerlol Lerck à Saint-Etienne, 63, pl. St-Roch.
- *Kidoline GALLIER, 38, bd Montparnasse, Paris.
- Kina-Coca-Kola GRANVAL, 12-14, r. Fery, Reims.
- Kina Elzevir Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
- *Kinéchol 40, bd Saint-Ruf, Avignon.
- *Kinctine 12, r. du Chemin-Vert, Ville-neuve-la-Garenne.
- Kineurine Moncour 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- Kioféine 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- Kipsol 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
- Kitine VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.
- *Kluchol Remeaud 38, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine.
- Koch-I-Cide LEISYN, 1 bis, r. Molitor, Paris.
- Kola-fer Trouette 15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
- Kola Gmet 27, fg. Montmartre, Paris.
- *Kola granulé Astier 45, r. du D^r-Blanche, Paris.
- Kola granulé Roy 81, boul. Suchet, Paris.
- Kolagum 4, r. des Carmes, Paris.
- Kolamalt U. C. E. P., 5, r. Labroque, Strasbourg.
- Kola Midy 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- *Kola Monavon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- Kola OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Kola Pichat 5, c. Charlemagne, Lyon.
- Kolarsine Pautauberge 10, r. Constantinople, Paris.
- Kolatinés 12, r. du Helder, Paris.
- Kola Venaize 4, r. des Carmes, Paris.
- Kréazone TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
- Kréofos Novat BOMEL, Annonay (Ardèche).
- *Kreptol LOUINET, 39, r. de l'Arcade, Paris.
- *Kydalose DALIN, 49, quai Saint-Vincent, Lyon.
- *Kymosine Rogier 56, boul. Péreire, Paris.

L

- *Lab-Lacto-Ferment
- *Laccodermes Brisson
- *Lachésine
- *Lacpinine
- Lacrenile Meurice
- *Lac-Ser
- Lactagol
- Lactagol Pearson
- *Lactaris
- Lactate d'Hg (Voir :
Comprimés Roy)
- Lactéol Boucard
- Lactéomaltol
- Lactermol Vigier
- *Lacticholéine Tulivet
- Lactifère
- Lactigélose
- *Lactimase Couturieux
- *Lactobacilline
- Lactobactyl
- *Lactobyl
- Lactocalcine
- *Lactochol
- Lactocoaguline Fabre
- Lacto-Diastal
- Lacto-ferment
- Lactofermentine
- Lactogélose
- *Lactolaxine Fydau
- Lacto Mannitase
- Lacto-Magnésie Vita
- Lactomorrhuel
- Lactophéine
- Lactopherine
- Lactophosphine
- Lactoseptyl Legrand
- *Lacto-Sérum Lavril
- Lactosérum R. M.
- MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
- 157, r. Championnet, Paris.
- RENAUD, 2, r. Demours,
Paris.
- FISCH, 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- 49, bd Port-Royal, Paris.
- 48, r. d'Alésia, Paris.
- 43, r. Pinel, Saint-Denis.
- Lab. Central, 129, r. de Turenne,
Paris.
- 30, r. Singer, Paris.
- 9, r. Rodier, Paris.
- 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
Laye.
- 3, r. Capitaine-Scott, Paris.
- DUCLOY, Arques (P.-de-C.).
- 18, av. Hoche, Paris.
- 13, r. Saint-Maurice, Nanterre
(Seine).
- TORAUDE, 22, r. de la Sor-
bonne, Paris.
- 46, av. des Ternes, Paris.
- 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- 46, av. des Ternes, Paris.
- 33, r. de la Haie-Coq, Aubervill-
liers.
- 7, av. Marceau, Paris.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
- THEVENOT, r. des Roses, Dijon.
- DUCLOY et C^{ie}, Arques (P.-de-C.)
- 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
- 37, r. de Tivoli, Bordeaux.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- DELPECH, 5, r. Danton,
Paris.
- CACHAT, Evian-les-Bains (Hte-
Saône).
- 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
- 8, r. de la Pompe, Paris.
- 11 pl. Louis XII, Blois, (L.-et-C.).
- 26, bd des Batignolles, Paris.
- 6 bis, rue Monsieur, Paris.

Lactosone	17, r. Cadet, Paris.
Lactozymase B.	52, r. La Bruyère, Paris.
Lactyl Meurice	61, av. Louise, Bruxelles.
Lait albumineux Mol- lard	25, cours Lafayette, Lyon.
Lait allégé Dieticus	15, quai de Bourbon, Paris.
Lait Berna	199 bis, bd St-Germain, Paris.
Lait de cèdre Sapolan	CAVAILLÈS, 29, r. de Singer, Paris.
*Lait de magnésie Phil- lips	O. C. P., 108, r. de Picpus.
Lait de Sapolan	id.
Lait de Soufre Sapolan	id.
Lait Gallia	11, r. de Prony, Paris.
Lait Gloria	19, bd. Malesherbes, Paris.
Lait Guigoz	19, r. J.-J.-Rousseau, Paris.
Lait Lepelletier	48, r. Ampère, Paris.
*Lait Mont-Blanc	Rumilly (Haute-Savoie).
Lait Oico	25, av. Michelet, St-Ouen.
*Lait sec C. G.	Sté de Spécial. Diététiques et Pharm. (COW et GATE), 22, r. des Belles-Feuilles, Paris.
Lait Sec Lo-lo	123, r. de Paris, Saint-Denis.
Lait sec Nutricia	65, bd Sébastopol, Paris.
Lait Seklé	200, av. Michel-Bizot, Paris.
*Laminarol	132, r. de Turenne, Paris.
*Laminolode	29, av. de St-Mandé Paris.
*Laminolax	id.
*Lansoyl	5, r. de la Paix, Paris.
*Lantol Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
*Larocaïne	HOFFMANN LA ROCHE, 21, pl. des Vosges, Paris.
*Larosane Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Laryngolan	24, r. Jardel, Bordeaux.
*Laurenol	19, r. Drouot, Paris.
Lax	19, av. Secrétan, Paris.
*Laxadonal	LOUINET, 39, r. de l'Arcade, Paris.
Laxagarine	5, av. des Tilleuls, Paris.
*Laxamalt	LICARDY, 38, bd Bourdon, Paris-Neuilly.
Laxamer Lefèvre	52, rue Decamps, Paris.
Laxatif Châtel-Guyon Gubler	70, r. Legendre, Paris.
*Laxatifs Miraton	48, r. d'Alésia, Paris.
Laxatine Mory	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Laxatone Déjardin	10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
Laxaul	pl. Guillaume -le -Conquérant, à Falaise (Calvados).
Laxia Dannec'h	64, r. des Tournelles, Paris.
Laxinol-Vichy	PATRICE, à Vichy.
*Laxocholéine Tulivet	52, r. de Poissy, St-Germain-en- Laye.
*Laxogélose Tulivet	id.
Laxoil	74, r. Monge, Paris.

- Laxoléine**
Laxol Fraudin
Laxo-lin
Laxolip Henry
 ***Laxopeptine Girard**
Laxophore Brachin
Laxor
- Lebnol Thévenot**
Lécithine Adrian
Lécithine Clin
- ***Lécithine Vacheron**
Lécithine Vial
Lécithosine Rovin
Lenicade Brisson
 ***Lénicure-Vichy**
 ***Léniforme**
Léophani
- Leptandrine Royer**
 ***Leucagine**
Leucaginol
Leucobules Gallier
 ***Leucoseptyl**
Leucosérum
Levaine
- Levulose Rogier**
Levurase
- ***Levure B. 17**
Levure Boss
- Levure Coirre**
 ***Levure de bière**
- Levure de bière De-**
bouzy
Levure Déjardin
 ***Levure fraîche Myceta**
 ***Levurine extractive**
Couturieux
Levurine brute
Levuritin
- ***Levuromaltine Dejar-**
din
Libérine
Licardet Brisson
 ***Lichénose**
- ***Lientine Grémy**
Limita)
- ***Limol Churchill**
- MILLET, à Rambouillet.**
 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
 182, av. de Versailles, Paris.
 39, r. Schessin, Liège.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 à Joinville (Haute-Marne).
 Lab. Biologique de l'Île-de-
 France, 3, r. Laugier, Argen-
 teuil.
 à Dijon.
 9, r. de la Perle, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jac-
 ques, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 8, r. Vivienne, Paris.
 13, r. de Poissy, Paris.
 157, r. Championnet, Paris.
 94, bd des Batignolles, Paris.
 26, r. Pétrelle, Paris.
 11, square Marie-Louise, Bru-
 xelles.
 223, r. Saint-Martin, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 121, av. Gambetta, Paris.
 66, r. Nationale, Lille.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 56, bd Péreire, Paris.
 CHARMAISON, av. de Royat,
 Chamalières (P.-de-Dôme).
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 Lab. G. CESAR & B. BOSS, Be-
 sançon (Doubs).
 5, bd Montparnasse, Paris.
 ADRIAN, 9, r. de la Perle,
 Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.
 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
 4, r. Bellart, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
- id.
 FEIGEL, à Lutterbach
 (Haut-Rhin).
 DEJARDIN, 10, r. Parent-de-
 Rozan, Paris.
 CAPIN, Roquefort (Landes).
 157, r. Championnet, Paris.
 DUCLOY et C^{ie}, Arques, (P.-de-
 C.).
 14, r. de Clichy, Paris.
 Lab. ROMON, 6, r. Bridaine,
 Paris.
 12, r. Castiglione, Paris.

- ***Limonade Godfrin** 5, av. Watteau, Nogent-sur-Marne.
- Limonade hypotensive** PACHAUT, 130, bd Haussmann Paris.
- ***Linadéline** Lab. VARIOT, 151 bis, Grande-Rue, Villemomble.
- ***Lin Tarin** 6, r. Dombasle, Paris (XV^e).
- ***Lioncyl** 6-8, r. Lacretelle, Paris.
- Lipasonol** 30, r. N.-Dame-des-Victoires, Paris.
- ***Lipaurol** LECOQ et FERRAND, 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- Lipex** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- ***Lipiodol Lafay** 22, r. du Landy, St-Ouen.
- Lipobil** 29, pl. Wilson, à Denain.
- ***Lipo-Bismuth Ercé** 37, r. de Bourgogne, Paris.
- ***Lipocérébrine** LEMATTE et BOINOT, 52, r. Labruyère, Paris (IX^e).
- Lipochol Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- Lipocytol Grémy** 14, r. de Clichy, Paris.
- ***Lipodeterpénol Zyma** 4, r. Bellart, Paris.
- Lipogazes dermatologiques** LECOQ & FERRAND, 14, r. Gravel, Levallois.
- Lipoféine** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Lipogyre Ciba** id.
- ***Lipoïdes Iscovesco** 107, r. des Dames, Paris.
- ***Lipoïdine Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Lipol** 10, r. des Fleurs, Ronchin (Nord).
- Lypolysine Merminod** 49, r. de Paradis, Paris.
- Lipolysine Martinet** 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- ***Liposeptine** 2, pl. des Vosges, Paris.
- ***Liposplénine du D^r Groc** 40, r. d'Enghien, Paris.
- Lipothine** JOSSE, pl. Wilson, Denain.
- Lipo-Vaccins** 32, r. de Vouillé, Paris.
- Lipovita** 14, r. de Birague, Paris.
- Liqueur d'Hermès** 12, bd Saint-Martin, Paris.
- Liqueur Laprade** 49, r. de Maubeuge, Paris.
- Liqueur Laville** 20, r. Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- ***Liqueur peptophosphorique** ADRIAN, 9, r. de la Perle, Paris.
- Liqueur de Pittermont** 2, rue de Paris, à Douai.
- Liqueur Talobre** Saint-Girons (Ariège).
- Liqueur à la Thyroïdine Bouty** 3, rue de Dunkerque, Paris.
- Liqueur végétale Narud** 38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.
- Liq. organiques inject.** BOUTY, 3, r. Dunkerque, Paris.
- Liseronine** 19, r. Drouot, Paris.
- Listérine** 5, r. de la Paix, Paris.
- ***Listose Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
- ***Lita Cortial** CORTIAL, 15 bd Pasteur, Paris.
- Litharsyne Ferré** 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
- Liverine** 5, r. de la Paix, Paris.
- ***Lobéliane** LALEUF, 20, r. du Laos, Paris.

*Lobéline Sandoz
 *Lobuline
 Lofodol
 *Loraga
 Lortocarboul
 Lotion végétale Pachau
 Luargol
 Luatine
 Lual
 Luarsyl
 Luatol
 Luchon

Lucinine

Lucodal

*Ludin

*Lugocalcion

Lusitol

*Lusoforme

*Lutéovar

Lux-Gaillac

Lycétol Vicario

Lyciflore

Lycobile

Lyméogène

Lymphactol

Lynérol

*Lysacrème L. M. L.

*Lysarthrol

*Lysaxins L. M. L.

Lysiode

Lysol

Lysolats

Lysomol

3-5 r. de Metz, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

98, r. de Sèvres, Paris.

13, rue Pagès, Suresnes.

86, bd Port-Royal, Paris.

130, bd Haussmann, Paris.

21, r. Jean-Goujon, Paris.

2, av. Parmentier, Paris.

BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
 id.

21, r. Jean-Goujon, Paris.

C^{ie} Fermière de Luchon (Haute-Garonne).

18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.

2, quai Paul-Bert, Tours.

REY, 12, r. Montmartre, Dijon.

NOVALIS, Oullins (Rhône).

7, passage Thionville, Paris.

15, r. d'Argenteuil, Paris.

14 bis, r. de la République, à
 Ermont (Seine-et-Oise).

av. du Mar.-Foch, Gaillac (Tarn).

17, bd Haussmann, Paris.

HOURTOULLE, 11, r. des
 2-Ponts, Paris (IV^e).

115, r. St-Honoré, Paris.

26, r. Cambon, Paris.

4 bis, r. de Lyon, Paris.

112, r. des Pyrénées, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

GOBEY, 89, r. du Cherche-Midi,
 Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

10, r. St-Antoine, Paris.

65, r. Parmentier, Ivry (Seine).

65, r. Parmentier, Ivry.

HENDRIX, à Anvers (Bel-
 gique).

M

*Magbromyl

*Magiodyl

Maglose

Magnacalcine

Magneblyl

10, r. de la Mairie, Ivry (Seine).
 id.

178, r. Montmartre, Paris.

SANOVA, 41, r. d'Amsterdam,
 Paris.

126, r. de la Pompe, Paris.

- Magnécal** 54, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- Magnéclo** 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- *Magnécylthine D^r Tissot** 24, bd de Clichy, Paris.
- *Magnélax** FAURE et DUSSUEL, Aix-les-Bains.
Fontainebleau (Seine-et-Marne).
- Magnésia Régnier** SCOTT, 348, r. St-Honoré, Paris.
- *Magnésie Bismurée** 7, bd Denain, Paris.
- Magnésie Durel** 105, bd Malesherbes, Paris.
- Magnésie Carlo Erba** BRISSON & C^{ie}, 157, r. Champlonnet, Paris.
- Magnésie D^r Gustin** 5, r. de la Paix, Paris.
- Magnésie Henry** 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
- Magnésie hydratée** 81, bd Suchet, Paris.
- Magnésie Roy** 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- *Magnésio-Cacodyline** JAMMES, 86, r. Michel-Ange, Paris.
- Magnésion** 27, r. Poids-de-la-Farine, Marseille.
- Magnésium chloruré** 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
- Magnésium Grorichard** 12, pl. de la Révolution, Besançon.
- *Magnésium Hardy** 42, bd St-Marcel, Paris.
- (Sirop et Tablette-Bouillon)** 37, r. Galilée, Paris.
- Magnésol** Moret-sur-Loing (S.-et-M.).
- *Magnésotubes Robinet** 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- *Magnésouvules** ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- Magnétol** 10, r. Vignon, Paris.
- *Magnétone** 17, r. du Midi, Vincennes.
- Magnidia** 6, r. Bridaine, Paris.
- Magnogène** 12, r. Castiglione, Paris.
- *Magol Churchill** 10, r. de la Mairie, Ivry (Seine).
- *Magsalyl Mg** 17, r. du Helder, Paris.
- Maizena** P. AUBRY, 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
- *Malarsan** Brasserie FANTA, 77, rte d'Orléans, Montrouge (Seine).
id.
- *Maltase Fanta** 8, ch. de Montbrillant, Lyon.
- *Malt Barley** 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
- *Maltea Moser** à Roanne (Loire).
- *Malt français Déjardin** Juvisy-sur-Orge (S.-et-O.).
(extrait) 14, r. de Birague, Paris.
- Maltine Gerbay** 189, r. de Vaugirard, Paris.
- Malt kneipp** U. C. E. P., 5, rue Labroque, Strasbourg.
- Maltine-Phénix** 20, Fg Poissonnière, Paris.
- Malt Moritz**
- Maltolax**
- Malt-Oléol**

- *Maltosan** 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- *Malt Pailleté** 77, r. de Miromesnil, Paris.
- Malt Régina** 34, r. Pajol, Paris.
- Malt Strauss** 12, r. Broca, Paris.
- *Malt Wander** 151 bis, route de Joinville, à Champigny (Seine).
- Malzémose** 18, r. de Ménilmontant, Paris.
- Mamelle Endocrisines** 7, r. Biscornet, Paris.
- Fournier**
- Mamelline Meurice** 61, av. Louise, Bruxelles.
- Mammol** Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- *Mancobène** 32, r. de l'Ouest, Paris.
- Mandragol** GAILLON, 113, bd Voltaire, Paris.
- *Mangaïne** 71, r. Sainte-Anne, Paris.
- Manganéol** Usine du Blosset, Moulin-sur-Yèvre (Cher).
- *Manganésia** Produits Dannech, 64, r. des Tournelles, Paris.
- Mangano-Calcique** à Saint-Amand-Montrond.
- Manganoglobine** Lab. du Gastrocabone, Saint-Louis (B.-du-Rhône).
- *Mangano Phosphal Julien** 105, r. de Rennes, Paris.
- Mangaphos** 4, imp. de Béarn, Paris.
- *Mangarsenic** Dr LAVOUË, Rennes (I.-et-V.).
- Manglynol Ducatte** 31, r. Francs-Bourgeois, Paris.
- *Mangratinés** 163, r. de Flandre, Paris.
- Mannitine** 62, r. Carnot, Vernon (Eure)
- Marabout** 6, r. Trencavel, Béziers.
- Marcynase** 7, r. Princesse, Paris.
- *Marimine** 191, Fg St-Antoine, Paris.
- *Marinol** à Dieppe (Seine-Inférieure).
- Mariode** BERGER, 14, r. des Pyramides, Paris.
- Marnal** 10, r. du Quatre-Septembre, Paris.
- Marron d'Inde Dausse** 4, r. Aubriot, Paris.
- Marronine Huard** 3, av. Orléans, Paris.
- *Marrubène** 2, pl. des Vosges, Paris.
- *Marrubiase** COMTE, 60, r. St-Guilhem, Montpellier.
- *Marrucol** COIRIER, 69, av. du Maine, Paris.
- Marruséra** 133, r. Lecourbe, Paris.
- Marsyle Clin** 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Marubor** VALENTIN, 1, r. d'Arras, Béthune.
- Masbi** 7, pass. Thionville, Paris.
- Mas de la Ville** Arles-sur-Rhône
- Masglandol** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- *Maté Douglas** 62, Champs-Élysées, Paris.
- Matéine Dufert** 163, r. de Flandre, Paris.
- Matico de Grimault** 8, r. Vivienne, Paris.

- Maya Bulgare
 Médicament de Saint-Boes
 Medicoferments Boss.
 Medocain
 *Mégathion
 *Ménacrine
 *Menatol
 Menopausine
 *Menosedine
 Ménovarine
 Mensorrhine
 *Mensuosedyl
 Mentholina
 Méral
 Mercuriaux Vigier
 Mercurochrome 220
 Méroléol Salle
 Mesarca Roche
 *Mésoforme
 *Mésogastrine
 *Mesothine
 *Mesothorium Rhemda
 *Mésothorium Buisson
 *Métacuprol
 *Métaformine
 Métalase
 Métallosal
 Métasérum
 Metasulfol Vigier
 *Méta-Titane
 Métaux colloïdaux
 *Méta-vaccins
 Métharfer Bouty
 Métharsinate Clin
 Métharsol Bouty
 *Methylarisnates Bouty
 Méthylarsinate Vicario
 Méthylarsinate Vigier
 *Métophan
 *Métricine
 *Metritols
 Métrostyptal Grorichard
 Mexyl
 322, r. Saint-Honoré, Paris.
 par Orthez (Basses-Pyrénées).
 10, r. de la Viotte, Besançon.
 71, r. de la Course, Bordeaux.
 OLIVIERO, 41, r. Denfert-Rochereau, Paris.
 18, r. Ferdinand, Flocon, Paris.
 BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
 9, pl. de la Paix, Mulhouse.
 Demasles, à Vienne (Isère).
 41, r. Etienne-Marcel, Paris.
 EON, 3, r. des Roualries, Dinan (C.-du-N.).
 AUGIER, 2, r. des Lombards, Paris.
 GUIGNIER, Bois-Colombes.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 AMECOUSEMA, 25, r. St-Augustin, Paris (II^e).
 4, r. El-évir, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 37, av. Jules-Coutan, Ivry-sur-Seine.
 RHEMDA, 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
 id.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 5, r. François-Ponsard, Paris.
 AUBERT, 3, pl. Jussieu, Paris.
 252, lg. St-Martin, Paris.
 LEO, 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
 BOUTY, 3, r. de Dunkerque, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 MÉTADIER, à Tours.
 COUTUREUX, 18, av. Hoche, Paris.
 MÉTADIER, à Tours.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 HY, 61, av. de Choisy, Paris.
 LEBRETON, 23, gde Rue Asnières.
 127, bd St-Michel, Paris.
 12, pl. de la Révolution, Besançon.
 6, r. des Dames, Paris.

- *Mialbaine
 Micelliodé
 Micranyl
 *Microlyse
 *Mictasol
 *Mictophile
 *Mictoseptol
 *Mictualine

 Migrainol
 Minéraline du Dr Baud
 Minéralogène
 *Minergil
 Minérol
 *Miroxyl
 *Mitigans
 Moka du Travailleur
 Mokavène
 Molavose
 *Molène
 Mondorasme
 Moranyl

 *Moréthyl Dausse
 *Morisland

 Morofidol

 *Morrhualène Gautier
 *Morrhuéline Jungken
 Morrhuline Puy
 *Morrhuel
 *Morrhuxine
 *Morubiase Crosnier
 Morubiline
 Moruemalt

 Moruphyllé
 *Moruxase Abadie

 Mouches Albespeyres
 *Mucicarbos

 *Mucilaxine
 Mucilose
 *Mucinum

 Mucobarytine
 Mucogène Astier
 Mucoléine

 *Mucosodine
 Mugrizol Dumesnil
 Muqueuse Endocrisi-
 nes Fournier
- 8, r. Favart, Paris.

 GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
 10, r. Strasbourg, Paris.
 28, r. du Four, Paris.
 7, av. Marceau, Paris.
 29, fg de Bourgogne, Orléans.
 CLUZEL, 60, cours E.-Zola,
 Lyon.
 16, c. Gambetta, Lyon.
 14, r. de Biraguc, Paris.
 4, pl. Croix-Rouge. Lyon.
 77, r. M. romesnil, Paris.
 10, r. Richelieu, Paris.
 32, r. de l'Ouest, Paris.
 6-8, r. Lacretelle, Paris.
 36, r. de Verdi, Nice.
 16, r. de Rocroy, Paris.
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
 95, r. de Turenne, Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 CHEVILLON, 99, r. de Paris,
 Massy (S.-et-O.).
 7, r. Guillaume-Budé, Mont-
 geron.
 17 bis, avenue Parmentier,
 Paris.
 105, r. de Normandie, Cour-
 bevoie (Seine).
 à Grenoble.
 8, r. Vivienne, Paris.
 163, r. de Flandre, Paris.
 6, r. Chanoinesse, Paris.
 32, r. Joubert, Paris.
 U. C. E. P., 5, r. Labroque,
 Strasbourg.
 BOST, Villefranche (Rhône).
 3, pl. Intérieure St-Michel,
 Toulouse.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Lab. E. MILLET, à Rambouillet
 (S.-et-O.).
 id.
 id.
 CHANTEREAU, 26 bis, r.
 Dombasle, Paris.
 145, r. Yves le Coz, Versailles.
 45, r. Docteur-Blanche, Paris.
 LANDON, av. Baraduc, Châtel-
 Guyon.
 37, r. de la Fédération, Paris.
 10, r. du Plâtre, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.

- ***Murones du Dr Robert** **SILBERT RIPERT**, 30, r. Bénédict, Marseille.
Jacques 13, r. St-Agricol, Avignon.
Musclanol **FEIGNOUX**, 95, r. de Turenne, Paris.
Musculargyre 121, r. Victor-Hugo, Houplines (Nord).
Musculogenol 26, av. Observatoire, Paris.
 5 bis, rue des Haudriettes, Paris.
 ***Musculosine** **Byla**
Mustérole
Mutandine **GREMY**, 14, r. de Clichy, Paris.
 55, bd de Strasbourg, Paris.
 ***Muthanol** 4, impasse de Béarn, Paris.
Muthoquinol Lab. **SERVIÉ**, à Orléans.
Muxol 77, bd de Grenelle, Paris.
Muxyl 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
Mycodermine 122, r. du Cherche-Midi, Paris.
Mycolactine 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
 ***Mycolysine** **Doyen** à Valence-sur-Rhône.
Mycidol Badel Labor. **DULCIS**, pl. Clichy, Monte Carlo.
Mydriasine E. **DAUPEZ**, Capvern-les-Bains (Htes-Pyr.).
 ***Myoden** 14, r. de Birague, Paris.
Myodine Mauchant 168, bd St-Germain, Paris.
Myo-Serum Labor. **DULCIS**, pl. Clichy, Monte Carlo.
Myosine (forte et faible) 49, r. de Paradis, Paris.
Myostone Merminod 47, r. Bokanowski, Asnières.
 ***Myothermine** 89, r. Cherche-Midi, Paris.
 ***Myovarsyl** 74, qual Jemmapes, Paris.
Myrcol 30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.
Myrtanol à Vienne (Isère).
Myrtilline Demasle

N

- Nader** 6, rue de l'Ecole, Versailles (S.-et-O.).
 ***Nadolor** 191, fg St-Antoine, Paris.
Nadorine 25, r. Tocqueville, Paris.
 ***Naïodine Logeais** 22 bis, r. de Sully, Boulogne-sur-Seine.
Naphtocarbène **FAURE**, 80, r. du Rocher, Paris.
Narcotile Bengué 47, r. Blanche, Paris.
 ***Narcyl** 34, r. Sedaine, Paris.

- Narsénol
- Nasale Ymera
- *Nasargine
- *Nasobore
- Nasocaïne
- *Nasosulfolarsan
- *Natibaïne
- *Natirose
- *Natrostyl
- Nazilante
- *Nazinette
- Nazolène
- Nazophyl Darva
- Nécessaire d'Accouchement
- Néfitol
- Neigotan
- *Néocarsite
- *Néo-Arsycodile
- Néo-Asclérol
- *Néo-Biol
- Néoby
- *Néo-Calciline
- *Néo-chloral Nau
- *Néo-Collargol
- *Néo-Dmegon
- *Néo-Dmetys
- Néo-Dispositif Ravaut
- Néo-Emétinol
- Néoferrol
- Néofilhos le Perdriel
- Néo-Galyl
- Néoglobuline
- Néoiacol
- Néo-Iodure Ménard
- Néo-Kola Lumière
- Néolactine
- Néo-Laxatif Chapotot
- *Néol Bottu
- Néolides H. B.
- *Néolyse
- Néo-Mésarca Roche
- Néo-Mg
- *Néo-Neurosine
- *Néo-Pancarpine
- *Néophage
- Néo-Phanol
- Néophos
- SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- 28, r. de Seine, Paris.
- MAIRE, 171, r. de Belleville, Paris.
- MONGE, Oullins (Rhône).
- Lab. ANINAT, Nîmes (Gard).
- DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
- 27, r. de la Procession, Paris.
- 27, r. de la Procession, Paris.
- 127, bd St-Michel, Paris.
- ANINAT, Nîmes (Gard).
- GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
- ODILIA, 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
- 19, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
- LUCINIA, 154 bis, r. de Breteuil, Marseille.
- 24, r. de Monttessuy, Paris.
- 48, bd La Tour-Maubourg, Paris.
- 7, r. Galvani, Paris.
- 62, r. de la Tour, Paris.
- 45, r. Caumartin, Paris.
- 4, pl. du Val, à Vanves (Seine).
- TROUETTE-PERRET, 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
- 21, r. Violet, Paris.
- 21, Gde-Rue Argenteuil (S.-et-O.).
- 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- id.
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
- 2, r. de Rivoli, Paris.
- 5, r. de Wasselone, Strasbourg.
- 11, r. Milton, Paris.
- MOUNEYRAT, Villeneuve-la-Garenne (Seine).
- 65, r. d'Hauteville, Paris.
- 105, bd Malesherbes, Paris.
- 3, r. République, Lyon.
- 23, cours de la Liberté, Lyon.
- 73, av. de Mariville, Le Parc-St-Maur (Seine).
- 56, bd Ornano, Paris.
- 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
- id.
- 55, bd de Strasbourg, Paris.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 229, cours Gambetta, Lyon.
- 1, quai Aulagnier, Asnières.
- 5, r. François-Ponsard, Paris.
- JAMMES, 86, r. Michel-Ange, Paris.
- 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
- 74, quai Jemmapes, Paris.

- *Néo-Physiosthénine
Néo-Pituitairine
*Néoplalysines
*Néopulmine
Néoquinine Falières
Néoral
*Néo-Rhomnol
*Néo-Riodine Astier
Néosantal
Néo-Serosan
*Néospasmodyl
Néo-spermine
Néo-Sphérulines
*Néosuline Fornet
*Néothorium Millot
Néo-Tréparséan
*Néo-Trépol
*Néotrophène
Néovitalyne
Néphrine Bouty
Néphrine Byla
Néphrocrinol
Néphryl
*Neptal
Neptol
*Nergine Heudebert
*Nervocithine Tissot
*Nestosyl
*Neubryne
*Neurène
*Neuréol
Neurhémol Vinçon
Neuricure
*Neurinase
*Neurobore
*Neurocalcium
Neurodonal Koenig
Neurodose
*Neuroflorine
Neurogaïacol Dethan
Neurogénol
Neuroiodure Dethan
*Neurolipase
Neuro-Moka
DROUET & PLET, Rueil-Malmaison.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
49, r. de Paradis, Paris.
7, av. Marceau, Paris.
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
O. C., P., 71 r. du Temple, Paris.
62, r. de la Tour, Paris.
45, r. Docteur-Blanche, Paris.
Fabris, Chambéry (Savoie).
TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
132, av. Victor-Hugo, Paris.
172, rue d'Alésia, Paris.
(Voir : *Opothérapie Moncour.*)
Institut de Microbiologie, Sarebruck.
54, r. Bienfaisance, Paris.
COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
22, r. de la Sorbonne, Paris.
Lab. de Chimie appliquée, 22, bd du Couchant, Nanterre (S.)
28, r. de l'Hôpital-Militaire, Lille.
3, r. de Dunkerque, Paris.
26, av. de l'Observatoire, Paris.
Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
6, r. Parrot, Paris.
SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
(Voir : *Topique Nasal A. B. C*)
85, r. Saint-Germain, Nanterre.
34, bd de Clichy, Paris.
72, r. St-Dominique, Paris (VII^e).
10, r. St-Antoine, Paris.
62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
LAFARGE, 6, bd Arago, Paris.
à Auxerre (Yonne).
77, bd de Grenelle, Paris.
45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
23, r. des Moines, Paris.
Lab. Biol. de l'Île de France, 3, r. Laugier, Argenteuil.
THOMAS, Chemillé (M.-et-L.)
47, r. de Neuilly, Nanterre.
6, r. Chanoinesse, Paris.
11, r. A.-de-Neuville, Paris.
Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
11, r. A.-de-Neuville, Paris.
132, r. de Turenne, Paris.

- Neuro-Pax** Cte de GRAUWE, 16, r. de Rocroy, Paris.
- *Neuroplasma** 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.
- Neuroplasmine** id.
- *Neuropol** FAURE, 80, r. du Rocher, Paris.
- *Neurosine Prunier** 1, quai Aulagnier, Asnières.
- Neurosmon** 49, r. Paradis, Paris.
- Neurosomnyl** 229, cours Gambetta, Lyon.
- Neurosthyll** 4, r., Lamotte-Picquet, Paris.
- Neurotanic** GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- Neurotonine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- *Neurotrol Abadis** 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
- Neurotrope** MÉROBIAN, 37, r. Pajol, Paris.
- *Neurotrophol Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- *Neurovarol Douetteau** 20, fg. Saint-Honoré, Paris.
- Neurovoine** GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- *Neutralcaol** BENDERITTE, Vendôme, (L.-et-Ch.).
- Neutralisine Bureau** 86, bd Port-Royal, Paris.
- Neutrol** AMICI, Saint-Sylvestre, Nice.
- Neutrose Vichy** 49, av. de Wagram, Paris.
- Neuvaritol** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Névoral** R. FEIGNOUX, Lab. RAPEY, 95, r. de Turenne, Paris (III^e).
- Névralgésine** DÉBORDES, à Moulins (Allier).
- Névralgine Montsarrat** à Revel (Hte-Garonne).
- *Névralgol Brossard** 1, r. Cordouans, La Rochelle.
- Névraltéine Rogier** 56, bd Péreire, Paris.
- Nevraltine** COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
- Névrasite** 11, r. Joseph-Bara, Paris.
- Nevristhone** GERDA, 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
- Névropathyl Leisyn** 1 bis, r. Molitor, Paris.
- *Nevrosan** P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
- Nevroserum** 4, fg Stanislas, Nancy.
- Névrosol** 12, r. des Apennins, Paris.
- *Névrosthénine Freys-singe** 6, r. Abel, Paris.
- Nickobalt** 12, r. Paul-Baudry, Paris.
- *Nigérine Vincent** 14, av. Mac-Mahon, Paris.
- *Nisaméline** TROUETTE, 15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
- *Nitium Buisson** 98, r. de Sèvres, Paris.
- Nitroyl Leisyn** 1 bis, r. Molitor, Paris.
- Noctifen Léo** 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- *Noctisédyll** AUGIER, 2-4, r. des Lombards, Paris.
- *Nopirine Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
- *Normacol** 41, r. de Rome, Paris.
- *Normalarine** 18, r. de Beaune, Paris.

- *Normatensol
 Nortal Clin
 Nosodol
 Nosol Aguetant
 *Novacétine Prunier
 Novaline de Montfleury
 Novanol
 *Novargyre Guillaumin
 Novarine Vicario
 *Novarsénobenzol Billon
 Novarsénobenzol Corbière
 Novarsénobenzol Ercé
 Novarthritol
 *Novatropin Basuyaux
 *Noviode
 *Novo-Brol
 *Novo-Lactol
 *Novolug
 Novoptine
 Novoseptine
 Novoxol
 Nox
 Nuclabia
 Nuclarène Cognet
 Nucléarrhol Gabriel
 *Nucléarsitol Robin
 *Nucléasine
 *Nucléatol Robin
 Nuclécithine
 *Nucléigène
 Nucléo-fenugrec
 Nucléo-fer Girard
 *Nucléophorine
 *Nuclhémosé
 Nuclocithol
 *Nujol
 Nurécasé
 Nurserine
 Nutréine
 Nutréol
 Nutritine Déjardin
 *Nutro
 87, r. Lafayette, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 57, r. Edgard-Quinet, Nantes.
 36, q. Fulchiron, Lyon.
 1, qu. Aulagnier, Asnières (Seine).
 6, r. d'Alsace, Grenoble.
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 DARBANS, St-Chinian, Hérault.
 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois.
 Lab. SALVOXYL, 237, r. Lafayette, Paris (X^e).
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s-Seine.
 Et. DAGUIN, St-Maur (Seine).
 NOVALLIS, Oullins (Rhône.)
 Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 57 bis, av. La Motte-Picquet, Paris (XV^e).
 18, r. Daguerre, Paris.
 UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris.
 Lab. chimie physiologique, 37, r. Tivoli, Bordeaux.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).
 19, r. de Poissy, Paris.
 163, r. de Flandre, Paris.
 13, r. de Poissy, Paris.
 Collonges-Saint-Just-sur-Loire (Loire).
 Lab. CHEVILLON, 99, r. de Paris, Massy (Seine-et-Oise).
 FURNON, Ste-Sigolène (Hte-Loire).
 48, r. d'Alésia, Paris.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
 RÉMY & LECOQ, 6, pl. Clichy, Paris.
 28, av. Grammont, Tours.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 GRANDVAL, à Reims.
 6, c. Joseph-Thierry, Marseille.
 46, av. des Ternes, Paris.
 61, r. de Seine, Paris.
 109, bd Haussmann, Paris.
 1, bd St-Martin, Paris.

*Nutrobiase
Nutromalt

Nuxyl
Nyctal

10, r. Cimarosa, Paris (XVI^e).
151 bis, route de Joinville,
Champigny (Seine).
26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
DURET & RÉMY, Asnières.

O

Occi-Gourme
Océanine
*Ocréine Grémy
Odarsol
Oderma
Odynal Chevalier
Oenase Couturieux
*Oenophos
Oenoquinol
*Oéréliode

Oïo-Thyroidine

*Olbia

Oléobiline
Oléo-Bi-Roche
Oléo-Calcium

*Oléocidase
Oléodermine Vincent
Oléodine
*Oléoformine«Corbière»
Oléogazeur
Oléo-Iode Dubois
Oléojasol
Oléol
Oléolaxine
*Oléo-Mel
Oléomucilaxine

Oléo-Psyllium

Oléo-Sérums

*Oléovules

Oléthyle Benzyle
Otiolase Corbière

4, av. de Brazza, Romainville.
52, r. La Bruyère, Paris.
14, r. de Clichy, Paris.
COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fo-
sés-Saint-Jacques, Paris.
Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).
à Varennes-sur-Allier.
18, av. Hoche, Paris.
29, pl. Bossuet, Dijon.
12-14, r. Fery, Reims.
BOUVOT, Auvers-sur-Oise (S.-
et-Oise).
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois
Bruxelles.
MOUNEYRAT, Villeneuve-la-
Garenne (Seine).
2, r. Maréchal-Pétain, Nice.
21, pl. des Vosges, Paris.
MAÜRES, à Port-de-Penne
(Lot-et-Garonne).
48, r. d'Alésia, Paris.
14, av. Mac-Mahon, Paris.
Pont-à-Celles (Belgique).
27, r. Desrenaudes, Paris.
122, fg. St-Martin, Paris.
16, bd. Pereire, Paris.
19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
BRUN, Demi-Lune, Lyon (Rh.).
5, av. des Tilleuls, Paris.
DELFOUR, Pouillon (Landes).
MILLET à Rambouillet (Seine-
et-Oise).
Lab. ADLER, 36, r. des Francs-
Bourgeois, Paris.
Route de Cimiez, Nice.
SFEAT, 15, r. Catulienne, St-
Denis.
122, fg. S-Honoré, Paris.
27, r. Desrenaudes, Paris.

- Oliricin Hardy
 *Olivéol Etiévant
 *Olkalan
 *Onction Angelini
 Onction Leisyn
 Ondanol
 Onguent Fréval
 Onguent Ilon
 Onguent Ivula
 Onguent Pyorrhépha-
 gine
 Onguent Salas
 Ophorine
 *Ophtalmine Leprince
 Ophtalmo-vaccin Sa-
 lantale
 *Opobyl
 *Opocalcium
 *Opocalcium Irradié
 *Opochlorine
 *Opochol
 *Opocobalt
 Opocrinases
 *Opodermyl
 *Opoferrine vitaminéo
 Opogénines
 Opoglandéol Fray
 *Opolases (voir *Am-
 polases)
 Opolaxyl Corbière
 *Oponuclyl irradié
 Trouette-Perret
 Opopédol
 Opopeptol
 *Opophytol
 *Oposérum
 Opositoires opothéra-
 piques Pellissier
 *Oposynergines
 *Opothérapie Bouty
 *Opothérapie Byla
 *Opothérapie Carrion
 Opothérapie Chaix
 Opothérapie Chevreton
 *Opothérapie Choay
 *Opothérapie du D^r
 Frayssé
 Opothérapie Fortin
 *Opothérapie Fournier
 Opothérapie Fumouze
 Opothérapie Henning
 42, bd St-Marcel, Paris.
 BRUN, Demi-Lune, Lyon.
 SERRE, 7, pl. Pey-Berland,
 Bordeaux.
 61, r. de Seine, Paris.
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 SAUBA, 1, r. d'Enghien, Paris.
 84, r. Rochechouart, Paris.
 31, r. Illzach, Mulhouse.
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,
 La Garenne (Seine).
 Croissy-sur-Seine.
 132, r. de Turenne, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 62, r. de la Tour, Paris.
 42, Grandes Arcades, Stras-
 bourg.
 BAILLY, 15-17, r. de Rome,
 Paris.
 121, av. Gambetta, Paris.
 121, av. Gambetta, Paris.
 132, r. Turenne, Paris.
 TÉTARD, Beauvais (Oise).
 83, bd de la Villette.
 132, r. de Turenne, Paris.
 BENSIMON, 36, r. des Martyrs,
 Paris.
 121, av. Gambetta, Paris.
 40, r. Bellechasse, Paris.
 DURAND, Aigues-Mortes.
 163, r. de Flandre, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 15, r. des Immeubles-Indus-
 triels, Paris.
 ISCOVESCO, 107, r. des Dames,
 Paris.
 105, bd Malesherbes, Paris.
 D^r TESTART, Chalais (Char^{te}).
 id.
 33, av. de Villiers, Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 10, r. de l'Orne, Paris.
 52, r. La Bruyère, Paris.
 48, r. Théoph.-Gautier, Paris.
 47, r. de Neuilly, Nanterre
 (Seine).
 35, r. Clerc, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 78, fg. Saint-Denis, Paris.
 49, r. de Paradis, Paris.

- Opothérapie "Le Pecq"** 11, r. Beautreillis, Paris.
***Opothérapie Moncour** 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Opothérapie Richard 79, av. d'Orléans, Paris.
Opothérapie Richter 49, r. Paradis, Paris.
Opothérapie U. T. A. P. THIVISSEN, 13, r. Sainte-Véronique, Liège.
Opothérapiques Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
***Opothérapiques Pélissier** 33, av. de Villiers, Paris.
Optonine 20, r. des Martyrs, Paris.
***Opo-vacuoline (Voir vacuoline)**
Opo-veininge 10, r. Maubeuge, Paris.
***Opozones Lumière** 23, cours de la Liberté, Lyon.
Opsine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
Opsolysine 7 à 13, r. Saint-Maurice, Nanterre (Seine).
***Opsomyl A et B.** 37, r. de Bourgogne, Paris.
***Optalidon Sandoz** 3 et 5, r. de Metz, Paris.
***Optraex** 16-22, r. des Orteaux, Paris.
Opunsine 94, r. Michelet, Alger.
***Orargol** Lab. AMICROS, 9, bd Edgar-Quinet, Paris.
Orarigène 35, av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
***Orchidine** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Orchitine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
Orchitine Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
Organocalcoine 121, av. de St-Ouen, Paris.
Orge germé Fanta 77, rte d'Orléans, Montrouge.
Orianol GENTON, à Petit-Quévilly (S.-Inférieure).
Oriphol 8, r. Richer, Paris.
Ormatol E. ROBINEAU, 80, rte des Petits-Ponts, Drancy (Seine).
Orpranor LOUVEL, Elbeuf (S.-I.).
Orthobiline 37, r. Galilée, Paris.
***Ortho-Gastrine** LEBLOND, 51, r. Gay-Lussac, Paris.
***Orthogénol** Lab. BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
***Orthozomine** LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
Osmoléine 26, r. des Moines Paris.
Osmo-Vaccins P. L. Lab. BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris.
Ossical ROBERT et CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.
***Osteline** Lab. Rissa, 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
***Ostéoglandulol** 14, r. des Pyramides, Paris.
Ostéo-hépatine 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.

- Ostéopeptine**
Ostomalt
 * **Ostreine Buisson**
 * **Otalgol**
Oto-Antiscérol
Oto-Draineur
Otolan
Oto-vaccin Salantale
 * **Ouabaine Arnaud**
Ouabaine Deglaude
 * **Ouataplasme Langlebert**
Ouate Rhinol
 * **Ovaire Fournier**
Ovairine
Ovaridine Meurice
Ovarids
Ovarigène Disdier
Ovarine Dubois
Ovarine Henning
Ovarine Meurice
 * **Ovarine Optima**
 * **Ovarine Tisy**
Ovarose
 * **Ovaro-Thyroidine**
Ovex Léo
Ovigénine Bouty
Ovo-biol
Ovo-Cao
 * **Ovo-lécithine Billon**
Ovomaltine
Ovothyrol
Ovules à l'Inolène
Ovules Amicros
 * **Ovules Chaumel**
Ovules Derma
Ovules Evine
Ovules au gonagone
Ovules Gynol
Ovules Halogènes du Dr Bern
Ovules Halleana
Ovules Ivula Pearson
Ovules Magida
 * **Ovules Néothorium**
Ovules Patrat
- DRAPIER, Lucquy (Ardennes).**
 46, r. Claude-Lorrain, Lille,
 98, r. de Sèvres, Paris
 21, r. Feydeau, Paris.
 6 pl. Cambronne, Paris.
 5, r. Emmanuel-Liais, Cherbourg.
 24, r. Jardel, Bordeaux.
 42, Gdes Arcades, Strasbourg.
 27, r. de la Procession, Paris.
 6, r. d'Assas, Paris.
SABATIER, 10, r. Pierre-Ducreux, Paris.
DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 62, r. Notre-Dame, Bordeaux.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
 40, av. Lamotte-Picquet, Paris.
 49, r. de Paradis, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 95, r. de Turenne, Paris.
 58, r. St-Placide, Paris.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 2, r. de Compiègne, Paris.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 42, r. Mont-Cenis, Paris.
 9, bd Edgar-Quinet, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.
 16, r. Barbette, Paris.
 54, fg. St-Honoré, Paris.
 Chaussée d'Ixelles, Bruxelles.
 3, pl. Int. St-Michel, Toulouse.
 4, imp. de Béarn, Paris.
J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).
 56, r. des Dames, Paris.
MILLOT, 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
 61, r. de Seine, Paris.

- *Ovules Rhemda
 *Ovules Roche
 Ovules Uxora
 *Ovules-Vaccins Salan-
 tale
 Ovules-Vaccins Gol-
 denberg
 Ovules Vézès
 Ovunéol Bottu
 Oxitane

 Oxycyanure d'hydrar-
 gyre
 Oxy-Dents C. R. S.
 Oxyde orangé de Hg
 ophtalmoforme
 *Oxydothyridine Paris
 *Oxydovarine Paris
 Oxydrol

 Oxygénase

 Oxygénés du Dr Prim
 *Oxy-Injecteur du
 Dr Fialip
 *Oxyléine
 Oxylisine

 *Oxymenthol Perraudin
 *Oxymuth Saca
 Oxynargyl

 Oxyol Leisyn
 Oxytane

 Oxyquinothéine

 Oxythymol

 Oxy-Thymoline
 Oxytoires Sorin
 *Ozobiase

 Ozodor
 Ozol
 Ozonair

 57, r. d'Alsace, Courbevoie.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 DHAUSSY, à Mennevret (Aisne)
 42, r. des Grandes-Arcades,
 Strasbourg.
 IVAGO, 17, r. de Provence,
 Paris.
 52, bd du Temple, Paris.
 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 CASENEUVE, Saint-Cyprien
 (Dordogne).
 GUILLAUMIN, 168, bd Saint-
 Germain, Paris.
 264, bd Voltaire, Paris.
 Lab. DULCIS, pl. Clichy, Monte-
 Carlo.
 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
 id.
 POINTET et GIRARD, 30,
 r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 Dr CHAPELLE, 8, r. Vivienne,
 Paris.
 27, r. Fourcroy, Paris.
 23, av. de la Motte-Picquet, Pa-
 ris.
 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
 LAMBERT, 6, r. de Longchamp,
 Vichy.
 21, r. Chap'al, Paris.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 BESNARD, 56, r. des Dames,
 Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 CASENEUVE, St-Cyprien (Dor-
 dogne).
 S. A. L. P., 91, r. Marietton,
 Lyon.
 GLORY, 38 bis, bd Beaumar-
 chais, Paris.
 GODFRIN, à Nancy.
 TROMBETTA, à Blain (L.-Inf.).
 37, r. de Marly, à Rueil-Mal-
 maison.
 Lab. SERVIER, Orléans (Loiret)
 à Avignon.
 2, r. de Vienne, Paris.

P

- Pacyl** 8, r. de Prague, Paris.
Pain d'amandes au gluten frais 37, r. du Rocher, Paris.
***Pain essentiel Heudebert** 85, r. de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
Pain Euréka 74, r. du Château, Boulogne-sur-Seine.
***Pain massé Sana** Gaillac (Tarn).
***Pains spéciaux Heudebert** 85, r. de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
Pains de régime Mil-liat 319, av. Berthelot, Lyon.
Pain Redeuil 7, r. Couche, Paris.
Pain de santé Martin à Montreuil-Belfroy (Maine-et-Loire).
Païphos 9, r. Pérignon, Paris.
Paloval Pharm. de l'Etoile, Strasbourg.
Paludase Corbière 27, r. Desrenaudes, Paris.
Paludol PATRICE, à Vichy.
Pampryl 2, villa de la Terrasse, Paris.
Panbiase antiphy - mique BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
***Panbiline** à Annonay (Ardèche).
Panbromine 17, r. Cadet, Paris.
Pancalbiose 1, r. Chancelier, Périgueux.
***Pancarbo** P. HARDY, 42, bd St-Marcel, Paris.
Pancréadénine OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
***Pancréanne** 10, r. Poncelet Paris (XVII^e).
Pancréas-Endocrisines Fournier 7, r. Biscornet, Paris.
***Pancréastase Defresne** 19, r. Jacob, Paris.
Pancréatokinase 54, fg St-Honoré, Paris.
***Pancréatose Idon** 89, r. St-Georges, Nancy.
***Pancrébile** D^r AUBERT, 3, pl. Jussieu, Paris.
***Pancrépatine Laleuf** 20, rue du Laos, Paris.
Pancrésal SCHREIBER, av. du Bois, Luxembourg.
***Pancrinol du D^r Debat** 60, r. de Prony, Paris.
Pandigitale Houdas 26, r. Saint-Claude, Paris.
Pandigitale OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
***Panfébrine** 17 bis, av. Parmentier, Paris.

- Panfortan**
***Pangaduine**
***Pangastrol**
***Pangestyl Narty**
***Panglandine Coutu-
rieux**
Pangynol
Panhémol
Panhistol
Panlacto-Midy
Panlax Allard

Panlutéine
Panopepton

Panophytes

***Panostyl**
Panphylase
Panprocol
Pansomnine
***Panthésine**
**Pantofort du Dr Boveil
(granules)**
**Pantolaxine du Dr Bo-
veil (cachets)**
Pantokinon
***Pantopon Roche**
Panurot Tissot
Panvalérase
Panvalérine Delattre
***Panxylon**

Paospholine
***Papaine Trouette-Per-
ret**
***Papaveryl**

Papavhydrine

Papier Albespeyres
Papier du Dr Balme
Papier Fayard
Papier Gicquel
***Papier iodogène Ey-
monnet**
Paquets P. C. L.
Paquets Védé
Paracarbochloryl
***Paradoline**

Paraffinol

Paraffinoléol Hamel
Paraformine
- 4, ch. de la Muette, Paris
 16, r. du Petit Musc, Paris.
 STOULS, 156, av. Victor-
Hugo, Paris.
 134, bd. Péreire, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.

 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse
 90, av. des Ternes, Paris.
 4 bis, r. de Lyon, Paris (XII^e).
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 Lab. GMET, 27, fg. Mont-
martre, Paris (IX^e).
 2, rue des 2-Ponts, Paris.
 ROBERTS, 5, r. de la Paix,
Paris.
 TROUETTE-PERRET, 15, r.
des Immeubles-Industriels,
Paris.
 57, r. Mathurin Régnier, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 222, r. Duguesclin, Lyon.
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 SANDOZ, 3-5, r. de Metz, Paris.
 1, r. Lassalle, Lyon.

 id.
 94, r. Michelet, Alger.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 34, bd de Clichy, Paris.
 36, av. Niel, Paris.
 10, r. du Bac, Paris.
 E. LOGEAI, 24, r. de Silly,
Boulogne-sur-Seine.
 21, r. Mouton-Duvernét, Paris
 15, r. des Immeubles-Industriels,
Paris.
 Lab. ORRILLARD, 245, r. de
Vaugirard, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,
Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 56, bd Péreire, Paris.
 94, bd Batignolles, Paris.
 64 r. des Tournelles, Paris.
 139 c. Tolstoi, Lyon-Villeur-
banne.
 163, r. de Flandre, Paris.
 2 et 4, pl. Gambetta, Paris.
 76, r. Réaumur, Paris.
 99, r. de Paris, Massy (Seine-et-
Oise).
 LANDON, av. Baraduc, Châtel-
Guyon.
 17, r. de Berri, Paris.
 172, r. d'Alésia, Paris

- Paragar** 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
- Paragélose** 22, r. des Martyrs, Paris.
- Paraghurt Léo** 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- *Paralactine Eyla** 26, av. Observatoire, Paris.
- *Paralaxol** TULIVET, 52, r. de Poissy à St-Germain-en-Laye.
- Paralymphine** 32, r. de Grenelle, Paris.
- Paratétanine** 17, r. Bourgelat, Lyon.
- *Parathyrocalcine Moncour** 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- Parathyroïde Endocrines Fournier** 7, r. Biscornet, Paris.
- Paratone Léo** 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- Paratexine Ducatte** 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Parlax** F. LATOUR, 71, r. Douy-Delcupe, Montreuil-sous-Bois.
- *Parolagar** 348, r. St-Honoré, Paris.
- *Paroxyl** THIRIET & C^{ie}, 26 et 28, r. des Ponts, Nancy.
- *Passiflorine** REAUBOURG, 2, r. Boulecaut, H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
- *Passival** BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
- *Pastapalm** BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse).
- Pastilles Bala** 5, av. Victoria, Paris.
- Pastilles Brachat** GIRAUD & JEANDET, 217, r. La Fayette, Paris.
- Pastilles Contre-ut** 199, r. St-Denis, Paris.
- Pastilles Fayès** Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
- Pastilles Helgè** 9, r. Dieu, Paris.
- Pastilles Houdé** 4, ch. de la Muette, Paris.
- Pastilles Irsi** 10, r. Cyrano-de-Bergerac, Paris.
- Pastilles Libéria** GOÿ, 23, r. Beautreillis, Paris.
- *Pastilles M. B. C.** 16, r. de Rocroy, Paris.
- Pastilles Méry** 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Pastilles Midy** 48, r. d'Alésia, Paris.
- Pastilles Miraton** 36, r. de Verdi, Nice.
- Pastilles Norvégiennes** 8, r. Vivienne, Paris.
- Pastilles Palangie** 46, r. de Saintonge, Paris.
- Pastilles Paterson** 24, r. de Montesuy, Paris.
- Pastilles Violettes A. B. C.** 24, bd des Capucines, Paris.
- Pastilles Vichy-Etat** 18, r. de Maubeuge, Paris.
- Pastils Meran** 21, r. Feydcau, Paris.
- Pâte Aseptor** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Pâte Berthé** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Pâte dentifrice** O. C. P., 108, r. de Picpus, Paris.
- Pâte dentifrice Philipps** NEYRET, 35, r. de la Bourse, Lyon.
- Pâte Dermos** 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
- Pâte Jane**

- * Pâte Mireille**
Pâtes lacto-maltées du
D^r Jacquet
Pâte Neyret
Pâte pectorale du P^r
Williams
Pâtes Sana
Pâte Silka
*** Pâte Spécia**
Pâte thionique Ram-
baud
*** Pathoïysine**
Pausodyne
*** Pavérinol**
*** Paveron Dausse**
*** Paxène**

Paxol

Pebromon Henry
Pectine
Pectoral des Dames de
France
Pellicules radifères du
D^r Vallet
*** Pélospanines**

Pelvisédol

Penghaivar Vicario
*** Pennès (Produits)**
Pepiodon Henry
Pepsenca Roberts
*** Pepsodia**
*** Peptalac**

*** Peptalmine**
*** Pepticol**

Peptidol
Peptobrol Kopp
Peptocalcine
*** Peptodiase**
*** Pepto-fer du D^r Jaillet**
Pepto-ferrine

*** Peptogil**
*** Peptokola Robin**
*** Peptonal**

*** Peptonate de fer Robin**
Peptone Byla
Peptone Catillon
Peptone Chapoteaut
- Lab. LEGENDRE & C^{ie}, sec-
tion D. S., Houilles (S.-et-O.).
89, r. de Rivoli, Paris.
- 35, r. de la Bourse, Lyon.
66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.)
- Gaillac (Tarn).
26, ch. de la Madeleine, Nantes.
21, r. Jean-Goujon, Paris.
38, r. Gay-Lussac, Paris.
- 142, r. de Picpus, Paris.
98, r. d'Angoulême, Paris.
LALEUF, 20, r. du Laos, Paris.
4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
MILLET & GUILLAUMIN, 8,
r. Richer, Paris.
- Lab. ORRILLARD, 245, r. de
Vaugirard, Paris.
39, r. Sclessin, Liège.
17, r. Cadet, Paris.
119, r. de Sèvres, Paris.
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- FOURNIER Frères, 7, r. Bis-
cornet, Paris.
Pharmacie C^{ie} de France, 21, r.
des Nonnains-d'Hyères, Paris.
17, bd Haussmann, Paris.
3, r. de Dunkerque, Paris.
39, r. Sclessin, Liège (Belgique).
5, r. de la Paix, Paris.
- 24, r. Paul-Bert, Paris.
Sté des Spécial. diététiques et
diurétiques (COW et GATE).
22, r. des Belles-Feuilles, Paris,
21, r. Chaptal, Paris.
- 13, av. Maréchal-Foch, Dam-
marie-les-Lys (S.-et-M.).
7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
19, r. des Foulons, Strasbourg.
22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.)
ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.
DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
- 77, r. Miromesnil, Paris.
13, r. de Poissy, Paris.
DURET & REMY, à Asnières
(Seine).
- 13, r. de Poissy, Paris.
26, av. de l'Observatoire, Paris.
3, bd Saint-Martin, Paris.
8, r. Vivienne, Paris.

- Peptone Cornélis**
***Peptone Vassal**
Peptosodine
***Peptosthénine Choay**
Peptovaleriane du Dr
Gigon
Peptozym
Peptyl
- Peraziodol**
***Percaïne-percaïnal**
- *Péricols Legros**
***Péristaltine Ciba**
- *Perles Jeka**
Perles réductrices
***Perles Taphosote**
Peroxydines
***Persodine Lumière**
Pertussin Salle
***Perubore**
Perunhyl
Pérusol
PeruvioI
Phagocytine Bureau
Phagolysine
***Phagostyl**
***Phagostyl Mangané**
***Phaguryl**
- Pharmetan**
***Pharyngaseptyl**
Pharynxoil
Phelaxine Moulines
***Phénacodine**
Phénalgéine
Phénaseptyl
Phénol Bobœuf
Phiamine Coursaget
Philocardine
Philodermine
- *Philogastrine**
Philogyne
- Philtroline**
- *Phléboguil**
Phlébosine M et F.
***Phlébotonine**
- Phlyctol**
Phora
- OPTIMA, 78, Gde-rue au Bois, Bruxelles.**
28, r. Hôpital-Militaire, Lille.
12, r. Mademoiselle, Paris (XV°),
48, r. Théophile-Gautier, Paris.
25, bd Beaumarchais, Paris.
- 90, av. des Ternes, Paris.**
COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
37, r. de Bourgogne, Paris.
CIBA, 113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
13, r. St-Agricol,, Avignon.
PATRICE, à Vichy.
20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
135, r. de Rome, Paris.
23, c. de la Liberté, Lyon.
4, r. Elzévir, Paris.
1, pl. Victor-Hugo, Paris.
80, r. du Rocher, Paris.
114, r. du Temple, Paris.
REBOUL, Pt. Ste-Maxence,
86, bd Port-Royal, Paris.
14, r. Cantin, Courbevoie.
A. PARIS, 4, r. La-Motte-Picquet, Paris.
A. PARIS, 4, r. La Motte-Picquet, Paris.
BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
61, av. Louise, Bruxelles.
20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
8, r. Vivienne, Paris.
à Villeneuve-la-Guyard (Yonne).
132, av. Victor-Hugo, Paris.
29, r. de Metz, Toulouse.
4, pl. Wilson, Limoges.
41, r. de Rome, Paris.
9, r. Porte-Côté, Blois (L.-et-C.).
25, r. Petits-Hôtels, Paris.
13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier)
34, r. Saint-Lazare, Paris.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
MARTINET, 16, r. du Petit-Musc, Paris.
H. SALLÉ, 4, r. Elzévir, Paris
54, Fg St-Honoré, Paris.
MARTINIE, 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
37, r. de Bourgogne, Paris.
LANG, 14, r. de Marignan, Paris.

- Phos**
Phosbiogyl
Phoscalgène
Phoscamine
Phoscol
Phosféryl Fournier
Phoshémoquinol
Phosiodine
Phosma
***Phosoforme**
Phosol Quinet
***Phosorine**
***Phosote Lambiotte**
Phosphalose
***Phospharsol**
Phospharsinol
Phospharsyl colloïdal
du D^r Pinard
Phosphate Geffroy
***Phosphates Pinard**
***Phosphate Vital de**
Jacquemaire
Phosphatine Falières
***Phosphatol Vitaminé**
Irradié
***Phosphobrom**
Phospho-Calcine
Phosphodéine
***Phospho-Fluor-Beynet**
***Phospho-Gaiacol Mary**
Phosphogénase
***Phosphogène Favri-**
chon
Phosphoglycérate de
Chaux Chapoteaut
Phospho-Iodine
***Phospholéose Demasles**
***Phosphomagnésium**
***Phosphopinal Juin**
Phosphorescine Leker
Phospho-Serum
Phosphotal Clin
Phospirine
Phostaniol
Phostone
***Phostyl**
Phusasmine
Phydermol
- 213, r. St-Honoré, Paris.
 P. FONTANIER, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 LESCAROUX, à Châteauroux
 (Indre).
 14, r. de Birague, Paris.
 LESCAROUX, à Châteauroux.
 7, r. Biscornet, Paris.
 21, r. des Roses, Dijon.
 GRAVIER, 64, r. d'Orsel, Paris.
 56, r. N.-D.-de-Lorette, Paris.
 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.
 143, r. du Temple, Paris.
 VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.
 20, r. Dumont-d'Uryville, Paris.
 62, r. Marengo, St-Étienne.
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 MORAND, à Auray (Morbihan).
 88, bd Saint-Denis, Courbevoie.
 DELAMARE & C^{ie}, Romilly-
 sur-Andelle (Eure).
 88, bd St-Denis, Courbevoie.
 à Villefranche (Rhône).
 6, r. de la Tâcherie, Paris.
 15, r. Catulienne, St-Denis
 (Seine).
 22, r. Poncelet, Paris.
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 165, r. Saint-Honoré, Paris.
 32, r. de l'Ouest, Paris.
 37, r. Tivoli, Bordeaux.
 à Saint-Symphorien - de - Lay
 (Loire).
 8, r. Vivienne, Paris.
 46, Gde-Rue, Boulogne-s.-Mer.
 Vienne (Isère).
 22, r. Poncelet, Paris.
 10, impasse Milord, Paris.
 13, r. Marbeuf, Paris.
 62, r. Dupont-des-Loges, Rennes.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,
 Paris.
 37, r. de Marly, Ruell (S.-et-O.).
 Lab. COMTOS à Feschés-le-Châ-
 tel (Doubs).
 BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris.
 Lab. P.Y. 58, bd R.-Wallacé,
 à Putaux.
 E. ROBINEAU, 80, rte des Pe-
 tits-Ponts, Drancy (Seine).
 70, r. Boucicaut, Fontenay-aux-
 Roses.

- *Phylactone Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- *Phylla Dyn 5, r. Claude-Decaen, Paris.
- Phyllosan 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
- Phymo-Stéryl Leysin 1 bis, r. Molitor, Paris.
- Physéine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- Physioscyamine 44, r. Gambetta Biarritz.
- *Physiosthénine DROUET & PLET, 37, r. de Marly, Ruell-Malmaison.
- *Physocrisine 7, r. Biscornet, Paris.
- Phytalgine P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- *Phytergol 24, r. Paul-Bert, Paris.
- Phyteta 7, pass. Thionville, Paris.
- *Phytinate de Quinine 109-113 bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Ciba
- *Phytine Ciba id.
- *Phytogénine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- Phytol 3, r. Chanez, Paris (XVI^e).
- *Phytolécithine 77, r. de Miromesnil, Paris.
- *Phytomarine 132, r. de Turenne, Paris.
- *Phytosplénol PLÉ, 111 bis, r. de Turenne, Paris.
- Phyto-Tanin D^r A. Petit, à Angoulême.
- Phytothérapie Coirre 5, bd Montparnasse, Paris.
- *Pilka (Gouttes) 4, r. Bellart, Paris.
- Pilules Anhépatiques 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
- Pilules antidiabétiques 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Midy
- Pilules Bengué 47, r. Blanche, Paris.
- Pilules Blancard 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
- Pilules Bosredon GIGON, 25 bd Beaumarchais, Paris.
- Pilules de Brides 41, r. de Verneuil, Paris.
- *Pilules bronchotoniques Arco 38 bis, Beaumarchais, Paris.
- Pilules Clauss GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
- Pilules Clérambourg 10, r. St-Antoine, Paris.
- Pilules Culpier 30, r. Louis-le-Grand, Paris.
- Pilules Cuticura 3, av. Lowendal, Paris.
- Pilules Doumer à Annonay (Ardèche).
- *Pilules du D^r Debouzy LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
- Pilules du D^r Moustier St-Vallier (Drôme).
- *Pilules du D^r Séjournet 62, r. de la Tour, Paris.
- Pilules énergétiques 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- Fradier
- Pilules Eparvier 26, Grande-Rue, Lyon.
- Pilules Gip 11, r. Joseph-Bara, Paris.
- Pilules Hardy 13, r. Minimes, Le Mans.
- *Pilules héléniennes 37, r. Pajol, Paris.
- Naud
- Pilules Hémabione Lab. MOURGUES, Chemin-Neuf, Ganges (Hérault).
- Pilules d'Hermal 28, r. Saint-Claude, Paris.
- Pilules Laville 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Pilules Lartigue 78, fg. Saint-Denis, Paris.
- *Pilules Lemary 14, r. Palais-Grillet, Lyon.

- *Pilules Mthuranées du D^r Boveil** 1, r. Lassale, à Lyon.
Pilules de Moussette 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
***Pilules Myosotis** 41, r. de Rome, Paris.
Pilules Nella 4, r. Jean-Goujon, Paris.
Pilules Oco 87, r. Lafayette, Paris.
Pilules oporénales 132, r. de Turenne, Paris.
Pilules Panma D^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
***Pilules Philippe** 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
Pilules Pocquin 46, r. République, Nolay (Côte-d'Or).
Pilules Prophylac - 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
tiques Christiaens
Pilules Purgatives du D^r Debaut 147, faub. Saint-Denis, Paris.
Pilules de Quassine 6, r. Abel, Paris.
Frémint
Pilules Roya 41, r. de Rome, Paris.
Pilules Salvia 139, av. Émile-Zola, Paris.
Pilules stibiées 2, r. Volney, Paris.
***Pilules V.-E. Doumer** Bomel, Annonay (Ard.).
Pinofluol 3, r. de Surène, Paris.
Pinolac ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.
Pinoléum id.
Pipérasol Tissot 34, bd de Clichy, Paris.
***Pipérazine Midy** 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Pipérazine R. B. La- 74, quai Jemmapes, Paris.
grave
Pipettes nasales M. S. 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Piscidia Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
Pitol 2, r. de Paris, Douai.
Pituglandol Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
***Pituitobine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
Pituitairine OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Pixel Koehly 117, r. Vieille-du Temple, Paris.
Placenta Endocrisines 7, r. Biscornet, Paris.
Fournier
Placentodose 47, r. de Neuilly, Nanterre.
***Plagéine Soulas** 119, r. de Sèvres, Paris.
***Plasma de Quinton** 54, f. Saint-Honoré, Paris.
Plasmargol HION, Paimpol (C.-du-N.).
Plasmocol 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Plasmodine Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
Plasone Vours 72, av. Kléber, Paris.
Plastima 17, r. Vieille-du-Temple, Paris.
***Pléxorine Vély** 132, av. Victor-Hugo, Paris.
***Plombyl** 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
***Pluribiase** 21, r. Violet, Paris.
***Plurion Couturieux** 18, av. Hoche, Paris.
Pneoline 8, r. Vivienne, Paris.
Pneuma Wander 151 bis, r. de Joinville, Champigny.
Pneumobiol 48, r. de Paris, Vichy.
Pneumo-calcine 46, av. des Ternes, Paris.
Pneumocratol 147, fg Saint-Denis, Paris.

- *Pneumogéine Renard 35, r. de Paris, Clichy.
 *Pneumogénol BURÉ, pl. St-Goëry, Epinal.
 *Pneumo-lipase YVRARD, 17, r. Soufflot, Paris.
 *Pneumostyl Daguin à Saint-Maur (Seine).
 Pneumotanic Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
 Podophylle Coirre 5, bd Montparnasse, Paris.
 *Poliol Churchill 12, r. Castiglione, Paris.
 Polvista 6, r. Trencavel, Béziers.
 *Polybromure Gonnon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 Polycine 113, bd Voltaire, Paris.
 *Polyferments LALEUF, 20, r. Laos, Paris.
 Polyformiate Coutu- 18, av. Hoche, Paris.
 rieux
 *Polyiodure Gonnon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 *Polyminéral Fort 16, r. Henri Regnault, Courbe-
 voie.
 Polyna 4, imp. de Béarn, Paris.
 *Polypeptonal DURET et RÉMY, Asnières
 (Seine).
 Polyphosphore Freyssinge 6, r. Abel, Paris.
 Polyvaline D^r Bayle 10, r. de l'Orne, Paris.
 Polyveinine JAUME, Tamaris (Gard).
 Pommade 731 1, r. Delacroix, Chartres.
 *Pommade adrénostyp- Lab. MIDY, 4, r. du Colonel-
 tique Midy Moll, Paris.
 Pommade à l'Inolène ODILIA, 42, r. Mont-Cenis, Paris.
 Pommade Bernhard 11, r. Lafayette, Paris.
 *Pommade Bertol Vichy HY, 61, av. de Choisy, Paris.
 Pommade Cuticura 3, av. Lowendal, Paris.
 Pommade de l'Esterel 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.
 Pommade de Séru LETTRY, 69, r. de Sèvres, Paris.
 Pommade Eon 3, r. des Rouairies, Dinan (C-
 du-N.).
 Pommade épidermo- 53, bd de Verdun, Fontenay-
 gène sous-Bois.
 Pommade Forgeue 37, r. de Bourgogne, Paris.
 *Pommade Fornet à l'In- INSTITUT DE MICROBIO-
 suline LOGIE, Sarrebruck.
 Pommade Harsen S. G. I. P., 73, r. Gal Sarrail, Le
 Havre.
 Pommade Heliatol 4, pl. Royale, Nantes.
 *Pommades Kléos 2, r. des Cordeliers, Meung-
 sur-Loire.
 *Pommade Lenoir 142, r. de Picpus, Paris.
 *Pommade Logeais 24, r. Silly, Boulogne-sur-Seine.
 *Pommade Midy 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 Pommade Néothorium 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
 Millot
 *Pommade au Nestosyl 72, r. Saint-Dominique, Paris.
 *Pommade Noelline Guingamp (C.-du-N.).
 *Pommades ophtalmi- CHIBRET, 5, r. St-Hérem, Clér-
 ques Chibret mont-Ferrand.
 Pommade Périol 21, r. Mouton-Duvernét, Paris.
 Pommade Phlébos 229, cours Gambetta, Lyon.
 Pommade Poncet 107, av. de la Reine, Boulogne-
 s-Seine.
 Pommade Quartier 34 r. de Paris, Essonnes (S.-et-O.)

- Pommade Radioactive** 14, r. de la Pépinière, Paris.
Raderm
Pommade Radine DUCLOS, Evreux (Eure).
***Pommade Raimoa** 264, bd Voltaire, Paris.
Pommade Rhinol DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.
Pommades Royer 223, r. Saint-Martin, Paris.
Pommades Stéryl 94, r. Michelet, Alger.
Pommade-Vaccin Sa- 42, r. des Grandes-Arcades
lantale Strasbourg.
***Pommade V.-E. Dou-** BOMEL, Annonay (Ardèche).
mer
***Post-Hypophyse Choay** 48, r. Théophile-Gautier, Paris.
***Potion Adol** GIROUD, 78, c. de la Liberté,
 Lyon.
Potion Boissel 4, cours Circé, Bordeaux.
Potion Bonnet 17, r. Cadet, Paris.
Potion des Cordeliers 19, av. Secrétan, Paris.
de Seez
Potion du D^r Henry Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
Potion Granval 12-14, r. Fery, Reims.
Poudre à l'Inolène ODILIA, 42, r. Mont-Cenis,
 Paris.
Poudre américaine Le- 12, r. de la République, Puteaux.
roy 39, r. Sclessin, Liège.
Poudre antiasthma-
tique Henry
***Poudre anti-épilep-** COLUMEAU, 19, r. St-Bazile,
tique Cassarini Marseille.
Poudre antigestralgi- BERNHARD, 11, r. Lafayette
gique Paris.
***Poudre Bellada** 24, r. Keller, Paris.
Poudre Cap 2, r. Marché-des-Blancs-Man-
 teaux, Paris.
***Poudre Chaumel** 78, fg St-Denis, Paris.
Poudre Cosy 89, r. St-Georges, Nancy.
***Poudre Cutiréxine** 3, r. de l'Arbre, Marseille.
Poudre Cytisia AXAREL, 15, r. Catulienne,
 St-Denis.
Poudre Deol 61, r. de Seine, Paris.
Poudre dentifrice 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Charlard
Poudre de Lausanne 87, r. Lafayette, Paris.
(Voir : Isotonyl).
Poudre de Sapolan CAVAILLES, 29, r. Singer,
 Paris.
Poudre de viande 15, r. des Immeubles-Industriels,
 Paris.
Poudre du D^r Cléry 18, r. de Maubeuge, Paris.
Poudre épidermogène 53, bd de Verdun, Fontenay-
 sous-Bois.
***Poudre Escoufflaire** à Baisieux (Nord).
Poudre Espic 20, r. Saint-Lazare, Paris.
Poudre Evine 16, r. Barquette, Paris.
Poudre Exhibard 6, r. Dombasle, Paris.
Poudre Fiort 61, r. de Seine, Paris.
Poudre Ferromanga- 8, r. Vivienne, Paris.
nique

- Poudre Gast**
Poudre Gécé
Poudre Génia
Poudre Gilbert Trillon
Poudre gynol
Poudre Gynule
Poudre Héliatol
Poudre Helvétia
Poudre Hunier
Poudre Klappa
Poudre Lartigue
***Poudre laxative de Vichy**
***Poudre Noelline**
Poudre Optima
Poudre O. R. L.
***Poudre Paterson**
***Poudre Pelevine**
***Poudre et Pommade d'Insuline Phyloze**
Poudre purgative Künckel
Poudre Pylor
Poudre Remoro
Poudre Rhodys
***Poudre Rocher laxative**
***Poudre Satine**
Poudre Stear
***Poudre Stom**
***Poudre Zani**
Poudre Ziethen
***Pragmoine**
Praunase Corbière
Prélaaxol
Précikase
Précy
Prélase
***Prévalidine**
***Prévarsyl**
***Préventyl**
***Prézymase**
Prises Delqué
***Probios**
Procuta Brisson
Produits antidiabétiques Dupont
Produits Benedictus
Produits Billaut
Produits Chanteaud
Produits diététiques
- 6, pl. Cléchy, Paris.
 48, r. de Berri, Paris.
 136, r. Chémis-Vert, Paris.
 24, r. Eugène-Pelletan, Vitry-sur-Seine.
 316, ch. d'Ixelles, à Bruxelles.
 CH. DEHAY, à Arras.
 4, pl. Royale, Nantes.
 50, r. de la République, Puteaux.
 REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
 GIBAN, à Sens (Yonne).
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 1, quai Aulagnier, Asnières.
 GUINGAMP (C.-du-N.).
 Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 46, r. de Saintonge, Paris.
 16, r. Barquette, Paris.
 48, r. de la Procession, Paris.
 3, r. Watteau, Courbevoie.
 20, Gde-Rue, Besançon.
 JEHAN & BRÉRA, Montauban (L.-et-G.).
 97, bd St-Germain, Paris.
 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
 7, r. Galvani, Paris.
 12, r. de Buci, Paris.
 HERIN, 98, r. Jeanne-Maillotte, La Madeleine (Nord).
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye.
 85, r. des Morillons, Paris.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 49, r. de Paradis, Paris.
 252, fg St-Martin, Paris.
 96, r. Lafayette, Paris.
 71, r. Ste-Anne, Paris.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 40, r. d'Enghien, Paris.
 LÉBOIME, 3, r. Fernand-Widal, Paris.
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 1, av. Pasteur, Paris.
 157, r. Championnet, Paris.
 38, r. Rochecouart, Paris.
 74, r. Lamarck, Paris.
 4, pl. de la Sorbonne, Paris.
 54, r. Francs-Bourgeois, Paris.
 FAVRICHON, à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).

- Produits Gmet**
Produits Gory
Produits de Malt
Produits organiques
 Richard
Produits Orhino
 ***Produits Pennès**
 (voir : *Pennès*)
Produits de Régime

 ***Prodynase**
 ***Progaster**
Progyne Thelliez
 ***Prométhine**
 ***Propeptase**
Prophylax
Prophylaxis

 ***Propidex**

 ***Propidon**

Prostaphile Leisyn
 ***Prostatols**

 ***Prosthénase Galbrun**
 ***Prostigmine**

Protaminol Byla
 ***Protensène**

Protéobiol
Protéol
Prothéine
Prothiol
Protiodo Grémy
 ***Protiodyne**
 ***Protonic**
Protolysine

Protyline Roche
 ***Proveinase**

Provenine
 ***Provitol**

 ***Proxytases**

 ***Proxytol**
Prunagar
Pruneline Bost
 ***Prunines Sentini**
Pruritol Raimoa
Psinase Grémy
 ***Psoréon**

Psorialan
- 27, fg. Montmartre, Paris.
 51, r. des Mathurins, Paris.
 5, r. Labroque, Strasbourg.
 79, av. d'Orléans, Paris.

 82, r. de la Croix-Verte, Albi.
 BOUTY, 3, r. de Dunkerque,
 Paris.
 LA NUTRICIA, 142, r. Fraus-
 man, Bruxelles.
 12, r. Charles-V, Paris.
 NOVALIS, Oullins (Rhône).
 83, r. Maubeuge, Paris.
 20, r. des Écoles, Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 6, r. des Feuillants, Marseille.
 11, r. de la Montagne-Stc-Gene-
 viève, Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 1 bis, r. Molitor, Paris.
 BEAUXIS-LAGRAVE, 74, quai
 Jemmapes, Paris.
 8, r. du Petit-Musc, Paris.
 HOFFMANN LA ROCHE, 21,
 pl. des Vosges, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 LEJEUNE, 142, r. de Picpus,
 Paris.
 BAILLY, 17, r. de Rome, Paris.
 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 4, r. Childebert, Lyon.
 14, r. de Clichy, Paris.
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 88, r. Duhesme, Paris.
 7, r. Guillaume-Budé, Mont-
 geron.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 MIDY Frères, 4, r. du Colonel-
 Moll, Paris.
 4, cité Magenta, Paris.
 Dr DEBAT, 60, r. de Prony,
 Paris.
 Lab. des PROXYTASES, 97, r.
 de Vaugirard, Paris.
 id.
 71, r. St-Jacques, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
 264, bd Voltaire, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 3, r. des Roualries, Dman
 (Côtes-du-Nord).
 14, r. St-Claude, Paris.

- Pscrimangane** MERMINOD, 49, r. Paradis, Paris.
- ***Psothanol** 55, bd de Strasbourg, Paris.
- Psycho-Neuryl** 1, r. F.-Ponsard, Paris.
- Puberglandol** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Pulcéine** LE NAOUR, Quimperlé (Fin.).
- Pulmicure** Eon, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- Pulmine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- Pulmobryne** 38, r. N.-Dame de Lorette, Paris.
- Pulmobules Hyva** 12, r. Grande, Evreux.
- ***Pulmocardine** 57, r. Origet, Tours.
- Pulmochofine** 20, r. d'Avron, Paris.
- ***Pulmodion** 10, impasse Milord, Paris.
- Pulmogyl** 33, r. Lauriston, Paris.
- Pulmolaxol** GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
- Pulmone** Lab. DARDENNES, Tours.
- Pulmonine Bouty** 3, r. de Dunkerque, Paris.
- Pulmopérol Marol** 46, r. Gandon, Paris.
- ***Pulmosérum Bailly** 15 et 17, r. de Rome, Paris.
- Pulmovaccin** 23, r. des Moines, Paris.
- ***Pulmoverne** 13, r. Dr Mazels, Grenoble.
- Pulmovitine** P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Pulmostéryl** à Châteauroux (Indre).
- Pulmostyl** Lab. LESCAROUX, 3, r. Victor-Hugo, Châteauroux.
- ***Pulsamone** 6, r. Dombasle, Paris.
- Pulsophyle** 4, imp. de Béarn, Paris.
- ***Pulvéol** 10, impasse Milord, Paris.
- Pulvérisateur E. G. S.** 10, r. Caumartin, Paris.
- Pulvérisateur Vaast** 22, r. de l'Odéon, Paris.
- Pulvi-Lactéol du Dr Boucard** 30, r. Singer, Paris.
- Pulvinha-Pathuro** LE GALLO, à Auray (Morb.).
- ***Pulvita** 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- Punch Novela** St-Julien-en-Jarez (Loire).
- ***Puragar** 46, r. de Rome, Marseille.
- Purgalex** 24, r. Monttessuy, Paris.
- ***Purganol Daguin** 5, r. Remises, St-Maur (Seine).
- Purgatif Voux** 31, av. Michel-Bizot, Paris.
- Purgelettes Roux** ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- ***Purgos** 7 bis, r. Galvani, Paris.
- Purgyl Koehly** 117, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- ***Pyo-Amphogel** RONCHÈSE, 6, r. Rothschild, Nice.
- ***Pyodermase** pl. du Marché, La Rochelle (Ch.-Inf.).
- ***Pyoformine** Lab. GOBEY, 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- ***Pyo-Vaclydun** 27, r. Desrenaudes, Paris.
- Pyramidon U. R.** 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Pyran** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.

Pyratone
***Pyrélaïne Collas**
***Pyréthane**
Pyridone D^r Berlioz
Pyrinol Vichy
***Pyri-Pyridium**

Pyrocidine

Pyroclase

***Pyroléol Edet**
Pyrothéine

71, bd Saint-Michel, Paris.
 15, r. Augustin-Thierry, Paris.
 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
 6, r. d'Alsace, Grenoble.
PATRICE, à Vichy.
Lab. SERVIER, Orléans (Loiret).
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris.
 id
 3, r. de Paris, Auxerre.

Q

***Quassia-Kina Rabot**
Quassine Frémint
***Quassine Houdé**
***Quergemol**

Quiétol

Quiétyl

***Quina Baron**

Quinacinas

Quina-fer Mechling

Quina Laroche

Quinamagnésion

Quinarsan

***Quinarsol Grandval**

***Quinby**

Quinéase

***Quinéine**

***Quinicardine**

***Quinimuthol Sacca**

Quinine Pelletier

Quinio-Goyl Meurice

***Quinio-Stovarsol**

Quinium Roy

Quinobrome

49, r. Bitche, à Courbevoie.
 6, r. Abel, Paris.
 9, r. Dieu, Paris.
BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
P. FOURNIE, 3, pl. Miséricorde, Lyon.
ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.
 à Mulhouse.
COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
SAUBA, 1, r. d'Enghien, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 12 et 14, r. Féry, Reims.
P. AUBRY, 54, r. Bienfaisance, Paris.
 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
 21, r. Chaptal, Paris.
 27, r. de la Procession, Paris.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 81, bd Suchet, Paris.
 Pharmacie centrale de France,
 21, r. des Nonnains-d'Hyères, Paris.

- Quinobromine**
***Quinoforme Lacroix**
***Quinoldine Duriez**
Quinol
Quinolax
Quinopyrol
Quinorhéine Duteil
Quinotane Valgny
***Quino-Thorium**
***Quinovarine**
***Quinquina Gmet**
Quinquina granulé Astier
Quinquina Granval
Quinquina Watelet
***Quinsal**
***Quinthéryl**
***Quinuryl**
Quiphos Churchill
***Le Quotidien (Raisin)**
- TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.**
37, r. Pajol, Paris.
20, pl. des Vosges, Paris.
G. HENRY, à Vernon (Eure).
ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.
172, r. d'Alésia, Paris.
90, av. St-Ouen, Paris.
12, r. Charles-V, Paris.
98, r. de Sèvres, Paris.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
27, fg Montmartre, Paris.
45, r. du Docteur-Blanche, Paris.
12-14, r. Féry, Reims.
16, av. Montsouris, Paris.
34, r. Thiers, Gray.
LÉONARDON, Arcachon (Gtr.)
LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
12, r. Castiglione, Paris.
H. Chartier, à Saumur.

R

- Radiargyl**
***Radiobaume Adrian**
Radiobiogyl
Radiocréméline
Radiodine
Radiofor
Radiogastrol
Radiole
***Radiolysine**
R a d i o m a g n é s i u m
Rhemda
***Radiopaque**
***Radiophorine**
Radiosérum Jaboin
***Radiotétrane**
Radiotonine
***Radiotropine**
- 51, r. d'Alsace, à Courbevoie.**
9 et 11, r. de la Perle, Paris.
Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
25, r. Vaneau, Paris.
4, r. St-Anastase, Paris.
10, r. Maubeuge, Paris.
34, av. G^{al}-Michel-Bizot, Paris.
25, r. Vaneau, Paris.
41, r. de Rome, Paris.
51, r. d'Alsace, Courbevoie.
HEUDEBERT, 85, r. St-Germain, à Nanterre.
JOOSS, Montreuil (Seine).
24, r. Monttessuy, Paris.
40, r. Bellechasse, Paris.
4, r. St-Anastase, Paris.
Établ. Laboradium, 33, r. St-Jacques, Paris.

- Radiovitine**
- Radiovules**
- Radipirine**
- Radjunal Chevrier**
- Raiforyl**
- Raisin Moillard**
- *Raisin quotidien**
- Rami-gouttes**
- Rapidoats**
- Ravix**
- Réalgose**
- Réaline**
- *Réalphène Buisson**
- Réargon**
- *Reconstituant Mary**
- *Rectagine**
- Rectaméline (Voir Pom made Logeais).**
- *Rectanol**
- *Rectoline**
- *Rectopanbiline**
- Rectoplasme**
- Rectosol**
- Recto-Vaccin Salan-tale**
- Recytil**
- Réfistine**
- Régulase Efgé**
- *Regyl**
- Rein- Endocrisines Fournier**
- Remède Boss**
- *Renaleptine**
- Renalgine**
- Renetol**
- *Renion Vincardi**
- *Renocardine**
- Renotanic Grémy**
- *Renovol**
- Réparateur Thuau**
- Résocaïne**
- Résurrex (Tablettes)**
- *Résyl**
- *Réthragine**
- Retropituine Carrion**
- Retusol**
- Revitalose**
- P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).**
- 51 r, d'Alsace, Courbevoie.**
- 9, r. Victor-Letalle, Paris.**
- 21, fg Montmartre, Paris.**
- 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.**
- 8, r. Lacépède, Le Havre.**
- CHARTIER, Saumur (M.-et-L.)**
- à Levallois-Perret, 44, r. Chaptal.**
- BLOCH à Tomblaine (M.-et-M.).**
- CRAISSON, 19, r. J.-J.-Rousseau, Paris.**
- 4, imp. de Béarn, Paris.**
- GUILLAUME, Issoudun.**
- 98, r. de Sèvres, Paris.**
- 41, r. de Rome, Paris.**
- 32, r. de l'Ouest, Paris.**
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.**
- 37, r. de Bourgogne, Paris.**
- 164, r. Saint-Hippolyte, Paris.**
- Lab. du Dr Plantier, à Annonay (Ardèche).**
- MILLET, à Rambouillet.**
- 164, r. St-Honoré, Paris.**
- 42, r. Grandes-Arcades, Strasbourg.**
- 4, r. d'Illzach, Mulhouse.**
- 20, r. du Conseil, Bruxelles.**
- 40, av. Secrétan, Paris.**
- 8, r. Richer, Paris.**
- 7, r. Biscornet, Paris.**
- PRAX, à Brest (Finistère).**
- SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.**
- LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.**
- DUVAL, à Falaise.**
- 42, av. Borriglione, Nice.**
- 57 r. Origet, Tours.**
- 14, r. de Clichy, Paris.**
- 22, r. de Paris, Houilles.**
- 22, fg. St-Michel, Angers.**
- BRESSIER, 102, r. Vincent, Marseille.**
- à Nolay (Côte d'Or).**
- 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.**
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.**
- 54, fg. Saint-Honoré, Paris.**
- 119 bis, av. Ch.-de-Fer, Rueil (Seine-et-Oise).**
- Dr FRAYSSE, 47, r. de Neuilly, Nanterre.**

- RévuIsif**
***RévuIsif Boudin** 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-le-Pont (Seine).
RévuIsif liquide SR 4, r. Levert, Paris.
***RévuIsif Milko** 60, cours Emile-Zola, Lyon.
***RévuIsif Procipha** 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
RévuIsior PAULIN & BARRE, Tours.
***RévuIsoplasme** 4, r. Levert, Paris.
***Rhagadine Bracque-
mond** 105, r. de Normandie, Courbe-
voie (Seine).
Rhamnine Henry 39, r. de Sclessin, Liège.
***Rhéantine Lumière** 23, c. de la Liberté, Lyon.
Rhéothymine 7, r. Guillaume-Budé, Mont-
geron.
***Rhésal-Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
Rhinadrargol 56, Gde-Rue, Harnes (P.-de-C.).
Rhinadrol A. FALVY, 40, r. des Acacias,
Paris.
Rhinaldose 4, imp. de Béarn, Paris.
Rhinalginol LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
Rhinaseptogène PATRICE, à Vichy.
***Rhinaspir** 21, r. Feydeau, Paris.
Rhinodol 50, r. de la République, Pu-
teaux.
***Rhinodrops** 194, r. de Rivoli, Paris.
***Rhinofluine** 5, r. François-Ponsard, Paris.
Rhinol 80, fg St-Denis, Paris.
**Rhino-Lactéol du D^r
Boucard** 30, r. Singer, Paris.
Rhinolan 24, r. Jardel, Bordeaux.
Rhinolin 82, av. Malakoff, Paris.
***Rhino-Liposeptine** 2, pl. des Vosges, Paris.
Rhino-Pro 4, cité Magenta, Paris.
Rhino-Salas 132, r. de Turenne, Paris.
Rhino Spécifique Favrot 6, r. Dombasle, Paris.
Rhinotherme Bagnères-de-Bigorre (Htes-Pyr.)
**Rhino-Vaccin Salan-
tale** 42, r. Grandes-Arcades, Stras-
bourg.
***Rhino-Vaclydun** 27, r. Desrenaudes, Paris.
Rhizotantin 56, bd, Ornano, Paris.
***Rhocya Dyn** 5, r. Claude-Decaen, Paris.
***Rhodarsan** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.
***Rhodazil** id.
**Rhodocaïne Coutu-
rieux** 18, av. Hoche, Paris.
***Rhoféine** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.
***Rhomnol Leprince** 62, r. de la Tour, Paris.
**Rhubarbe comp. de
Baudry** 8, r. Vivienne, Paris.
Rhumatoïdine 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).
***Ricéyl Billault** 22, r. de la Sorbonne, Paris.
Ricifruit S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le
Havre.
***Ricigel** ROBERTS & C^{ie}, 5, r. de la
Paix, Paris:

Ricinopalmine
 Ricinpoudre
 Ricomalt
 *Riodine Astier
 *Rob Cabanès
 Rob Dussang

 Rob Gory
 *Rob Oberlin
 Roléine
 *Romarantyl

 *Romarène

 *Rosaly A et B
 Rosanol
 Rosaseptor
 Royérine Dupuy
 *Rozoderme
 *Rubyl

 *Rutonal

 *Rylal Noyon
 Rythmos Leisyn
 *Rythmosystol

5, bd. des Brotteaux, Lyon
 15, r. de Naples, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 45, r. du Docteur-Blanche, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 Lab. LESCAROUX, Château-
 roux.
 JOOSS, Montreuil (Seine).
 TINARDON, 17, r. Cadet, Paris.
 40, r. de Bitche, Courbevoie.
 15, r. des Immeubles-Indus-
 triels, Paris.
 BEAUFOUR, 44, r. de la
 Manuf. Nationale, Beauvais.
 101, r. de Paris, Rueil (S.-et-O.)
 L. HINGLAIS, à Epernay.
 21, r. Feydeau, Paris.
 223, r. St-Martin, Paris.
 11, r. des Deux-Ponts, Paris
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon.
 Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean Goujon,
 Paris.
 24, r. Paul-Bert, Paris.
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 COMTE, 60, r. St-Guilhem,
 Montpellier.

S

*Saint-Aré

 *Salantale

 *Salasenyl
 Salbiase
 Salbine du Dr Fayès
 *Salénal Ciba

 *Salène Ciba
 Salicaïne
 Salicaire Dausse
 Salicaire Henry
 Salicairine
 Salicérat Clin
 Salicol Dusaule

Sté des Eaux minérales de
 Decize (Nièvre).
 NOTH & ANSELME, 42, Gran-
 des-Arcades, Strasbourg.
 132, r. de Turenne, Paris.
 La Baule-sur-Mer (Loire-Inf.).
 3, r. du 4-Septembre, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu.
 Lyon.
 id.
 168, b. Saint-Germain, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 39, r. de Sclessin, Liège.
 3, r. de Sévigné, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 6, r. Abel, Paris.

- Salicydol**
Saliodé
 ***Salsanos**
 ***Salubrine Phénix**
Salurol
Salvacid
Salvanos

Salva-Serum

 ***Salvatyl**

 ***Salvé**
 ***Salvenase Legoux**

Salvoçaf
Salvoxyli
Salychiore
 ***Salyptol Narty**
 ***Salysérum**

 ***Sambul**
Sanalgine

Sanalia

 ***Sanas**
Sanatogène Bauer
 ***Sandoptal Sandoz**
 ***Sanedrine**

 ***Sanex Inhalant**

Sanguifer Bouret
 ***Sanguil**
 ***Sanguine irradiée**

Sangul Dubat
Sanka

 ***Sanluol**

Sanocrysine
Sanocure
 ***Sanoformine**
Sanogène
 ***Sanogyl**
 ***Sanoquinol**

 ***Sanoram**
Sanos

Santal Bretonneau
Santal Clin

 ***Santal Midy**
 ***Santal Monal**
- 69, r. de la Colonie, Paris.
 GABAIL, 5, r. Lefebvre, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 14, r. de Birague, Paris.
 56, ch. de Combe-Blanche, Lyon.
 MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
 2, r. Marché-des-Blancs-Man-
 teaux, Paris.
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 42, r. Emile-Deschanel, Cour-
 bevoie.
 7, av. Marceau, Paris.
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 Villeneuve-les-Avignon (Gard).
 237, r. Lafayette, Paris.
 46, r. de Rome, Marseille.
 134, bd Péreire, Paris.
 37, r. de Marly, Rueil-Mal-
 maison.
 à Evreux (Eure).
 Lab. SANAL, St-Louis (Haut-
 Rhin).
 35, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 72, r. du Commerce, Paris.
 49, r. Paradis, Paris.
 3 et 5, r. de Metz, Paris.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 BOISSY, 49, r. Hoche, Cour-
 bevoie (Seine).
 87, r. Lafayette, Paris.
 12, r. Saint-Gilles, Paris.
 RIETHE, 40, r. des Abbesses,
 Paris.
 80, fg. Saint-Denis, Paris.
 54, quai de Boulogne, Boulogne-
 sur-Seine.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 REBOUL, Pont-Ste-Maxence,
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
 131, r. Cambronne, Paris.
 CIBA, 113, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 131, r. Cambronne, Paris.
 G. MIQUEL, 3, av. Lowendal,
 Paris.
 6, r. Saint-Claude, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 6, r. Bridaine, Paris.

- Santalol Montagu** 49, bd Port-Royal, Paris.
Santal Oberlin 17, r. Cadet, Paris.
Santal P. Petit 12, bd Saint-Martin, Paris.
Santal Salolé Cabanès 17, r. Cadet, Paris.
Santéine Montagu 49, bd. Port-Royal, Paris.
***Santhéose** 4, r. du Roi-de-Sicile, Paris.
Santogénol Caubin 62, r. Erlanger, Paris.
Santomalt U. C. E. P., 5, r. Labroque, Stras-
 bourg.
Santuroi 21, r. des Roses, Dijon.
Sapobarbe CAVAILLES, 29, r. Singer.
 Paris.
Sapocade id.
Sapocrème id.
***Sapolan** id.
Sapopâte id.
Sapogynol 36, r. des Martyrs, Paris.
Sarco-sérum 107, r. des Dames, Paris.
Sarcoglobine DUCLOY et Cie Arques (P.-
 de-C.).
Sarcolactine 28, bd de la Cluse, Genève.
***Sarcoptol** 9, bd Edgar-Quinet, Paris.
Sarkol à Dammarie-les-Lys (S.-et-M.).
Satine 11, r. Joseph-Bara, Paris.
Saturalgine 3, bd Beaumarchais, Paris.
Saturoi Laborat. DURET & RÉMY,
 Asnières
Sauge Gmet 27, fg. Montmartre, Paris.
Savon dentifrice Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Savon de Sapolan CAVAILLES, 29, r. Singer,
 Paris.
Savon Iodé Oberlin 17, r. Cadet, Paris.
Savons Denisol Brisson 157, r. Championnet, Paris.
Savons ichthyol, sou- VIGIER, 12, bd Bonne-Nou-
fre, etc. velle, Paris.
Savons Michon 49, bd Port-Royal, Paris.
***Savons Mollard** 2, r. du Marché-des-Blancs-
 Manteaux, Paris.
Savon Perusol 114, r. du Temple, Paris.
Scatagar 46, r. de Rome, Marseille.
Scialine P. C. B., 12, r. du Téléphone,
 Bruxelles.
Sciaticure 121, av. St-Ouen, Paris.
***Scillarène** SANDOZ, 5, r. de Metz, Paris.
***Scillitrine** PERRIER, 17 bis, bd Roche-
 chouart, Paris.
Scléramine Dausse 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
Sclérobyl 65, av. Victor-Hugo, Paris.
Sclérolysine 31, r. des Francs-Bourgeois Paris.
***Sclérosérol** 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
***Sclérosérum** 114, r. du Temple, Paris.
Scléroveine Hardy 200, r. de Tolbiac, Paris.
Scorogènes COMAR, 20, r. des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
***Scurocaïne** SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
***Scuroforme** id.

- *Sécacornine Roche
 Seccase
 Sédacrine Crestey
 *Sédarsan Optima
 Sédasthmine
 Sédatif Py
 *Sédatine Christiaens
 Sédaton Leo
 *Sédatoze Gigon
 *Sédatuline
 Sedlitz Ch. Chanteaud
 Sedobore
 *Sédobrol Roche
 Sédocardine
 Sédoderme
 *Sédogastrine
 Sedo-gaz
 Sédogène Sallé
 *Sédol Buisson
 Sédomens
 *Sédoneurol
 Sédopelvien
 Sédopulmine
 *Sédorhinol
 *Sedormid Roche
 *Sédosine
 Sédospasmine
 *Sédotensyl
 Sédó Viette
 Seklé
 Sektal Grémy
 *Selamon
 Sels Clarks
 Sel D.
 *Sel de Hunt
 *Sel d'Ewald
 *Sel digestif Bé Me Cé
 Sel de fruit Crolas
 *Sélénol Couturieux
 *Sel hépatique U. N.
 Arquevaux
 Sel Impérial Borotar-
 trine
 Sel Jolivet
 *Sels du Jura
 *Sels de lithine effe-
 vescents
 Sels naturels de Brides
 les-Bains
 Sel de Salins-Moutiers
21. pl. des Vosges, Paris.
 DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.
 164, r. Saint-Honoré, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 3. bd Beaumarchais, Paris.
 58, bd Richard-Wallace, Pu-
 teaux.
 2, r. du Ch.-de-Mars, à Reims.
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 25, bd Beaumarchais, Paris (IV^e).
 46, r. de la Barrière, Elbeuf.
 54, r. Francs-Bourgeois, Paris.
 80, r. du Rocher, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 Lab. BARRE, 7, pl. Pèreire,
 Paris.
 FERRAND, Clichy (Seine).
 ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.
 BOUDIER, 37, r. de Bourgogne,
 Paris.
 14, r. des Pyramides, Paris.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
 66, r. Nationale, Lille.
 196, r. de Paris, Montreuil-sous-
 Bois.
 6-8, r. Lacretelle, Paris.
 REGAGNON, 276, r. Lecourbe,
 Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 38, b. Bourdon, Neuilly-s-Seine.
 DEMASLES, Vienne (Isère).
 6-8, r. Lacretelle, Paris.
 163, r. de Flandre, Paris.
 51, r. Rennequin, Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.
 10, r. Vignon, Paris.
 16 bis, r. Vivienne, Paris.
 DUPUY, à Montluçon (Allier).
 16, r. Boulainvilliers, Paris.
 BRACQUEMOND, 105, r. de
 Normandie, Courbevoie.
 21, r. Violet, Paris.
 56, ch. de Combe-Blanche, Lyon.
 18, av. Hoche, Paris.
 à Etampes (Seine-et-Oise).
 22, r. de l'Arcade, Paris.
 140, fg. Saint-Honoré, Paris.
 11, av. de l'Opéra, Paris.
 11, r. Milton, Paris.
 46, rue Pierre-Charron, Paris.
 46, r. Pierre-Charron, Paris.

- Selor
Selvan
- Sel Vichy-Etat
Selnos-Vichy
Sels radioactifs Ra-
diana
*Selunic
- Sel Zem
Sénophile
Séotral Leisyn
*Sephydine
*Septicémine Cortial
*Septometrol
Septylase
- Séquardine Bouty
Sérélbé
Sérénol
*Serifer Laurençon
Sérohel
Séro-Citral
Séro-Collosol
*Séro-comprimés Mé-
rieux
*Serodausse antitoxi-
senyl
Séroferrine
Sérogyne
*Séroléine
- *Seroma Rey
Séroquinol
- Sérosan
- *Séro-Sérum Rivier
Serosine Boullé
- Sérosthényl Bouty
Serpoline
- *Sérum antiasthmati-
que de Heckel
Sérum antiphymique
Vadam
Sérum antityphoïdique
de Rodet
Sérum Collyre
*Sérum de Jousset
- Sérums de l'Institut
Mérieux
Sérum maternel
- *Sérum neuropsychique
- 3, r. de Vouillé, Paris.
COUTURIEUX, 18, av. Hoche,
Paris.
24, bd des Capucines, Paris.
COUBAND, 27, r. Drouot, Paris.
20, pl. de la Nation, Paris.
- G. MIQUEL, 3, av. Lowendal,
Paris.
85, r. Turbigo, Paris.
17, r. de Berri, Paris.
1 bis, r. Molitor, Paris.
Chabeuil (Drôme).
15, bd Pasteur, Paris.
132, av. Victor-Hugo, Paris.
BRISSON & C^{ie}, 157, r. Cham-
pionnet, Paris.
3, r. de Dunkerque, Paris.
L. B. L., 18, r. Daguerre, Paris.
46, av. des Ternes, Paris.
Villefranche-sur-Saône (Rhône).
LBL 18 r. Daguerre, Paris.
37, r. de Bourgogne, Paris.
116, bd Haussmann, Paris.
63, r. Victor-Hugo, Lyon.
- 4, r. Aubriot, Paris.
- 52, r. La Bruyère, Paris.
LBL, 18, r. Daguerre, Paris.
C. BARON, aux Sables-d'Olonne
(Vendée).
12, r. Montmartre, Dijon.
Ph^{ie} centrale de France, 21, r.
des Nonnains-d'Hyères, Paris.
TORAUDE, 22, r. de la Sor-
bonne, Paris.
26-28, r. St-Claude, Paris.
12, av. de la Grande-Armée,
Paris.
3, r. de Dunkerque, Paris.
OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
CORBIERE, 27, r. Desre-
naudes, Paris.
(Voir : Antiphymique).
- Lab. AGUETTANT, 36, q. Ful-
chiron, Lyon.
26, av. Observatoire, Paris.
BRUNEAU, 17, r. de Berri,
Paris.
17, r. Bourgelat, Lyon.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
191, Fg-St-Antoine, Paris.

- Sérum Nevrotone
 *Sérum Normet
 *Sérum Oliviero
 Sérum polymicrobien
 *Sérums Fraisse
 Sérum sthénique
 *Sérum végétal
 Siccogyne
 Siccoul
 Sicopion
 Sidérarsan
 Siforcía
 Sigma-Cones
 Sigma-Sérum
 Sigmöidine Grémy
 Sigol
 *Silguine
 Silicate de soude Pel-
 lissier
 *Silicyl
 *Silisode
 Simocalcine
 Sinahin
 Sinapisme Rigollot
 Sinaplasme du D^r
 Faure
 *Sinaseptic
 Sinrénaline
 *Sinuzyl
 Sirodion
 Sirop d'Aconit Ecalfe
 Sirop Alba
 Sirop antiasthmaticque
 Favrot
 Sirop d'Aubergier
 *Sirop Axaria
 Sirop Bala
 Sirop béchique Mairé
 Sirop Belca
 Sirop Berthé
 Sirop Blagny
 Sirop de Blancard
 Sirop Blottière
 *Sirop Brahma
 P. C. B., 12, r. du Téléphone,
 Bruxelles.
 10, r. Vignon, Paris.
 41, r. Denfert-Rochereau, Paris.
 ADLER, 36, r. des Francs-Bour-
 geois, Paris.
 8, r. Jasmin, Paris.
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 D^r CUGUILLERE, 19, r. des
 Chalets, à Toulouse.
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,
 La Garenne (Seine).
 5 r Robert-Planquette, Paris.
 31, r. Saint-Georges, Paris.
 Lab. HALLEANA, 4, imp. de
 Béarn, Paris.
 163, r. de Flandre, Paris.
 17, r. Cadet, Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 à Saint-Fons (Rhône).
 2, r. Boucicaut, Paris.
 33, av. de Villiers, Paris.
 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
 9, r. Castex, Paris.
 CHARMASSON, à Marseille
 15, r. d'Argenteuil, Paris.
 7-13, r. St-Maurice, Nanterre.
 FAURE & DUSSUEL, à Aix-
 les-Bains.
 LE MAROIS, 197, av. de Ver-
 sailles, Paris.
 66, r. Nationale, Lille.
 CHATEAU, 137, av. Parmen-
 tier, Paris.
 228, r. de Paris, Montreuil-
 sous-Bois.
 98, r. de Sèvres, Paris.
 61, r. de Seine, Paris.
 BLOTTIÈRE, 6, r. Dombasle,
 Paris.
 COMAR, 20, r. des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 AXAREL, 15, r. Catulienne,
 St-Denis.
 BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse)
 171, r. de Belleville, Paris.
 THÉVENOT, r. des Rosés,
 Dijon.
 8, fg Saint-Denis, Paris.
 PAMÉLA, Forges-les-Eaux.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris
 6, r. Dombasle, Paris.
 COULOUX, 116, r. du Pont,
 Auxerre (Yonne).

- Sirop Briant**
Sirop Britannia
Sirop de Broméine

Sirop Brumauld
Sirop Buci

Sirop Bural
Sirop carbolique du
D^r Vialle
***Sirop Castanol**
Sirop composé aux Hy-
pophosphites Fellows
***Sirop de Créosote Va-**
cheron
Sirop de Dentition Al-
deni
Sirop Delabarre
Sirop de Raifort iodé
de Grimault
Sirop Derbecq
Sirop de digitale

Sirop Diver

Sirop Dubois au créosal
(Voir : Créosal).
Sirop du D^r Dubreuil
Sirop Ducode

Sirop de Dusart
Sirop D^r Dusourd
Sirop Escolle

***Sirop Famel**
Sirop ferrug. Laroze
Sirop Flamand
Sirop C. Frany
Sirop Gabi

***Sirop de Gaïarsol**

Sirop Gécé
***Sirop Gelineau**

Sirop Gelvart
Sirop de Gibert
Sirop Gigon
Sirop Girard
***Sirop de glycérphos-**
phates Vacheron
***Sirop Gribell**
Sirop Grimault
Sirop Guilliermond
Sirop du D^r Hecquet
Sirop Helgé
131. r. Vaugirard, Paris.
 Labor. BERTHIER, Grenoble.
 MONTAGU, 49, bd Port-Royal,
 Paris.
 65, cours National, Saintes.
 COMAR, 20, r. des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 1, rue Rambuteau, Paris.
 87, r. Lafayette, Paris.

 9, pl. Municipale, Tulle.
 5, r. de la Paix, Paris.

 14, r. Victor-Hugo, Lyon.

 15, r. Catulienne, St-Denis.
 (Seine).
 78, taub. Saint-Denis, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.

 12, rue Cadet, Paris.
 LABELONYE, 99, r. d'Aboukir,
 Paris.
 50, r. de la République, Pu-
 teaux.
 20, r. du Laos, Paris.

 37, r. Galilée, Paris.
 P. ROCHE, Aigueperse (P.-
 de-Dôme).
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
 8, r. Vivienne, Paris.
 LAMAR, pl. Forbin, Aix. (B.-
 du-R.).
 16 à 22, r. des Orteaux, Paris.
 2, r. des Lions, Paris.
 6, pl. Clichy, Paris.
 52, av. de la République, Paris.
 AXAREL, 15, r. Catulienne,
 St-Denis.
 BOUTY, 3, r. de Dunkerque,
 Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 MOUSNIER, 9, bd Carnot,
 Bourg-la-Reine.
 24, r. Bagnolet, Paris.
 Maisons-Laffitte (S.-et-O.).
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 48, r. d'Alésia, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.

 19, r. Drouot, Paris (IX^e).
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
 131, r. de Vaugirard, Paris.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 D^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude.

Sirop d'Hémoglobine	26, av. Observatoire, Paris.
Byla	
Sirop d'Hémoglobine	8, r. Vivienne, Paris.
Grimault	
Sirop d'Hémoglobine	39, r. Sclessin, Liège.
Henry	
Sirop d'Hémoglobine	2, r. Marché-des-Blancs-Man-
Star	teaux, Paris.
Sirops Henry	39, r. Sclessin, Liège.
Sirop Henry Mure	71, r. Saint-Jacques, Paris.
Sirop d'Hypophosph.	8, r. Vivienne, Paris.
de chaux	
Sirop d'Iodéine	49, bd Port-Royal, Paris.
Sirop Iodermol Vigier	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Sirop-Iodo-noyer	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Sirop Jackson	id.
Sirop Jane	2, r. Marché-des-Blancs-Man-
	teaux, Paris.
Sirop Jolivet	140, fg Saint-Honoré, Paris.
Sirop Jovin	172, r. d'Alésia, Paris.
Sirop Kopé	4, r. Alexandre-III, Dunkerque.
Sirop Lagasse	8, r. Vivienne, Paris.
Sirop Lambert	25, r. des Petits-Hôtels, Paris.
Sirop de Lamouroux	6, r. Dombasle, Paris.
Sirop Lanchat	Lab. COMTOS, à Feschel-le- Châtel (Doubs).
Sirop Laurin	86, bd Port-Royal, Paris. J
Sirop laxatif Gobey	89, r. du Cherche-Midi, Paris.
Sirop Lecoeur	GAVIN, Vimoutiers (Orne).
Sirop Lex	MARTINET, 16, r. du Petit- Musé, Paris.
*Sirop de Lovel	14, r. Victor-Hugo, Lyon.
Sirop Magali	43, av. Kleber, Paris.
Sirop du Dr Manceau	à Château-du-Loir (Sarthe).
*Sirop de la Maternité	7, r. Galvani, Paris.
Sirop Maver	S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
Sirop de Mimotannin	3, r. Bab-Azoun, Alger.
Iodo-phosphaté	
*Sirop minéral sulf.	6, r. Chanoinesse, Paris.
Crosnier	
*Sirop Mireille	Lag. LEGENDRE & C ^{ie} , Sec- tion DS. Houilles (S.-et-O.).
*Sirop Morlas	18, r. Favart, Paris (II ^e).
Sirop Mory	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
*Sirop Myrianis	AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.
*Sirop Névra	FAURE, 80 r. du Rocher, Paris.
*Sirop Noguès	7, r. Galvani, Paris.
Sirop Nourry	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris. (Voir: Vin Nourry).
Sirop Patrat	61, r. de Seine, Paris.
*Sirop phéniqué Vial	8, r. Vivienne, Paris.
Sirop Polybromuré La-	2, r. des Lions, Paris.
roze	

- Sirop Polyformiaté Pr. Chapelle** 8, r. Vivienne, Paris.
Sirop polyiodure Gonon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
***Sirop Prega** (Voir Capsules Préga),
Sirop Rabuteau COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Sirop Rami r, Chaptal, Levallois-Perret.
Sirop Ramos 7, r. Capeyron, Bordeaux.
Sirop Rébellion 6, r. Pas-de-la-Mule, Paris.
Sirop Reinwillier 131, r. Vaugirard, Paris.
Sirop Rhégia BONNAURE, Alès (Gard).
***Sirop Roche au thiocol** 21, pl. des Vosges, Paris.
***Sirop Sentini** DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
Sirop de Sirtal 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
***Sirop de Teyssedre** 34, fg d'Angoulême, Limoges.
Sirop Thomas 2, r. Volney, Paris.
***Sirop Tinardon** 17, r. Cadet, Paris.
Sirop tribromuré Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris.
***Sirop Vacheron au gaiacol** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
Sirop Vauthier Marcq 98, r. du Chemin-Vert, Paris.
Sirop vermifuge Rémonia AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.
Sirop Viette 163, r. de Flandre, Paris.
Sirop Zemmette 85, r. Turbigo, Paris.
Sirtal COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
***Sistomensine Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
S. I. V. A. Labor. des Immuno-Vaccins, av. des Sources, Nice.
Sodamyl LEGRAS, à Avranches (Manche).
***Soderséine** 18, r. de Beaune, Paris.
Sodogastrol 229, cours Gambetta, Lyon.
***Sodolactine** Lab. GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
Sodorose Labor. Hyg. Appliquée, 64, bd Voltaire, Paris.
Sodotetrane 132, av. Victor-Hugo, Paris.
***Sodothiol** Labor. de Médecine Expérimentale, Beauvais.
***Sol-Bi Fraisse** 8, r. Jasmin, Paris.
Solicide 94, r. Michelet, Alger.
***Solmuth** 14, r. Gravel, Levallois (Seine).
Solubaine Nativelle 27, r. de la Procession, Paris.
Solucalcine D^r COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.
***Solucamphre Delalande** 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.
***Soluprotine Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.
Solurase 71, r. du Fort, Aubervilliers.
Solurol COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Soluté Gaube du Gers 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
Soluthanol 55, bd de Strasbourg, Paris.
***Solution Bardet** 76, r. de Sèvres, Paris.

- Solution de bi-phosphate de chaux**
Solutions Clin
Solution Coirre
Solution Cunaud
Solution du Dr Jacobson
Solution Fumouze
Solution Henry Mure
***Solution huileuse au Nestosyl**
Solution Laroyenne
***Solution Pautauberge**
Solution Schoum
Solution Valens
Solution V.-E. Doumer
Solvochine
***Solvosclérose**
***Solvuric**
Somalginé
Somnacétine
***Somnicones**
***Somnifène Roche**
Somnitis
Somnoblol
Somnofan
***Somnopol**
***Somnothyrl**
***Sonagar**
***Sonamel**
***Sonène**
***Soneryl**
***Soporalosé**
***Soporigène Delqué**
***Sornyal**
Sorol Churchill
Sparablanc
Sparaplast Fournier
Spartéine Houdé
Spasalgique
***Spasmacol**
Spasma Couturieux
***Spasmalginé Roche**
Spasmicet
***Spasminé Jolly**
Spasmolyse
Spasmopurino
***Spasmosédine**
- ARSAC**, Montélimar (Drôme).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 pl. du Marché, La Rochelle (Ch.-Inf.).
CARRION, 54, fg St-Honoré, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 à Annonay (Ardèche).
 72, r. St-Dominique, Paris.
 7, bd Denain, Paris.
 10, f. de Constantinople, Paris.
 19, r. St-Roch, Paris.
 52, r. Decamps, Paris.
BOMEL, Annonay (Ardèche).
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 83, bd de la Villette, Paris.
 14, r. de Birague, Paris.
 18, av. Daumesnil, Paris.
MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 194, r. de Rivoli, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
LYONS, 30, r. Monge, Paris.
 50, r. de l'Université, Liège.
TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 80, r. du Rocher, Paris.
 Lab. **CANTIN**, Palaiseau (S.-ct-O).
MICHELON, 20, bd Heurte-loup, Tours.
 id.
 2, pl. des Vosges, Paris.
SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
POINTET & GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 12, r. Castiglione, Paris.
SAUTER, à Bellegarde (Ain).
 18, r. de Jouvence, Dijon.
 9, r. Dieu, Paris.
DUTEIL, 90, av. de St-Ouen, Paris.
 Alexandre, 41, r. de Rome, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 7, r. Aug.-Lançon, Paris.
 1, r. Christine, Paris.
 24, av. de Châtillon, Paris.
MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 6, r. d'Assas, Paris.

- Spasneurol**
Spécific Brachat
***Spécifique Bejean**
Spécifique Broca
Spécifique Lancelot
Spécifique Rousset
***Spectrol**
Sphérulines - Moncour
 (Voir *Opothérapie*)
Sphinkterol
Spiralguine
Spirillan
Spirobismol
Spirogyl
***Splénarmone**
***Splénocarbène**
Splénocrinol
***Splénocrisine**
***Splénodose**
***Spleno-Magnésium**
***Splénomanganol**
Splenora
Splénose
Splenotanin
***Spyrolides**
***Stal-Kosal**
Stabyne
***Stalysine**
***Stanion Couturieux**
Stanno-Bardane Henry
Stannolip Henry
***Stannoxyd**
Staphyloxyl
Staphyloxyl
***Staphylagone**
***Staphylase du Dr Doyen**
***Staphylocide Audras**
***Staphylo-coccine Fraquet**
Staphyloplast
***Staphylostanol**
***Staphylo-Vaclydun**
Staré Dupraz
Stasol
Stéarol
- 64, bd Barbès, Paris.
 Lab. chimico-pharmac., à Livry-Gargan (S.-et-O.).
 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.
 100 ter, av. St-Mandé, Paris.
 9, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
 46, av. Victor-Hugo, Boulogne-s.-Seine.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 Lab. SERVIER, Orléans.
 23, r. de Berne, Paris.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 La Biothérapie, 131, r. Cambronne, Paris.
 BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 88, r. Duhesme, Paris.
 Lav. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 47, r. de Neuilly, Nanterre.
 FAURE, 80, r. du Rocher, Paris.
 191, fg St-Antoine, Paris.
 LÉONARDON, Arcachon (Gironde).
 163, r. de Flandre, Paris.
 GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 62, bd Jean-Jaurès, B.-s.-Seine.
 REBOUL, Pt. Ste-Maxence.
 41-47, r. Docteur-Blanche, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.
 39, r. Sclessin, Liège.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 WARIN, 4, chemin de la Muette, Paris.
 CARRION, 54, fg St-Honoré, Paris.
 LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
 112, r. de Gerland, Lyon.
 21, r. Chaptal, Paris.
 FOURNIER, Dijon.
 51, bd. S. rasbourg, Paris.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 41, r. Etienne-Marcel, Paris.
 LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
 M. Bonnet, Saint-Etienne.

- Sténergine**
Sténofor Lumière
Sténol Chanteaud
Stenon du D^r Gelm
Sténophyl Vigan
Sténovarine
***Stéramine**
Stéridrophil Wuhrlin
Stérilait
Stérinase Vincent
Stérobi
Sterocalcium
***Stérogyl du D^r Roussel**
Sthénoléine
***Sthenoxal**
Stibial
Stock-Vaccin Bovy-
Cantonnet
Stomachine
Stomacol Boulet
***Stomagyl**
Stomal
***Stomarine Billault**
***Stomarol**
Stomaton
***Stomaxines**
***Stoméol Vichy**
Stommol Leisyn
***Stomobrol**
***Stomophile**
***Stomoxygène**
***Stopral**
***Stovaine Billon**
***Stovarsol**
***Stovédrine**
***Strepto-vaclydun**
Strictoforme Dausse
Strontium Paraf-Javal
Strontiurane
Strophantal
***Stropaantine et Stro-**
phantus Catillon
***Strychnal Longuet**
***Strychnarsitol Robin**
Strychno Cacodyl
Stryphnotonin
- 4, pl. des Vosges, Paris.
 23, cours de la Liberté, Lyon.
 54, r. Franco-Bourgeois, Paris.
 D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
 103, r. Saint-Lazare, Paris.
 132, r. de Turenne, Paris.
 Lab. Antiseptiques Chlorés,
 40, r. Thiers, Le Havre
 à Hou'ouville (Eure).
 10, r. Cardinal-Mercier, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 15, r. Catulienne, St-Denis.
 132, r. de Turenne, Paris.
 Lab. Chimiothérapie, 89, r. de
 Cherche-Midi, Paris.
 47, r. Bokanowski, Asnières.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 19, r. Drouot, Paris.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 14, r. Eugène-Delacroix, Paris.
 143, c. de la Somme, Bordeaux.
 Lab. PY, 58, bd R.-Wallace,
 à Puteaux (Seine).
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 ROLLAND, 31, r. des Francs-
 Bourgeois, Paris.
 6-8, r. Lacretelle, Paris.
 6-8, r. Lacretelle, Paris.
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 4, av. Brazza, Romainville
 (Seine).
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 2 bis, r. du Chevalier-de-la-Barre,
 à St-Quentin.
 47, r. Bokanowski, Asnières.
 SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 id.
 LICARDY, 38, bd Bourdon,
 Neuilly-sur-Seine.
 27, r. Desrenaudes, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 8, r. Vivienne, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Para-
 dis, Paris.
 62, r. Marengo, St-Étienne.
 3, bd Saint-Martin, Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.
 13, r. de Poissy, Paris.
 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
 34, r. Pasteur, Fontenay-sous-
 Bois.

- *Stupho
 Succharure Leprince
 Succomussuline
 Suc-Durham
 Suckine
 Sucre Diabetalm
 *Sucre Edulcor Ferré
 Suc Simon
 Sucroquinine
 Suc Wiandyl
 Sudyl Roberts
 *Sulf ampoules
 Sulfan
 Sulfarène
 *Sulfarsenol
 Sulfarsinol Lefèvre
 Sulfate d'Atropine Clin
 Sulfate de quinine Léo
 Sulfhydral Ch. Chan-
 teaud
 Sulfinal
 Sulfo-benzol
 Sulfo-bore Roy
 *Sulfobyl
 *Sulfocadol
 *Sulfocrème Liless
 Sulfodelbiase
 *Sulfodermol
 *Sulfoidol Robin
 Sulfol Charlard
 *Sulfoline Rozet
 Sulfo-Mésarca Roche
 Sulfo-mel du Dr Fayès
 Sulfo-Perless
 Sulforéon
 Sulfo-rhinol Fayès
 Sulfosine Léo
 *Sulfo-Thiorine
 Sulfostan
 Sulfozal
 Sulfoxyne
 *Sulfur concentré Dax
 *Sulfureux Pouillet
 *Sulfurine du Dr Lan-
 glebert
 *Sulfurion Couturieux
 *Sulfuryl Monai
 38, r. Mainguy, Bondy (Seine).
 62, r. de la Tour, Paris
 10, r. de l'Orne, Paris.
 14, r. de Birague, Paris.
 12, av. Stéphane-Mallarmé, Paris
 61, r. Vandamme, Paris.
 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
 Chalon-sur-Saône.
 7, r. Guillaume-Budé, Mont-
 geron.
 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
 5, r. de la Paix, Paris.
 Cauterets (Htes-Pyr.).
 DALAYEUN, Sannois (S.-et-O.)
 (Lab. du), à Agen.
 19-21, r. Van-Loo, Paris.
 52, r. Decamps, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris,
 11, square Marie-Louise, Bru-
 xelles.
 54, r. Francs-Bourgeois, Paris.
 98, r. J. Maillotte, La Madeleine.
 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 81, bd Suchet, Paris.
 Lafarge, 6, bd Arago, Paris.
 16, r. Henri-Regnault, Courbe-
 voie.
 FISCH & C^{ie}, 4, r. d'Illzach,
 Mulhouse.
 8, r. Vivienne, Paris.
 FLAHAUT, 74, r. Monge, Paris.
 13, r. de Poissy, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 à Vendôme (Loir-et-Cher)
 21, pl. des Vosges, Paris.
 3, r. du 4-Septembre, Paris.
 26, r. Friant, Paris.
 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-
 du-N.).
 199, r. St-Denis, Paris.
 11, square Marie-Louise, Bru-
 xelles.
 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 CAVAILLES, 29, r. Singer,
 Paris.
 FANYAU, 48, r. Claude-Lor-
 rain, Lille.
 43, r. Laffitte, Paris.
 MORELLET à Bagnoles-de-
 l'Orne.
 62, r. du Cardinal-Lemoine.
 9, r. de la Perle, Paris.
 13, av. Hoche, Paris.
 6, r. Bridaine, Paris.

***Sulf.-Y**

Sulphaqua Pépin
Sulphénine Trouette

Sulphium

Sunoxol**Super-digestif*****Supernucléine Legrand*****Suppargyre du D^r Faucher**

Supparsol

Suppo-Cuivrol

***Suppo-Gynals**

Suppositoires Almine
Louveau

Suppositoires Anugeol

Suppositoires au Nestosyl**Suppositoires Chau - mel*****Suppositoires Corbière**
Suppos. Corbière au 606***Suppositoires à l'Esculéol**

Suppositoires Eon

Suppositoires Gonnon**Suppositoires Hymel**

Suppositoires Lama-
line

Suppositoires Logeais**Suppositoires Midy*****Suppositoires Pachaud*****Suppositoires Pepet*****Suppositoires Pyrax*****Suppositoires Rocav*****Suppositoires Royer*****Suppositoires S. F. E.**
A. T.

Suppotonic Lagoutte

Suppo-Vaccin Salan-
tale

Suprarénidine

Suractivase

Suralimentine Rolland

***Surbical**

Surrénale - Endocri-
sines Fournier

Surrénaline Bouty

SALAVERT, Ste-Foy-la-Grande
(Gironde).

116, bd Haussmann, Paris.

15, r. des Immeubles-Industriels,
Paris.

BRISSON, 157, r. Championnet,
Paris.

KUHLMANN, 145, bd Hauss-
mann, Paris.

96, r. Monge, Dijon.

96, r. Monge, Dijon.

24, bd de Clichy, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

Matray, Aubières (Puy-de-D.).

124, r. du Bac, Paris.

78, bd des Batignolles, Paris.

BOEGLIN, 26, r. Ste-Claire,
Mulhouse.

72, r. St-Dominique, Paris.

78, fg Saint-Denis, Paris.

27, r. Desrenaudes, Paris.
id.

16, r. Henri-Regnault, Cour-
bevoie.

3, r. des Rouairies, Dinan (C.-
du-N.).

14, r. Victor-Hugo, Lyon.

DUTEIL, 90, av. de St-Ouen,
Paris.

AFFRE, St-Mandé (Seine).

24, r. de Silly, Boulogne-sur-S.

4, r. du Colonel-Moll, Paris.

130, bd Haussmann, Paris.

56, bd. Péreire, Paris.

Lab. Chavialle, 70, Gde-Rue,
Sèvres (S.-et-O.).

116, bd Haussmann, Paris.

223, r. Saint-Martin, Paris.

16, r. Catulienne, St-Denis.

229, cours Gambetta, Lyon.

42, r. Grandes-Arcades, Stras-
bourg.

OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.

122, r. du Cherche-Midi, Paris.

41, r. d'Amsterdam, Paris.

42, r. Mont-Cenis, Paris.

7, r. Biscornet, Paris.

3, r. de Dunkerque, Paris.

Surrénötanic Grémy
 *Sylcase Grysa
 Sylvol
 Sylvor
 *Sympathyl
 Synase
 Syncaïne Clin
 *Syncrines Choay
 *Synergyl Vadam
 *Synthaline B
 Synthol

14, r. de Clichy, Paris.
 7, r. Saint-André, Le Mans.
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 4, q. Pasteur, Sète.
 26 bis, r. Dombasle, Paris.
 40, r. des Acacias, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,
 Paris.
 48, r. Théophile-Gautier, Paris.
 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 Lab. CRUET, 13, rue Miollis,
 Paris (XV^e).
 3 à 9, r. de l'Abreuvoir, Bou-
 logne-sur-Seine.

T

Tabedo
 Tablettes Boval
 Tablettes de Brides
 Tablettes Enurésan
 *Tablettes Hova
 Tablettes oxymenthol
 Perraudin
 *Tablettes Perroud
 Tablettes Renard
 Tablettes de Phos-
 pharsol
 Tablettes de thyroïde
 *Tablettes Zeva
 *Taburol Monal
 *Tachygastrine
 *Taenifuge Bardet
 Taenifuge des Dames
 de France
 *Taenifuge du D^r Du-
 hourcau
 *Taenifuge du D^r Jac-
 quème
 Taenifuge Ercé
 *Taenifuge Kirn
 Taenifuges Limousin

SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 DEHAY, Arras (P.-de-C.).
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 KUNTZMANN, à Ribeauville
 (Haut-Rhin).
 Lab. Zyma, 4, r. Bellart, Paris.
 Lab. SCIENTIA, 21, r. Chap-
 tal, Paris.
 3, r. Sébastien-Gryphe, Lyon.
 GIBAN, à Sens (Yonne).
 17, r. Rochechouart, Paris.
 CATILLON, 3, bd Saint-Martin,
 Paris.
 60, c. Emile-Zola, Lyon.
 6, r. Bridaine, Paris.
 DUCLOY et C^{ie}, Arques (Pas-de-
 Calais).
 76, r. de Sèvres, Paris.
 119, r. de Sèvres, Paris.
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 CHIARINI, Aix-en-Provence.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
 sur-Seine.
 10, r. du Bac, Paris.

- *Tamar Indien Grillon DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.
- *Tamarine 4, rte de Médoc, Le Bouscat (Gironde).
- *Tampol Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
- Tampovules Corbière 27, r. Desrenaudes, Paris.
- Tanacétyl Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Tanisol MIGNON, 119, r. de Noisy, Les Lilas.
- Tannarsol 119, r. de Sèvres, Paris.
- Tanno-Bismuth REBOUL, Pont-Ste-Maxence.
- *Tanno-Calceine 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- Tannurgy 15, av. de Marlioz, Aix-les-Bains.
- Tanosal FEIGEL, à Lutterbach (Haut-Rhin).
- *Tapo Lab. MADYL, 14, r. Miromesnil, Paris.
- Tarbisol 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Tardospermine MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- Tartrate Borico-potas- 25, bd Beaumarchais, Paris.
- sique du Dr Gigon
- *Tartrate Borico-potas- 130, bd Haussmann, Paris.
- sique Pachaut
- Tartro-Bi Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
- Tartrobol 71, r. St-Jacques, Paris.
- *Taxol 46, av. des Ternes, Paris.
- *T. B. X. Métacrysine S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
- *Tébéphaguine Institut de Microbiologie, Sarrebruck.
- *Técarine SPECIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
- Tégéol 20, r. des Martyrs, Paris.
- Teinture de Cocheux 36, q. Fulchiron, Lyon.
- *Teinture de Sunoxol KUHLMANN, 145, bd Haussmann, Paris.
- Ténébryl 22, r. du Landy, St-Ouen.
- Teperos 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- Tercinol 158, r. Saint-Jacques, Paris.
- Tercodal 14, r. Demarquay, Paris.
- Tercolène 14, r. de Birague, Paris.
- Tercyn Chéron à Vincennes.
- Térébules Gallier 38, bd Montparnasse, Paris.
- *Tergyl Lamo 26-28, r. Paul-de-Kock, Paris.
- *Terkal Monal 6, r. Bridaine, Paris.
- Ternose Trouette 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
- Terpène iodé FROSSARD, 86, r. de Varenne, Paris.
- Terpine Boveil 9, pl. des Terreaux, Lyon.
- Terpine Duval 62, r. Marengo, St-Etienne.
- *Terpine Gonnon 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- *Terpine granulée BARON, 74, r. Monge, Paris.
- Terpinets 8, r. Vivienne, Paris.
- Terpinol Adrian 9, r. de la Perle, Paris.

- *Terpoxyl
 Tersol
 Teskrine
 Testicule - Endocrisines Fournier
 Tétralguine Routhier
 *Tetranitrol Roussel
 Tetrasthénol
 Tetrasulfol Vigier
 Testogan
 Thalaphyl
 Thalassan
 *Thalassotonine Vadam
 *Thaolaxine
 Thapsia Lé Perdrifol
 *Thébaïl
 *Thé de Brides
 Thé de l'Emyrne
 Thé Evine
 *Théinol Bailly
 *Théïsine Dubat
 Thelygan
 *Themsaline Zyma
 Théobromine Guillaumin
 Théobromine Houdé
 *Théobromine Invar
 Théobromine Rousseau
 Théobromine Vicario
 *Théobromose
 *Théobryl Roche
 Théosalvine
 *Théosalvose
 *Théovadil
 *Théovérine Laleuf
 *Théoxanthine
 Thermo-bloc
 *Thermocédone
 Thermoplaste
 Thermo-Vicardine
 *Thé Suédois
 Thiesdyne
 *Thigénol Roche
 *Thiocitran
 *Thiocol Roche
 Thiokéine
 *Thionhydroï Grémy
 Thiophyl
- JOLLY, 1, r. Christine, Paris.
 32, r. Carnot, Beaune (Côte-d'Or).
 89, Grande-Rue, Sens (Yonne).
 7, r. Biscornet, Paris.
 à Vierzon.
 10, r. Washington, Paris.
 19-21, r. Van-Loo, Paris.
 12, bd Bonne-Bouvelle, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 BOUTTET, à Rufec (Charente-Inférieure).
 49, r. Paradis, Paris.
 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 DURET & REMY, à Asnières.
 11, r. Milton, Paris.
 7, r. Galvani, Paris.
 46, Pierre-Charron, Paris.
 151, r. St-Maur, Paris.
 16, r. Barquette, Paris.
 15 et 17, r. de Rome, Paris.
 80, fg Saint-Denis, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
 4, r. Bellart, Paris.
 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
 9, r. Dieu, Paris.
 21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
 à Ermont (Seine-et-Oise).
 17, bd Haussmann, Paris.
 10, r. du Plâtre, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 13, r. Cherche-Midi, Paris.
 85, r. des Morillons, Paris (XV^e).
 20, r. du Laos, Paris.
 6, r. d'Assas, Paris.
 GAUDICHARD, à Châtellerault (Vienne).
 11, r. Lepic, Paris.
 COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).
 ACHARD, 15, r. du Commerce, Riom (P.-d.-D.).
 HERIN, 98, r. Jeanne-Mallotte, La Madeleine (Nord).
 BESNARD, 56, r. des Dames, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 THEVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.
 21, place des Vosges, Paris.
 4, imp. de Béarn, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.

- *Thiorine
 Thiosinamine Cognet
 *Thiosote-Lambiotte
 Thiosyl
 *Thio-terpine Dalin
 *Thorium-Rhemda
 *Thoroxy
 *Thymo-Mentol Eup-
 nique
 Thymus -Endocrisi-
 nes Fournier
 Thymine
 Thymol doré
 Thymoléine
 Thymosine Byla
 Thyratosine Byla
 Thyrénine Grémy
 Thyrocréine Grémy
 *Thyrodose
 Thyroïde - Endocrisi-
 nes Fournier
 Thyroïde Leo
 Thyroïdine Bouty
 Thyroïdine Byla
 Thyroïdine Couturieux
 Thyroïdine Flourens
 *Thyroïdine Gory
 Thyroïdine Henning
 Thyroïdine Meurice
 Thyrol A.
 Thyroxine Henning
 *Thyroxine Roche
 Tinctiode
 *Tiodine Cognet
 Tisane Cisbey
 Tisanes Dausse
 Tisane dépurative de
 Cavaillès
 Tissus Le Perdriel
 *Tochlorine
 Tegal
 Tonal
 Tonax
 *Tonicalcine
 *Tonicardine Gonnon
 Tonocardine
 Tonigène
 Tonigénine
- 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 M. BERGER, à Orléans.
 BOITAS & C^{ie}, 1 r. de la Mar-
 tinière, Lyon.
 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
 40, r. de Bellechasse, Paris.
 13, r. de Rivoli, Paris.
 7, r. Biscornet, Paris.
 11, ch. de la Muette, Paris.
 10, impasse Milord, Paris.
 ABOU, 26, r. Temple, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 id.
 14, r. de Clichy, Paris.
 id.
 47, r. de Neuilly, Nanterre.
 7, r. Biscornet, Paris.
 11, square Marie-Louise, Bru-
 xelles.
 3, r. de Dunkerque, Paris
 26, av. Observatoire, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 62, r. N.-Dame, Bordeaux.
 JOOSS, 7 bis, r. Général-Galliéni,
 Montreuil (Seine).
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,
 Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 107, r. des Dames, Paris.
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,
 Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 ROBERT et CARRIERE, 37,
 r. de Bourgogne, Paris.
 43, r. de Saintonge, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 29, r. Singer, Paris.
 11, r. Milton, Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 22, r. Godot-de-Maurai, Paris.
 61, r. de Seine, Paris.
 LYONS, 30, r. Monge, Paris.
 MARTINIE, 62, av. Philippe-
 Auguste, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 LECOQ, 56, fg St-Honoré, Paris.
 Labor, à Montrevel (Ain).

- *Tonikéine Chevretin
 Tonilécithine Rogier
 *Toni-Pectoral
 Toniphlébine Hardy
 Toniphos Baron
 Toniphosphine
 *Tonique Gonnon
 Tonique Koenig
 *Tonique Roche
 Tonique Zéva
 Toni sérum Freyssinge
 *Tonudol
 Tonyol "F"
 Tophol
 Topique Bertrand
 Topiques Chaumel
 Topique Nasal A. B. C.
 Topique pyorrhépha-
 gine
 Topique stomacal
 Dausse
 *Torigyre Lamo
 *Toritane Lamo
 *Toritanol Lamo
 Totalcalin
 Totaliode
 *Total-Tonic
 *Tot'Hamelis
 *Toussyl Py
 Trachovaccin Salantale
 Transpulmine
 Tranquital
 Tréparsénans
 *Tréparsol
 *Tréphonyl du Dr Rous-
 sel
 *Trépobiur
 Trépocidine
 *Trépol
 *Trépoquinol
 Tréposan
 Trépositoires
 Triase
 *Tribromure Gigon
 *Tricalcine
 *Tridigestine Dalloz
 52, r. Labruyère, Paris (IX^e)
 56, bd Péreire, Paris.
 ADRIAN, 9, r. de la Perle,
 Paris.
 200, r. de Tolbiac, Paris.
 Les Sables-d'Olonne.
 56, r. des Dames, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 37, av. Marceau, Paris.
 21, pl. des Vosges, Paris.
 60, cours Emile-Zola, Lyon.
 6, r. Abel, Paris.
 LICARDY, 38, bd Bourdon,
 Paris-Neuilly.
 VARGAS, 5, r. Chauveau-
 Lagarde, Paris.
 3, r. Condillac, Grenoble.
 à Oullins (Rhône).
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Lab. TIFFENEAU, 24, r. Mont-
 tessuy, Paris
 Croissy-sur-Seine.
 4, r. Aubriot, Paris (IV^e).
 26-28, r. Paul de Kock, Paris.
 id.
 id.
 S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarraïl,
 Le Havre.
 58, r. de Maubeuge, Paris.
 29, fg Bourgogne, Orléans.
 CHANTEREAU, 26 bis,
 Dombasle, Paris.
 58, bd Richard-Wallace, Pu-
 teaux.
 42, Gdes Arcades, Strasbourg.
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
 6, r. Bridaine, Paris.
 COMAR, 20, r. des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 LECOQ & FERRAND, 14, r.
 Gravel, Levallois-Perret.
 97, r. de Vaugirard, Paris.
 S. F. E. A. T., 15, r. Catulienne,
 St-Denis.
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 id.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie
 id.
 4, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 21, r. Chaptal, Paris.
 13, bd la Chapelle, Paris.

- *Tridynol
 Triféryl
 Trifloral Francois
 Triganol Vigier
 *Triglandine Bouty
 Triglandol Bouty
 Tri-Iodo-Ercé
 Trijumine Pelletier
 Trilactine
 *Triluès

 Trilysine
 *Trinitrine Caféinée Du-
 bois
 *Trinitrine-Papavérine
 Laleuf
 *Trinitrine Roussel
 Trinitrine Vicario
 *Triradol
 *Triseptine

 *Trisodyl Rozet
 *Tristyl Noyon
 Tritonine
 Triurase
 Trixy! Fraudin
 Tri-Zymol

 Troparin
 Trousses Dosurine
 Tryclene
 Trynol

 Tryparsamide

 Trypsogen
 *Tséamine

 Tuberculine C. L.
 Tubercuséine Leisyn
 *Tubérol
 *Tubes Blache
 Tubes Bromure Pa-
 chaut
 *Tubes Chauvin
 *Tubes Dulcis

 *Tubes Ferlux
 *Tubes du D^r Guiraud
 Tubes Levasseur
 Tubes Sals
 *Tulle gras Lumière
 *Tulle rose Beslier
 Fussomalt

 Tuya Feuillé
- 4, pl. de Strasbourg, Lille.
 37, r. Galilée, Paris.
 TACLET, Arras (P.-de-C.).
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 id.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 48, r. Jacob, Paris.
 14, r. de Birague, Paris.
 S. F. E. A. T., 15, r. Catulienne,
 St-Denis.
 49, r. Paradis, Paris.
 LALEUF, 20, r. du Laos. Paris.
 id.
 10, r. Washington, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 55, bd Strasbourg, Paris.
 LAMBERT, 6, r. de Longchamp,
 Vichy.
 BENDERITTER, a Vendôme.
 24, r. Paul-Bert, Paris.
 64, r. des Tournelles, Paris.
 46, r. de Rome, Marseille.
 4, av. Desieux, Boulogne-s.-S.
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
 Bruxelles

 16, r. Charlemagne, Paris.
 52, bd du Temple, Paris.
 FALVY, 40, r. des Acacias,
 Paris.
 SPECIA, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 DÉJÉCÉ, 7, r. Princesse, Paris.
 S. F. E. A. T., 15, r. Catulienne,
 St-Denis.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 1 bis, r. Montol, Paris.
 23, r. des Moines, Paris.
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
 130, bd Haussmann Paris.

 Aubenas (Ardèche).
 D^r FERRY, pl. Clichy, Monte-
 Carlo.
 G. BOUSQUET, à Albi.
 10, imp. Milord, Paris.
 23, r. de la Monnaie, Paris.
 Oullins (Rhône).
 23, c. de la Liberté, Lyon.
 COQUELÉ, Digoïn (S.-et-L.).
 U. C. E. P., 5, r. Labroque,
 Strasbourg.
 D^r BIDOT, 4, r. du Cirque.
 Paris.

Tymocalcine
Tympano

156, r. des Fauvelles, Courbevoie,
CHAUVIER, 66, r. Falguière,
Paris.

U

- *Uclarsyl 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Udanka Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
- *Ulcéobalnéine 76, r. des Rondeaux, Paris.
- *Ulcéobande id.
- *Ulcéoplaque id.
- *Ulcéosine id.
- *Ulcéosol id.
- Ulcérine Berger F. BOUVIER, 34, bd de la
Villette, Paris.
- *Ulcérophile Nosan 6^{ter}, r. Voltaire, La Garenne-
Colombes (Seine).
- Ulmaire Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
- *Ulmarené Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris.
- *Ultracao Laurençon 16, r. République, Villefranche-
s.-Saône.
- *Ultra-Levure 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- Ultrargen Leclepc 10, r. Vignon, Paris.
- Ultrasténil P. FONTANIER, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).
- *Ultra-Violets La Verrerie Scientifique, 12, av.
du Maine, Paris.
- *Ultravitamine 4 LAURENÇON, 16, r. Républi-
que à Villefranche-sur-Saône.
- Ultravitine P. FONTANIER, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).
- Uracétose 76, r. des Rondeaux, Paris.
- *Uralysol 46, av. des Ternes, Paris.
- Uraséol 17, r. Cadet.
- *Uraseptine Rogier 56, bd Péreire, Paris.
- *Urazine SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.
- *Ur-Clar ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- Urdol OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
- Urénile Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- Uréol Ch. Chanteaud 54, r. des Francs-Bourgeois,
Paris.
- Urgoplast FOURNIER, Dijon.
- *Uricémine 29, r. de Liège, Paris.
- Uricine 50, r. République, Puteaux.
- *Uriclarine 157, r. Championnet, Paris.
- *Urifluine 2, pl. des Vosges, Paris.

Uriloxal	108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
Urilysonne	109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
Uri-Magnétol	ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
Urisal du Dr Des-champs	20, r. du Laos, Paris.
*Urisanine	LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
Urixine	S. G. I. P., 73, r. Gal-Sarrail, Le Havre.
Urobényl	MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
Urobiose	4, imp. de Béarn, Paris.
Urobleu	4, imp. de Béarn, Paris.
*Urobuccol Malmarche	101, av. de Paris, Rueil (S.-et-O.),
Urocarbol	GENTON, Petit-Quévilly (S.-Inférieure).
Urocédrol	GALLO, à Aurillac.
*Uroclase	ALEXANDRE, 41, r. de Rome, Paris.
Urocléan	ADLER, 36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
Urococcine	20, r. du Laos, Paris.
Urocuroï	10, r. Maubeuge, Paris.
*Uroformine Gobey	89, r. du Cherche-Midi, Paris.
Urogène	Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
*Uroïdine	45, bd Lafayette, Calais.
Urolan	55, bd de Strasbourg, Paris.
Urol Neuville	239, fg St-Honoré, Paris.
Urolithiase	Sté Rég. de l'Ouest, Rennes.
Urolithol	3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
*Urométhyl	BRESSIER, 102, r. Vincent, Marseille.
*Urométine Lambiotte	20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
*Uromil	Dr BELIERES, 19, r. Drouot, Paris.
*Urophényl	CROUY, 73, d'Albuféra, Vernon (Eure).
*Urophile Bailly	15 et 17, r. de Rome, Paris.
Uroquinase	DUBOIS, 16, bd Péreire, Paris.
*Urosaly	GARDIOL, 6, r. Félix-Pyat, Marseille.
*Urosan	12, r. des Saints-Pères, Paris.
*Urozea	LOBRY, 6, r. Parrot, Paris.
Uteramine Zyma (Voir Hemosamine)	4, r. Bellart, Paris.
Utérol Léo	11, square Marie-Louise, Bruxelles.
*Uvargol	MARTINIE, 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
*Uvé	18, r. Saint-Amand, Paris.
*Uvéoline	Pharmacie Ambard, Carcès (Var).
Uvéovulés	AMBARD, Carcès (Var).
*Uvéphorine	37, r. Galilée, Paris.
*Uvesterol	18, r. Saint-Amand, Paris.
Uviostérine	(Voir : Irrastérine).

V

- Vabéol
Vacciderm
- *Vaccin anti-asthma-
tique du Pr. Minet
Vaccin antigonococci-
que
*Vaccin antigrippal du
Pr. Minet
*Vaccin anti-pneumoni-
que du Pr. Minet
Vaccin antitubercu-
leux Bössan
*Vaccin Demonchy
- *Vaccin de Weill et
Dufourt
*Vaccinothérapie ato-
xique Cépède
Vaccinovules
Vaccins antipollin
Vaccins Antitubercu-
leux Vaudremer
*Vaccins atoxiques sta-
bilisés
*Vaccins Bactériens
I. O. D.
Vaccins bactériophages
*Vaccins Bruschetti
Vaccins Clin
*Vaccins de Ronchèse
Vaccins du Dr Creuzé
*Vaccins Goldenberg
Vaccins Inava
Vaccins Irsi
Vaccins Lucinia
Vaccins microbiens
caratifs
*Vaccins pansements
*Vaccins Polyvalents
Renard
*Vaccins Sténé
Vacciplast
*Vaccydon Vaclyderm
Vacodyl
- 30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris
UNIS-SPES, 14, r. Demar-
quay, Paris.
Lab. STÉNÉ, 2, pl. des Vosges,
Paris.
OLIVIERO, 41, r. Denfert-
Rochereau, Paris.
2, place des Vosges.
2, place des Vosges.
Lab. des Indus. Biologiques,
26, r. Royale, Paris.
THERAPLIX, 98, r. de Sèvres,
Paris.
37, r. de Bourgogne, Paris.
60, r. Mathurin-Régnier. Paris.
23, r. des Moines, Paris.
26, av. Observatoire, Paris.
ST-BENOIT, 6 bis, r. Monsieur,
Paris.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon,
Paris.
Lab. Biochimie Médicale, 16,
r. Dragon, Marseille.
46, r. de Verneuil, Paris.
7, r. Biscornet, Paris.
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
6, r. Rothschild, Nice.
1, r. Bonaparte, Paris.
IVAGO, 17, r. de Provence, Paris
26, r. Pagès, Suresnes (Seine).
4 ch. de la Muette, Paris.
(Voir : *Formo-vaccins*).
GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
VIRULTRA, à Launay-Ser-
quigny (Eure).
37, r. de Bourgogne, Paris.
2, pl. des Vosges, Paris.
FOURNIER, Dijon.
27, r. Desrenaudes, Paris.
25, r. Petits-Hôtels, Paris.

- Vacuoline**
Vadérol
***Vagosédyl**
Vagotonic Fournier

***Valbornine Rogier**
***Valbrol**

***Valedyl**
***Valénal**
Valéral Puy
***Valéramyl Foulon**

Valérianate Gabail
Valergyl Doucet
***Valérianate Grignon**
Valérianate Pachaut
***Valérianate Pierlot**
***Valériane Byla**
Valériane Dausse
***Valériane Gmet**
***Valériane Pachaut**
***Valérianose Gigon**
***Valeriflore**
***Valérinodor Malmanche**
***Valerium Paul Thibault**
***Valérobromine Le-grand**
***Valéromenthol**
***Valéronal**

Valéthryne
Valimyl Clin
***Valovarine**
***Valovosan**

Vals St-Jean
***Valthène**
Valtine
Valyl Midy
Vamétol
***Vanadarsine Guillaumin**
Vanadine Chevrier
Vaniol
Vansol
Vanucléol
Varicine
Varicolyse

Varicure Marck
***Varilaxine**
***Varisclérine**
***Variserum Lebon**
Vasculine
- 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).
 DURAND, à Joigny (Yonne).
 20, r. des Martyrs, Paris.
 Institut physiologique, Vaucresson (S.-et-O.).
 56, bd Péreire, Paris.
 MAYOLY, 1 pl. Victor-Hugo, Paris.
 191, fg St-Antoine, Paris.
 NOVALIS, Oullins (Rh.).
 à Grenoble (Isère)
 14 bis, r. de la République, à Ermont (Seine-et-Oise).
 5, r. Lefebvre, Paris.
 r. Gambetta, Bolbec.
 2, r. Duphot, Paris.
 130, b. Haussmann, Paris.
 26, r. Saint-Claude, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 4, r. Aubriot, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 130, bd Haussmann, Paris.
 25, bd Beaumarchais Paris.
 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
 101, av. de Paris, Rueil (Seine-et-Oise).
 48, r. d'Alésia, Paris.
 DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.
 10, r. Poncelet, Paris (XVII^e).
 BERGER, 14, r. des Pyramides, Paris.
 39, r. de la Chapelle, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 64, r. d'Orsel, Paris.
 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois.
 53, bd Haussmann, Paris.
 51, r. de Tourtille, Paris.
 12, r. Tour-des-Dames, Paris.
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
 14, r. de Périgueux, Angoulême.
 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
 21, fg Montmartre, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 18, r. Maréchal-Foch, Versailles.
 37, r. Pajol, Paris.
 12, r. Cadet, Paris.
 DAGRAN, 16, r. Salaire, Tarascon (Bouches-du-Rhône).
 à Neuilly-sur-Seine.
 164, r. Saint-Honoré, Paris.
 61, r. de Seine, Paris.
 à Charost (Cher).
 4, imp. de Béarn, Paris.

- *Vascurol**
Vasocônes
Vasoconstrictine
Vasogènes Pearson
***Vasolaxine**
***Vaso-Neurine**

***Vaso-Rhinol**
Vaxa du Dr Boucard
***Véganine**
***Végéphos**
***Végétol Fournier**
***Véguya Wander**

Veinaldol
Veinargyre

Veinhormones Logeais

Veinicura
Veinofluine
Veinoglandol
Veinophiline
***Veinoposine**
***Veinoserum Abadie**

***Veinosine**
***Veinotrope**
Veinyl
Velledol Adrian
***Velpeau (bande de crêpe)**
***Vénecine**
***Véralgine**
Veramone
***Vérianne Buriat**
Vermicure Pigeon
***Vermifuge Cornet**
Vermifuge des Moines

Vermifuges Pivot
Vermifuge Rabi
Vermifuges Sorin
***Vermirène Audibert**
Vermitox

Vermosol
***Vernis à la Diachusine**
Verocodal Boeglin
Véroginol
***Véronidia Buisson**
Verruccin Leo

Verrucure
***Verrulyse**
***Verticurine**
- GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).**
BRUN, Demi-Lune, Lyon.

id.
48, r. d'Alésia, Paris.
7, r. Biscornet, Paris.
Lab. Pathologie Glc de Paris, 5
r. François-Ponsard, Paris.
20 bis, r. Gravelotte, Toulouse
30, r. Singer, Paris.
19, r. Pagès, Suresnes (Seine)
21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
8, r. des Quatre-Fils, Paris.
151 bis, r. de Joinville, Cham-
pigny.
64, bd Barbès, Paris.
29, r. des Jardiniers, Mon-
treuil (Seine).
24, r. de Sully, Boulogne-sur-
Seine.
42, bd Péreire, Paris.
239, fg St-Honoré, Paris.
156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
27, r. Poids-Farine, Marseille.
40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
3, pl. Intérieure St-Michel, Tou-
louse.
5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
46, av. des Ternes, Paris.
4, imp. de Béarn, Paris.
9, r. de la Perle, Paris.
21, r. des Nonnains-d'Hyères,
Paris.
7, r. des Italiens, Paris.
38, r. du Mainguy, Bondy.
Cruet, 13, r. Miollis, Paris.
25, r. Copernic, Paris.
18, r. de Jouvence, Dijon.
7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
2, r. Marché-des-Blancs-Man-
teaux, Paris.
PUY, Grenoble (Isère).
14, r. Turgot, Limoges.
TROMBETTA, Blain (L.-Inf.)
Cinq Cantons, Bayonne.
BOULLÉ, 12, av. de la Gde-
Armée, Paris.
46, r. du Bac, Asnières. *
142, r. de Picpus, Paris.
26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
101, av. Mozart, Paris.
98, r. de Sèvres, Paris.
11, square Marie-Louise, Bru-
xelles.
6, r. d'Auteuil, Paris.
MIGUET, Villefranche (Rhône).
GRIAS, 47, r. Feray, à Corbell
(Seine-et-Oise).

- *Vesicatoire rose Bes-
lier
- Vésicatoires d'Albes-
peyres
- Vexillan
- Viburniode
- Viburnum Gmet
- *Viceliase
- *Vichy Purgatif
- Vichy Rapide
- *Vigardyne
- Vigine
- Vigogastrine
- *Vigostérol
- Vigotonal
- Vilax
- Vin à l'extrait de foie
de morue
- Vin d'Anduran
- Vin Aroud
- *Vin de Baudon
- Vin Boillaud
- Vin Bravais
- Vin de Beef Lavoisier
- *Vin de Bugeaud
- *Vin de Carnéose
- *Vin de Chassaing
- Vin de Coca du Pérou
- Vin des Indes
- Vin Désyless
- *Vin diurétique Pyrola
- Vin énergétique Fra-
dier
- Vin Gallia
- *Vin Girard
- Vin de Kola Midy
- *Vin de Lavoix
- Vin de Moride
- Vin de Séguin
- Vin de Vial
- *Vin Lux Gaillac mous-
seux
- Vin Mariani
- Vin Mory
- Vin Nourry
- Vin Oophorine
- *Vin Raimoa Tonic
- Vin St-Raphaël
- COQUELU, Digoin (S.-et-L.)
- FUMOUE, 78, fg Saint-Denis,
Paris.
- 89, av. Wagram, Paris.
- GIRY, 49, r. de Metz, Nancy.
- 27, fg Montmartre, Paris.
- 71, av. de la République, Cham-
pigny (Seine).
- 7 bis, r. Galvani, Paris.
- 22, r. de l'Arcade, Paris.
- 21, r. du Chemin de fer, Sceaux.
- AMBLARD, Cunlhat (P.-de-D.).
- 222, r. Duguesclin, Lyon.
- B R I C H A R D, Bar-le-Duc,
(Meuse).
- 122, bd Murat, Paris.
- 16, bd Filles-du-Calvaire, Pa-
ris (XI^e).
- 21, Fg Montmartre, Paris.
- MOUSNIER, à Sceaux.
- 6, r. Dombasle, Paris.
- 12, r. Charles-V, Paris.
- 172, r. d'Alésia, Paris.
- 3, r. Mogador, Paris.
- Usine du Blosset, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).
- 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
- Usine du Blosset, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).
- 1, quai Aulagnier, Asnières.
- 21, Fg Montmartre, Paris.
- 61, r. de Seine, Paris.
- Levallois-Perret (Seine).
- 19, r. des Chalets, Toulouse.
- 53, bd de Verdun, Fontenay-
sous-Bois.
- 7, r. des Petits-Carreux, Paris.
- 48, r. d'Alésia, Paris.
- 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- (Voir : Beef Lavoix).
- LANDRIN, 12, r. de la Répu-
blique, Puteaux.
- 165, r. Saint-Honoré, Paris.
- 36, pl. Bellecour, Lyon.
- 6, av. Foch Gaillac (Tarn).
- 41, bd Haussmann, Paris.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
Bruxelles.
- 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,
Paris.
- Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- 264, bd Voltaire, Paris.
- à Valence (Drôme).

- Vin Surtonique Val**
 Notre-Dame
Vin Tonic Tiffeneau
Vin Tonique F. K.
Vin Urané Pesqui
Vin Voguet
 ***Vioforme Ciba**
Vioformol Ciba
Violet Bidot
 ***Viophan**
 ***Viosten**

 ***Vioxyl Mouneyrat**
Viridol
Viriligen
Virilium

Viscine

Visco-dermine

 ***Viscoserum**
Viscosodine
Visco-Veine Fosset

 ***Viscum Zyma**
Visvitis
 ***Vitacalcine Moncour**

Vitaderme Bergonier
 ***Vitadone**
 ***Vitagéine**
Vital Extrait

Vitalogène

Vitamina
Vitamine Rogier
 ***Vitaminol**

 ***Vitamorrhaine**

 ***Vitamyl**
Vitaphorine

 ***Vitargyl**

Vitasol

 ***Vitastérol**

Vitazem
 ***Vitène**
 ***Vitergomine**
- Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre, (Cher).
 24, r. de Monttessuy, Paris.
 46 av. des Ternes, Paris.
 au Bouscat-Bordeaux.
 5, r. Eug.-Delacroix, Paris.
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 id.
 4, r. du Cirque, Paris.
 81-83, r. de Lille, Roubaix.
 D^r LESCENE, 58, r. de Vouillé, Paris et Livarot (Calvados).
 Villeneuve-la-Garenne (Seine).
 65, r. Monge, Paris.
 DEGÉCÉ, 7, r. Princesse, Paris.
 MERMINOD, 49, r. Paradis, Paris.
 11, r. de Fontainebleau, Kremlin-Bicêtre.
 FOSSET, 21, Gde-Rue, Montfermeil (Seine-et-Oise).
 55, bd Strasbourg, Paris.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 21, Gde-Rue de Montfermeil (S. et-O.).
 4, r. Bellart, Paris.
 7-9, bd Haussmann, Paris.
 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
 122, bd Murat, Paris.
 BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 SÉGUIN 7, r. Ste-Isaure, Paris.
 E. BASSOL, à Ste-Alvère (Dordogne).
 REBOUL, Pont-Ste-Maxence, (Oise).
 8, r. Vivienne, Paris.
 56, bd Péreire, Paris.
 BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 Usines du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 POINTET & GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 49, r. d'Angoulême, Cognac (Charente).
 F. GUILBERT, 10, r. du Collège, Arras (P.-de-C.).
 85, r. Turbigo, Paris.
 12, r. Charles-V, Paris.
 Pharmacie centrale de Belgique, 12, r. du Téléphone, Bruxelles.

Vitosine Décornez	a Ornans (Doubs).
Vitricine Carves	à Chambéry (Haute-Savoie).
Vivassol	78, fg Saint-Denis, Paris.
Viviodol	41, r. de Marseille, Paris.
Vivo-Dynergol	BROTHIER, 163, r. St-Denis, Paris.
*Vivoléol	24, r. de Fécamp, Paris.
*Vocaldop	222, fg St-Martin, Paris.
Vogénol	13, r. de la République, Yzeure- Moulins (Allier).
Voltargol Robin	43, r. de Poissy, Paris.
*Vonol	MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
Vulcapil Brisson	157, r. Championnet, Paris.
*Vulcase Brisson	157, r. Championnet, Paris.
*Vulnérine Bergen	DUCOQ, Langeais (I.-et-L.).

W

Wantor	BÉRAUD, 13, pl. de la Nation Paris.
*Wismuthane Vély	132, av. Victor-Hugo, Paris.

X

Xanthocol	37, r. de Bourgogne, Paris.
Xémaderm	59, r. Châteaudun, Paris.
Xylosulfol Vigier	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

Y

*Yaourtine	18, pl. Laborde, Paris.
*Yo-Androl	ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
Yogourth (Extrait de)	23-25, r. Singer, Paris.
Yoghourt Karlos	à Lécluse (Nord).
Yoghourt Lactella	à Tourcoing.
Yoghourt Lagnel	7, r. de la Pépinière, Paris.

- *Yo-Gynine
 Yohourth Carrion
 Yohimalt
 Yohimbine Gilbert
 *Yohimbine Vicario
 Yprine
 Yse
 Ystaline
 Yzeurol
- ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
 54, fg St-Honoré, Paris.
 U. C. E. P., 5, r. Lahroque, Strasbourg
 2, r. du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 4 bis, r. Hébert, Courbevoie (Seine).
 62, r. Louis-Blanc, Paris.
 2, pl. du Th.-Français, Paris.
 26, av. Tourville, Paris.

Z

- *Zaryl
 Zébo-Plastol Dumesnil
 Zédéno
 *Zimbyl
 Zinc-Sulfarsénol
 Zingal
 Zistazine
 *Zohol
 *Zomine du Pr. Richet
 Zomol
 Zomo-maltine
 *Zomo-musculosine
 Byla
 *Zymatine-Lescène
 *Zymogastrine Kervan
- CHAUZEIX, 26, r. Pradier, Ville-d'Avray (Seine-et-Oise).
 10, r. du Plâtre, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 CHAUZEIX, 26, r. Pradier, Ville d'Avray (Seine-et-Oise),
 19-21, r. Van-Loo, Paris.
 11, ch. de la Muette, Paris.
 163, r. de Flandre, Paris.
 46, av. des Ternes, Paris.
 34, r. Sedaine, Paris.
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
 172, r. d'Alésia, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 à Livarot (Calvados) et 58, r de Vouillé, Paris.
 81-83, av. Ledru-Rollin, Paris.

4^e Partie

NOMENCLATURE
DE
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
CLASSÉES
PAR LABORATOIRES

- Lab. Abadie Tanzi**, 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse. — *Asclérogénol* (cachets), *Baume de la Faculté*, *Cachets digestifs du D^r Bern*, *Diocol*, *Essence landaise*, *Gouttes calciques Zanit*, *Gouttes halogènes du D^r Bern*, *Gouttes pectosérum*, *Moruxase*, *Neurotrol*, *Ovules halogènes du D^r Bern*, *Urolithol granulé*, *Veinosérum*.
- Lab. d'Actino-Biologie**, 16, r. de la République, Villefranche-sur-Saône. — *Serifer Laurençon*, *Ultracao Laurençon*, *Ultravitamine 4*.
- Lab. Adam**, Granville (Manche), *Adrénocalcine*, *Chloci*.
- Lab. Adol (M. Giroud)**, 78, cours de la Liberté, Lyon. — *Baume Adol*, *Blennopiat*, *Cachets Adol*, *Potion Adol*.
- Lab. Adoue**, Pauillac (Gironde). — *Fantine*.
- Lab. Adrian et Cie**, 9-11, rue de la Perle, Paris. — *Adrianine*, *Adrialgine*, *Arrhénal*, *Comprimés Adrian*, *Dragées Adrian*, *Extrait de céréales Adrian*, *Formine*, *Levure de bière*, *Liqueur peptophosphorique*, *Radiobaume Adrian*, *Sulfurine du D^r Langlebert*, *Toni-pectoral*, *Vellédol Adrian*.
- Lab. de l'Aigue d'or**, 53 bis, bd de la Liberté, Lille. — *Aigue d'or*.
- Lab. Pierre Alexandre**, 41, rue de Rome, Paris. — *Decorpa*, *Enzypan*, *Hamaméline Roy*, *Normacol*, *Phénol Bobeuf*, *Pilules Myosotis*, *Pilules Roy*, *Radiolysine*, *Réargon*, *Spasmacol*, *Uroclase*.
- Lab. de l'Amibiasine**, 58, rue de Miromesnil, Paris. — *Amibiasine*, *Bioentérase*, *Intestase*.
- Lab. Amicros**, 9, boul. Edgar-Quinet, Paris. — *Amicrargol*, *Etain Amicros*, *Fer Amicros*, *Orargol*, *Ovules Amicros*, *Sarcoptol*.
- Lab. des Prod. Amido**, 4, pl. des Vosges, Paris (IV^e). — *Amidal*, *Backerine*, *Génatropine*, *Génésérine*, *Genhyoscyamine*, *Génomorphine*, *Génosthéniques*, *Génoscopoline*, *Génostychnine*, *Vitamyl irradié*.
- Lab. H. Ammann**, 3, impasse Adam, Boulogne-sur-Seine. — *Belhemine*, *Blocs Vécov*.
- Lab. de l'Amphotonyl**, 20, rue du Bourg, Laon (Aisne). — *Amphotonyl*, *Arsecrinol*.
- Lab. des Ampho-vaccins (Ronchèse)**, 6, rue Rothschild, Nice (A.-M.). — *Ampho-pulvérisateur Ronchèse*, *Ampho-tablettes*, *Ampho-vaccin anti-infectieux*, *Ampho-vaccin anti-staphylococcique*, *Ampho-vaccin antityphoïdique T. A. B.*, *Ampho-vaccin pulmonaire*, *Ampho-vaccin urinaire*, *Ampho-vaccin intestinal*, *Ampho-vaccin pansement antipyogène*, *Ampho-vaccin pansement rhino-pharyngien*, *Pyo-amphogel*.
- Lab. Angelini**, 61, rue de Seine, Paris. — *Depuriode*, *Nutréol*, *Onction Angelini*, *Ovules Patrat*, *Poudre Deol*, *Poudre Fiore*, *Sirop Alba*, *Sirop Patrat*, *Tonal*, *Vin des Indes*, *Varisclérine*.

- Lab. de l'Angiolymph, 4 bis, rue Hébert, Courbevoie. — Angiolymph du D^r Rous, Argycuprol, Yprine.
- Lab. de l'Aniodol, 3-9, rue des Alouettes, Nanterre. — Algalan, Aniódol.
- Lab. de l'Antasthme, 199, av. Victor-Hugo, Aubervilliers. — Antasthme Cibrand.
- Lab. des Antigénines, 1, pl. Lucien-Herr, Paris. — Antigénines, Biazan, Cresentyl.
- Lab. des Antiseptiques chlorés, 40, rue Thiers, Le Havre. — Clonazone, Stéramine.
- Lab. de l'Aphosal, 48 bis, av. Mozart, Paris. — Aphosal.
- Sté d'Application pharmacodynamique, 5, rue Claude-Decaen, Paris. — Erythra Dyn, Phylla Dyn, Rhocya Dyn.
- Sté générale d'Applications thérapeutiques « Théraplrix », 98, rue de Sèvres, Paris. — Bromure Souffron, Crescol Buisson, Freinix Buisson, Féroxal Buisson, Grassyl Buisson, Hématonine Buisson, Iodure Souffron, Ixiun Buisson, Mésothorium Buisson, Nitium Buisson, Nujol, Ostréine Buisson, Quino-thorium Buisson, Réalphène Buisson, Sédol, Vaccin Démonchy, Véronidia Buisson.
- Lab. L. Arquevaux, Pharmacien, pl. de la Bastille, Etampes (S.-et-O.). — Elixir thiogaiacolé Arquevaux, Eupeccoral, Glyctone phosphatée Charrière, Sel hépatique U. N. Arquevaux.
- Lab. Aseptor, 21, rue Feydeau, Paris (II^e), — Aseptorhine, Auriculine, Boréol, Glycalcion, Otagol, Rhinaspir, Rosaseptor.
- Lab. P. Astier, 41-47, rue du D^r-Blanche, Paris. — Arhéol, Condurango granulé Astier, Colitique, Glycophosphates granulés Astier, Kola Astier, Néo Riordine, Quinquina granulé Astier, Riordine, Stalysine.
- Lab. du D^r E. Aubert, 3, pl. Jussieu, Paris : Créatonine, Métaformine, Pancrébile.
- Lab. Aubry, 54, r. de la Bienfaisance, Paris. — Cellu-Son, Malarsan, Quinby.
- Lab. Marcel Audibert, Cinq-Cantons, Bayonne. — Gélipurine Audibert, Vermirène Audibert.
- Lab. Audras, 112, rue de Gerland, Lyon. — Staphylocide Audras.
- Lab. Augier, 2, rue des Lombards, Paris. — Biocalcine, Mensupsédy, Noctisédy.
- Lab. Axarel, 15, rue Catulienne, St-Denis. — Balsaseptor, Bléomaltine, Crème Graziana, Poudre Cylisia, Galactésia, Phosphatol vitaminé irradié, Sirop Axaria, Sirop de dentition Aldeni, Sirop Gabi, Sirop Myrianis, Sirop vermifuge Remonia.

- Lab. Bailly et Cie**, 15, rue de Rome, Paris (VIII^e). — *Anaxeryl*, *Forxol*, *Glucolactol*, *Huilaixine*, *Ménatol*, *Opobyl*, *Pastapalm*, *Phaguryl*, *Pulmosérum*, *Quergémol*, *Theinol*, *Urophile*.
- Lab. du Dr Baissade**, Saint-Loup, Marseille (B.-du-Rh.). — *Baume du Dr Baissade*.
- Lab. du Baldisedan**, 133, rue Lecourbe, Paris. — *Baldisedan*.
- Lab. Bardet**, 76, rue de Sèvres, Paris. — *Cachets Kapytan*, *Capsules Bardet*, *Solution Bardet*, *Taenifuge Bardet*.
- Lab. du Dr Barey**, 37, av. Jules-Coutant, Ivry-sur-Seine. — *Formocitriné*, *Mesogastriné*.
- Lab. C. Baron**, Les Sables-d'Olonne. — *Antiseptinol Baron*, *Séroléine granulée Baron*, *Toniphos Baron*.
- Lab. Bassin**, 38, r. de Mainguy, Bondy (Seine). — *Stupho*, *Véralgine*.
- Lab. Basuyaux**, 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois (Seine). — *Demalgon*, *Novatropin*, *Stryhnotonin*, *Valovbsan*.
- Lab. B. C. L.**, 29, fg de Bourgogne, Orléans. — *Alsodine*, *Gastrépatine*, *Mictoseptol*, *Total Tonic*.
- Lab. B. E. A.**, 17, faub. des Ancêtres, Belfort. — *Alibourine*, *Curoxyure*.
- Lab. Beau**, 36, rue des Archives, Paris. — *Angiosédine*.
- Lab. Beaufour**, 44, r. de la Manufacture-Nationale, Beauvais. — *Romàrène*.
- Lab. Beauxis-Lagrange**, 74, quai Jemmapes, Paris. — *Acatar*, *Bénzamine*, *Calomel R. B. Lagrange*, *Cérébrinol A et B*, *Cinnolipol chaulmoogré*, *Kamara C. 47*, *Infusion orientale RBL*, *Myrcol*, *Néophos Pipérazine RB Lagrange*, *Prostatols*.
- Lab. du Spécifique Bejean**, 12, rue des Hospitalières-St-Gervais, Paris (IV^e) et 30, r. des Francs-Bourgeois. — *Spécifique Bejean*.
- Lab. Belhomme**, 2, rue Tiron et 13, rue de Rivoli, Paris. — *Thymo menthol eupnique Belhomme*.
- M. Belières**, 19, rue Drouot, Paris. — *Absturic*, *Antirrhôide*, *Arachise*, *Argion*, *Dépuratif Kromelinch*, *Désensibilysine*, *Eusomnine*, *Lauréol*, *Orthogénol*, *Sirop Gribell*, *Uromil*.
- MM. Benderitter et Cie**, Vendôme (L.-et-C.). — *Gastrocâol*, *Neutralcaol*, *Sulfoléine*, *Trisodyl Rôzet*.
- Lab. du Dr Bengué**, 16, rue Ballu, Paris. — *Baume Bengué*, *Dragées Bengué*, *Chloréthyle*.
- Lab. Béral**, 194, r. de Rivoli, Paris. — *Adrénoides*, *Adréphédrine Beral*, *Clearol*, *Ephédrine Beral*, *Rhinodrops*, *Somnicones*.

- Lab. Berger**, 14, rue des Pyramides, Paris. — *Calciphose, Glutinettes d'Aspirine, Gynéose, Mariode, Ostéoglandulol, Valéronal.*
- Lab. Bergevin**, Châteaudun (E.-et-L.). — *Arrhénuclène.*
- Lab. G. Bernhard**, 11, rue Lafayette, Paris. — *Ampélidine Bernhard, Baume Bernhard, Cachets parégoriques Bernhard, Granulés des Vosges, Poudre antigestasique Bernhard, Pommade Bernhard.*
- Lab. G. Berthon**, Dornes (Nièvre). — *Asthmo Actine Berthon.*
- Lab. de la Bexinine**, 6, r. Ballainvilliers, Clermont-Ferrand. — *Bexinine.*
- Lab. Beytout**, 12, bd St-Martin, Paris. — *Aérophagyl, Carbonésie, Kaolinase, Thiophyl, Tisane Cisbey.*
- Lab. de Biochimie médicale (Ch. Desgrez, Dr en pharmacie)**, 19-21, rue Van-Loo, Paris. — *Arsénos solvant. Ced-Roc, Sulfarsénol, Tétrasthénol, Zinc sulfarsénol.*
- Lab. Biologie appliquée (MM. Carrion et Cie)**, 54, l'aub. St-Honoré, Paris. — *Antasthène, Cardistreptine, Evalmine Carrion, Gonagone, Hématoéthyrôidine, Hépanème, Opothérapie Carrion, Ovules au gonagone, Pancrétokinase, Phlébosine M. et F., Plasma de Quinton, Staphylagone.*
- Lab. de Biologie**, 3, r. de l'Arbre, Marseille. — *Poudre Cutirexine.*
- Lab. de Biologie médicale**, 10, r. de Strasbourg, Paris. — *Microlyse.*
- Lab. de Biologie médicale**, 7, av. des Sources, Nice. — *Antipiol, Entérofagos.*
- Lab. Biologique de l'Île de France**, 3, rue Laugier, Argenteuil (S.-et-O.). — *Appétyl, Aloplastine, Iodocalcium, Neurocalcium, Laxor.*
- Lab. de la Biomarine**, Dieppe (S.-Inf.). — *Arthritose, Ionyl, Marinol.*
- Lab. du Bionéol**, 14, r. Périgueux, Angoulême. — *Bionéol, Vamétol.*
- La Biothérapie**, 131, rue Cambronne, Paris. — *Antivirus, Arapal, Bili-vaccins, Crysiodal, Sanogyl, Spirogyl.*
- Lab. du Biotrigon (M. Lorthioir)**, 8, rue Pierre-Girard, Paris. — *Biotrigon.*
- Lab. Bloch**, Tomblaine près Nancy (M.-et-M.). — *Arrow-root, Blokao, Farines de régime, Farines de Céréales, de légumes et de fruits, Rapidoats, Semoules et flocons de céréales, Tapiocas.*
- Lab. Idon Bloch**, 89, r. St-Georges, Nancy. — *Pancréatose Idon, Poudre Cosy.*
- Lab. Blouin**, 50, r. de Turenne, Paris. — *Adénoseptyl, Fluocholine.*
- Lab. Boissy**, 49, rue Hoche, Courbevoie. — *Ampoules Boissy, Causyth (comprimés), Iode organique Boissy, Sanex-Inhalant.*

- Lab. **Bomel**, Annonay (Ardèche). — Ampoules V.-E. Doumer, Bi-iodural Novat, Collutoire V.-E. Doumer, Iodural Novat, Kreofos Novat, Pommade V.-E. Doumer, Pilules V.-E. Doumer, Solution V.-E. Doumer.
- Lab. **Bonetti frères**, 12, rue Vavin, Paris. — *Diadermine*.
- Lab. **Bottu**, 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris. — *Codoforme Bottu*, Gaze néolée, Néol, Néolides, Ovunéol Bottu.
- Lab. **Boudin**, 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-le-Pont. — *Révuksif Boudin*.
- Lab. **Bouillet**, 50, bd des Batignolles, Paris. — *Bismuth Tulasne*.
- Lab. **des Boules Quiès**, 47, bd Victor, Paris. — *Boules Quiès*.
- Lab. **E. Boule**, 12, av. de la Grande-Armée, Paris. — *Cataplasme du Dr Lelièvre*, *Géranine*, *Sérosine Boule*, *Vermilox*.
- Lab. **Boulommier**, 24, r. Keller, Paris. — *Poudre Bellada*.
- Lab. **du Dr Bourdeau**, Parthenay. — *Détergine*.
- Lab. **Bousquet et Leroux**, 46, r. de la Barrière, Elbeuf. — *Cralégine*, *Sédatuline*.
- Lab. **Bouteille**, 23, rue des Moines, Paris. — *Gantéine*, *Disuryl*, *Neurobore*, *Tubérol*, *Vaccinovules*.
- Lab. **Boutroy**, 8, rue de Passy, Paris. — *Eugastrol*, *Exonérol*.
- Lab. **Bouty**, 3, rue de Dunkerque, Paris. — *Biliol*, *Gastrozymase*, *Globépal*, *Liqueur Bouty*, *Liquides organiques injectables*, *Métasérum*, *Métharfer*, *Métharsol*, *Méthylarsinates*, *Néphrine*, *Opothérapie Bouty*, *Ovigénine*, *Produits Pennès*, *Sérosthényl*, *Sirop de Gaïarsol*, *Surrénaline*, *Thyroïdine*, *Triglandine*, *Triglandol*.
- Lab. **Bouvelot**, 62, rue d'Antibes, Cannes. — *Acodros*, *Inhalol*.
- Lab. **Bouvot Auvers-sur-Oise** (S.-et-O.). — *Oéréliode*.
- Lab. **Bracquemond et Cie**, 105, rue de Normandie, Courbevoie. — *Morrhuéline Juncken*, *Rhagadine Bracquemond*, *Sel d'Ewald*.
- Lab. **Ch. Brésil**, 12, rue St-Gilles, Paris. — *Broncosol*, *Sanguil*.
- Lab. **J. Bressier**, 102, rue Vincent, Marseille. — *Adrénargol*, *Nasobore*, *Résocaïne*, *Urométhyl*.
- Lab. **Brichard et fils**, Bar-le-Duc (Meuse). — *Baby Bala*, *Hémovéine*, *Pastilles Bala*, *Sirop Bala*, *Vigostérol*.
- C^{ie} de **Brides (Sous-Produits)** voir M. M. Ricardou et Cie.
- Lab. **Pierre Brisson**, 157, rue Championnet, Paris. — Ampoules *Egralène*, Ampoules *huile soufrée*, Ampoules *Sigmuth*, Anytal Brisson, Cathiote Brisson, *Denisia*, *Denisoline*, *Dithioléine* Brisson, *Entéricure* Brisson, *Jovine* Brisson, *Laccodermes* Brisson, *Lenicade* Brisson, *Licardel* Brisson, *Procula* Brisson, *Savon Denisol* Brisson, *Vulcase* Brisson, *Vulcapil* Brisson, *Uriclarine* Brisson, *Septylase* Brisson, *Sulphium* Brisson.
- Lab. **Bruneau et Cie**, 17, rue de Berri, Paris. — *Sénophile*, *Sérum de Jousset*.

- Lab. du Dr Brunerye, 10, r. St-Antoine, Paris. — *Entero-septyl*, *Lysiode*, *Neubryne*.
- Lab. A. Brunot, 16, rue de Boulainvilliers, Paris. — *Dialyl*, *Sel de Hunl*.
- Lab. Buriat, 25, rue Copernic, Paris. — *Arséniode Buriat*, *Vériane*.
- Établ. Byla, 26, av. de l'Observatoire, Paris. — *Amino-sel Amunine*, *Antélobine*, *Gui Byla*, *Hormovarine*, *Insuline Byla*, *Héparmone*, *Irrastérine*, *Musculosine*, *Neurotrophol*, *Opothérapie Byla*, *Paralactine*, *Phylactone*, *Phytogénine*, *Piluilobine*, *Splénarmone*, *Valériane*, *Vitadone*, *Vitaminol*, *Zomo-musculosine*.
- Lab. Caillaud, 37, rue de la Fédération, Paris. — *Aldine*, *Choléo Combretol*, *Cyanhérmine*, *Dioradin*, *Hydralin*, *Mucosodine*.
- Lab. Calmel-Domergue, 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse. — *Arsétonyl*, *Biiodures Domergue*, *Dermodiol*, *Eucalcine*, *Gonurool A. et B.*, *Hexarubrine*, *Iodures Domergue*, *Pangynol*, *Pharyngaseptyl*, *Vaso-rhinol simple*, *Vaso-rhinol mentholé*, *Vaso-rhinol adrénaliné*, *Viscosodine*.
- Lab. Camuset, 18, rue Ernest-Rousselle, Paris. — *Hexotal*, *Pyrétane*, *Silicyl*.
- Lab. du Canol, 5, r. des Lyonnais, Paris. — *Canol*.
- Lab. Cantin, Palaiseau (S.-et-O.). — *Gouttes Nican*, *Somnothyrid*.
- M. J. Capin, Pharmacien, Roquefort (Landes). — *Antiphi*, *Libérine*.
- Lab. Caresmel, 2, quai Paul-Bert, Tours. — *Antonal*, *Granulé Caresmel*, *Lucodal*.
- Lab. Carlier, à St-Florentin (Yonne). — *Colarsénol*, *Infangyl Carliers*.
- Lab. Carron, 69, rue de St-Cloud, Clamart. — *Amiphène*, *Fosfoxyl*, *Fosyls*.
- Lab. Carteret, 15, rue d'Argenteuil, Paris. — *Bactioxyne*, *Cétémol*, *Chrysemine*, *Diurène*, *Euronal*, *Lusoforme*, *Sinahin*.
- Lab. du Castanol, 9, pl. Municipale, Tulle. — *Sirop Castanol*.
- Lab. Catillon, 3, boul. St-Martin, Paris (III^e). — *Glycérine Catillon*, *Iodo thyroïdine Catillon*, *Peptone Catillon*, *Strophantine Catillon*, *Strophantus Catillon*.
- Lab. du Dr R. Cavaillès, 29, r. Singer, Paris. — *Broncho-*

plastre, Coloplastre, Crème du Dr Rap, Crème de Sapolan, Emplâtres Rogé-Cavaillès, Extrait du Dr Rap, Gaze Anadhère, Lait de Cèdre Sapolan, Lait de Sapolan, Lait de soufre Sapolan, Poudre de Sapolan, Sapobarbe, Sapocade, Sapocrème, Sapolan, Sapopale, Savon de Sapolan, Sulfoslan, Tisane dépurative de Cavaillès.

- Lab. Central, 129, rue de Turenne, Paris (III^e). — *Lactaris*.
- Lab. Cesbron, 63, rue de la Falsanderie, Paris. — *Gélor*, *Ioda*.
- Lab. du Céthocal, 8 bis, rue J.-J.-Rousseau, Fontenay-sous-Bois. — *Céthocal*.
- Lab. Chaix, 8-10, rue de l'Orne, Paris (XV^e). — *Colloïdogénine* du Dr Bayle, *Polypaline* du Dr Bayle.
- Lab. P. Chambon, 5, pl. Francheville, Périgueux (Dordogne). — *Antisciatique* P. Chambon.
- Phie R. Chantereau, 51, r. Paris, Pierrefitte (Seine). — *Gastrodium*.
- Lab. Chantereau, 26 bis, rue Dombasle, Paris. — *Mucinum*, *Sympathyl*, *Tot Hamélis*.
- Lab. des Charbons Fraudin, 4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine). — *Benzopale* de naphtol Fraudin, *Biscots*, *Carboiodure* Fraudin, *Charbon* Fraudin naphtolé, *Charbon* Fraudin simple, *Laxol* Fraudin.
- Lab. Charmaison, 26, av. de Royat, Chamalières (P.-de-D.). — *Dragées* de Royat, *Gobérol*, *Levurase*.
- Lab. V. Charret-Tomasi, Saint-Just-sur-Loire (Loire). — *Diabétuline*, *Diurégine*.
- M. Henri Chartier, Saumur. — *Le Raisin quotidien*.
- Lab. Chassaing Le Coq et Cie, 1, quai Aulagnier, Asnières (Seine). — *Poudre laxative* de Vichy, *Vin* de Chassaing.
- Lab. Pierre Château, 137, av. Parmentier, Paris. — *Digéryl*, *Energétyl*, *Gélaç*, *Inhalyl*, *Sinuzyl*.
- Lab. Chatelut, 65, rue Louis-Blanc, Paris. — *Dragées Yse*.
- Pharmacie Chaumel, 87, rue Lafayette, Paris. — *Isotonyl* Bourel (poudre de Lausanne), *Normalensol*.
- Établ. Alfred Chauvin, Aubenas (Ardèche). — *Acoégénol*, *Tubes Blache*, *Tubes Chauvin*.
- Lab. biologique Chauzeix, 26, r. Pradier, Ville-d'Avray. — *Banikol*, *Zaryl*, *Zimbyl*.
- Lab. Chavialle, 70, Grande-Rue, Sèvres. — *Baume Saihel*, *Dynamocalcine*, *Fornose*, *Suppositoires Pyrax*.
- Lab. Chevillon, 99, rue de Paris, Massy (S.-et-O.). — *Bilio-gastrine*, *Moriland*, *Nucleigène*, *Paradoline*, *Stoméol* Vichy.
- Lab. Chevretin-Lematte, 52, r. La Bruyère, Paris. — (Voir Lab. Lematte et Boinot)
- Lab. Chiarini, Aix-en-Provence (B.-du-R.). — *Elixir vermi-fuge* chiarini, *Tæniyuge* du Dr Jaquème,

- M. Chibret**, 5, rue St-Hérem, Clermont-Ferrand. — *Gollyres Chibret « Optima »*, *Pommades ophtalmiques Chibret « Optima »*.
- Lab. Chimico-thérapeutique de Paris**, 24, rue Paul Bert, Paris. — *Ixogyne*, *Névosol*, *Pepsodia*, *Phyltergol*, *Rylal-Noyon*, *Tristyl-Noyon*.
- Lab. de « Chimie appliquée de Nanterre »**, 22, boul. du Couchant, Nanterre. — *Néotrophène*.
- Lab. Français de Chimiothérapie**, 89, rue du Cherche-Midi. — *Bivatol*, *Ditagel*, *Gynœstryl*, *Folliculine cristallise Sterogyl* du Dr Roussel.
- Lab. Choay**, 40, rue Théophile-Gautier, Paris. — *Extraits opothérapiques Choay*, *Extraits injectables*, *Extraits totaux Choay*, *Folliculine Choay*, *Gélotanin Choay*, *Opothérapie Choay*, *Peptosthénine Choay*, *Post-hypophyse Choay*, *Synchrines Choay*.
- Christiaens (Lab. de la Pharmacie de la Place-Royale)**, 2, rue du Champ-de-Mars, Reims. — *Antialgos Christiaens*, *Benzophosphine Christiaens*, *Capsules Goubaux*, *Pilules anhépatiques Christiaens*, *Pilules prophylactiques Christiaens*, *Sédatine Christiaens*.
- Lab. Churchill**, 12, rue de Castiglione, Paris. — *Limol Churchill*, *Magol Churchill*, *Poliol Churchill*.
- Lab. Ciba**, 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon (Rhône). — *Agomensine*, *Androstine*, *Ascéine*, *Atoquinol*, *Cibalgine*, *Coagulène*, *Coramine*, *Dial*, *Dialacétine*, *Didial*, *Digifoline*, *Elbon*, *Ferrophytine*, *Fortossan*, *Fortossan irradié*, *Hémypnal*, *Lipoiodine*, *Percaïnol*, *Percaïne*, *Péristaltine*, *Phytinate de quinine*, *Phytine*, *Résyl*, *Salène-Salenal*, *Sanoquinol*, *Sistomensine*, *Vioforme*, *Vioformol*.
- Lab. du Cimatryl**, 4, pl. Royale, Nantes. — *Cimatryl*.
- Etabl. C. I. P.**, 128, r. Vieille-du-Temple, Paris. — *Dialine*.
- Lab. Claëys**, 1, bd St-Martin, Paris. — *Babeurre Nutricia*, *Nutro*.
- Lab. Claverie**, 4, av. Brazza, Romainville. — *Occi-Gourme*, *Stomobrol*.
- Lab. du Clupeyl**, 69, av. Faidherbe, Malo-les-Bains. — *Clupeyl*.
- Lab. Cluzel**, 60, cours Emile-Zola, Lyon. — *Gouttes Milko*, *Mictualine*, *Révuksif Milko*, *Tablettes Zéva*, *Tonique Zéva*.
- Lab. des Prod. Cognet (Armingeat et Cie)**, 43, rue de Saintonge, Paris (III^e). — *Agonol Cognet*, *Capsules Cognet*, *Dragées de fer Cognet*, *Dragées Dubourg*, *Hemoneurol Cognet*, *Nuclarène Cognet*, *Tiodine Cognet*, *Thiosinamine Cognet*.
- Lab. A. Coirier**, 69, av. du Maine, Paris. — *Codérax*, *Marrucol*.
- Lab. Colas**, 133, r. Lecourbe, Paris. — *Curoraisin*.
- Sté des Prod. Collas et Boudault**, 15, rue Augustin-Thierry, Paris. — *Pyrélaïne Collas*.
- Lab. Raoul Columbeau**, 19, rue St-Bazile, Marseille. — *Gualodine*, *Poudre Cassarini*.

Complexes colloïdaux du Dr Biquoir (Lab. Merminod et Cie),
49, rue de Paradis, Paris. — Colloïxols, Néoplatysine^s,
Préaloxol, Vonol.

Lab. des Complextraits Huckel, Héricourt (Hte-S.). — Complextraits. Condunango, Complextraits. Convallaria, Complextraits Cratægus, Complextraits digitale, Complextraits G. P. V., Complextraits H. H., Complextraits Kola, Complextraits Marron, Complextraits Valériane.

Lab. Comte, 60, rue St-Guilhem, Montpellier. — Bulles d'Haley, Marrubiase, Rythmosystol.

Lab. C. Cons, rue des Ecoles, Chambéry. — Juglane.

Lab. du Coprex, 39, r. de Clichy, Paris. — Coprex.

Lab. Coqueli, Digoïn (S.-et-L.). — Compressif Beslier, Cochluplaste, Thermoplaste, Tulle rose Beslier, Vésicatoire Rose Beslier.

Lab. Corbière, 27, rue Desrenaudès, Paris. — Alcalinose, Broncho-Vaclydun, Coli-Vaclydun, Créagénol, Cytocholine, Cyto-manganol, Cytophédrine, Cyto-sérum, Cyto-Strychnine, Dermatine, Fixococcine, Geno-Vaclydun, Hémocyto-sérum, Iolase, Novarsénobenzol, Oléoformine, Oliolase, Opolaxyl, Paludase, Pyo-Vaclydun, Praunase, Rhin-Vaclydun, Sérum anti-asthmique de Heckel, Staphylo, Strepto-Vaclydun, Suppositoires Corbière, Suppos-Corbière, au 606, Vaclydun-Vaclydèrm.

Lab. Cornaud et Brossard, 1, rue des Cordouans, La Rochelle. — Névralgol Brossard.

Lab. Cortial, 15, boul. Pasteur, Paris. — Androcalcion, Cortiode, Dohyfral, Gynocalcion, Iodaseptine, Lita, Septicémine.

Lab. Coulloux, 116, rue du Pont, Auxerre. — Sirop Brahma.

Lab. Cousin, rue Albert I^{er}, Beaumont-sur-Oise. — Hépatergol.

Lab. G. Coussinet, 20, rue des Martyrs, Paris. — Bursol, Codocol, Opotonine, Vagosedyl.

Lab. Couturieux, 18, av. Hoche, Paris. — Anti-paludique. — Argolion, Arsenion, Aurion, Abanazol, Azufrol, Bismuthion, Bromiase, Cidrase, Collargol, Cuprion, Cytuline, Diurétique, Fébrifuge, Fer-ion, Glésol, Glycolactimase, Héracléine, Hydrargyriol, Iodurase, Lactimase, Lantol, Leuvre extractive, Lecurine brute, Métaux colloïdaux, Cénase, Panglandine, Plurion, Polyformiate, Séléniol, Selvan, Spasma, Stanion, Sulfurion, Thyroïdine.

Lab. de la Créoformine, 18, r. de Jouvence, Dijon. — Créoformine.

Lab. Croc, 57, av. Jean-Jaurès, St-Fons. — Canypaïne.

Lab. Crouy, Vernon (Eure). — Urophényl.

Lab. Cruet, 13, rue Miollis, Paris. — Arcanan, Atophan, Atophanyl, Synthaline B.

- Lab. Cuguillière**, 19, rue des Chalets, Toulouse. — *Sérum végétal, Vin Pyrola*.
- Lab. de la Curatine Brunet**, 23, rue des Ecoiffes, Paris. — *Curatine Brunet*.
- Lab. du Curogène**, 145, r. Yves-le-Coz, Versailles. — *Curogène*.
- Lab. Daguin**, 7-13, rue Bobillot, St-Maur (Seine), — *Choléolactol, Novo Lactol, Pneumostyl, Purganol*.
- Lab. Dalet**, 94, bd des Batignolles, Paris. — *Furonculase, Baume Dalet, Lénicure-Vichy, Papier Fayard et Blayn*.
- Lab. Dalichoux**, 36, r. de Verdi, Nice. — *Globules Rebaud, Digestif Dal, Moka du Travailleur, Pastilles norvégiennes*.
- Lab. Dalin**, 49, quai St-Vincent, Lyon. — *Cérébrosthénine, Glycocarpine, Kydalose*.
- Lab. Dalin (R. Boitias et Cie)**, 1, r. de la Martinière, Lyon. — *Cyanhermyl, Thio-Terpine Dalin*.
- Lab. Dalloz et Cie**, 13, boul. de la Chapelle, Paris. — *Antalgol, Glycérophosphate, Gosiérine, Hémoglobine, Tridigestine*.
- Lab. Daniel Brunet**, 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s-Seine. — *Coréine, Cholergine, Hépato-Byl, Neurène, Novobrol, Ostéo-hépatine, Ovobiol, Ovothyrol, Pulvita, Stal Kosal, Ténifuge Kirn, Tanno-calcine*.
- Lab. Danjou**, 28, rue de l'Hôpital-Militaire, Lille (Nord). — *Anapeptone, Peptone Vassal*.
- Prod. Dannec'h (MM. Brun et Martineau)**, 64, rue des Tournelles, Paris. — *Chloridia, Cigares Gicquel, Elixir du Dr Thermes, Laxia Dannec'h, Manganésia, Papier Gicquel, Fritonine*.
- Établ. Darrasse**, 13, rue Pavée, Paris. — *Pepto-fer du Dr Jaillet, Tamar Indien Grillon, Valérobromine Legrand*.
- Lab. Darrasse**, 7-13, rue St-Maurice, Nanterre. — *Choléine Camus, Choléine lactique, Dragées Séranti, Eupnine Vernade, Lactobaciline, Opsolysine*.
- Lab. P. Daumas**, 3, r. Ch.-Gounod, St-Raphaël. — *Dentoryl*.
- Lab. Daupez**, 37, rue des Lois, Toulouse (Hte-Gar.). — *Myoden*.
- Lab. Daussa**, 4, rue Aubriot, Paris. — *Ampoules névrosé-
niques, Camphodausse, Fondants, Gouttes, Hémogénol,
Intrails, Moréthyl, Paveron, Sérodausse*.
- Lab. du Dr Debat**, 60, rue de Prony, Paris. — *Filtrat.
Inosepta, Inogyl, Inorenol, Inorhinyl, Inosepta, Ino-*

septa ophthalmique, Inosphacelol, Inosplenol, Inotyol, Inoxemol, Inoxyl, Pancrinol, Provitol.

Lab. Debruères, 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.). — *Anasec-tol, Baume Tanex, Pâte pectorale du P^r Williams.*

Lab. Dechartre, 20 bis, r. Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois. — *Bronchoforme.*

Lab. Déchosal, 39, rue de la Gare, Bondy. — *Aldor formo-gène, Opo-Vacuoline, Rhumatoïdine, Vacuoline.*

Lab. Defresne, 19, r. Jacob, Paris. — *Pancréastase Defresne.*

Lab. Deglaude, 6, rue d'Assas, Paris. — *Cardibaine, Digi-baine, Theoxantine, Spasmosédine.*

Lab. Dehaussy, 66, rue Nationale, Lille. — *Anti-asthmine, Capsules et sirop Préga, Céréossine, Crédone, Crypther-mol, Diastogène, Entérobyl, Gladyl, Hermarsinol, Hermomulhol, Leucosérum, Sédoneurol, Sinrénaline.*

Lab. Dehay, 58, rue St-Géry, Arras. — *Inhalone, Poudre Gynule, Tablettes Boval.*

Lab. Déjardin, 10, rue Parent-de-Rozan, Paris. — *Extrait de malt français Déjardin, Laxatone Déjardin, Levure Déjardin, Levuro-Maltine Déjardin, Malt français Déjardin, Mycodermine Déjardin.*

Lab. Delalande et Cie, 16, rue Henri-Regnault, Courbevoie. — *Baume Suella, Esculéol, Neuroplasma Fort, Neuro-plasma Massif, Neuroplasmine, Polyminéral, Solu-camphre, Sulfocadol, Suppos. à l'esculéol.*

Lab. Delfour, Pouillon (Landes). — *Oléo-mel laxatif.*

Lab. Deliss, 10, r. de la Mairie, Ivry-sur-Seine. — *Catalyl Mg, Magbromyl, Magiodyl, Magsalyl Mg.*

Lab. Delorme, 13, r. St-Agricol, Avignon. — *Cachets diges-tifs Carbowil, Musclanol, Perles Jeka.*

Lab. Demasles, 5 pl. Miremont, Vienne (Isère). — *Atihal, Biogénol, Hématogénine, Ménosédine, Myrtiline, Phos-pholéose, Sédospasmine.*

Lab. Denis, 85 bis, rue du Ranelagh, Paris. — *Glottyl.*

Lab. Denisot, 19, rue de Fleurus, Paris (VI^e). — *Carbolactyl simple, Carbolactyl bilié, Cervol, Hémosédine.*

Lab. Depruneaux, 18, rue de Beaune, Paris. — *Diemenal, Dienol, Dragées Elkin, Granules Elkin, Hypophé-drine, Normalarine, Soderséine.*

Lab. de la Dermofagine (L. Sagot), 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer. — *Dermofagine, Dys-pepsia, Dyuril, Holocalcine, Raiforyl.*

Lab. Dr Derozier, 24, r. Jardel, Bordeaux. — *Anozyl, Buccol-lan, Laryngolan, Otolan, Rhinolan.*

Lab. Deschiens, 9, rue Paul-Baudry, Paris. — *Hémoglobine Deschiens, Holos, Hépathémo.*

Lab. Descoureaux et fils, 52, bd du Temple, Paris. — *Chloro-Magnésion, Dragées Lumeval, Ovules Vézès, Tryclène.*

Lab. du Détensyl, 8, av. Walkanaer, Nice. — *Detensyl.*

- Lab. Diabétalim**, 61, r. Vandamme, Paris. — *Diabétalim*.
- Lab. du Diasclérol**, 26, r. de Norvins, Paris. — *Diasclérol*.
- Sté de Spéc. Diététiques et pharmaceutiques** (Cow et Gate), 22, r. des Belles-Feuilles, Paris. — *Chocolat Milk* (C. G.), *Lait sec* (C. G.), *Peptalac*.
- Lab. de la Digastrine**, 11, r. St-Agricol, Avignon. — *Digastatine*.
- Lab. du Dolophos**, 61, rue de St-Quentin, Caudry (Nord). — *Dolophos*.
- Lab. Charles Domergue**, Agen (L.-et-Gar.). — *Antiasthmatique D.*, *Antifuronculeux D.*, *Crayons antifissure Domergue*, *Elixir vermifuge Allvers*, *Gatercodéine*, *Naso-Sulfolarsan*, *Prurigne Sentini*, *Sirop Sentini*.
- Lab. Dor** (M. Dorantowicz, Pharmacien), 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Alcamfétol*, *Benzylocalcium*.
- Lab. Dorantowicz**, 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Chéloïdine*, *Curiodé*, *Hormobiline*, *Mésosforme*, *Morrhudlène* Gauthier, *Panfêbrine*, *Stomophile*.
- Lab. de la Dosurine**, 16, rue Charlemagne, Paris. — *Dosurine* (Trousses).
- Lab. Douetteau**, 20, r. du Fg St-Honoré, Paris. — *Neurovarol*.
- Lab. Drapier**, Lucquy (Ardennes). — *Ampoules Reipar*, *Ostéoéptine D^r Drapier*.
- Lab. Drouet et Plet**, 37, rue de Marly, Rueil (S.-et-O.). — *Anexol*, *Byliréine*, *C. 40 comprimé*, *C. 40 injectable*, *Magnésie hydratée*, *Néo-physiosthénine*, *Ozobiase*, *Ozobiase opothérapique*, *Oxyléine*, *Phosoforme*, *Phosphirine*, *Physiosthénine*, *Plombyl*, *Quinéase*, *Rosétyl A. et B.*, *Salysérum*.
- Sté Française du Dryco**, 5, rue St-Roch, Paris. — *Dryco* (lait sec).
- Lab. du D^r Dubat**, 30, faub. St-Denis, Paris. — *Ovale Rhinol*, *Pommade Rhinol*, *Seccase*, *Théisine*.
- Lab. des Prod. Dubois**, 16, bd Perrière, Paris. — *Cardialgine*, *Colloïode*, *Campho-Spartéine*, *Codarsyl*, *Oléo-Yode*, *Uroquinase*.
- Lab. Ducatte**, 31, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Enterointigènes Danysz*, *Paratoxine*, *Sclérolysine*.
- Lab. Ducloy et Cie**, Arques (P.-de-C.). — *Boldo-Biline*, *Bradygastrine*, *Lactogélose*, *Lichénose*, *Sarcoglobine*, *Tachygastrine*.
- Lab. Ducoq**, Langeais (Indre-et-Loire). — *Vulnérine*.
- Lab. Dufayard**, 12, rue des Saints-Pères, Paris. — *Cheralys*, *Urosan*.
- Lab. Henri Dufour**, 40, rue des Carmes, Orléans (Loiret). — *Apsophol*, *Edistol*.
- Lab. du D^r E. Duhourcau**, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Dragées anticatarthales du D^r Duhourcau*, *Gastricine du D^r E. Duhourcau*, *Ténifuge française du D^r E. Duhourcau*.

- Lab. Dulois, D^r Ferry,** place Clichy, Monte-Carlo. — Alcaloides seuls et combinés, Argolène, Cadmiol zinc, Cuprinol, Iodo-calrique, Iodo-Rubidium, Ichtyol zinc, Myosine forte et faible, Mdyniasine, Novoptine oxyde orangé de Hg, Ophthalmoforme.
- Lab. Dumesnil, 10,** rue du Plâtre, Paris. — Aseptampoules Dumesnil, Crêmo-plastol Dumesnil, Dépuratif Dumesnil, Dermo plastol Dumesnil, Geliorème Dumesnil, Girasiol Dumesnil, Huile au calomel Dumesnil, Mugrizol Dumesnil, Théobromose Dumesnil, Zébo-plastol Dumesnil.
- Lab. Dumesny, 6,** rue Chanoinesse, Paris. — Dermo-sufrol, Granules Crosnier, Morubiase, Neuroflorine, Sirop Crosnier.
- Lab. Dumesny, 18,** rue de Maubeuge, Paris. — Cigarettes antiasthmatiques du D^r Glery, Poudre antiasthmatique du D^r Glery, Pastils Meran.
- Lab. Durand, 28,** r. de Seine, Paris. — Graœural.
- Etabl. du D^r Durand, 6,** av. Foch, Gaillac (Tarn). — Vin Lux Gaillac mousseux.
- Lab. Duret et Rémy, 13 bis-15,** rue des Champs, Asnières. — Bis-Ka-Ma, Choléokinase, Gomprimés d'Alibour, Hépatosodine, Nyctal, Peptonal, Polypeptonal, Saturöl, Thiolaxine.
- Lab. E. Duriez, 20,** pl. des Vosges, Paris. — Chlonal bromuré, Elixir Ducro, Quinoidine.
- Lab. du D^r Henri-Dussaud, 52,** rue de Rome, Marseille. — Elixir Dussaud.
- Lab. A. Duteil, 90,** av. de St-Ouen, Paris. — Elixir Hymel, Quinorhéine Duteil, Spasalgique Duteil, Suppositoires Hymel.
- Sté des Eaux minérales de Decize, 49,** bd de Port-Royal, Paris. — (Source) Saint-Are.
- Lab. de l'Entériode, 39,** r. de Clichy, Paris (IX^e). — Enteriode.
- Lab. Eon, 3,** rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.). — Carnofer Cathartine, Derméon, Gercerine, Mensorrhéine Pom made et suppas. Eon, Psoréon, Pulmicune, Sulforéon.
- Lab. Eparvier, 26,** Gde-Rue St-Clair, Lyon. — Boldoïne, Cascara, Ferroxyline.
- Lab. de l'Eranol, 45,** rue de l'Echiquier, Paris. — Eranol.
- Lab. Escoufflaire, Baisieux (Nord).** — Cigarettes anti-asthmatiques Escoufflaire nos 1 et 2, Poudres anti-asthmatiques Escoufflaire nos 1 et 2.

Lab. général d'Etudes biologiques, 23, pl. Bossuet, Dijon (Côte-d'Or). — *Doloma*, *Enophos*, *Protibdyne*.

Lab. Evine, 16, r. Barbette, Paris (III^e). — *Baume Pélevine*, *Orules Evine*, *Poudre Evine*, *Poudre Pélevine*, *Thé Evine*.

Sté Française d'Extension bio-chimique, 2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre, St-Quentin. — *Boromyl*, *Gabiol*, *Halocure*, *Stomoxygène*.

Lab. Fagard, 44, rue d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine. — *Antiashme Bengalais*, *Barèges Fagard*, *Capsules d'Euviscol*, *Cigarettes Schulzé*, *Elatine Bouin*.

Lab. Falcoz et Cie, 9, rue Boissonnade, Paris. — *Æthone*.

Lab. P. Famel, 20-22, r. des Orteaux, Paris. — *Optraex*, *Sirop Famel*.

Brasserie Fanta, 77, rte d'Orléans, Montrouge. — *Bièrre Fanta pour nourrices*, *Malt Barley*, *Mallase Fanta*, *Orge germée Fanta*.

Lab. Fanyau, 48, rue Claude-Lorrain, Lille. — *Anti-épiléptique de Liège*.

Lab. Faure, 80, rue du Rocher, Paris. — *Citropeptol*, *Naphtocarbine*, *Neuropol*, *Perunhyl*, *Sedobore*, *Sirop Nevra*, *Somnopol*, *Spleno-magnésium*.

Lab. Faure et Dussuel, 15, av. de Marlioz, Aix-les-Bains. — *Elixir Bonjean*, *Euphorine du D^r Chaboud*, *Magnelax*. *Le Sinaplasme*, *Tannurgyl*.

Lab. Favrichon et Vignon, Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). — *Céréales Bébé Favrichon*, *Céréales granulées*, *Farines mâtées*, *Phosphogène Favrichon*.

Lab. Feignoux, 95, rue de Turenne, Paris (III^e). — *Névoral*, *Ovarine Tisy*.

Lab. du Feminadène, 120, rue Lecourbe, Paris. — *Feminadène*.

Lab. G. Fermé, 55, bd de Strasbourg, Paris. — *Muthanol*, *Néolyse*, *Psothanol*, *Soluthanol*, *Staphylotanol*, *Tri-radol*, *Urolan*, *Viscosérum*.

Ferme de Lafaye, Marlihes (Loire). — *Babeurre Lafaye*.

Lab. de la Fer-ovarine Vitalis, 38, bd de Charonne, Paris. — *Fer-ovarine Vitalis*.

Lab. du D^r Ferré, 6, rue Dombasles, Paris. — *Disimine Favrot*, *Hémoluol*, *Lin Tarin*, *Poudre Exibard*, *Pulsamone*, *Sirop Lamoureux*.

Lab. E. Ferré, 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris. — *Iodures L. Foucher*, *Litharsyne*, *Poudre Rocher laxative*, *Sucre Edulcor*.

- Lab. du D^r Fialip**, 23, av. de la Motte-Picquet, Paris. — *Oxy-injecteur du D^r Fialip*.
- Lab. Fisch et Cie**, 4, rue d'Illzach, Mulhouse (Haut-Rhin). — *Bains carbogazeux Wolo, Baumolacpinine, Chlormagnésium, Chymosine Fisch, Elastoplaste, Fango Fisch, Fluol, Lacpinine, Poudre Orl, Prévalidine, Recytile, Révulsif Procipha, Solvochine, Spirobismol, Spirobismol soluble, Sulfocrème, Tepéros, Transpulmine*.
- Lab. Flahaut**, 74, r. Monge, Paris. — *Acépileine, Laxoil, Sulfodermol, Terpene granulée Baron*.
- Lab. du Fluosalyl (M. Beaugourdon)**, 43, av. Kléber, Paris. — *Fluol, Fluosalyl Beaugourdon, Sirop Magali*.
- Lab. de la Fluxine (M. Bonthoux)**, 42 bis, rue Pasteur, Villefranche (Rhône). — *Evonyl, Fluxine (Gouttes)*.
- Lab. du Fokiényl**, 94, r. Pasteur, Fontenay-sous-Bois. — *Fokiényl*.
- Lab. Paul Fontanier**, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — *Algbiogyl, Algilaxine, Algovitine, Curalgine, Gaduine algovitinée, Gastrosalvine, Phosbiogyl, Phytalgine, Pulmovitine, Radiovitine, Ultrasténil, Ultravitine*.
- Lab. Fouard**, 61, r. Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine). — *Les granions de Fouard*.
- Lab. H. Foucher**, 77, bd de Grenelle, Paris. — *Copraxe, Elixir Héla, Entérohépatine, Gastérinase, Muxyl, Neuricure*.
- Lab. Fournie**, 3, pl. Miséricorde, Lyon. — *Quina Baron*.
- Lab. A. Fournier et Cie**, 147, bd de Montparnasse, Paris. — *Cérébrine Fournier*.
- Lab. Fournier frères**, 7, rue Biscornet, Paris. — *Bileyl, Biolactyl, Crinosthényl, Opothérapie Fournier, Ovaire Fournier, Pélospanines, Physocrisine, Splenocrisine, Vaccins, Vasolaxine*.
- Lab. M. Fraisse**, 8, rue Jasmin, Paris. — *Camphro Salyl Fraisse, Fer intraveineux Fraisse, Gouttes hypotensives Fraisse, Iodo bismuthate de quinine Fraisse, Sérum névros-thénique Fraisse, Sérum hypotensif Fraisse, Sol.Bi Fraisse*.
- Lab. du D^r Fraysse**, 47, r. de Neuilly, Nanterre. — *Arthridol du D^r Fraysse, Energinose du D^r Fraysse, Hypophydose du D^r Fraysse, Opothérapie du D^r Fraysse, Revitalose du D^r Fraysse*.
- Lab. Freyssinge**, 6, rue Abel, Paris. — *Capsules Dartois, Chloramine, Nevrosthénine, Polyphorine Freyssinge, Quassine Frémint, Salicol Dusaule*.
- Lab. Fumouze et Cie**, 78, faub. St-Denis, Paris. — *Capsules Raquin, Carnine Lefranc, Globules Fumouze, Ovules Chaumel, Poudre Chaumel, Suppositoires Chaumel*.

- Lab. Galbrun, 8-10, rue du Petit-Musc, Paris. — Aristargol, Iodalose Galbrun, Prosthénase Galbrun.
- Lab. R. Gallier, 38, bout. Montparnasse, Paris. — Arhémapectine Gallier, Busedowine, Kidoline.
- Etab. Gallina, 4, rue Candolle, Paris. — Huile Gallina, Iodentérol, Iodhémar.
- Lab. Clément Gardiol, 6, rue l'Écluse-Pyat, Marseille. — Urosalyt.
- Lab. Gauchon, 83, bd' de la Villette, Paris. — Buccurool, Opocobalt, Solvosclérose.
- Lab. J. Gautier, 42, rue Emile-Beschanel, Courbevoie. — Gambéol, Ganderma, Salvatyl.
- Lab. Genevet, 40, boul. St-Ruf, Avignon. — Kinechol.
- Lab. Génévrier, 45, rue du Marché, Neuilly-sur-Seine. — Adolan, Alepsal, Boues radioactives de Pistyan-les-Bains (Tchécoslovaquie), Neurinase.
- Lab. Gerda, 163, boul. Croix-Rousse, Lyon (Rhône). — Arvensyl, Gerdabyl, Nevristhone Daclin, Pulmolaxol, Sodolactine.
- Lab. des Prod. du Dr Gigon, 25, boul. Beaumarchais, Paris. — Cétrarose, Sédalose, Tribromure, Ulmarène, Valérianose.
- Lab. Gilbert, 6, rue du Laos, Paris. — Agaricine Clauss, Artérase, Bilolive, Forcéase, Nazirette, Pilules Clauss.
- Lab. A. Girard, 48, rue d'Alésia, Paris. — Biophorine, Caséoline, Glycérophosphate de Chaux granulé Girard, Laxo-peptine Girard, Nucléofer Girard, Sirop Girard, Vin Girard.
- Lab. Givaudan Lavirotte, 56, chem. de Gombé-Blanche, Lyon. — Glyphosfer, Hipposarcine Roy, Huile de ricin Crolas, Salusab, Sel de fruit Crolas.
- Lab. Glory, 38 bis, bd. Beaumarchais, Paris. — Alcasodine, Pilules bronchotoniques Anco, Valériflore.
- Lab. des Gloxines, 133, av. de St-Ouen, Paris. — Gloxines.
- Lab. Gmet, 27, rue du Faubourg-Montmartre, Paris. — Boldo Gmet, Coca Gmet, Composé Gmet, Condurang, Gmet, Crataegus Gmet, Diurétique Gmet, Dragées Gmet, Extrait Hamyd, Frêne Gmet, Fucus Gmet, Gmet, Gui Gmet, Hamamélis Gmet, Hydrastis Gmet, Jugland Gmet, Kola Gmet, Pseiddia Gmet, Quinquina Gmet, Valériane Gmet, Viburnum Gmet, Sauge Gmet, Ulmaire Gmet.
- Lab. Gobey, 89, rue du Cherche-Midi, Paris. — Lysarthrol, Pyoformine, Sirop laxatif, Uroformine.

- Lab. P. Godfrin, 5, av. Watteau, Nogent-sur-Marne. — Limonade Godfrin.
- Lab. du Gomenol, 48, rue des Petites-Ecuries, Paris. — Gomenol, Gomenoleo et tous produits au Gomenol.
- Prod. Gonnon, 14, rue Victor-Hugo, Lyon. — Antidiabétique Monavon, Cacodyle Gonnon, Créosote soluble Vacheron, Eupeptique Monavon, Irénine Gonnon, Kola Monavon, Lecithine Vacheron, Polybromure Gonnon, Polyiodure Gonnon, Sirop de créosote Vacheron, Sirop de glycérophosphates Vacheron, Sirop de Lovel, Sirop Vacheron au gaulcol, Suppositoires Gonnon, Terpene Gonnon, Tonicardine Gonnon, Tonique Gonnon.
- Lab. Gourn, 20, r. des Écoles, Paris. — Avantol, Cuprémoné, Prométhine.
- Lab. Gouzène, 139, rue de Paris, Pantin. — Alloysine.
- Établ. Goy, 23, rue de Beautreillis, Paris. — Gouttes Magalo, Hémostatique Goy, Pastilles M. B. C.
- Lab. Grandval, Quirin succ., 12-14, rue Féry, Reims (Marne). — Eugynol Grandval, Hamamélis Grandval, Enoquinol Grandval, Potion Grandval, Quinquina Grandval, Kina coca kola Grandval, Quinarsol antianémique Grandval, Quinarsol fébrifuge Grandval.
- Lab. Comte René de Grauwé, 16, rue de Becroi, Paris. — Elixir Duchamp, Fer Bravais.
- Lab. Grémy, 14, rue de Clichy, Paris. — Drasténine, Episodine Grémy, Eutensyl Grémy, Felestrine, Grémy, Immuniderm Grémy, Immuniperos Grémy, Immuniphages Grémy, Immunisols Grémy, Lientine, Ocréine Grémy, Thyrémine Grémy, Thyrocréine Grémy.
- Lab. Grias, 47, rue Feray, Corbeil (S.-et-O.). — Verticurine.
- Lab. Grignon, 2, rue Duphot, Paris. — Eniode Lefebvre, Valériane Grignon.
- Lab. Grorichard, 12, pl. de la Révolution, Besançon. — Comitiol, Magnésium Grorichard, Métrasyptal Grorichard.
- Lab. Gros, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand. — Antisep-tique alcalin Gros, Capsellase, Diurocalcine Gros, Diurocalcine iodurée, Hergénol.
- Lab. Grysia, 7, rue Saint-André, Le Mans (Sarthe). — Cineyl, Syltense.
- Lab. André Guerbet et Cie, 22, rue du Landy, St-Ouen (Seine). — Lipiodol Lafay, Ténébryl.
- Lab. Guéret, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire (Loiret). — Anoxyne, Comprimés Kléos, Pommades Kléos.
- Lab. P. Guérin, 58, rue Basse, Meulan (S.-et-O.). — Ferro-calcine, Vascurol.
- Lab. André Guillaumin, 13, rue du Cherche-Midi, Paris. — Acésine, Comprimés Guillaumin, Cyanangyre, Novangyre, Théosalvose, Vanadarsine.
- Lab. Guillaumin et Gérard, 12, rue Charles V, Paris. — Pro-dynase.

- Lab. Paul Hardy**, 42, bd St-Marcel, Paris. — *Cèdre bleu*, *Jécofluyl*, *Magnésium Hardy*, *Olriricin Hardy*, *Pancarbo*.
- Lab. Hautdider**, 37, rue Galilée, Paris. — *Benzylol*, *Dentoxyl*, *Gastérol*, *Hématogénol*, *Iénol*, *Inhalex*, *Iodométine*, *Magnésol*, *Orthobiline*, *Sirop Dubreuil*, *Triferyl*, *Uvéphorine*.
- Lab. de l'Hémostyl du D^r Roussel**, 97, rue de Vaugirard, Paris. — *Hémostyl*, *Tréphonyl*.
- Lab. Hépatie Efa**, rue du Château, Carentan (Manche). — *Hépatie Efa*.
- Lab. Hérault**, 14, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beauvais. — *Benzo-bromine*.
- Lab. des Prod. français L. Hérin**, 98, rue J.-Maillotte La Madeleine (Nord). — *Cachets réparateurs*, *Dragées Calm*, *Eucalinal* *Goudrinhal*, *Poudre « Stom »*, *Sulfinhal*, *Thé Suédois*.
- Prod. Heudebert**, 85, rue St-Germain, Nanterre. — *Farine de Mall*, *Nergine*, *Pain essentiel*, *Pains spéciaux*, *Radiopaque*.
- Lab. de l'Hexaranol**, 88, rue Duhesme, Paris. — *Héxaranol*.
- Lab. Hinglais**, Epernay (Marne). — *Capsules Kuchner*, *Chénantol*.
- Prod. Hinglais**, 30, rue Miromesnil, Paris. — *Follicormone buccale Hinglais*.
- Lab. Hocquette**, 191, rue du Faubourg-St-Antoine, Paris. — *Acobella*, *Eugaline*, *Marimine*, *Nadolor*, *Sérum neuro-psychique*, *Splenomanganol*, *Valédyl*.
- Lab. Hoffmann La Roche et Cie**, 21, pl. des Vosges, Paris. — *Adoverne*, *Airolroche*, *Allonal*, *Ampoules de Pantopon*, *Ampoules de Digalène*, *Ampoules de Sécacornine*, *Ampoules de Spasmalgine*, *Ampoules de Théobryl*, *Arsylène*, *Cachets Roche thiocol*, *Choline*, *Comprimés Roche thiocol*, *Digalène*, *Hémostra*, *Iodostarine*, *Iloglandol*, *Isacène*, *Larocaïne Larosan Roche*, *Ovules Roche*, *Pantopon*, *Prostigmimine*, *Sécacornine*, *Sédobrol*, *Sédormid Roche*, *Sirop Roche*, *Soluprotine*, *Somnifène*, *Spasmalgine*, *Tampol*, *Théobryl*, *Thigénol*, *Thiocol*, *Thyroxine*, *Tonique Roche*.
- Lab. Houdé**, 9, rue Dieu, Paris. — *Aloïne*, *Boldine Houdé*, *Granules Houdé*, *Hyoscyamine Houdé*, *Quassine Houdé*.
- Lab. Hourquet et Vienne**, 114, rue du Temple et 18, av. Daumesnil, Paris. — *Curatoxine*, *Euphoryl*, *Hirudinase*, *Péruisol*, *Savon Péruisol*, *Scérosérum*.
- Lab. J. Huerre et Cie**, 9, rue de la Gare, Levallois. — *Albuplast Vigier*.

- Lab. Huet, 4, pl. de Strasbourg, Lille. — *Tridynol*.
 Lab. Hy, 61, av. de Choisy, Paris. — *Métophan*, *Pommade Bertol Vichy*.
 Lab. de l'Hydrocamphre, 88, r. Duhesme, Paris. — *Hydrocamphre*, *Splenocarbène*.
 Compagnie de l'Hydroxydase, 10, rue Blanche, Paris. — *Hydroxydase*.
 Lab. d'Hygiène et Thérapeutique appliquées, 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine). — *Calcomagnésie*, *Dysithène*, *Héxafel*, *Myothermine*, *Sthénoxal*, *Stopral*.
 Lab. Hypnos, Chabeuil (Drôme). — *Gobillettes Hypnos*.

- Lab. des Immuno-vaccins, av. des Sources, Nice (A.-M.). — *Cinol*, *Digicardine*, *Immuno-vaccin antirhumatismal*, *Immuno-vaccin bronchopulmonaire*, S. I. V. A.
 Institut de Biologie appliquée (M. C. Cépède), 57-59-60, rue Mathurin-Régnier, Paris (15^e). — *Vaccinothérapie aloxique Cépède*.
 Institut de Microbiologie, Sarrebruck (Sarre), et 23, r. du Caire, Paris. — *Anthraxone Fornet*, *Blennosine Fornet*, *Grippol Fornet*, *Insuline Fornet*, *Néosuline*, *Pommade Fornet*, *Tébéphaguine Fornet*.
 Institut de recherches G. Jacquemin, Malzeville-Nancy. — *Ferment pur de raisin Jacquemin*.
 Institut Pasteur, 22, rue Dutot, Paris. — *Serums*, *Vaccins*.
 Lab. de l'Iodarsenic Guiraud, 10, imp. Milord, Paris. — *Gouttes païdophiles du Dr Guiraud*, *Iodarsenic Guiraud*.
 Lab. Iscovesco, 107, rue des Dames, Paris. — *Adrénol total*, *Afatyl*, *Androcrinol Iscovesco*, *Andropolycrinol*, *Cardiocrinol*, *Cérébrocrinol*, *Gynocrinol*, *Gynohyphophysol*, *Gynolutéol*, *Gynopolycrinol*, *Hépatocrinol*, *Hypophysol*, *Lipoides H. I.*, *Mammol*, *Néphrocrinol*, *Opopédol*, *Splenocrinol*, *Thyrol A.*, *Sarcosérum*, *Yo-Androl*, *Yo-Gynine*.
 Lab. Ivago, 17, r. de Provence. — *Vaccins intradermiques*, *Gelées vaccins Ivago*.

- Établ. Jacquemaire, Villefranche (Rhône). — *Blédine*, *Phosphate Vital*, *Verrulyse*.
 Lab. Jammes, 86, rue Michel-Ange, Paris. — *Cacodyline Jammes*, *Iodinjectol Jammes*, *Magnésio-cacodyline*, *Néophage*.

- Lab. du Jécol, 3, rue Watteau, Courbevoie. — *Allophaquina, Jécol.*
- Lab. Jicem, 304, rue Saint-Jacques, Paris. — *Citropatine, Iodarsine, Jicémine.*
- Lab. Jolly, 1, rue Christine, Paris. — *Créosifloires, Spasmine Jolly, Tërpoxyt.*
- Lab. Jonids, 9, boul. Sévigné, Dijon (Côte-d'Or). — *Athérolistine, Générgosine, Hémaxol.*
- Lab. Jooss, 7 bis, rue du Général-Gallieni, à Montreuil (Seine). — *Thyroidine-Radiophorine.*
- Lab. Julien, 105, rue de Rennes, Paris (VI^e). — *Benzoflorine, Elgine Julien, Manganophosphat Julien.*
- Lab. du Kaobrol, 54, r. de Paris, Charenton. — *Kaobrol.*
- Lab. L. Kerfysen, 4, rue Alexandre-III, Dunkerque (Nord). — *Benzoguinol, Dermatine, Denteulendère, Globabyl, Hémoïroïdine, (Pommade, Gouttes, Suppositoires),*
- Lab. Kervan, 81-83, av. Ledru-Rollin, Paris. — *Zymogastirine Kervan.*
- Lab. A. Koehler, 10, rue Cimarosa, Paris. — *Nitrobiase Raisin vivant.*
- Lab. Kraus, 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris. — *Francoplaste.*
- Lab. Krieger, 121, av. de St-Ouen, Paris. — *Antipur, Artérovéine, Butyral, Eczémacure, Gélocalcine, Géraldine, Organocalcine, Sciaticure.*
- Etabl. Kuhlmann, 145, boul. Haussmann, Paris. — *Chloralosane, Sunoxol, Teinture de Sunoxol.*
- Laboradium, 33, rue St-Jacques, Paris. — *Aseptoradol, Dermoradol, Radiotropine.*
- Lab. Lacombe et Cie, 42, r. du Mont-Cenils, Paris. — *Chlorumagène, Fanerval, Surbical.*
- Lab. Lacroix, 37, rue Pajol, Paris. — *Camphostyl, Pilules Hélieniennes Naud, Quinoforme, Vanucléol.*
- Lab. du Lacto-sérum Lavril, 26, bd des Batignolles, Paris. — *Lacto-sérum Lavril.*
- Lab. Lafarge, 6, boul. Arago, Paris. — *Neuréol, Sulfohyl.*
- Lait (Compagnie générale), Rumilly (Hte-Savoie). — *Lait Mont-Blanc.*
- Lab. du Dr Balaurie, Carac-d'Aude. — *Adolol, Analgol, Calamenyl, Cemag, Cremasepta, Elixir Gelm, Grains*

Gelm; Gunose; Pastilles Helge; Pilules Panama; Sirop Helge, Stenon du Dr Gelm, Udanka, Urogène.

Lab. Laleuf, 20, rue du Laos, Paris. — *Adrépatine, Colloïdine, Créosol, Folliovarine, Iodatoxine, Lobétiane, Pancrépatine, Pavérinol, Polyferments; Sirop Dubois au créosol, Théoverine Laleuf, Trinitrine caféinée Dubois, Trinitrine-Papavérine Laleuf, Urisal du Dr Deschamp, Urococcine.*

Lab. Lamar, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rh.). — *Anaural, Biliboldo, Sirop Escolle.*

Lab. Lambert, 6, rue de Longchamp, Vichy. — *Epicral, Oxytysine, Triseptine.*

Lab. L. Lambert, 8, av. de Grammont, Tours. — *Géto pansements gastro-intestinaux.*

Lab. Lambert, pl. du Châtelet, Orléans. — *Comprimés Galac, Fenucine.*

Lab. Lambiotte frères, 20, rue Dumont-d'Urville, Paris. — *Arhine, Créosoforme, Galform, Perles Taphosote, Phosote, Thiosote, Urométine.*

Lab. des. Prod. Lamo, 26-28, rue Paul-de-Koch, Paris. — *Toritan Lamo, Toritanol Lamo, Tergyl Lamo, Torigyre Lamo.*

Lab. Lancosme, 19, rue Alain-Chartier et 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris. — *Acolitol, Algocratine, Anémor, Argybil, Bain Carré, Bismhydral, Bismuth Desleaux, Carbonate de chaux Lancosme, Globules Laincar, Hémodrome, Inhalation Lancosme, Magnésie Storke, Spectrol, Stasol.*

Lab. Landrin et Cie, 12, rue de la République, Puteaux. — *Cipromarol, Elixir de Virginie Nyrdahl.*

Lab. Lang et Cie, 2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris. — *Capsules Dieu, Digestif Capmartin, Hémoglobine Star, Poudre Cap, Savons Mollard, Salvanos, Sirop Jane et pâte Jane, Vermifuge des mains, Yohimbine Gilbert.*

M. Langlois, domaine de la Cressonnière, Pont-l'Évêque (Calvados). — *G^e: Cidre Bol régime.*

Lab. L. Laraze, 54, rue de Paris, Charenton (Seine). — *Bigynol, Cytopan, Dosqtol, Kaohrol.*

Lab. Laryngologique du Dr Cordier, 222, faub. St-Martin, Paris. — *Hydorrhéol, Inhalation, Gargarisme, Vocal-dop.*

Lab. Latour, 71, rue Douy-Decupe, Montreuil-sous-Bois. — *Parlax.*

Lab. du Dr Laurent-Gérard, 40, rue de Bellechasse, Paris. — *Evolaxine, Radiotétrane, Thoroxyl.*

Lab. Lauriat, avenue Foch, La Garenne-Colombes (Seine). — *Bronchaspitol Lauriat, Héliosthényl.*

Lab. Lavergne, 5, rue Grande, Cannes (A.-M.). — *Holaseptine.*

Lab. Lavire, 46, r. de Rome, Marseille. — *Arsysérum, Aseptovule, Aseptopoudre, Fluoganèse, Puragar, Satylchlore, Scatagar, Triurase.*

- Lab. du Dr Lavoué, Rennes (I.-et-V.). — *I. A. M., Mungar-senic.*
- Lab. Lebeault et Cie, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris. — *Citro-largol, Germose, Mycolysine, Staphylase du Dr Doyen, Veinosine, Vin de Bugeaud.*
- Lab. Le Blond, 51, rue Gay-Lussac, Paris. — *Alexime, Ortho-Gastrine.*
- Lab. Leboime, 3, r. Fernand-Widal, Paris. — *Calcozymase, Prezymase.*
- Lab. Lebon, Charost (Cher) — *Corpogénine, Vari-Sérum Lebon.*
- Lab. Lebreton, 23 Grande Rue, Asnières Métricine.
- Lab. Lebrun, 155, bd Magenta, Paris. — *Dragées toni-cardiaques, Eucalyptine.*
- Établ. T. Leclerc, 10, rue Vignon, Paris. — *Bactériophage Leclerc, Entérochir, Entéroxin Leclerc, Félicol, Magné-lone, Sélamon, Sérum Normel.*
- Lab. Lecoq et Ferrand, 14, rue Gravel, Levallois-Perret. — *Antipsorine, Curalues du Dr Lafay, Entéropraxines Abry, Erythrolues du Dr Lafay, Helminthyl, Lipaurol, Molène, Solmuth, Tréparsol.*
- Lab. Le Davay, 2, rue Notre-Dame, Guingamp (C.-du-N.). — *Bioplasmyl.*
- Lab. Lees, 127, bd St-Michel, Paris (V^e). — *Métritols, Suppo-gynals.*
- Lab. Legendre et Cie, Houilles (S.-et-O.). *Pâte Mireille, Sirop Mireille.*
- Lab. Legoux frères, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Salvénas Legoux.*
- Lab. Lejeune, 142, rue de Picpus, Paris. — *Baume Daynoc, Diachusine, Gouttes Daynoc, Indhaméline simple, Indhaméline Plurigl., Patholysine, Pommade Lenoir, Protensène.*
- Lab. Le Marois, 197, av. de Versailles, Paris. — *Sinaseptic.*
- Lab. Lematte et Boinot, 52, rue La Bruyère, Paris. — *Acecolex, Acecoline, (camphre, spartéine, Yo-hymbine), Arsoplasmine, Biocalcose Chevreton, Calcional, Choléstériodine, Hémotoni kéine, Hormodine, Hypolan, Jap, Lactozymase B, Lipocérébrine, Océanine, Séro-ferrine, Tonikéine.*
- Lab. Léonardon, rue du Casino, Arcachon (Gironde). — *Hemofluidol, Quintheryl, Splenora.*
- Lab. Le Perdriel, 11, rue Milton, Paris. — *Antipyrine effervescente Le Perdriel, Benzoate de lithine effervescent Le Perdriel, Biosine Le Perdriel, Bromhydrate de lithine effervescent Le Perdriel, Carbonate de lithine effervescent Le Perdriel, Citrate de lithine effervescent Le Perdriel, Coaltar Saponiné Le Beuf (émulsion de goudron de houille), Fucoglycine du Dr Gressy (sirop bromo-iodo-phosphoré végétal), Glycérophosphate de chaux effervescent Le Perdriel, Glycérophosphate de*

fer effervescent Le Perdriel, Glycérophosphate de lithine effervescent Le Perdriel, Glycérophosphate de soude effervescent Le Perdriel, Goudron Le Beuf (émulsion de goudron végétal), Salicylate de lithine effervescent Le Perdriel, Taffetas Marinier (à l'arnica, au baume du commandeur ou au collodion), Thapsia Le Perdriel-Reboulleau, Toile vésicante Le Perdriel, Tolu le Beuf.

Lab. Leporeq, 9, rue du Temple, Enghien (S.-et-O.). — *Ardogène.*

Lab. du Dr Leprince, 62, rue de la Tour, Paris. — *Arsycodile, Cascarine Leprince, Eumictine, Ferrocodile et Ferricodile, Freinospasmyl, Guipsine, Néo arsyncodile, Néo Rhomnol, Ophthalmine, Pilules du Dr Séjournet, Rhomnol.*

Lab. Lerck, 63, pl. St-Roch, St-Etienne (Loire). — *Kerlol.*

Lab. Lescene, 58, rue de Vouillé, Paris. — *Anaquintine Lescène, Balsamol, Viosten, Zymatine.*

Lab. G. Lesourd, 18, rue Ferdinand-Flocon, Paris. — *Bolcitol, Crescogénol, Elixir Fleig Formiaté, Fœnugol, Lucinine Correlle, Ménacrine, Pericols.*

Lab. Lesure, 70, rue du Bac, Paris. — *Arqueritol Lesure.*

Lab. Lettry, 69, rue de Sèvres, Paris. — *Agoxyl, Gouttes de Séru, Pommade de Séru.*

L. E. V. A., 26, rue Pétreille, Paris. — *Leniforme.*

Lab. Licardy, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine. — *Fluobyl, Gélogastrine, Hémoductyl, Laxamalt, Sédosine, Stovédrine, Tonudol.*

Lab. des Lipides, 40, rue d'Enghien, Paris. — *Dermosplénine Liposplénine du Dr Groc.*

Lab. de la Liposeptine, 2, pl. des Vosges, Paris. — *Fenugrène, Gastrobiase, Marrubène, Liposeptine, Rhino-Liposeptine, Sonène.*

Lab. Lobica, 46, av. des Ternes, Paris. — *Azotyl, Béatol, Chlorobyl, Iodo-trypsine, Lactobyl, Lactochol, Nutréine, Pneumo-calcine, Sérénol, Taxol, Uralysol, Veinotrope, Vin tonique « Eska », Zohol.*

Lab. Lobry, 6, rue Parrot, Paris. — *Hemofer, Urozéa.*

Lab. Emile Logeais, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine. — *Panxylon, Pommade Logeais (Rectaméline), Suppositoires Logeais, Veinhormones Logeais.*

Lab. J. Logeais, 22 bis, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine. — *Boricine Meissonnier, Fluidol, Gobules Secretan, Iodamélis, Naiodine.*

Lab. Longuet, 34, rue Sedaine, Paris. — *Arsi-Strychnal, Citrosodine, Clisemine, Facmine, Fixine, Levure de bière du Dr Debouzy, Narcyl, Ortho-Zomine, Pilules du Dr Debouzy, Quinuryl, Réinalgine, Rhinalginol, Strychnal, Urisanine, Zomine.*

Lab. Lorrain de Produits synthétique purs, Étain (Meuse). — *Caparlem.*

Lab. Louinet, 39, rue de l'Arcade, Paris. — Laxadonal, Kreptol.

Lab. Lucina, 154 bis, rue de Breteuil, Marseille. Formovaccins, Fusol, nécessaire d'accouchement Lucinia. — Galabartéine.

Lab. Lumière (Prod. chimiques spéciaux « Brevets Lumière »), 23, cours de la Liberté, Lyon. — Allocaine Lumière, Allochrysine Lumière, Antipyludique, Borosodine Lumière, Cryogénine Lumière, Cryptargol Lumière, Emge Lumière, Entérovaccin Lumière, Entéova Lumière, Gelée Lumière, Germosine Lumière, Hémo-plase Lumière, Hermophényl Lumière, Iodure d'amidon Lumière, Néokola Lumière, Opozones Lumière, Persodine Lumière, Rhéantine Lumière, Tulle gras Lumière.

Lab. du Lutéovar, 44 bis, r. de la République, Erment (Seine-et-Oise). — Colhépatyl, Lutéovar, Valéramyl.

Lab. Madyl, 14, rue de Miromesnil, Paris. — Bromovose, Euphytose, Papo.

Lab. Maire, 171, r. de Belleville, Paris. — Calcisténine, Guttoléol, Nasargine.

Lab. Malmarche, 101, av. de Paris, Reuil-Malmaison. — Digestif Harvey, Rosalyl, Urobuccol, Valerinodor.

Lab. du Malone (M. Vincent), Ancenis (Loire-Inf.). — Gouttes Malone.

Lab. Mannet, Loudun (Vienne). — Dragées ferro-ergatées Mannet, Elixir ferro-ergoté Mannet, Elixir tribromure Mannet au Salol, Elixir Mannet à l'iodure de potassium et au Salol, Elixir Mannet à l'iodure de sodium et au salol.

Lab. Marchand et Leroy, 40, rue d'Enghien, Paris. — Préventyl.

Lab. Marinier, 52, rue de Flandre, Paris. — Bi-Cétrol.

Lab. A. Martin, 24, r. de Charenton, Paris. — Cytobiase.

Lab. du Dr Martinet, 16, rue du Petit-Musc, Paris. — Granoxyl, Hémopausine, Magnésosvules, Néo-collargol, Pangaduine.

Lab. Martinie, 62, av. Philippe-Auguste, Paris. — Phlebotonine, Tonicalcine, Uvargol.

Lab. Mauchant, 14, rue de Birague, Paris. — Asthmapepton, Bircol Mauchant, Cassilol, Fluveïnose Mauchant, Iodonucléol, Lipovita, Maltine Phenix, Minéraline du

- D^r C. Baud**, *Myodyne*, *Marchant*, *Phoscamine*, *Salubrine*, *Phénix*, *Solvuric*, *Surc Durham*, *Tercolène*, *Trilactine*.
- Lab. Mayaud**, 6 ter, rue Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine). — *Ulcérophile* Nosan.
- Lab. Mayoly Spindler**, 1, place Victor-Hugo, Paris. — *Baume*, *Aroma*, *Borostyrol*, *Dicaliode*, *Euphon*, *Fluenzyl*, *Isoluol*, *Kalastyl*, *Perubore*, *Pipettes nasales* M. S. *Sanoformine*, *Valbrol*.
- Lab. de Médecine Expérimentale**, 1-3, rue Malherbe, Beauvais. Tél. : 484. — *Fludiose*, *Formocarbène*, *Opochol*, *Sodothiol*.
- Lab. Médico-Pharmaceutique de France**, 6-8, rue Lacreteille, Paris. — *Lioncyl*, *Mitigans*, *Sédopulmine*, *Sédotencyl*, *Stomaxines*, *Stomaton*.
- Lab. Mercier**, Fécamp (Seine-Inf.). — *Baume Iki*.
- Lab. Merminod**, 49, r. de Paradis, Paris. — *Acitophosan*, *Balnacid*, *Calcothéobromine*, *Cholotonon*, *Colloixols*, *Complexes Colloïdaux* (*Collōixols* et *Néoplatsines*), *Comprimés gynécologiques* Merminod, *Cystopurine*, *Desitin*, *Eutomon*, *Formint*, *Hypérol*, *Kalmopyrine*, *Néoplatsines*, *Neurosmen*, *Opothérapie* Richter, *Préaxol*, *Sanatogène* Bauer, *Thalassan*, *Trilysine*, *Vonol*.
- Lab. J. Messis**, 71, av. de la République, Champigny (Seine). — *Guérysipèle*, *Vicéliase*.
- Lab. du Métacuprol**, 5, rue François-Ponsard, Paris. — *Métacuprol*.
- Lab. Métadier**, 55, rue Nationale, Tours. — *Méta-vaccin*, *Méta-titane*.
- Lab. Meunier**, 11, bd Davout, Auxerre. — *Anacidase*.
- Lab. du D^r Mialhe**, 8, rue Favart, Paris. — *Adréline*, *Anusol*, *Aquintol*, *Digimialbine*, *Digitaline*, *Elixir Mialhe*, *Lab-lacto-ferment*, *Mialbine*.
- Lab. Michelon**, 20, bd Heurteloup, Tours. — *Aesculase*, *Sonagar*, *Sonamel*.
- Lab. Michels**, 9, rue Castex, Paris. — *Chloro-calcion*, *Silisède*.
- Lab. du Mictasol**, 28-30, rue du Four, Paris. — *Mictasol*.
- Lab. Midy frères**, 4, rue du Colonel-Moll, Paris. — *Anti-grippine*, *Bétul-ol*, *Carbolin*, *Cascara*, *Cocaïne*, *Colchi-Sal*, *Pipérazine*, *Pommade Midy*, *Proveinase* Midy, *Suppositoires* Midy.
- Lab. E. Millet**, Rambouillet (S.-et-O.). — *Carbos*, *Formo-carbos*, *Gastroplasme*, *Laxoléine*, *Mucicarbos*, *Mucilaxine*, *Mucilose*, *Oléomucilaxine*, *Rectoplasme*.
- Lab. Millet et Guillaumin**, 5, r. Ambroise-Thomas, Paris. — *Paxène*, *Kénol*.
- Lab. Millot**, 54, rue de la Bienfaisance, Paris. — *Ampoules* Dubé, *Benzo-bismuth* Millot, *Comprimés néothorium* Millot, *Crayons néothorium* Millot, *Ovules néothorium*

Millot, Pommade néothorium Millot, Soluté Gaube du Gers.

Lab. Géo Miquel, 3, av. Lowendal, Paris. — *Glyco-M, Sanos, Selunic, Witch Hazel.*

Lab. Monal, 6, rue Bridaine, Paris. — *Boléase, Santal Monal au bleu de méthylène, Sulfuryl Monal, Taburool Monal, Terkal Monal.*

Lab. Moncour, 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. — *Opothérapie Moncour (sphérulines et néo-sphérulines), Parathyrocalcine Moncour, Vitacalcine Moncour.*

Lab. Monin, 49, rue de Maubeuge, Paris. — *Dépuratif Rob. Lechaux, Elixir Grez.*

Lab. Montagu, 49, boul. de Port-Royal, Paris. — *Broméine Montagu, Carbalcaloïdes, Carbatropine, Carbosanis, Dragées Hecquet, Génacide, Iodéine Montagu, Lac-Ser, Savons Michon.*

Lab. Morellet, Bagnoles-de-l'Orne. — *Euchol Morellet, Sulfur Concentré Dax.*

Lab. Moser et Cie, 8, chem. de Montbrillant, Lyon (Rhône). — *Maltea Moser cristallisée.*

Lab. Moulin, 50, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Aseptone, Bacilactine, Baume Dolora, Benzothymol, Capsules ovigéniques, Dépuratine, Diabésia, Purgemini granulé, Poudre Helvetia, Rhinodol, Sirop Diver, Uricine.*

Lab. Mouneyrat, 12, rue du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne. — *Histogénol, Hectine, Hectargyre, Kinectine, Olbia, Vioxyl.*

Lab. Mousnier-Delerme, 9, boul. Carnot, Bourg-la-Reine. — *Dragées du D^r Gélinau, Sirop du D^r Gélinau.*

Lab. Mouré, 18, r. Favart, Paris. — *Sirop Morlas.*

Lab. Narodetzki, 19, boul. Bonne-Nouvelle, Paris. — *Elixir Spark, Griponal, Nazophyl Darva, Spyrolides.*

Lab. Nativelle, 27, rue de la Procession, Paris. — *Digitaline Nativelle, Natibaïne, Natirose, Ouabaïne Arnaud, Quinicardine, Solubaïne.*

Lab. Nau, 21, Grande-Rue, Argenteuil (S.-et-O.). — *Néochloral Nau.*

Lab. du Néobiol, 4, pl. du Val, Vanves (Seine). — *Néobiol.*

- Lab. du Nestosyl, 72, rue St-Dominique, Paris. — Nestosyl, Pommade au Nestosyl, Solution huileuse au Nestosyl Suppositoires au Nestosyl.
- Lab. Neuville, 239, faub. St-Honoré, Paris. — Hyol, Urol.
- Lab. R. Niel, 60, rue Auguste-Comte, Lyon (Rhône). — Bismusodine, Kalmobrol.
- Lab. H. Noé, 14, r. Thiers, St-Amand-les-Eaux (Nord). — Carbophos, Citrophos.
- Lab. Noelline, Guingamp (C.-du-N.). — Pommade Noelline, Poudre Noelline.
- Lab. H. Nogues, 7-7 bis, r. Galvani, Paris. — Baume maternité, Capsules Noguès, Grains de Vals, NéoarSITE Poudre Satine, Sirop maternité, Sirop Noguès, Thé-bail.
- Lab. Novalis, Oullins (Rhône). — Progaster compr., Lugocalcion, Novolug, Valénal.
- Lab. Oberlin, 17, rue Cadet, Paris. — Aliment Tinardon, Analgénine, Biodynamine, Ferropeptone Oberlin, Gastrocalcine, Gouttes Dr Ludlam, Granulé Tinardon, Gynaicéol, Hamaméliode, Iode Oberlin Juvéol, Lactosone, Panbromine, Pectine Oberlin, Potion Bonnet, Rob Cabanès, Rob Oberlin, Santal Oberlin, Santal Salolé Cabanès, Savon iodé Oberlin, Sigma Cones, Sirop Tinardon, Uraséol.
- Lab. Océana, 29, av. de St-Mandé, Paris. — Cama-Laminiode, Ferro-Laminiode, Laminiode, Laminolax.
- O. C. P., 108, rue de Picpus, Paris. — Lait de magnésie Phillips, Pâte dentifrice Phillips.
- Lab. Odilia, 42, rue du Mont-Cenis, Paris. — Gynopausine, Inolène (simple, vaseliné, thymolé), ovules à l'Inolène, pommade à l'Inolène, poudre à l'Inolène, Nazolène.
- Lab. Odinet, 21, r. Violet, Paris. — Calciline, Gastrosodine, Néocalciline, Pluribiase, Sel digestif Bé Me Cé.
- Lab. de l'Olivéol, Tassin-la-Demi-Lune (Rhône). — Oléol, Olivéol, Vasocones, Vasoconstrictine.
- Lab. Oliviero, rue Denfert-Rochereau, 41, Paris. — Algostérine, Biocéane, Gytomagnésium, Hépatine Gad, Hétérolysine, Mégathion, Sérum Oliviero.
- Lab. de l'Opodermyl, 36, rue des Martyrs, Paris. — Opodermyl.
- Lab. moderne d'Opothérapie et Biologie médicale, 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse. — Glandocalcyl, Hépatozyl Caldo, Nucléophorine, Sclérosérol, Veinoposine.

Lab. Optima, 78-80, Cde-Rue au Bois, Bruxelles. — Alimentine Mory (poudre), Ampoules Optima, Asthmacidine (ampoules), Apyrexine (comprimés), Bismuth 25 (ampoules), Bromure d'éthyle (ampoules), Cardiolonine (liquide), Cataplasme Optima, Chloraseptine (comprimés), Chloroforme (ampoules), Comprimés Garga, Digitalis Purpurea (poudre), Dragées hépatiques, Dragées d'iodurine, Dragées menthol-borax-cocaïne, Eau de Lorraine, Eitreb-embrocation (liniment), Ethier pour narcose (ampoules), Formétine (comprimés), Glycéro-bromurine (granulés), Glycéro-iodurine (granulés), Glycéro-ovarine (granulés), Glycéro-thyroidine (granulés), Glycéro-tribromurine (granulés), Granules d'Aloïne, Granules Boldine, Granules Colchicine, Granules digitaline 1/5 de milligramme; Granules Digitaline, 1/10 de milligramme, Granules hydrastinine, Granules hyosciamine, Granules spartéine, Hémoferrine (Elixir), Héparadénine (comprimés), Héparbiline (granulés), Hypophysine (comprimés), Iode liq. lambotte (ampoules), Iodonine (flac. compte-gouttes), Idéolaxine, Jécorine (émulsion), Kola (granulés), Lacto-ferment (comprimés), Laxatine Mory (dragées), Levaine (granulés), Ligatures chirurgicales, Néo-pituitairine (ampoules), Neurotonine (granulés), Oiothyroidine (comprimés), Orchidine (comprimés), Ovarine (comprimés), Ovaro-thyroidine (comprimés), Oophorine (vin), Pancréadénine (comprimés), Pandigitale (teinture forte), Pepto-ferrine (flac. compte-gouttes), Peplone Cornélis, Phylogyne (poudre), Phospho-calcine (granulés), Phospho-calcine ferrugineuse (granulés), Pituitairine (voir Néo), Pyrocidine (comprimés), Quinovarine (dragées), Quinovarine injectable (ampoules), Salva-sérum, Sédarsan (gouttes), Serpoline (sirop), Sérum maternel (gouttes concentrées), Sérum sthénique (flac. compte-gouttes), Sirop Mory, Sirop iodo-noyer Cornélis, Sirop Jackson, Stomachine (comprimés), Stomachine (granulés), Suprarénidine (comprimés), Suprarénidine (ampoules), Tri-zymol (granulés), Toni-cardine (vin), Vin Mory, Vin Oophorine, Trépocidine (ampoules), Poudre Optima, Urdol.

Lab. Orrillard, 245, rue de Vaugirard, Paris. — Biarsol, Rapaveryl, Paxol.

Lab. Pachaut, 130, boul. Haussmann, Paris. — Bromures Pachaut, Cachets Pachaut Alpha et Gamma, Eupaveryl, Pachaut, Iodures Pachaut, Limonade hypotensive Pachaut, Lotion végétale Pachaut, Suppositoires Pachaut, Tartrate borico-potassique Pachaut, Tubes de Bromure Pachaut, Valériane liquide Pachaut.

- Lab. **Paméla**, Forges-les-Eaux (S.-Inf.). — *Blaguy* (Gouttes Dragées, Sirop).
- Lab. du **Professeur Pancler**, 21, rue de Saint-Léon, Amiens. — *Energine iodée de Berck*, *Energine phosphorée de Berck*.
- Lab. du **Papier Eymonnet**, 139, cours Tolstol, Lyon-Villeurbanne. — *Papier iodogène Eymonnet*.
- Lab. **Paret**, 22, rue Guibal, Marseille. — *Azym*, *Cellules Paret*, *Fixase et Fixase irradiée*.
- Lab. **Paris**, 4, rue de la Motte-Picquet, Paris. — *Hémophagostyl*, *Lactolaxine*, *Oxydothyrine*, *Oxydovarine*, *Phagostyl*, *Phagostyl Mangané*.
- Lab. **Paris**, 1, rue Lassalle, Lyon (La Boucle). — *Cachets du Dr Boveil*, *Comprimés de pantolaxine du Dr Boveil*, *Ergoline Lamanté*, *Granulés de Pantofort du Dr Boveil*, *Kerlactine*, *Pilules lithuranées du Dr Boveil*.
- Lab. du **Parolagar**, 348, r. St-Honoré, Paris. — *Parolagar*.
- Lab. des **Prod. Paterson** (G. et M. Armingeat), 46, rue de Saintonge, Paris. — *Poudre Paterson*, *Pastilles Paterson*.
- Lab. de **Pathologie**, 5, rue François-Ponsard, Paris. — *Néopancarpine*, *Rhinofluine*, *Vaso-neurine*.
- Lab. **Pautauberge**, 10, rue de Constantinople, Paris. — *Cap-sules Pautauberge*, *Dragées Pautauberge*, *Gaiacol Pautauberge*, *Solution Pautauberge*.
- Lab. **Pavy**, pl. du Marché, La Rochelle. — *Pyodermase*, *Solution Cunaud*.
- Lab. **Pellissier**, 33, av. de Villiers, Paris. — *Hepagastrol*, *Opothérapiques Pellissier*, *Opositoires opothérapiques*, *Pellissier*, *Silicate de soude Pellissier*.
- Lab. **Pépin et Leboucq**, 30, rue Armand-Sylvestre, Courbevoie. — *Bromogénol*, *Gairol*, *Guéthural*, *Iodogénol*.
- Lab. du **Pepticol**, 13, av. du Maréchal-Foch, Dammarie-les-Lys, près Melun. — *Pepticol*, *Sarkol*.
- Lab. **Perichon**, 11, r. Lepic, Paris. — *Avistyl*, *Collubleu*, *Thermocédoné*.
- Lab. **H. Perignon**, 6, rue de Paris, Joinville-le-Pont. — *Elixir Godfrin*.
- Cie française des Peroxydes**, 12-18, rue Lamartine, Paris. — *Ektogan Boquillon*, *Hopogan Boquillon*.
- Lab. **Perrier**, 17 bis, bd Rochechouart, Paris. — *Scillitrine*.
- Lab. **Perzin et Bruno**, 4, r. Desirée, Lyon. — *Hémeantitoxine Sofos*.
- Lab. **Perrouchon**, 57, rue Orizet, Tours (I. et L.). — *Eurectol*, *Grains d'Evian*, *Palmocitrine*, *Renocardine*.
- Lab. **Perroud**, 3, rue Sébastien-Gryphe, Lyon. — *Carbonate de bismuth*, *Tablettes Perroud*.

- Lab. E. Petit**, pl. de l'Eglise, Argenteuil (S.-et-O.). — *Hémagénine*.
- Pharmacie anglaise des Champs-Élysées**, 62, av. des Champs-Élysées, Paris. — *Emerson's Bromo Seltzer*, *Maté Douglas*.
- Pharmacie Biologique** G. Combastel, F. Rischshoffer Sr, 57, r. Mathurin-Regnier, Paris. — *Panostyl*.
- Pharmacie Centrale de Belgique**, 12, rue du Téléphone, Bruxelles. — *Digistabiline*, *Hypersan*, *Iophénol*, *Névosan*, *Scialine*, *Vitamorrhaine*, *Vilergomine*.
- Pharmacie Centrale de France**, 21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris. — *Adrénaline Invar*, *Caféine Invar*, *Crêpe Velpeau*, *Digitaline Invar*, *Pyroléol Edet*, *Théobromine Invar*, *Végéphas*, *Pelvisédol*, *Pyroclase*, *Quinobrome-Séroquinol*.
- Pharmacie de la Place Royale**, Reims (voir Christiaens).
- Pharmacie Rationnelle**, 20, fg Poissonnière, Paris. — *Cuscutine Foulon*.
- Lab. de Pharmacologie générale**, 8, rue Vivienne, Paris. — *Boldorhéine*, *Capsules d'apioline* Chapoteaul, *Capsules de boldo-glucine* Chapoteaul, *Capsules de Colchistor*, *Capsules à l'éther valérianique* de Vial, *Capsules d'eucalyptéol* Antoine, *Capsules à l'huile de génévrier* de Vial, *Capsules de lécithine* Vial, *Capsules de morrhuol* Chapoteaul, *Capsules de Morrhuol créosoté* Chapoteaul, *Capsules de Santal Midy*, *Cardiosthénine* Cérévisine, *Cigarettes indiennes* de Grimaull et Cie, *Crystol*, *Cypridol*, *Delbiase*, *Delbosel*, *Dusart*, *Elixir polybromuré* de Baudry, *Elixir digestif de pepsine* de Grimaull et Cie, *Farine maltée* Vial, *Fer Girard*, *Fer Leras*, *Gélocalcase*, *Gélodelbiase*, *Glycogène* Guarana purifié de Grimaull et Cie, *Malico* de Grimaull et Cie, *Morrhuol*, *Oxygénase*, *Pastilles Palangé*, *Peptone* de Chapoteaul, *Pharynxoil*, *Phosphoglycérate de chaux* Chapoteaul, *Pnéoline*, *Poudre ferromanganique* de Burin du Buirsen, *Quinine Rhubarbe comprimée* de Baudry, *Sirop du Dr Dusourd*, *Sirop d'hémoglobine* de Grimaull et Cie, *Sirop d'hypophosph. de chaux* de Grimaull, *Sirop Lagasse*, *Sirop phénique* Vial, *Sirop polyformiale* du Dr Ph. Chapelle, *Sirop de Raifort iodé* de Grimaull et Cie, *Strontium para* Javal, *Sulfodelbiase* (cachets), *Terpinets*, Vial, *Sirop phénique*, *Vitamina*.
- Lab. du Dr Philippe**, 14, rue du Palais-Grillet, Lyon. — *Gouttes scandinaves*, *Iodure Philippe*, *Pilules Lemary*, *Pilules Philippe*.
- Lab. du Phosphopinal Juin**, 10, imp. Milord, Paris. — *Phosphopinal Juin*, *Pulvéol*, *Pulmodion*.
- Lab. de Physiologie du Puits-d'Angle**, Le Chesnay (S.-et-O.) — *Dyspeptine Hepp*.
- Lab. de Phytothérapie** de Paris, 113, boul. Voltaire, Paris. — *Amipyrine*, *Ballotyl*, *Polycine*.
- Lab. Pialoux**, 55, rue de Chabrol, Paris. — *Airoglyce*, *Cédro-méthyle*, *Chlorurol*, *Dynamojérol*, *Iodoplume*.

- Maison du Dr Pillet**, 5, av. Victoria, Paris. — *Anti-urique de Contrexéville, Beef Lavoix (ou Vin Lavoix), Hygioline Pastilles Brachat.*
- Lab. du Dr Pinard**, 88, boul. St-Denis, Courbevoie. — *Phosphates du Dr Pinard.*
- Lab. Planche**, 2, rue Volney, Paris. — *Amidon Planche, Eau Sova, Hémophiline Planche, Pilules Stibiées, Sirop Thomas.*
- Lab. du Dr Plantier**, Annonay (Ardèche). — *Hemopanbiline, Panbiline, Rectopanbiline.*
- Lab. J. Plé**, 111 bis, rue de Turenne, Paris. — *Antiphymique Vadam, Phytosplénol Plé, Thalassotonine Vadam, Synergyl Vadam.*
- Lab. du Pneumogénol**, pl. St-Goéry, Epinal. — *Anxiosédine Pneumogénol.*
- Lab. Pointet et Girard**, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Goudroline, Soporalose, Vitargyl.*
- Lab. Polytechniques**, Netter, 100, bd de Sébastopol, Paris. — *Bougies Franklin, Capsules Franklin.*
- Lab. Pompanon**, 62, rue du Cardinal-Lemoine, Paris. — *Figadol Vivien, Sulfureux Pouillet.*
- Lab. Porcher**, 35, rue des Blancs-Manteaux, Paris. — *Eczéda, Eczosec.*
- Lab. Probios**, 1, av. Pasteur, Paris. — *Crème Probios anti-pyogène, Probios vaccins.*
- Sté Progil**, 77, r. de Miromesnil, Paris. — *Diasés, Galactolgil, Malt Pailleté, Minergil, Peptogil, Phytolécithine.*
- Lab. Prothérapie**, 132, r. de Turenne, Paris. — *Antifébra, Carboiodine, Embrocation Salas, Ferrocol, Flusan, Fucoiodine, Helminthose, Laminarol, Neurolipase, Onguent Salas, Opochlorine, Opocrinases, Oposynergines, Pilules oporénales, Phytomarine, Propeptase, Rhino-Salas, Salasényl, Sigma — Sérum, Sirop Gécé, Stenovarine, Stérocacium.*
- Lab. L. Prothière**, 55, rue Auguste-Comte, Lyon. — *Fucosine.*
- Lab. du Protonic**, 88, r. Duhesme, Paris. — *Protonic.*
- Lab. des Proxylases**, 97, rue de Vaugirard, Paris. — *Angioxyl, Insulanol, Insulyl, Insuloxyl, Proxylases, Proxylol.*
- Lab. Georges Prunier et Cie**, 4, rue de la Coutellerie, Paris. — *Comprimés Vichy-Etat, Dioséine Prunier, Neurosine Prunier, Néo Neurosine Prunier, Novacétine Prunier.*
- Lab. du Pulvéol**, 10, impasse Milord, Paris. — *Pulvéol.*
- Sté Purgos**, 7-7 bis r. Galvani, Paris. — *Vichy purgatif, Purgos.*
- Lab. Py**, 58, boul. Richard-Wallace, Puteaux. — *Baume. Py Phostyl, Sédafit Py, Stomal, Toussyl Py.*
- Sté Pyrné (M. Lafitte Pharmacien, Caunterets (Htes-Pyr.)**
— *Sulfa.*

- Lab. du Dr Quesneville, 112, rue de Bucy, Paris. — Crème de Bismuth, Crème des Bismuth Chl. magnésienne, Cupro-Salyt.
- Lab. du Quinsal (M. Leulier), 34, rue Thiens, Gray (Hte-Saône). — Quinsal, Poudre Stéar.
- Lab. Raby et Cie, pl. de la Comète, Asnières. — Biliase Raby.
- Lab. de Radiumthérapie, 25, rue Vaneau, Paris. — Artoradine, Radiocrémeline, Radiole.
- Lab. Raimoa, 264, boul. Voltaire, Paris. — Pommade Raimoa, Vin Raimoa Tonic, Oxy-dents G. R. S., Pruritot Raimoa.
- Lab. Ranque et Senex, 16, rue du Dragon, Marseille. — Vaccins bactériens I. O. D.
- Lab. Ranson, 121, av. Gambetta, Paris. — Opocalcium irradié, Opocalcium, Opoferrine vitaminée Leucoseptyl, Awa-clasine.
- Lab. Ravaud, 6, pl. de Breteuil, Paris. — Baume merveilleux, Bismutarinol.
- Lab. Reaubyourg, 2, rue Boucicaut, Paris. — Agarase, Passiflorine, Silgaïne.
- Lab. Regagnon et Cie, 276, rue Lecourbe, Paris (XV^e). — Amborhinol, Sedorhinol.
- Lab. du Regyl, 8, rue Richer, Paris. — Regyl.
- Lab. Remeaud, 38, av. J.-B. Clément, Boulogne-sur-Seine. — Kluchol Remeaud.
- Lab. Remy et Lecoq, 6, pl. Clichy, Paris. — Gâchets anti-grippe Flamand, Nuclémose, Poudre Gast, Sirop Flamand M. Lecoq, Vagotonic Fournier.
- Lab. Renard, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — Atural, Crypthiol, Pneumogéine.
- Lab. Renard et Cie, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — Gaduamine.
- M. Renaud, 2, rue Demours, Paris. — Lachesine.
- Lab. du Renovol, 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.). — Renovol, Peptocalcine.
- Lab. Revel, 34, rue St-Lazare, Paris. — Iodonesyl, Philo-gastrine.
- Sté des Révulsifs, 4, rue Levert, Paris. — Revulsoplasme, Révulsif liquide S. R.
- Lab. Rey, 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or). — Ludin, Sercma Rey.

Lab. Rhemda, 51, rue d'Alsace, Courbevoie. — Boues radio-actives: Rhemda; Bougies radioactives: Rhemda; Dermathorium, Mésolthorium: Rhemda, Mésoline; Ovules Rhemda Radio Magnésium, Thorium X: Rhemda.

Lab. du Rhinophta, 82, rue de la Croix-Verte, Albi (Tarn). — Produits Rhino, Tubes Ferlux.

Lab. Ricardou et Cie, 46, rue Pierre-Charron, Paris. — Bains de Brides, Brides-les-Bains; Dentoline; Innerclean Fructia, Phospharsol, Prises Delqué, Sel de Brides, Soporigène; Sylvol, Thé de Brides.

Lab. Richer, 7, av. Marceau, Paris. — Comprimés Salvé, Euskiné, Florhépatine; Mictophite; Néopulmine.

Lab. Riethe, 40, rue des Abbesses, Paris. — Sanguine irradiée.

Lab. Rissa, 46, rue Claude-Lorrain, Lille. — Calci-Ostéline, Glaxo, Iodex, Oséline, Osломall.

Lab. H. Rivier, 26-28, rue St-Claude, Paris. — Anégrine, Ascoléina, Rivier, Séro-sérum Rivier, Valérianate Pierlot.

Pharmacie J. Robert (J. Boudier, succ.), 37, rue de Bourgogne, Paris. — Hémoalcopectine, Sédô-Gaz.

Lab. Robert et Carrière, 37, rue de Bourgogne, Paris. — Adral, Ampoules Pinceaux, Anacamphe, Bacté-intesti-phage, Bacté-coli-phage, Bacté-pyo-phage, Bacté-staphy-phage, Bacté-rhino-phage, Bacté-dysentéri-phage, Benzyanyl, Biocholine, Chlorakin, Comprimés Aqua-pura, Cyanure indolore Ercé, Néodispositif Ravaut, Dysurol, Endoxène, Ennego, Erцерhinol, Fibrinine, Gométer, Gométyl, Huile grise Ercé, Iodo-bismuth Ercé, Lipo-bismuth Ercé, Lobuline, Lysaxins L. M. L., Lysacrème L. M. L., Panphylase, Novarsénobenzol, Opsomyl « A » et « B », Ossical, Péráziodol, Phlyctol, Pommade Forgeue, Reclanol, Séno-Citral, Stannoxyol, Supparsol, Taenifuge Ercé, Tinctiodes, Tri-iodo-Ercé, Vaccin pneumo-entéro-staphylococcique de Weil et Dufour, Vaccins Renard, Xanthocot.

Lab. Roberts et Cie, 5, rue de la Paix, Paris. — Allcock's Porous Plaster, Antikamnia, Bemax, Bromidat, Calox, Coluval, Embrocation Roche, Lansoyl, Listerine, Liverine, Magnésie Henry, Panopepton, Pepsencia, Pinéoléum, Rinolac, Quinacinas, Quinolax, Ricigel, Salsanos, Sudyl.

Lab. Robin, 13, rue de Poissy, Paris. — Bismuthoidol Robin, Bromone Robin, Camphydryl Robin, Glycérophosphate Robin, Glykolaine Robin, Iodone Robin, Nucléarsitol, Nucléatol, Peptonale de fer Robin, Peptokola Robin, Strychnarsitol Robin, Sulfoidol Robin.

Lab. Robinet, Moret-sur-Loing (S.-et-M.). — Magnésio tubes Robinet.

Lab. Rachereau, Salbris (L.-et-C.). — Dolysine.

Pharmacie Rogé Cavaillès, 146, boul. Haussmann, Paris. — A노ide, Elixir iodépuratif Pépin, Suppositoires Rocav.

- Lab. Henry Rogier**, 56, boul. Péreire, Paris. — *Baume Delacour*, *Insuline*, *Kymosine Rogier*, *Levulose Rogier*, *Suppositoires Pepet*, *Uraseptine*, *Valbornine Rogier*, *Vitamine Rogier*.
- Lab. Albert Rolland**, 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris. — *Hepaphos*, *Hépatrol*, *Stomarol*.
- Lab. Pierre Rolland**, 127, bd St-Michel, Paris. — *Balmiga*, *Hypalène*, *Natrosyl*.
- Lab. Romon**, 6, rue Bridaine, Paris. — *Ampoules Romon*, *Forcival*, *Globules Romon*, *Limital*, *Magnogène*, *Tranquital*.
- Établ. Roques**, 36, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris. — *Delcaïne Roques*.
- Lab. Rosa**, 1, pl. Champerret, Paris. — *Chophytol Rosa*, *Cynurol Rosa*.
- Pharmacie Roussel**, 10, rue Washington, Paris. — *Tetranitrol Roussel*, *Trinitrine Roussel*.
- Lab. Routier**, 20, rue St-Lazare, Paris. — *Baume Duret*.
- Lab. Paul Roux**, 151, rue Lafayette, Paris. — *Fer Larcade*.
- Lab. Roux**, 58 rue de Maubeuge, Paris. — *Armosine*, *Arsallyl R. X.*, *Gastronaldine*, *Glucalcium R. X.*, *Magnétol Roux*, *Purgelettes Roux*, *Totaliode*, *Ur-Clar Blanc Bleu*, *Uri-magnétol*.
- Lab. du Rozoderme**, 11, rue des Deux-Ponts, Paris. — *Rozoderme*.
- Lab. Sabatier**, 10, rue Pierre-Ducreux, Paris. — *Fluodyle*, *Ouataplasme Dr Langlebert*,
- Lab. Salantale**, 42, rue Grandes-Arcades, Strasbourg. — *Ophthalmo-vaccin Salantale*, *Oto-vaccin Salantale*, *Ovules vaccin Salantale*, *Pommade-Vaccin Salantale*, *Recto-Vaccin Salantale*, *Rhino-Vaccin Salantale*, *Salantale*, *Suppo-Vaccin Salantale*, *Tracho-vaccin Salantale*.
- Lab. Salavert**, Ste-Foy-la-Grande (Gironde). — *Antinéase*, *Sulf-Y*.
- Lab. H. Salle**, 4, rue Elzévir, Paris. — *Agamétol*, *Bronchitol*, *Conjonctol*, *Elzévir dentition*, *Heracéol*, *Iodo-vitasins*, *Passival*, *Phleboguil*.
- Lab. du Salvoxy**, 237, rue Lafayette, Paris. — *Noviode*.
- Lab. du Sambul**, 22, rue St-Pierre, Evreux (Eure). — *Dermopode*, *Sambul*.
- Sté des Produits « Sana »**, Gaillac (Tarn). — *Pain massé Sana*, *Pâtes Sana*.
- Prod. Sandoz**, 3-5, rue de Metz, Paris. — *Allisatine Sandoz*, *Belladénal Sandoz*, *Bellafoline Sandoz*, *Calcium Sandoz*, *Félamine Sandoz*, *Gynergène Sandoz*, *Lobéline Sandoz*, *Optalidon Sandoz*, *Panthésine Sandoz*, *Sandoptal Sandoz*, *Scillarène Sandoz*.

- Prod. Sanova**, 29, rue de Liège, Paris. — *Hépatismine, Iodasclérine, Magnacalcine, Uricémine.*
- Lab. de la Santhéose**, 4, rue du Roi-de-Sicile, Paris. — *Santhéose.*
- Lab. A. Savigneux**, 63, rue Victor-Hugo, Lyon. — *Séro-Comprimés Mérieux.*
- Lab. Schmit**, 71, rue Ste-Anne, Paris. — *Galliodine, Mangaïne, Prélase.*
- Lab. des Prod. Scientia** (D^r E. Perraudin, pharmacien de 1^{re} classe), 21, rue Chaptal, Paris. — *Calcoléol, Diabétifuge, Digestonic, Globexine, Huile iodée Scientia, Oxymenthol Perraudin, Peptalmine, Peptalmine magnésinée, Quinéine, Staphylococcine Fraquet, Tricalcine.*
- Lab. Scott et fils**, 348, rue St-Honoré, Paris. — *Magnésie bismurée.*
- Lab. Seguin**, 165, rue St-Honoré, Paris. — *Capsules Joret et Homolle, Phosphofluor Beynel.*
- Sels du Jura**, 11, av. de l'Opéra, Paris. — *Sels du Jura.*
- Lab. Sephyda**, Chabeuil (Drôme). — *Sephydine.*
- Lab. Serindat**, 22, rue Poncelet, Paris. — *Phosphobrom, Phosphomagnésium.*
- Lab. J.-M. Serre**, 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux. — *Olkalan, Vermifuge Cornet.*
- Lab. Servier**, 25, rue Eugène-Vignat, Orléans (Loiret). — *Gaduase, Muxol, Ozodor, Pyri-pyridium, Spiralgine.*
- Lab. Sevenet**, 10, rue Le Chapelais, Paris. — *Hemagène Tailleur.*
- Lab. Sévigné**, 76, rue des Rondeaux, Paris (III^e). — *Ulcéobalnéine, Ulcéoplaque-Ulcéobande, Ulcéosine, Ulcéosol.*
- Lab. S. F. E. A. T.**, 15, r. Catulienne, St-Denis. — *C. B. K. Gaméttoxyl, Huile grise argentique SFEAT. (SFEOL), Oléovules, Suppositoires SFEAT, Stérobi, Trépobiur, Trilues, Tséantine.*
- Lab. du Siècle**, 94, rue Monge, Dijon (Côte-d'Or). — *Superdigestif Legrand, Super-nucléine Legrand.*
- Etabl. Silbert et Ripert**, 30, rue Bénédit, Marseille. — *Murones du D^r Robert Jacques.*
- Lab. Guy Simon**, 44, r. d'Inkermann, Lille. — *Essoforme, Essoforme Ephédrine, Carsédol.*
- Lab. Soudan**, 48, r. d'Alésia, Paris. — *Bromo-maisine, Euonymine Thibault, Iodo-maisine, Lactagol, Laxatifs Miraton, Oléocidase, Valérium Paul Thibault, Vasogènes Pearson.*
- Lab. A. Soulas**, 119, rue de Sèvres, Paris. — *Pectoral des Dames de France, Plagéine Soulas, Tannarsol, Tœnifuge des Dames de France.*
- Lab. Soulié**, 333, r. Vaugirard, Paris. — *Gernal.*
- **Specia** (Sté Parisienne d'Expansion chimique), 21, rue Jean-Goujon, Paris. *Acétylarsan, Alunozal, Anthéma, Ascialine, Balsoforme, Baume Rhodia, Cardyl,*

- Coryphédrine, Crisalbine, Diaphothorine, Dmélcos, Ergorone, Hariod, Gardenal, Gelobarine, Gonacrine, Huile de foie de morue médicinale suractivée Rhône-Poulenc Hyrganol, Moranyl, Néo Dmégon, Néo Dmelys, Neptal, Novarsénobenzol, Ovolecithine, Pâte Spécia, Pragmoline, Propidex, Propidon, Quinio-Storvasol, Rénaleptine, Rhodarsan, Rhodazil, Rhoféine, Rubyl, Rutonal, Sanedrine, Sanluol, Scurocaine, Souroforme, Soneryl, Slovaine, Stovarsol, Tabedo, Tecarine, Tochlorine, Tryparsamide, Urazine, Vaccins atoxiques stabilisés.
- Lab. Spès-Guiraud, 10, impasse Milord, Paris. — Elixir Spès du D^r Guiraud, Tubes du D^r Guiraud.
- Lab. de la Splénocarbine, 88, r. Duhesme, Paris. — Hydrocamphre, Splénocarbine.
- Prod. Stalys, 64, rue La Boétie, Paris. — Dermo Stalys, Dento Stalys.
- Sté des Lab. Sténé, 2, pl. des Vosges, Paris. — Bilifluine, Bouillon vaccin opératoire Sténé, Crésopirine, Flavurool, Hémato-iodine, Urifluine, Vaccin anti-pyogène Sténé, Vaccin anti-staphylococcique Sténé, Vaccin du professeur Minel, Vaccin opératoire Sténé, Vaccins Sténé.
- Lab. du Stomagyl, 143, cours de la Somme, Bordeaux. — Stomagyl.
- Lab. H. Stouls, 156, av. Victor-Hugo, Paris. — Pangastrol.
- Lab. Substantia, 13, rue Pagès, Suresnes. — Calmag-Na, Laraga, Véganine.
- Lab. Sulfo-Thiorine, 39, r. Fondaudège, Bordeaux. — Sulfo-Thiorine, Thiorine.
- Lab. de la Tamarine, 4, rte de Medoc, Le Bouscat. — Tamarine.
- Lab. H. Tavernier, 32, rue de l'Ouest, Paris. — Cinabre, Inhalo-bol, Inhalo-sel, Mancobène Mitroxyl, Phospho-Gaiacol Mary, Reconstituant Mary.
- Lab. du D^r Testart, Chalais (Charente). — Gérol, Opophytol, Oposérum.
- Lab. Teyssèdre, 34, faub. d'Angoulême, Limoges. — Sirop Teyssèdre.
- Lab. du Théovadil, 85, rue des Morillons, Paris. — Théovadil.
- Lab. A. Thépenier, 12, rue Clapeyron, Paris. — Amygladiastase, Bulgarine Thépenier.
- Lab. de Thérapeutique exotique, Arpajon (S.-et-O.). — Ifranol.
- Lab. de Thérapeutique générale, 48, rue de la Procession, Paris (XV^e). — Endopancrine, Holovarine, Insuline

(Votr Endapanerine), Insuline Phyloze (poudre et pommade).

Lab. Thévenot, 21, rue des Roses, Dijon. — Azigol, Borocatyl, Cholébaldine, Cosmargyre, Eupnéol, Jambodyl, Lactofermentine, Phoshémoquinol, Santurol, Sirop Belca, Thiocitran.

Lab. Thiriet et Cie, 26-28, rue des Ponts, Nancy. — Paroxyl.

Lab. G. Tinard 134, boul. Péreire, Paris. — Pangesyl, Salypsol.

Lab. du Dr G. Tissot, 34, boul. de Clichy, Paris. — Bronchodermine, Charbon Tissot, Diasto-pepsine, Magnecythine, Nervocithine (Hépatocithine), Supparyre.

Lab. Toraude, 22, rue de la Sorbonne, Paris. — Diurnal, Emapiirine, Flévar, Fruxatyl, Hemo-serosan, Hépatyl, Lactobactyl, Leucagine, Leucagitol, Levure B. 17, Néo-serosan, Néo-trépol, Quinarsan, Quinobromine, Rectagine, Réthragine, Riceyl Billault, Sérosan, Somnofan, Sornyal, Stomarine Billault, Trépol, Trépoquinol, Ultra-Levure.

Lab. Tronette-Perret, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris. — Aphlôine, Gouttes trivoniennes, Nisaméline, Oponucyl, Papaine, Romarantyl.

Lab. Tulivet, 52, rue de Poissy, St-Germain-en-Laye (S.-et-O.). — Céréaline, Cigarettes Zani, Chlorobaciline, Lacticholéine, Laxocholéine, Laxagélase, Panalaxol, Poudre Zani.

Lab. Unis-Spès, 14, rue Demarquay, Paris. — Algophagine, Gastiase, Hémostal, Hépatodiase, Nox, Vacciderm. Ter-codal.

Lab. Urbé (M. Laffargue, Ph^{ten}), Barsac (Gironde). — Comprimés Urbé.

Lab. de l'Uroïdine, 45, boul. Lafayette, Calais (P.-de-C.). — Uroïdine.

Lab. Uromil (M. Bellières, Dr en Ph^{te}), 19, r. Drouot, Paris. — Uromil.

Usine de Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — Cachet Lavoisier, Carnéose du Dr Spès, Dépurgatif Berry, Elixir supertonique Stella, Gargarinal, Iasthol, Manganéol, Neurogénéol, Potion du Dr Henry, Radiobiogyl, Vin de Beef Lavoisier, Vin surtonique du Val Notre-Dame, Vitaphorine.

Usines Chimiques des Laboratoires Français, 89, rue du Cherche-Midi, Paris. — Myovarsyl, Oxymuth S. A. O. A., Quinimulhol S. A. G. A., Prévarsyl Uclarsyl.

Lab. de l'Uvé-Grinex, 18, rue St-Amand, Paris. — *Folliculine Crinex, Uvé, Uvestérol.*

Lab. de l'Uvéoline (M. Ambard, Pharmacien), Carces (Var). — *Uvéoline. Uvéovules.*

Lab. du Valéromenthol, 10, rue Poncelet, Paris. — *Caoglands, Pancréanne, Valéromenthol.*

Lab. de la Valovarine, 64, r. d'Orsel, Paris. — *Valovarine.*

Lab. de la Valthène (A. Valat), 51, rue de Tourtille, Paris. — *Valthène.*

Lab. Vanda, 16, rue Ficatier, Courbevoie (Seine). *Aquasoluble, — Iosorbine.*

Lab. de la Varilaxine (M. Crestey), 164, rue St-Honoré, Paris. — *Rectoline, Varilaxine.*

Lab. J. Variot, 151 bis, Grande-Rue, Villemomble (Seine). — *Linadeline.*

Lab. des Vaso-Rhinol : voir Calmel-Domergue.

Lab. Vaudin et Guillaumin, 12, rue Charles-V, Paris. — *Elixir eupeptique Tisy, Prodynase, Quinotane Valguy, Vin de Baudon antiminio-phosphaté, Vitène.*

Lab. Vécór, 64, rue de la Folie-Mericourt, Paris. — *Blocs Vécór.*

Lab. du Végétol, 8, rue des Quatre-Fils, Paris. — *Végétol Fournier.*

Lab. F. Vellay, 116, av. Berthelot, Vienne. — *Biophylactine M. G., Eupnogénol.*

Lab. des Prod. Vely, 132, av. Victor-Hugo, Paris. — *Amphosthène, Disolurane, Eufosyl, Hypnovel, Kalmogastrol, Lipex, Néospasmodyl, Neuvaritol Pansomnine, Phénacodine Phosfodéine, Plexorine, Septométrol, Sodo-tétrane, Wismuthane.*

Cie française de la Vénécine, 7, rue des Italiens, Paris. — *La Vénécine.*

Lab. Venot, 139, av. Emile-zola, Paris. — *Bain Salvia, Pilules Salvia,*

Lab. opothérapique E. Vergelot, 163, rue de Flandre, Paris. — *Ampolases, Amyliodine, Déméteros, Opolases, Mangralines, Matéine Dufert, Morrhuxine, Paquets P. C. L. Nucléasine, Sédo Viète, Siforcina. Sirop Viète, Splénose, Zistazine.*

Lab. Verne, 13, rue du Dr-Mazets, Grenoble (Isère). — *Bolde Verne, Pulmoverne.*

BIU SANTE POLE PHARMA PARIS



D

088 213110 8

